

Latridius.

1. L. fusculus.
Prope Barnaul.
2. L. pubescens.
Ibidem frequens.
- 3.... species plures dubiae.

Sylvanus.

1. S. unidentatus.
Prope Barnaul passim.
2. S. sexdentatus.
Ibidem rarus.

Cucujus.

1. C. depresso.
Prope Salair et Riddersk passim.

L O N G I C O R N E S.

Spondylis.

1. S. buprestoides.
Prope Barnaul et Salair frequens.

Prionus.

1. P. brachypterus m.
Antennis serratis, thorace trispinoso, castaneus, elytris abbreviatis, apice singulatim rotundatis. Long. 16 — 18 l. lat. 6 — 7 l. — Supra parum nitidus, subtus nitidior. Caput latum, ruguloso-punctatum, modice convexum, medio canaliculatum, labro lato, brevi, impresso, apice

subtruncato, ciliato; mandibulis basi rectis, apice cruciatis, inermibus; oculis lunatis. Antennae longitudine dimidii corporis, articulo tertio elongato, 12 articulatae, acute et apice profundi serratae, articulis omnibus laevibus. Thorax longitudine duplo latior, antice et postice griseo-ciliatus, apice emarginatus, lateribus declivis, marginatus, trispinosus; spina apicali lata reflexa, intermedia angusta, basali abbreviata, basi sinuatus, declivus, margine vix reflexus; supra medio convexus, ruguloso-punctulatus, medio late et leviter impressus. Scutellum rotundatum, punctatum. Elytra ab humero prominulo ad apicem sensim attenuata, apice singulatim rotundata, tertium vel quartum abdominis segmentum non superantia; supra deplanata, leviter coriacea, striis 3 elevatis, obsoletis. Alae corpore breviores. Corpus subtus sublaeve, glabrum, abdominis segmentis magnis, apice, ani medio late canaliculato, margineque pallidis. Pedes longiusculi, compressi, tenues, laeves, tarsis omnibus angustis, subtus glabris et medio canaliculatis, apice utrinque spina armatis. Duo specimina feminea capta, alterum ad fl. Irtysch, alterum in deserto Kirghisico. Primo intuitu P. coriaceo affinis; at notis indicatis diversissimus.

2. P. depsarius.

In sylva Salairensi passim.

Purpuricenus.

1. P. Ephippium Sch.
Schönherr. l. c. III. app. p. 157. — Cerambyx