

latatus, totus ater, profunde et rugose punctatus, flavescenti-pilosus. Scutellum nigrum, pilosum. Elytra profunde punctata, sanguinea, apice attenuata, dehiscentia, emarginata. Corpus subtus nigrum, flavescenti pilosum, pedibus nigris.

.701) LEPTURA STRAGULATA *Illigeri*: thorace basi dilatato, medio gibbo, punctata, atra, flavescenti pilosa, elytris plaga triangulari scutellari vittaque marginali testaceis, apice oblique truncatis. Habitat in Lusitania.

Magnitudine L. cinctae. Caput nigrum, flavescenti-pilosum, antennis nigris. Thorax oblongus, lateribus obtuse rotundatus, apice angustior, basi coarctatus, angulis rursus prominulis obtusis, dorso convexus, totus niger, punctatus, flavescenti-hirtus. Scutellum nigrum. Elytra apicem versus angustiora, apice oblique truncata, tota profunde et confertim punctata, flavescenti-pilosa, atra: macula triangulari scutellari et vitta marginali ante apicem abbreviata testaceis. Corpus subtus cum pedibus nigrum, pubescens.

.702) LEPTURA ABBREVIATA *Zenkeri*: thorace subovali, punctata, nigra, subtus argenteo-holosericea, elytris vitta abbreviata testacea. Habitat in America septentrionali.

Statura L. sexguttatae, paullo major. Caput cum antennis nigrum, griseo-pubescens.

Tho-