

breviores, nigrae, articulo primo clavato, secundo minuto, tertio elongato, reliquis obtrigonis. Thorax transversus, lateribus rotundatus, basi coarctatus, ater, nitidus, profunde punctatus, plagis tribus dorsi laevibus. Scutellum atrum. Coleoptera thorace haud latiora, oblonga, plana, lateribus marginata, medio obtuse longitudinaliter elevata, punctata, apice truncata, flava, plaga oblonga communi dorsali apiceque atris. Corpus subtus nigrum, griseo-pubescentis, abdominis segmentis margine albido ciliatis.

.685) *CALLIDIUM INSUBRICUM Ziegleri*: punctatum, atrum, elytris coriaceis, aeneis. Habitat in Italia.

Statura Call. violacei sed multo majus, C. clavipes adhuc superans. Caput canaliculatum, atrum. Antennae corporis longitudine nigrae, articulis primis apice subtus spinosis. Thorax transversim ovatus, planus, vage punctatus, ater. Coleoptera plana, apice magis deplanata latiora, coriacea, atro-coerulea, aeneo-nitidula, lineis utrinque duabus elevatis. Corpus subtus atrum. Pedes atris, femoribus subito et valde clavatis.

.686) *CALLIDIUM MACROPUS Ziegleri*: thorace spinoso, hirto, punctatissimo, atrum, opacum, elytris planis, punctato-rugosis. Habitat in Austria, Curonia.

Magni-