

hirtus, niger. Elytra abdominis longitudine, apice angustiora, punctata, nigra. Corpus subtus hirtum, nigrum, abdomine rufo. Pedes nigri, femoribus apice inflatis, basi fulvis.

696) *LEPTURA CONSTRICTA*: thorace spinoso, basi apiceque constricto, punctata, atra, elytris convexis, oblongis, (maris) flavo-maculatis apice rotundatis, aut (feminae) immaculatis, apice truncatis. Habitat in Sibiria.

Statura L. interrogationis, sed paullo major. Caput punctato-rugosum, atrum, opacum, antennis corpore brevioribus, nigris. Thorax oblongus, basi apiceque constrictus, lateribus medio spinosus, dorso gibbus, canaliculatus, totus ater, opacus, griseo subpubescens, confertim punctatus. Coleoptera thorace duplo fere latiora, apice parum angustiora, convexa, confertim punctata, maris macula obliqua humerali, arcu medio et fascia ante apicem testaceis variegata, apice obtuse rotundata, feminae tota atra, apice truncata. Corpus subtus cum pedibus nigrum, griseo-sericeum.

697) *LEPTURA INSITIVA Böberi*: thorace subspinoso, nigra, femoribus ferrugineis, elytris fastigiatis, testaceis: vitta laterali suturaque fuscis, apice oblique truncatis. Habitat in Russia meridionali.

Statura fere L. attenuatae. Caput magnum, punctatum, pubescens, nigrum, palpis flavis. Anten-

Antennae nigrae, apice in nostro specimine mutilatae. Thorax oblongus, basi apiceque constrictus, lateribus medio obtuse spinosus, dorso transversim convexus, canaliculatus, totus ater, griseo-pubescens. Elytra elongata, angusta, apicem versus fastigiata, punctata, pallide testacea, vitta lata laterali suturaque fuscis, apice oblique truncata. Pectus nigrum, flavescenti-pubescens. Abdomen ferrugineum. Pedes nigri, femoribus medio ferrugineis.

698) *LEPTURA QUAGGA Zenkeri*: thorace basi apiceque constricto, aureo tomentosa, antennis pedibusque rufis, elytris holosericeo-atris: fasciis quatuor aureis, prima lunari. Habitat in America septentrionali.

Affinis L. zebratae, sed antennis obscure ferrugineis, thorace basi constricto, et elytris holosericeis dissimilis. Caput aureo-tomentosum, clypeo et ore rufis. Antennae obscure ferrugineae. Thorax brevis, gibbus, subglobosus, basi apiceque constrictus, angulis posticis iterum porrectis, extensis, aureo-tomentosus, plaga media transversa denudata atra. Elytra breviuscula, apicem versus parum et sensim angustata, apice truncata, parum convexa, holosericea, atra, fasciis flavo-aureis, tomentosis: prima lunari, secunda angusta ante medium, tertia infra medium, quarta ante apicem. Corpus subtus tomentosum, flavo-aureum, pedibus rufis.