

COLEOPTERORUM SPECIES

NOVAE AUT MINUS COGNITAE,
DESCRIPTIONIBUS ILLUSTRATAE,

AUCTORE

E. F. GERMAR,

PHIL. DR. MINERAL. PROF.

CUM TAB. AEN. II.

HALAE,

IMPENSIS J. C. HENDELII ET FILII.

1824.

519

694) *CALLIDIUM (Clytus) TEMESIENSE*
Kollari: thorace globoso, flavo-fasciato, hirtum, piceum, antennis pedibusque fulvis, elytris puncto pone basin fasciisque tribus flavis, prima antrorsum arcuata. Habitat in Transsylvania.

Parvum, *C. gazella* duplo fere minus et angustius, magis hirtum. Caput nigrum, fronte flavo-pubescente. Antennae fulvae. Thorax globosus, punctato-rugosus, piceus, albido-hirtus, margine antico posticoque flavis. Scutellum flavum. Elytra angusta, punctata, pilis nigris setosa, basi albido-hirta, apice subtruncata; picea: macula obliqua pone basin, fascia media pone suturam antrorsum curvata, scutellum haud attingente, altera recta infra medium apiceque flavis. Pectus piceum, flavescenti-hirtum, pleuris et striga laterali flavis. Abdomen piceum, segmentis margine flavis. Pedes fulvi, femoribus posterioribus ante apicem obscurioribus.

695) *NECYDALIS FEMORATUS Steveni*: elytris integris, apice angustatis, hirtus, niger, abdomine rufo, femoribus basi fulvis, apice inflatis nigris. Habitat in Rossia meridionali.

N. rufo duplo minor. Caput punctatum, hirtum, atrum, labro testaceo. Antennae pilosae, nigrae. Thorax transversus, basi apiceque coarctatus, dorso impressus, tricallosus, hirtus,