

G. SAPERDE. SAPERDA. Fabr.

S. CENDRÉE. *S. cinerea*. Gory. Pl. 74.

S. cinerea, antennis thorace vittis duabus brunneo-cinereis ;
elytris planis , punctulatis , lateribus brunneo-cinereis.

Longueur, 27 millim. ; largeur, 6.

D'un blanc cendré pubescent. *Tête* finement ponctuée, couverte d'une pubescence blanchâtre. *Corselet* presque carré, avec deux bandes longitudinales brunes. *Écusson* carré, arrondi postérieurement, blanc. *Élytres* carrées à leur base, méplates, allongées, allant en se rétrécissant jusqu'à l'extrémité, qui est arrondie; elles ont quelques lignes longitudinales de points, et leurs bords latéraux sont d'un brun mêlé de grisâtre. Dessous du corps et pattes couverts de cette pubescence blanchâtre, piquetés de petits points noirs (femelle).

Cette espèce sera placée entre les *S. vittigera* de Fabricius et *Guerinii* de Brème (*Rev. zool.*, 1840, p. 277)¹.

De Constantine.

¹ La femelle de cette dernière vient d'être décrite et figurée par M. Erichson (*Reisen in Algier, etc.*, par Wagner, vol. III, p. 183, n. 43, pl. VIII, 1841) sous le nom de *Saperda* (*Phytacia*) *glauca*.

(G.-M.)



Saperda cinerea, Gory.