

nui densa cinerea obducta, unde fusco-cinerea vel plumbea apparent; punctis sub-seriatis impressa, lineisque 2 vel 3 sub-elevatis in singulo notata; in ipsa basi interiore juxta scutellum, macula magna flavo-testacea, postice bifida. Corpus subtus flavo-testaceum sub-læve, pectore pallido-pubescente, interdum litura laterali nigra notato; abdominis tria prima segmenta plaga magna media, quartum macula angusta baseos nigris; quintum canaliculatum, apice nigrum. Pedes breviusculi flavo-testacei, tenuerubescentes, tarsis obscurioribus.

G Y L L E N H .

260) **SAPERDA MOLYBDENA**: parva, filiformis, cœruleo-chalybæa tota, unicolor; supra punctatissima, subitus subtilissime obsolete strigosa; antennis longitudine corporis.

Habitat Hale Saxonum. Dom. Sturm. Mus. Schönh.

Fere minima hujus generis, **S. præusta** paullo longior sed duplo fere angustior, filiformis unicolor, parte cinereo-pubescentis. Antennæ corpore vix longiores, nigro-fuscæ, subtilissime pallido-pubescentes, interjectis pilis longioribus sparsis subtus. Caput thorax & elytra cœruleo-chalybea, æqualiter confertissime punctata. Thorax elongatus cylindricus; elytra valde elongata, linearia; os & oculi nigri. Elytra apice cinereo-pubescentia; scutellum albido-pubescentis. Corpus subtus coneolor magis nitidum, subtilissime obsolete strigulosum, cinereo-pubescentis. Pedes mediocres, graciles, læves, fusco-chalybæi, tenuerubescentes.

D A L M .

261) **SAPERDA KIRBYI**: brevior, nigra, thorace angulato-dilatato, supra fortius rugoso-punctato, luteo-tri-vittato, elytris umbrinis unicoloribus, apice singulatim rotundatis.

Habitat in Lusitania. Dom. Lundstedt. Mus. Schönherr & Gyllenhal.

*Sap. Cardui* affinis, sed latior & brevior, statura fere **S. Seydlii**. Caput breve latum nigrum, confertim punctatum, pube densa lutea testum, immixtis pilis longioribus nigris erectis; os & palpi nigri; oculi lunati brunnei, modice prominuli; frons inter antennas profunde sulcata; verticis latera nuda, sed in ejus medio vitta lutea, thoraci contigua. Antennæ corpore parum longiores, setaceæ, articulo primo magno elon-

gato, secundo minuto transverso, totis nigris; sequentibus 3-12, sensim angustioribus, pallide testaceis, parum albido-pubescentibus, apice sub-crassioribus atroholosericeis, subtus pilis longioribus nigris ciliatis. Thorax brevis transversus, antice angustior, basi apiceque truncatus, lateribus pone medium valde dilatatus, subangulatus, supra in medio modice convexus, intra basin & apicem constrictus, totus niger, sub-nitidus, sat profunde confertim rugoso-punctatus, pilis longioribus erectis nigro-fuscis adspersus; in medio dorsi vitta inæqualis e pube densa saturate lutea, & alia ejusmodi in utroque margine lateral. Scutellum transversum, pube densa lutea omnino testum. Elytra thorace multo latiora, humeris rectangulis, & illo quintuplo longiora, apice singulatim rotundata, dehiscentia, supra modice convexa, æqualia, nigra, sed materia umbrina opaca adglutinata omnino testa, ipsa tantum basi nuda; pubescencia tenui pallescente æqualiter adspersa, ad humeros granulata, juxta basin præterea profundius, versus posteriora sensim subtilius confertissime punctata. Corpus subtus nigrum, sub-nitidum, subtilissime coriaceum, pube densa depressa flavescente, obsolete fusco-punctata, testum. Pedes mediocres nigri, pube tenui densa cinereo-flavescente testa.

Dom. Guit. Kirby, Rector Barhamiæ, Monographia Apum Angliæ excellentissimæ, plurimumque Operum Entomologicorum magni pretii, Author, summa cum laude nominandus.

G Y L L E N H .

262) **SAPERDA SPENCI**: longior nigra, thorace lateribus sub-rotundato, supra subtilissime rugoso-punctato, luteo-tri-vittato, elytris umbrinis unicoloribus, apice sub-acuminatis.

*Saperda Asphodeli*. Latr. Illig. tesse Dom. Dejean.

Habitat in Gallia meridionali. Mus. Schönherr & Gyllenhal.

Magnitudo, statura & affinitas **S. Cardui**, sed elytra unicolora, umbrina, opaca, apice sub-acuminata, cum in **S. Cardui**: elytra nigra, sub-nitida, pilis ferrugineo-flavescentibus fasciulatim variegata, apice singulatim rotundata; antennæ etiam in **S. Spencii** longiores, tenuiores, &c. — Caput quoad structuram, pubescientiam ejusque colorem, omnino ut ad **S. Kirbyi** descriptum, modo punctura subtilior & oculi saturatius.