

31. *Cyrtoclytus capra* Germ. Allmän vid Minusinsk, Verchne-Sujetuk, Osnatjennaja och Abakanska bruket. E. H.

*32. *Anoplistes minutus* n. sp.

Niger, elytris lateritio-rubris; capite prothoraceque parce albido-pubescentibus, illo antice subtiliter-, inter oculos rugoso-punctato; prothorace longitudine paullo latiore, ante basin leviter coarctato, utrinque impressione longitudinali basin versus convergente, quam vertice multo fortius ruguloso-punctato, lateribus medio obtuse angulatis; elytris macula basali subtriangulariter rotundata, flavorubra, in hac fortiter punctatis, ceterum subtiliter et dense ruguloso-punctatis, dense atque aequaliter albo-pubescentibus; corpore subtus sat subtiliter punctulatus et albido-pubescentis. Long. 9 m. m.

♀ Antennæ corpore distincte (circiter $\frac{1}{4}$) breviores, pygidio margine postico dense testaceo-imbriato.

Svart, hufvudet framtill lätt, pannan och främre delen af hjessan temligen djupt punkterade, med sparsam och uppstående hvit behåring. Prothorax något bredare än lång, framtill och baktill afstött, vid bakre randen något insnörd, sidoranden med en liten trubbig knöl, framåt och bakåt måttligt afsmalnande, vid främre randen nästan bredare än vid bakre. Den är skrynkligt punkterad, på hvardera sidan bakom midten med en svag emot basen konvergerande intryckning, på undre sidan med sparsam och åtliggande behåring. Täckvingarne svarta, sidoranden och en rundad fläck inom skuldran rödgula, skilda från hvarandra genom ett temligen bredt svart band. Punkteringen inom skulderfläcken djup, för öfrigt äro täckvingarne temligen tätt och likformigt skrynkligt punkterade. Den hvita behåringen på elytra är tät, kort och likformig, hvarigenom täckvingarne erhålla ett gråskimrande utseende. Kroppens undre sida med åtliggande hvit behåring, meso- och metasternum lätt, prosternum starkare, svagt skrynkligt punkterade. Bukringarne mycket lätt punkterade, försedda med hvit behåring.

Denna art synes stå *A. Halodendri* närmast, från hvilken den dock genom sin mindre kroppsstorlek, kortare antenner och genom sin punktering lätt kan skiljas.

Bland de utaf G. N. Potanin uti China och Mongoliet insamlade samt af L. Ganglbauer beskrifna Cerambyciderna (Труды русскаго энтомологическаго Общества, Томъ XXIV) förekommer en ny art *A. mongolicus*, från hvilken den i fråga varande arten, om ock erbjudande vissa likheter, dock lätteligen skiljes genom kroppstorlek, genom den temligen smala gulröda sidoranden längs elytra och genom den rundade från den förra skilda basalfläcken, genom punkteringen och den mera likformiga hvita pubescensen på elytra.

Ett enda exemplar (♀) taget i Mongoliet invid Bjakows handelsfaktori vid floden Kemschik af Ehnberg, den 19 sept.

33. *Criocephalus rusticus* L. Tagen i flertal vid Minusinsk, dessutom i Osnatjennaja. E. H.

34. *Asemum striatum* L. Ett exemplar från Abakanska bruket. H.

35. *Spondylis buprestoides* L. Från Minusinsk och Osnatjennaja. E. H.

Lamiitae.

*36. *Neodorcadion quinquevittatum* n. sp. Nigrum, nitidum; capite lateribus cinereo-pulverulento, medio sulcato, antice mediocriter, vertice fortius atque densius ruguloso-punctato; antennis unicoloribus, articulo primo sparse et subtiliter punctato, antè apicem plica transversa circulari, ceteris rufotestaceis; prothorace ruguloso-punctato, sulco medio, ad basin impressione transversa instructo; elytris oblongo-ovatis, nitidis, margine laterali vittisque quatuor albis: tertia et quarta, eodem modo prima et secunda postice conjunctis; carinis quinque, suturali, humerali tribusque inter has instructis; corpore subtus albido-pulverulento; pedibus nigris, albido-griseis. Long. 17 m. m.

Kroppen svart, på undre sidan med hvitgrå behåring, hvilken ock sträcker sig längs sidorna af hufvudet. Deremot är hufvudets öfra sida, likasom prothorax kal, glänsande. Punkteringen på hufvudets främre del ganska djup.