

1—4 flavis; oculis magnis prominentibus. Thorace cylindrico, lateribus parum ampliatis, angulis omnibus obtusis, postice parum angustato, fortiter disperse punctato, parum fulvo piloso, flavorufescente, macula discoidali post marginem anticum postice acuminata angulisque anticis aeneo-nigris. Elytris aurichalceis, convexis, basi thoracis latitudine in basi, lateribus parum ampliatis, apice truncato-rotundatis, disperse fortiter (fortius quam in thorace) punctatis, punctis pilum flavum gerentibus. Pedibus flavis.

Variat macula thoracis late ad basin producta, femoribus basi nigris.

Taschkent Turkestanicae duo specimina a Dom. Hauser data.

Mordellidae:

9. *Anaspis (Larisia) flavipennis* Heyden. Corpore subtus, capite, thorace basi rufa excepta, scutello nigris. Antennis articulis 1—5 basalibus flavis, 6—8 brunneis, 9—10 nigris clavam formantibus. Capite thoraceque lucidulis impunctatis. Elytris flavo-fulvis, lucidis, tenuiter transversim strigosis. Tibiis tarsisque anticis flavis, apicibus obscuratis, femoribus nigris; pedibus intermediis et posticis femoribus nigris, apice tibiisque rufis, tarsis obscuratis. Unguiculis flavis. — Long. $1\frac{2}{3}$ —2 mill. Colore corporis valde distincta.

Kyndyr-Tau Turkestanicae, specimina duo a Dom. Hauser missa.

Cerambycidae:

10. *Leptura tripartita* Heyden. Ex affinitate *L. cordigerae* Füssly. Tota nigra, elytrorum parte prima dimidia sanguinea, tibiis anticis intermediisque flavo-rufis, basi apice tarsisque obscurioribus, tibiis posticis apice indistincte rufis. Supra parce flavo-rufescente, in parte nigra elytrorum subtusque parce griseo-flavescente pilosa. Thorace minus parum dense punctato quam in *L. cordig.*, lateribus minus dilatatis, linea mediana impressa nulla. Elytris longioribus magis parallelis, in parte rufa fortius, in parte nigra multo subtilius punctatis, in apice oblique truncatis ut in *L. cordig.* Antennis longissimis, coxas posticas superantibus. Abdomine apice rufotincto. — Long. 16 mill. (elytris 11, in *cordig.* 10). Femina unica e Syria a Dom. Doct. Staudinger missa.

11. *Clytus bifarius* Heyden. Ex affinitate *Cl. ciliciensis* Chevr. sed major, opacus, thorace multo minus asperato. Capite thorace toto nigris, fulvo parce villosis, thoracis basi linea tenui