

## Quelques nouvelles espèces du sous-genre *Compsodorcadion* Ganglb.

Par

B. E. Jakowleff.

---

### **Dorcadion pantherinum**, sp. n.

♂. Corps guère large; tête relativement étroite, à joues peu saillantes; front échancré en arc au bord antérieur; cavité frontale large, prolongée presque jusqu'au bord antérieur; toute la surface de la tête traversée par un sillon longitudinal linéaire; parties latérales, vertex et cavité frontale densément revêtus de duvet blanchâtre; seules les parties en relief du front, qui se dirigent de la base des antennes au bord antérieur de la tête, sont dénudées et couvertes de ponctuation clair-semée et de rares soies nairâtres; vertex avec les 2 bandes noires habituelles, étroites et parallèles, un peu divergentes en avant. Labre couvert de fine ponctuation et de longues soies fauve roussâtre. Antennes n'atteignant pas l'extrémité du corps, glabres, brillantes, seulement les derniers articles revêtus de duvet fauve obscur; 1-er article faiblement épais, un peu plus court que le 3-e, rouge roussâtre, assez densément finement ponctué et garni de rares soies roussâtres; les autres articles noirs.

Pronotum un peu plus large au bord postérieur que long, convexe au milieu; épines latérales fortes et aiguës, à extrémité réfléchie et dirigée en arrière; surface densément revêtu de duvet à coloration blanche dominante; celle-ci forme notamment une large bande médiane, divisée en deux par une très fine petite côte presque linéiforme noire, polie et brillante, et une très large bande marginale de chaque côté; les deux bandes discoïdales noires relativement étroites, élargies après le milieu et fortement rétrécies vers le bord postérieur; on voit derrière les épines latérales plusieurs points noirs dénudés et quelques longues soies; le prosternum forme, en dessous des épines latérales, des reliefs plats, dénudés et brillants, fortement ponctués. Ecusson très petit, étroit, triangulaire, lisse et brillant.

Elytres allongés, assez étroits, graduellement élargis, derrière les épaules, jusqu'au dernier tiers de la longueur; surface convexe, avec 3 côtes dénudées, dont l'humérale est la plus développée et couverte à la base de fortes petites épines pointues; épaules arrondies; région intrahumérale à peine distinctement concave. Fond des élytres noir velouté avec 5 paires de bandes longitudinales blanches; la suturale très étroite, linéiforme, étroite; les deux dorsales larges mais très interrompues, formant des taches séparées de contour irrégulier, la 1-re n'atteignant pas, d'un peu, l'extrémité des élytres, la 2-e se terminant avant le dernier tiers de leur longueur; l'humérale également large, entière, à bord externe irrégulier; la marginale de forme très irrégulière et séparée parfois à son bord interne en des taches isolées.

Pattes longues, assez robustes, roux rougeâtre, tarses noirs, courts, le 1-er article des postérieurs aussi long que le 4-e; fémurs parfois noirâtres à l'extrémité; brosse de poils aux tibiaux intermédiaires jaune roussâtre, tibiaux intermédiaires et postérieurs assez densément revêtus de soies de la même nuance; on distingue sur les fémures un duvet continu blanchâtre.

Dessous du corps revêtu de duvet blanc-grisâtre qui se perd facilement, de sorte que le milieu du ventre est généralement dénudé, avec une très fine ponctuation; segment anal revêtu en dessus de soies noires, en dessous de soies rous-sâtres.

Long. 21. larg. élytr. 7 mm.

*Steppes Kirghises* entre Kazalinsk et Karkaralinsk (W. Bateson! 1887).—Deux exemplaires ♂ (coll. P. Sémenow).

---

Le groupe des *Compsodorcadion* à 2 bandes dorsales aux élytres comptait jusqu'à présent 3 espèces propres à l'Asie centrale: *D. abakumowi* J. Thoms., *D. laterale* B. Jak., *D. globitorax* B. Jak.; les collections de St. Pétersbourg renferment deux autres espèces du même groupe, encore inédites, provenant du même pays. Il me semble utile de faire précéder les description de ces nouvelles espèces d'un tableau synoptique destiné à compléter celui que j'avais publié en 1895 (cf. *Horae Soc. Ent. Ross.*, XXIX, p. 282).

♂. Corps entièrement revêtu d'un duvet noir ou brunâtre, élytres avec 2 bandes dorsales blanches, dont l'externe est entière, tandis que l'interne offre de nombreuses interruptions et disparaît même, parfois, entièrement. 1-er article des antennes visiblement plus long que le 3-me.

♀. Même coloration que chez les ♂, à l'exception de *D. tschitscherini*, dont les ♀ présentent une coloration spéciale.

1 (4). Bande marginale blanche des élytres large, à bords latéraux réguliers, droits.

2 (3). Antennes et fémurs noirs. Corps plus large; tête grande. Duvet général de la surface noir; pronotum entièrement revêtu de duvet qui dissimule la fine ponctuation de la surface. 1-re bande dorsale des élytres parallèle à la bande humérale, ne s'y réu-

nissant pas à la base; 2-e bande dorsale prenant naissance à la base-même des élytres.

**D. abakumowi** J. Thoms.

- 3 (2). 1-er article des antennes et fémurs roux. Tête assez petite, corps plus étroit. Duvet général de la surface brun-roussâtre. Pronotum très grossièrement rugueux-ponctué et revêtu de duvet diffus. 1-re bande dorsale se réunissant, à la base, à la bande humérale; 2-e bande dorsale n'atteignant pas la base des élytres.

**D. sokolowi**, n. sp.

- 4 (1). Bande marginale blanche des élytres large, à bords irrégulièrement denticulés.
- 5 (8). Antennes noires. Surface du corps revêtue, outre le duvet noir général, de longs poils noirs.
- 6 (7). ♂. 3-e article des tarses intermédiaires avec des lobes largement arrondis. Tarses postérieurs très longs et étroits, le 1-er article de moitié plus long que le 4-e. Dessus des élytres tout-à-fait plan dans toute leur longueur; 2-e bande dorsale souvent à peine apparente. Pattes rousses, base des fémurs et l'extrémité des tibias noirâtres.

♀. Elytres avec des bandes alternantes blanches et d'un roux pâle, avec des taches séparées noires, de forme irrégulière, le long de la suture. 3-e article des tarses intermédiaires avec des lobes aigus.

**D. tschitscherini**, n. sp.

- 7 (6). ♂. 3-e article des tarses intermédiaires avec des lobes aigus (chez la ♀ de même). Tarses postérieurs assez larges, courts, le 1-er article aussi long que le 4-e. Elytres faiblement convexes, visiblement déclives en arrière; 2-e bande dorsale les traversant presque entièrement. Fémurs et l'extrémité des tibias noirs.

♀. Elytres très larges et convexes, colorés comme chez les ♂.

**D. laterale** B. Jak.

♂ (5). Base du premier article des antennes et pattes rouges, extrémité des fémurs et des tibias noirâtre. Surface du corps sans poils spéciaux. Thorax très convexe. 1-er article des tarses postérieurs beaucoup plus long que le 4-e. La plus grande espèce de ce groupe.

**D. globitorax** B. Jak.

**Dorcadion sokolowi**, n. sp.

♂. Corps étroit; assez convexe; élytres entièrement revêtus d'un duvet brun-roussâtre, avec 5 bandes blanches dont l'extérieure (latérale) est plus large que les autres et à bord interne rectiligne. Premier article des antennes et pattes, moins les tarses, entièrement d'un rouge roussâtre. Long. des élytres  $10\frac{1}{4}$ , larg.  $5\frac{1}{2}$  mm.

♀. Même coloration que chez le ♂; élytres plus convexes et plus larges. Long. des élytres 11, larg. 7 mm.

♂. Tête assez petite, étroite; joues faiblement convexes; front plat, faiblement échancré au bord antérieur, couvert de fine ponctuation éparses et de poils adhérents roussâtres très fins; impression frontale étroite mais assez profonde; vertex rugueusement ponctué, avec un relief lisse de chaque côté du fin sillon linéaire longitudinal, qui traverse toute la tête. On remarque, sur le fond clair de l'impression frontale, deux étroites petites bandes noires-veloutées. Labre de forme ordinaire, couvert de longs poils d'un brun-roussâtre obscur.

Antennes courtes, n'atteignant pas l'extrémité du corps, glabres au milieu, revêtus vers l'extrémité de poils bruns-roussâtres; le 1-er article visiblement plus long que le 3-e, couvert de très fine ponctuation et de longs poils jaunâtres.

Pronotum court, plus large au bord basal que long, assez convexe, grossièrement rugueux-punctué, avec un étranglement visible derrière le bord antérieur et une petite épine pointue de chaque côté aux bords latéraux; le disque en est revêtu de rares poils bruns roussâtres, qui se perdent facilement; les bords latéraux et un très menu sillon longitudinal au milieu sont blancs. Ecusson très petit, triangulaire, arrondi à l'extrémité.

Elytres étroits, quatre fois aussi longs que le prothorax, légèrement arrondis aux côtés, assez faiblement rétrécis en arrière, l'extrémité de chacun largement arrondie; le maximum de convexité est situé au deuxième tiers de la longueur; côtes très faiblement convexes et dissimulées sous le duvet général; côte humérale faiblement imprimée à la base, conjointement avec la partie attenante de la bande humérale; les épaules-même légèrement convexes, arrondies. Chaque élytre avec 5 bandes longitudinales: une suturale, étroite; deux dorsales, dont l'interne (2-e), également étroite, n'atteint ni la base ni l'extrémité des élytres; l'externe (1-re) à peine plus large que l'interne et plus rapprochée de cette dernière que de la bande humérale, légèrement arquée, en avant, vers l'épaule d'où elle part conjointement avec la humérale et la rejoint ensuite de nouveau immédiatement devant l'extrémité; bande humérale un peu plus large que les autres, bords latéraux des élytres occupés par une large bande à bords réguliers et droits, graduellement rétrécie en arrière. Toutes les bandes blanches sont entières, seulement la deuxième dorsale (interne) est parfois interrompue chez les ♀; à la base des bandes humérale et 1-re dorsale (externe) et surtout de la latérale ressortent distinctement les points noirs et glabres de la ponctuation dissimulée sous le duvet général de la surface. Il y a entre la bande suturale et la deuxième dorsale (interne) une bande noire veloutée, détachée chez les ♀ en plusieurs taches isolées.

Pattes rouges-roussâtres à tarsi noirs, dépourvues de du-

vet général, garnies (les tibias postérieurs surtout) de rares poils roux; la brosse de poils au bord externe des tibias intermédiaires d'un brun roussâtre obscur. Pattes grêles; tarse postérieurs comprimés, étroits, le 1-er article un peu plus long que le 4-e.

Le premier segment abdominal produit antérieurement une saillie en pointe triangulaire. Dessous du corps revêtu d'un épais duvet blanc-grisâtre, l'abdomen—de poils plus rares.

*Prov. de Sémipalatinsk* (J. Ingenitzky!).—Trois exemplaires ♂ ♀ (coll. N. Sokolow).

### **Dorcadion tschitscherini**, n. sp.

♂. Corps étroit; tête assez petite à joues peu saillantes; front plat, triangulairement échancré au bord antérieur, couvert d'une double ponctuation assez dense et de soies rousses semi-adhérentes; vertex et cavité frontale longitudinalement traversés d'une étroite et assez profonde rigole qui se prolonge jusqu'au bord antérieur en forme de trait linéaire; sur le vertex les bords de la rigole sont longés de reliefs parallèles en forme de côtes ou de tubercules longitudinaux obtus; une bande médiane au front (parfois large et atteignant le bord antérieur), les côtés de la tête, les orbites et une petite bande longitudinale sur le vertex blancs; cette dernière est longée de deux larges bandes noir voluté. Labre faiblement échancré, avec de longues soies rousses. Antennes grêles, n'atteignant pas l'extrémité du corps, revêtues de petits poils et de soies fauve obscur; on remarque parfois un duvet blanc grisâtre à la base du 3-e et 4-e article; 1-er article épaissi, assez fortement ponctué et considérablement plus long que le 3-e.

Pronotum court, un peu plus large au bord postérieur que long, convexe (notamment en arrière), à épines latérales grêles mais longues, dirigées en arrière à l'extrémité; surface

entièrement revêtue de duvet et, en outre, de fines soies noires; une large bande longitudinale médiane et une bande, marginale, encore plus large, de chaque côté, blanches; le reste du disque est occupé par deux larges bandes parallèles noir velouté; sur le fond blanc des bords latéraux, au-dessus des épines latérales, se détache nettement, en forme de petite tache noire, un petit tubercule dénudé et brillant; derrière les épines on remarque quelques gros points noirs. Ecusson petit, entièrement blanc ou (plus souvent) avec un fin trait linéaire, lisse et noir, le long du milieu.

Elytres très étroits, à épaules arrondies, presque parallèles, rétrécis vers l'extrémité, où ils sont arrondis séparément, trois fois aussi longs que le pronotum; surface tantôt plane, tantôt légèrement convexe au 2-e tiers de la longueur; côte humérale à peine distinctement sinueuse à la base. Fond de la surface noir velouté avec 5 paires de bandes blanches; la marginale, à bords très irrégulier, est plus large que les autres, surtout à la base; la humérale assez large, entière, atteignant l'extrémité des élytres, la 1-re dorsale de moitié moins large que l'humérale, également entière, n'atteignant pas, d'un quart ou d'un cinquième, l'extrémité des élytres et ne se réunissant à aucune des autres; la 2-e dorsale très étroite, n'atteignant ni la base ni l'extrémité des élytres, très interrompue et parfois à peine accusée; la suturale presque linéaire, entière, traversant toute la longueur des élytres; le fond noir est parsemé de fines soies noires, qui se perdent facilement et manquent complètement sur les bandes blanches.

Pattes longues et grêles, roux rougeâtre, entièrement revêtues de duvet blanchâtre clair-semé et de longues soies rousâtres (les tibias postérieurs surtout); brosse de poils aux tibias intermédiaires d'un roux fauve; tiers apical de fémurs, extrémité des tibias intermédiaires et postérieurs et tarses noirs; articles des tarses antérieurs et intermédiaires dilatés, le 3-e à lobes arrondis à l'extrémité; tarses postérieurs très



longs, étroits, le 1-er article de moitié plus long que le 4-e. Dessous du corps revêtu de duvet blanc grisâtre, ventre garni de soies jaunâtres.

Long. 15—17, larg. élytr.  $4\frac{3}{4}$ — $5\frac{1}{2}$  mm.

♀. Corps plus large que chez le ♂; le duvet général de la surface, au lieu de noir, est d'un jaune fauve pâle, plus obscur sur le pronotum. Côte dorsale des élytres élevée, à bords unis, dénudée et garnie de soies noires clair-semées, qui couvrent également toutes les bandes obscures de la surface et sont particulièrement manifestes sur le pronotum. Bande suturale des élytres confluent entièrement avec la 2-e dorsale et paraissant ainsi du double plus large que chez le ♂; suture longée d'une série de petites taches noires ou fauve obscur, de dimension variables et très irrégulières de contour; des taches semblables, mais moins nombreuses, sont clair-semées le long des côtés de la 1-re bande dorsale, qu'elles empiètent parfois, surtout à l'extrémité des élytres. Tarses antérieures étroits; le 3-e article des intermédiaires à lobes pointus; tarses postérieurs conformés comme chez les ♂.

Long. 17, larg. élytr. 6 mm.

*Sémiretchié*: village Malowodnoïé (G. & M. Grum-Grzimaïlo! V. 1889).—Une nombreuse série d'exemplaires ♂ ♀ (coll. P. Sémenow, coll. B. E. Jakowleff).

