

ОПИСАНІЕ НОВЫХЪ ВИДОВЪ.

Dorcadion (Compsodorcadion) optatum, n. sp.

♂. Туловище довольно узкое, вытянутое, одѣтое бархатно-чернымъ покровомъ, съ цѣльными буровато-желтыми полосками, кромѣ второй спинной, которая слабо намѣчена; боковые шипы переднеспинки тонкіе, острые, обращенные вершиной взадъ; ноги черныя, только голени въ самомъ основаніи съ красно-бурой полоской.

Голова небольшая, такъ-же окрашенная, какъ и у сосѣднихъ видовъ; лобъ плоскій, съ рѣдкими разбросанными точками и черными полуприлегающими щетинками; усики черныя, немного не достигающіе до конца надкрылій, съ первымъ членикомъ на $\frac{1}{3}$ длиннѣ 3-го.

Переднеспинка довольно выпуклая, нѣсколько болѣе развитая въ ширину по заднему краю (4 мм.), чѣмъ въ длину (3,5 мм.), съ длинными, тонкими боковыми шипами, обращенными остриемъ взадъ; три обычныхъ продольныхъ полоски—узкая средняя и болѣе широкія боковыя—буровато-желтаго цвѣта; щитокъ болѣе развитъ въ длину, на концѣ округленный.

Надкрылья въ $3\frac{1}{2}$ раза (12,5 мм.) длиннѣе переднеспинки, постепенно суживающіяся къзади; окраинная полоска шире остальныхъ, съ неправильнымъ какъ-бы зазубреннымъ краемъ; плечевая и 1-я спинная сплона цѣльныя, узкія, 2-ая спинная—линейная, разорванная и вообще слабо выраженная; плечевыя ребра довольно развитыя, въ основной половинѣ слегка поперечно-морщинистыя, а къ концу гладкія; спинныя ребра очень короткія, замѣтныя только въ основаніи.

Нижняя сторона туловища густо покрыта волосками мышьянаго цвѣта; отростки передне- и среднегруди узкіе; ноги тонкія, длинныя; бедра задней пары одинаковой длины съ голеними и тарсами той-же пары; преобладающій цвѣтъ ногъ черный, только основаніе голеней буровато-красное; виѣшняя вырѣзка на голеняхъ средней пары со щеткой волосъ чернаго цвѣта; первый членикъ тарсовъ задней пары ногъ почти вдвое длиннѣе четвертаго членика ихъ.

Дл. 18, шир. 6,5 мм.

Александровскій хребтъ, близъ Токмака (22. IV. 03, Ровнягинъ!) (колл. Семенова).

Dorcadion (Compsodorcadion) pelidnum, n. sp.

♂. Туловище довольно длинное, бархатисто-чернаго цвѣта, съ цѣльными бѣлыми полосками сверху, изъ которыхъ вторая спинная слабо выражена; усики черныя; ноги умѣренной толщины, буровато-красныя, кромѣ тарсовъ и верхней трети бедръ, которые чернаго цвѣта.

Голова довольно большая, съ плоскимъ лбомъ, вдавленнымъ только между основаніями усиковъ, покрытая рѣдко разбросанными, но крупными точками, которыя нѣсколько сильнѣе и гуще на *clypeus*: усики на $\frac{1}{5}$ короче длины всего тѣла, съ первымъ членикомъ длиннѣе третьяго.

Переднеспинка толстая, довольно широкая и выпуклая, одинаково развитая какъ въ длину, такъ и въ ширину по заднему краю (4,5 мм.), съ короткими боковыми шипами, обращенными вверху и назадъ; срединная бѣлая продольная полоска узкая, замѣтно вдавленная въ задней половинѣ; боковыя бѣлыя окраины неширокія. Щитокъ на концѣ раздвоенный.

Надкрылья втрое длиннѣе (14 мм.) переднеспинки, почти параллельныя въ основной половинѣ и постепенно суживающіяся къзади; окраинная бѣлая полоска шире остальныхъ, съ краями весьма неправильными, разбитыми на отдѣльныя пятна; плечевая полоска довольно широкая, цѣльная, съ нѣсколькими черными точками; 1-ая спинная узкая, цѣльная, короче плечевой, 2-я спинная едва намѣченная, но явственная; сутуральная полоска почти линейная; плечевыя ребра плоскія, почти гладкія, покрытыя рѣдкимъ, мелкимъ пунктиромъ; спинныя незамѣтны.

Нижняя сторона туловища одѣта довольно густо желтовато-сѣрыми волосками; отростокъ переднегруди очень узкій, среднегрудной вдвое его шире; ноги довольно толстыя, длинныя; бедра задней пары почти одинаковой длины съ голеними той-же пары; преобладающій цвѣтъ ихъ буро-красный; вырѣзка среднихъ голеней со щеткой волосъ чернаго цвѣта; тарсы задней пары ногъ длинныя, 1-й членикъ ихъ почти вдвое длиннѣе четвертаго.

♀ неизвѣстна.

Дл. 20, шир. 7,5 мм.

Александровскій хребтъ, близъ Токмака (12. VI. 03, Ровнягинъ!) (колл. Семенова).

***Dorcadion (Compsodorcadion) rufidens*, n. sp.**

♂. Туловище довольно узкое, вытянутое, бархатисто-чернаго цвѣта; надкрылья съ выступающими ребрами и снѣжно-бѣлыми узкими полосками; ноги ярко-красныя, кромѣ черныхъ вершинъ бедръ и тарсовъ, первый членикъ усиковъ также ярко-красный кромѣ вершины, равно какъ и остріе боковыхъ шиповъ переднеспинки.

Голова небольшая, лобъ съ очень рѣдкимъ разбросаннымъ пунктиромъ, двумя обычными затылочными пятнами чернаго цвѣта и небольшимъ пятнышкомъ между основаніями усиковъ; послѣдніе на $\frac{1}{4}$ короче туловища, сверху голые, 1-й членикъ ихъ длиннѣе 3-го, ярко-краснаго цвѣта, съ черной, рѣзко отграниченной вершиной; верхнія окраины бугорковъ, поддерживающихъ усики, также красноватаго цвѣта.