

nom de *luxatus*, lorsque M. Sturm le publia sous celui de *laticollis*, qui doit néanmoins prévaloir, parce qu'il a été publié le premier.

APPENDICE.

Genre CRYPTOBATIS, Esch. — *Aspasia*, Dej.

(Carabiques troncatipennes.)

Ce n'est pas le genre *Physodera* d'Eschscholtz qui correspond à celui d'*Aspasia*, Dej., comme nous l'avons dit dans le tome II, p. 107 de cette *Revue*, mais bien celui de *Cryptobatis*. Nous avons rectifié cette erreur dans l'*Histoire des Insectes*, t. IV, p. 220.

ARTICLE XVIII.

DESCRIPTION D'UN COLÉOPTÈRE NOUVEAU,

PAR A. LEFEBVRE.

LEPTURA, Linné.

SILBERMANN, Lefebvre.

Long. 18 mil. (8 lin.)

Corpus concretum, creberrime punctatum, nigrum.

Elytra, pedes, abdomen (absque subtus primis segmentibus) antennarumque tres primi articuli, omnino fuscii. Elytra ad apicem nigri, valdeque introrsum incisi. Insuper ad medium maximo puncto nigro rotundo notati.

Tête noire, très-finement ponctuée, creusée entre les antennes, et offrant à cet endroit un sillon assez senti.

Corselet noir, pointillé, pubescent, au milieu, vers la base, une impression longitudinale, émarginé devant, sinueux postérieurement.

Ecusson petit, triangulaire et noir.

Labre, palpes maxillaires et labiaux fauves, couverts de poils blonds.

Antennes aussi longues que les élytres, noires; les cinq premiers articles fauves à la base; le dernier de la même couleur à son extrémité.

Poitrine noire et finement ponctuée.

Pates fauves, noires à leur origine.

Elytres d'un fauve foncé. Les points, qui les couvrent, moins serrés qu'au corselet, loin d'y paraître disposés comme dans un crible, semblent se succéder en forme de lignes ondulées. De chacun d'eux sort un poil d'un roux foncé, couché en arrière. Leur extrémité largement teintée de noir est fortement échancrée. A leur centre et près du bord externe, sur chacune d'elles, un gros point noir et arrondi.

Ailes transparentes, obscures, noirâtres à leur partie apicale.

Abdomen d'un fauve foncé en dessus et en dessous; mais de ce dernier côté son premier segment est noir et seulement bordé de fauve, et au second cette bande en occupe inférieurement la moitié transversale et les bords marginaux.

Taille généralement trappue; les élytres, plus larges que le corselet, à leur naissance, diminuent peu de largeur

et donnent à cette espèce une apparence moins svelte, moins élancée que ses congénères.

Patrie. Syrie, Mont Liban, où elle fut prise le 21 juillet 1829, par M. le docteur Lagasquie.

OBSERVATIONS. Elle a plus de rapports avec la *L. Binotata* de M. le comte Dejean qu'avec toutes les autres, néanmoins voici les principaux caractères qui la distinguent d'avec les espèces suivantes dont les élytres terminées de noir, présentent également un point noir sur chacune d'elles.

L. DISTIGMA. ♀ (Charp. *Horæ Ent.* p. 227. pl. 9. f. 4.)

Patrie: Portugal, Espagne.

Antennes: Noires.

Élytres: Rouges, un large point noir à leur centre, échancrées, et largement teintées de noir à leur extrémité.

Abdomen: Les cinq derniers segments rouges.

Pates: Rouges, la base et le sommet des intermédiaires et des postérieures noire, tarsi noirs.

TESSERULA, Charp. (*Ibid.* p. 227.) ou *Bisignata*, Dahl.

Patrie: Hongrie.

Antennes: Noires.

Élytres: Testacées, un petit point noir à leur centre, échancrées, et teintées de noir à leur extrémité.

Abdomen: Noir.

Pates: Noires.

BISIGNATA, Brullé. (*Exp. sc. de Morée*, p. 264. pl. XLIII. f. 7.)

Patrie: Morée.