

## DESCRIPTION

DE DEUX

# COLÉOPTÈRES NOUVEAUX,

PAR GUSTAVE LEVRAT,

Présentée à la Société Linnéenne de Lyon.



### *Purpuricenus Wachanrui.*

Longueur 13 millim. ; largeur 3 millim.

*Tête* courte, noire, finement chagrinée, hérissée de poils d'un brun noirâtre. Labres et yeux bruns ; ceux-ci très-échancrés, entourant une partie de la base des antennes. Antennes grêles, noires : chacun de leurs articles un peu renflé vers le sommet.

*Thorax* noir, fortement ponctué, globuleux, chargé dans son milieu d'une ligne longitudinale brillante, à peine saillante, résultant de l'absence des points ; une large tache d'un rouge orangé le recouvre presque complètement en dessus, et ne laisse qu'une bordure marginale noire formant trois festons à sa base ; des poils obscurs revêtent le dessous du corselet.

*Elytres* d'un tiers plus larges que la base du prothorax ; légèrement rebordées, presque parallèles jusqu'aux deux tiers de leur longueur ; d'un noir soyeux, couvertes d'une ponctuation très-forte vers leur partie antérieure et graduellement plus faible vers leur extrémité ; une tache d'un rouge orangé pare chacune des élytres et s'étend à partir du premier cin-

quième de leur longueur jusqu'au troisième inclusivement ; la forme de chacune de ces taches est celle d'un demi-cercle tangent à la suture de l'élytre. Vers le bord externe de l'élytre, cette tache s'étend en forme de pointe prolongée jusqu'à l'angle huméral.

Cette espèce est voisine du *Purpuricenus Desfontainii*, dont elle diffère soit par la disposition de ses taches, soit par son corselet qui est mutique.

PATRIE, la Turquie (*ma collection*).

Je l'ai dédiée à mon excellent ami, Monsieur Alexandre Wachanru, à qui la science doit tant de découvertes intéressantes ; ce n'est là qu'un bien faible gage de la profonde affection que je lui ai vouée.

### *Acmaeodera Chevrolati.*

Longueur 5 millim. ; largeur 2 millim.

*Tête* : cuivreuse, d'une ponctuation fine et très-serrée, offrant dans son milieu entre les yeux une dépression longitudinale assez profonde qui est garnie d'une houppe de poils blancs ; deux autres houppes semblables mais plus fournies accompagnent les yeux du côté interne ; les antennes sont d'un bronzé obscur.

*Thorax* : cuivreux, très-convexe, arrondi sur les côtés, peu déprimé à la base, marqué d'une ponctuation profonde, mais bien moins serrée que celle de la tête ; une ligne médiane le sépare longitudinalement et se termine à la base par un point enfoncé, qui est accompagné de chaque côté de deux autres points plus profonds, autour desquels s'élèvent quelques poils.

*Elytres* : d'un bronzé cuivreux ; faiblement rétrécies près de leur partie médiane, marquées de stries formées par