





ultā egerunt qui ante nos fuerunt. Sed non peregerunt  
etlumq; ad huc restat opera, multumq; restabit  
que illi nato post mille secula pūdetur occasio  
quid adhuc adjuvendi.

2 voll



62  
Linnaeus  
QK91  
.C58  
1758  
v.1

CAROLI LINNÆI

EQUITIS DE STELLA POLARI,  
ARCHIATRI REGII, MED. & BOTAN. PROFESS. UPSAL.;  
ACAD. UPSAL. HOLMENS. PETROPOL. BEROL. IMPER.  
LOND, MONSPEL. TOLOS. FLORENT. SOC.

SYSTEMA  
NATURÆ

PER

REGNA TRIA NATURÆ,

SECUNDUM

CLASSES, ORDINES,  
GENERA, SPECIES,

CUM

CHARACTERIBUS, DIFFERENTIIS,  
SYNONYMIS, LOCIS.

MISSOURI  
BOTANICAL  
GARDEN.

TOMUS I. *Sach. Ekstrand.*

EDITIO DECIMA, REFORMATA. *negat Wallberg.*

*Cum Privilegio S:æ R:æ M:tis Sveciæ.*

HOLMIÆ,

IMPENSIS DIRECT. LAURENTII SALVII,

1758.



## O JEHOVA

*Quam ampla sunt Tua Opera!*

*Quam sapienter Ea fecisti!*

*Quam plena est Terra possessione Tua!*



S:Æ R:Æ M:TIS SUMMÆ FIDEI VIRO  
*CELSISSIMO ILLUSTRISSIMO que*  
*COMITI*

**D:NO CAR. G. TESSIN,**  
REGIS REGNIQUE SVIOGOTHICI SENATORI,  
REGIÆ CANCELLARIÆ PRÆSIDI,  
AD AULAM REGIARUM CELSITUDINUM SUMMO  
MARESCHALLO,  
EDUCATIONI SERENISS. PRINCIPIS GUSTAVI PRÆFECTO,  
CANCELLARIO ACADEMIÆ ABOENSIS,  
ORDINIS S:Æ R:Æ MAJEST. SERAPHINORUM EQUITI AURATO  
ET COMMENDATORI, EQUITI AURATO DE AQUILA NIGRA,  
NEC NON OMNIUM S:Æ R:Æ MAJEST. SVECICÆ  
ORDINUM CANCELLARIO  
*SACRUM.*

**C**um quivis auctor speret se apud posteros gratiam  
habere & posse secum duratura nomina educere,  
AUCTORI meæ fortunæ Libellum decimò nunc offero;  
ILLE me, peregrinum in patria, reducem excepit;  
ILLE mihi Stipendium ab Ordinibus regni expetiit;  
ILLE mihi spartam Medici classici procuravit;  
ILLE mihi Munus, quo fungor, conciliavit;  
ILLE mihi Titulum, quo distinguor, paravit;  
ILLE me ad Sereniss. Reges introduxit;  
*ILLE meas errare boves ut cernis & ipsum*  
*ludere quæ vellem calamo permisit agresti;*  
quare  
*cana prius gelido desint absinthia ponto*  
*quam immemor vivam*

**TANTI MÆCENATIS**

Upsaliæ 1757,  
d. 24 Maji.

*Cultor devotissimas*  
C. LINNAEUS.



*Magnus est DEUS noster,  
& magna est potentia Ejus,  
& potentia Ejus non est numerus.*



\* \* \* \* \*

# RATIO EDITIONIS.

SYSTEMA NATURÆ iteratis vicibus prodiit.

1. Leydæ 1735 Folio imper. pag. 12. a me per J. F. GRONOVIVM.  
*Conspectus tantum operis & quasi Mappa Geogr.*
2. Holmiæ 1740 Octavo. pag. 80. a me ipso revisum.  
*Auctum Animalium nomenclaturis, characteribus.*
3. Halæ 1740 Quart. oblong. pag. 70. per J. J. LANGEN.  
*Latino-germanice, ceterum idem cum 1.*
4. Parisiis 1740 Octavo. pag. 108. t. 1. per B. JUSSIEUM.  
*Adjecta nomina Gallica. idem cum 2.*
5. Halæ 1747 Octavo. pag. 88. per M. G. AGNETHLER.  
*Nomina Germanica, ceterum idem cum 2.*
6. Holmiæ 1748 Octavo. pag. 232. t. 8. auctum a me ipso.  
*Characteres essent. Vegetabilium. Species Anim. & Lapid.*
7. Lipsiæ 1748 Octavo. pag. 232. t. 8. per Typographum.  
*Nomina Germanica, ceterum idem cum 6.*
8. Holmiæ 1753 Octav. p 136. Vegetabilia per J. J. HAARTMAN.  
At regnum Lapideum Scaræ 8:vo per MÖLLER.
9. Leydæ 1756 Octavo. pag. 226. per GRONOVIVM.  
*Paucissima de Avibus, Piscibus. idem cum 6.*
10. Holmiæ hac editione, longe auctius factum a me ipso:  
*Species animalium omnium mihi cognitorum cum Differentiis, Synonymis, Locis, nominibus Trivialibus.*  
*Methodus Animalium ex novis observatis reformata.*  
*Piscium imprimis nova methodus cum Auctorum observatis radiis pinnarum.*  
*Plantarum reformati characteres, emendatæ differentiæ variæ.*  
*Lapidum plures species, observationes, & omnium Nom. Trivialia.*  
*Observationes in Regna Naturæ novæ, cum introductione in Naturam.*



COLLECTANEA, quæ obtinere potui, disposui; imprimis adjuvarant

S: i ADOLPHI FRIDERICI Regis Museum *tom. 1.* quem edidi, & *tom. 2. Msc. de Animalibus exoticis*, quem composui.

S: æ LOVISÆ ULRICÆ Reginæ Museum *Msc.*

in *Conchiliis & Insectis* stupendum, descriptionibus adornavi.

C. TESSIN Museum. Holm. 1753. Fol.

in *Lapidibus & Conchiliis* magnificentum.

C. DE GEER Museum.

*Amphibiis, Insectis* aliisque rarioribus dives.

UPSALIENSIS Museum Academiæ:

ex *Animalibus* undiquaque conquisitis.

STOCKHOLMENSIS Museum Academiæ Scientiarum.

Variis pulchris naturalibus scatens.

ITINERA propria: *Oelandicum* 1741, *Gotlandicum* 1741, *Westrogothicum* 1746, *Scanicum* 1749 edita; & *Lapponicum* 1732, *Dalekarlicum* 1734 inedita.

*Discipulorum* quondam meorum instituta Itinera, mihi, ab exterorum gazophylaciis remoto, proficua:

C. TERNSTROEM in *Asiam* (sed periit in Poulicandor) 1745.

P. KALMII in *Pensylvaniam & Canadam*. 1747.

L. MONTINI in *Laponiam Luleensem*. 1749.

F. HASSELQUIST in *Ægyptum & Palestinam*. 1749.

O. TORENI in *Malabariam & Suratte*. 1750.

P. OSBECKII in *Chinam & Javam*. 1750.

P. LOEFLINGII in *Hispaniam & Americam*. 1751.

P. J. BERGII in *Gotlandiam* insulam. 1752.

M. KÆHLERI in *Italiam & Apuliam*. 1752.

D. SOLANDRI in *Lapp. Pitensem & Tornensem*. 1753.

D. ROLANDRI in *Surinamum & Eustatium*. 1755.

FINEM Operis obtinero, si inde

*Peregrinatores* dignoscant notiora antea naturalia.

Curiosi attentiores *Musea* intrantes, visa intelligant.

Docti nova, nec trita, *actis* suis inserant.

Scientia facilius *augeatur* sepositis vulgatoribus.

*Nomina* magis stabiliantur, imprimis *Trivialia & Generica*.

His utere L. B. donec alii plura præstantioraque sistant.

Upsaliæ 1757. Maji 24.

IN-

---

Docuisti me DEUS a juventute mea,  
& usque nunc pronuntiabo Mirabilia Tua.

---



## INTROITUS.

**H**OMO mundi intraturus theatrum quæritur *Quis sit: unde ortus?* e stemmate Creationis; *Quo tendat?* ad vitam beatam; *Quid hic?* intueri naturam; *Quo munere?* curiosum esse similemque quidem reliquis animantibus (quæ vorant, ludunt, pruriunt, generant, multiplicantur, dormiunt, commoda stabula quærunt, proximis sui generis inserviunt, vitam tuentur, sentiunt, percipiunt,) sed nobiliorem, utpote qui meditatur, ratiocinatur, miratur pulchrum sapientis opus Artificis. O quam contempta res est homo, nisi supra humana se erexit! Quid enim erat cur in numero viventium se positum gauderet? an ut Cibos & Potiones percolaret? ut hoc corpus casurum periturumque sarciret? quæ tanta necessitas in fundum telluris intimæ hominem merfit, ut oblitus dierum, oblitus fortunæ melioris, ab hoc se averteret? Puto certe multos ad sapientiam perventuros, nisi superbia magnæ fortunæ inflati, putassent se pervenisse; sapiens utique est, qui fines respicit.

*Finis Creationis telluris est gloria DEI ex Opere Naturæ per Hominem solum.*

Tanto igitur magis nosse Naturam opere pretium, quo nullum majus est! neque enim quidquam habet in se hujus materiæ tractatio pulchrius, cum multa lateant futura usui, quam quod hominem Magnificentiâ sua detinet, nec mercede, sed Miraculo colitur!

Quota enim pars operis Tanti nostris oculis committitur, & quam multa, præter hæc, quæ vidimus, in secretum eunt nunquam humanis oculis orientia; neque enim omnia DEUS humanis oculis nota fecit. Multa etenim sunt quæ esse audivimus, qualia autem sint ignoramus! quamque multa hoc primum cognovimus sæculo! & quidem multa venientis ævi populus, ignota nobis, sciet! multa sæculis tunc futuris, cum memoria nostri exoleverit, reservantur; veniet tempus, quo ista quæ nunc latent, in lucem dies extrahat & longioris ævi diligentia. Rerum enim Natura sacra sua non simul tradit; initiatos nos credimus, in vestibulo ejus hære-



mus ; illa arcana non promiscue, non omnibus patent !  
reducta & interiori sacrario clausa sunt ; involuta veri-  
tas in alto latet.

Si in hoc juvenus sobria incumberet (\*), hoc Ma-  
jores docerent, hoc Minores addicerent, vix tamen ad  
fundum veniretur, in quo veritas posita est, quam nunc  
in summa Tellure, & levi manu quærimus. Magni  
omnino res est rerum Naturæ latebras dimovere, nec  
contentum exteriori ejus conspectu, introspicere & in  
Divina secreta descendere. *Senec.*

Intravi itaque densas umbrosasque Naturæ Silvas,  
hinc inde horrentes acutissimis & hamatis spinis, evita-  
vi quotquot licuit plurimas, at neminem tam esse cir-  
cumspectum didici, cujus non diligentia sibi ipsi ali-  
quando excidat, ideoque ringentium Satyrorum cachin-  
nos, humerisque insipientium simiolorum speculationes  
sustinui, incessi viam & quem dederat cursum fortu-  
na peregi.

IMPE-

---

O JEHOVA!

Quam magnifica sunt Tua Opera!

Vir insipiens non cognoscit ea

& stultus non animadvertit ea.

*David.*

---

(\*) Confer *Worm. mus. præfat. 1.*



# IMPERIUM NATURÆ.

DEUM *sempiternum, omniscium, omnipotentem a tergo transeuntem vidi & obstupui! legi aliquot Ejus vestigia per creata rerum, in quibus omnibus, etiam minimis, ut fere nullis, quæ Vis! quanta Sapientia! quam inextricabilis Perfectio! Observavi Animalia inniti vegetabilibus, Vegetabilia terrestribus, Terrestria telluri; Tellurem dein ordine inconcusso volvi circa solem, a quo vitam mutuatur; Solem demum circa axin gyrari cum reliquis Astris, systemaque Siderum, spatio & numero vix definiendum, mediante motu in vacuo nihilo suspensum teneri ab incomprehensibili Movente primo, ENTE ENTIIUM (a), Causa causarum, Custode Rectoreque universi, mundani hujus operis Domino & Artifice. Vis illud FATUM vocare, non errabis, est ex quo suspensa sunt omnia. Vis illud NATURAM vocare, non errabis, est ex quo nata sunt omnia. Vis illud PROVIDENTIAM vocare, recte dices, est cujus consilio mundus actus suos explicat (b); totus est SENSUS, totus VISUS, totus AUDITUS, totus ANIMÆ, totus ANIMI, totus SUI; hujus EXTERA indagare non capit humana conjectura mentis (c); NUMEN esse credi par est, æternum, immensum, neque genitum neque creatum (d). Hoc sine quo nihil est, quod totum hoc fundavit & condidit, quodque oculos nostros & implet & effugit, cogitatione tantum visendum est; in sanctiore enim secessu Majestas tanta delituit, nec ulli dat aditum nisi animo. (e)*

MUNDUS complectitur omnia sub jove, quæ in notitiam nostram per sensus cadere possunt; sunt hæc *Astra, Elementa, Tellusque inenarrabili velocitate circumacta; horum inoffensam velocitatem procedere videmus aternæ legis imperio, nec esse temere errantis hunc ordinem, neque quæ temere coiverunt tanta arte pendere, ut terrarum gravissimum pondus sedeat (quasi) immotum & circum se properantis cæli fugam spectet. (f)*

(a) Aristoteli. (b) Senec. quæst. II: 45. hoc respectu, sed caute, ne effectus sumatur pro causa. (c) Exod. XX: 4. (d) Plin. Nat. II. t 7. (e) Senec. VII: 31. (f) Senec. I: 1.



ASTRA sunt remotissima corpora lucida, quæ gyranur motu perpetuo; sunt hæc aut SIDERA propria luce radiantia, ut *Sol*, remotioresque *Stella fixæ*; aut PLANETÆ a sideribus lucem mutuantes, quorum primarii Solares: *Saturnus*, *Jupiter*, *Mars*, *Tellus*, *Venus*, *Mercurius*; secundarii obsecundantes Planetis, ut *Luna* Telluri, aliique; *nec posse sine Custode tantum opus stare, nec hunc siderum discursum fortuiti impetus esse. nam quæ casus incitat sæpe turbari & cito arietare.* (g)

ELEMENTA sunt corpora simplicissima, atmosphæram Planetarum constituentia, spatia inter Astra forte replentia:

TERRA opaca, fixa, frigida, quiescens, sterilis.

AQUA diaphana, fluida, humida, penetrans, concipiens.

AËR pellucidus, elasticus, siccus, obvolitans, generans.

IGNIS lucidus, resiliens, calidus, evolans, vivificans.

*Omnia Elementorum alterni recursus sunt, quidquid alteri perit in alterum transit; alternæ sunt vices rerum.* (h)

TELLUS est globus planetarius horis 24 rotatus, circum solem quotannis in orbem actus, *Elementorum* atmosphæra obvelatus, rerum *Naturalium* stupendo cortice tectus, cujus cognoscendæ superficiæ studemus. Globus hic terraqueus est, cujus depressiorem partem Aquæ inundant & *Mare* lente coarctandum; elatiorem vero aquæ fugiunt sensim dilatandam in *Continentem* siccam habitabilem. Hæc Aquarum halitu, vi Aëris in *nubes* actæ, irroratur, ut summi montes perennique nive *Alpini Scaturigines* in *Fluvios* perennes concurrentes, eamque permeantes, potum terrestri cibo addant in alimentum incolarum, dum *Venti* motum excitant *Ignis* calore vivificatis corporibus. *Sic omnia adjuvabunt Naturam, ut naturæ opera peragantur* (i).

NATURALIA sunt corpora cuncta Creatoris manu composita, corticem Telluris constituentia, in Regna Naturæ tria divisa, quorum limites concurrunt in *Lithophytis*.

LAPIDES corpora congesta, nec viva, nec sentientia.

VEGETABILIA corp. organisata & viva, non sentientia.

ANIMALIA corp. organisata & viva & sentientia, sponteque se moventia. *Tota enim hujus mundi concordia ex discordibus constat* (k); *Nec ad usum Natura formam opus suum præstat, sed in ipsa varietate se jactat* (l).

HOMO

(g) Senec. (h) Senec. III; 10. (i) Senec. III; 29. (k) Senec.  
(l) Senec. VII; 27.



HOMO sapiens, creatorum operum perfectissimum, ultimum & summum, in Telluris cortice, Majestatis Divinæ stupendis iudiciis obiecto, constitutus, secundum sensus judicans artificium, admirans pulchritudinem, veneraturus Auctorem. Retrogrediendo per generationes multiplicatas videt *Creatorem*; Progrediendo per conservationem multiplicandam videt *Naturam*; ad utrumque invitant Pulchritudo, Mechanismus, Nexus, Fines, Commoda. Sic *totus Mundus gloria divina plenus est* (m), *dum omnia creata opera Deum glorificant per hominem* (n), qui ex inerti humo, Dei manu vivificata contemplatur auctoris sui Majestatem ex fine creationis, dignus hospes constitutus Summi Entis præco. *Hæc contemplatio Naturæ evadit præsentia voluptatis cælestis, cujus particeps Animus in luce obambulat & tamquam in terrestri cælo vitam degit* (o); *Nec pietas adversus Deum, nec quanta huic gratia debeatur, sine explicatione Naturæ intelligi potest* (p).

SAPIENTIA, divinæ particula auræ, summum est attributum Hominis Sapientis. Primus Sapientiæ gradus est res ipsas nosse. Notitia consistit in vera *idea* objectorum, qua similia a dissimilibus distinguuntur *notis* propriis, a Creatore rebus inscriptis; hanc notitiam ut cum aliis communicet, *nomina* propria non confundenda singulis diversis imponat; Nomina enim si pereunt, perit & rerum cognitio. Hæc literæ elementaque erunt, quibus destitutus nemo naturam legerit; quum *ignorato genere proprio, nulla descriptio quamvis accurate tradita, certum demonstraret, sed plerumque fallit* (q).

METHODUS, anima Scientiæ, sistat notas proprias rebus inditas systematice digestas; Systema apte quinque tantum subdividitur: sic

<i>Classis,</i>	<i>Ordo,</i>	<i>Genus,</i>	<i>Species, Varietas.</i>
<i>Genus sum.</i>	<i>G. intermedium,</i>	<i>G. proximum,</i>	<i>Species, Individuum.</i>
<i>Provinciæ,</i>	<i>Territoria,</i>	<i>Parochiæ,</i>	<i>Pagi, Domicilium.</i>
<i>Legiones,</i>	<i>Cohortes,</i>	<i>Manipuli,</i>	<i>Contubernia, Miles.</i>

*Nisi enim in ordines redigantur & veluti castrorum acies distribuuntur tumultu & fluctuatione omnia perturbari necesse est* (r).

NOMINA respondeant Methodo Systematicæ; sint itaque:  
Nomina *Classium, Ordinum, Generum, Specierum, Varietatum,*  
Character. *Classium, Ordinum, Generum, Specierum, Varietatum;*  
Differentiis definita, nam nomina nosse oportet qui rem esse

A 4

velit,

(m) *Esa. VI: 4.* (n) *David. CXVIII.* (o) *Act. holm.* (p) *Cicero.*  
(q) *Cæsalpinus.* (r) *Cæsalpinus.*



velit, *confusis enim nominibus omnia confundi necesse est. Nominum ideoque impositio primi hominis in aurea ætate actio erat.*

SCIENTIA Naturæ innitur Cognitioni Naturalium Methodicæ & Nomenclaturæ Systematicæ tamquam filo ariadneo, secundum quod Naturæ inæandros unice tutoque permeare liceat.

Ordo alius struentis est, alius est inhabitantis. Creator incipit a simplicissimis elementis Terreis, per Lapidés, Vegetabilia, Animalia in hominem desit. Homo autem incipiat a se ipso, desinat in Terram. Auctor Systematis a particularibus ad universalia ascendat; Doctór vero contra a generalibus ad specialia descendat. Fontes enim concurrunt in rivos, hi in fluvios; ascendat autem nauta quousque poterit, nec tamen fontium ultimas origines attingerit. Data distincta rerum cognitione ulterius penetrandum in Specialissimas Proprietates, Phænomena, Mysteria, Dotes, Vires, Usus; Naturalis quum Scientia trium regnorum Fundamentum sit omnis Diætæ, Medicinæ, Oeconomix tam privatæ quam ipsius naturæ. *Felices agricolæ bona si suam norint.*

Omnes res creatæ sunt divinæ sapientiæ & potentiæ testes, divitiæ felicitatis humanæ; ex harum usu *bonitas* Creatoris; ex pulchritudine *Sapientia* Domini; ex oeconomia in *Conservatione, Proportione, Renovatione*, potentia *Majestatis* elucet. Earum itaque indagatio ab hominibus sibi relictis semper æstimata; a vere eruditis & Sapientibus semper exulta; perverse doctis & barbaris semper inimica fuit.

RE-

---

Narrabo mirabilia Tua DOMINE,  
& virtutem Terribilium Tuorum dicant  
generationes.

*David.*

---



## REGNUM ANIMALE.

ANIMALIA organisatione viva, nervis *sentiunt, percipiunt, seque ex arbitrio movent motu possibili.*

VIVENTIA singula, in multiplicatione prodica Natura, orditur a minimis, generat in fluido, incipit in ovi liquido, cum *omne vivum ex ovo.*

OVUM intra *Tunicas*, sæpe includens *Albumen*, continet *Vitellum*, cupis lateri emergenti insertum *Embryonem* vel *Embryonem*, vegetans in Embryonem, *caulescentem* Iunculo umbilicali, *radicatum* placenta vitellina.

MATER prolifera promit ante generationem vitum compendium novi animalis siquæ simillimi, tanquam plumulam intra semen vegetabile; hoc Patris polline spermatico electi satum calore excluditur; Punctum saliens enim Ovi incubantis Avis ostendit primum Cor micans Cerebrumque cum Medulla; corculum hoc, cessans a frigore, excitatur calido habitu, premitque *Balla* aërea, *scissim* dilatata, liquores secundum canales fluxiles. *Præsum* vitalitatis itaque in viventibus est tantum a prima creatione continuata vitæ ramificatio, cum ovum sit gemma matris ab exordio viva, licet non sentiens ante fœcundationem; sic *Generatio Equivoca nulla.*

CORPUS Animantium composita est machina:

NATURALIS, vegetat e cranii  *Tuberc* crullato, *Caule* verticali, articulato, rigido, oppolite ramolo, cui insident *Folia* carnosa, fibrosa, sparsa, apicibus etiam affixa in Musculos, produnte *Fructificatione* genitalium e dichotomia ultima caulis.

VITALIS, e *Bulbo* Cordis perpetuo mobili, *re* *caute* variis lacteis intra tubi intestinalis serquinniam, *ram* *hanc* ad caulem naturalem duplii canali circulante, ne succas alimentaris quavis temperate & flatu deficiat.

ANIMALIS, e *Bulbo* Cerebri repentisque *Medullæ*, indolis incognitæ, sedis cogitantis, *Fila* simplicissima, electrica ad fibras omnes irritabiles exteris, per quæ cogitans sentit & movet.

ORGANA sensuum machinæ sunt physica, inserta extremi-  
tati nervi, sensorio cerebri proximi, quibus divina arte percipit Animal:

OCULUS: *Camera obscura* imaginem proportionem, figura, colore depingens.



**AURIS:** *Tympanum* membranæ corda tensæ super *cocleam*, a motu ætheris tremens.

**NASUS:** *Membrana* latissima, humida, contortuplicata, æris perceptantis volatilia figens.

**LINGVA:** *Spongiolæ* bibulæ, sparsæ, humido solutum atra-hentes.

**TACTUS:** *Papillæ* molliusculæ, figuram impressam brevi assumentes.

His gaudant plurima Animalia, sed non omnia. Plura si Creator nature placisset, plura percepissent; uti Magnete præteritum Ferri, Electro electricitatis phænomena. *Antennas* insectis concessit, nobis æque ignotas ac illis *Aures*.

In *oculis* ex luce, *Auris* ex æthere appropinquantia; perceptant *Tactus* ex unione solida præsentia; examinat *Nasus* volatilia nervis, *Lingua* solubilia fibris, assumenda: s. concessa salutaria, s. vetita noxia.

**COGITANS** allicit ad *velle* gratum, aut *nolle* ingratum.

<b>GAUDIUM</b>	puerile,	sanguineum, rubrum,	oleosum,	
	longiosum, tepidum,	libere pulsans,	anhelans,	
	ridens,	tranquillus, promptum.	<i>Vita.</i>	
<b>METUS</b>	juvenilis,	phlegmatic. pallescens,	aquosus,	
	laxus,	horrens,	debile pulsans, dyspnoicus,	
	infocans,	caecans,	tremens.	<i>Morbus.</i>
<b>IRA</b>	virilis,	cholericæ, fœta,	spirituosa,	
	stricta,	fervens,	dure pulsans,	asthmatica,
	stertens,	miēturiens, agitans.		<i>Medicina.</i>
<b>MOEROR</b>	senilis,	melancholic. ater,	acidus,	
	rigidus,	fœtidus,	tarde pulsans,	orthopnoicus,
	suppirans,	obstipans,	quiescens.	<i>Mors.</i>

Sic *Gaudium* bonis fruitur, *Metus* fuga eripit, *Ira* armis defendit, *Moeror* amissa luget.

**IMPERANTIUM** causa quemadmodum *Populi* non sunt belli, sed subditorum ordini servando Imperantes constituti, in *Vegetabilium* causa Animalia *Phytophaga*, phytophagorum *Carnivora*, & ex his *Majora* ob parve, *Homo* (qua animal in œconomia naturæ) ob maxima & singula, sese vero præcione, seva mercede conducta tyrannidem exercent, ut *Pro-prio* cum nitore *Reipublicæ* naturæ perennet. Vicissim singuli cives conspirant in *Majestatem* *Hominis* rationalis imperantis, cujus est summum *Reipublicæ* auctorem agnoscere.



RES PUBLICA Naturæ, tanquam Aqua e Fontibus in Rivulos, Amnes, Fluvios ad Mare tranans, e numerosissima Plebe in pauciores Nobiles, paucissimosque Magnates ad Imperantem adscendit, dum Animalia minima, numero, vi, potentia facile infinita, in usum cedant majoribus, inertioribus, præstantioribus, cum natura nunquam magis quam in minimis tota sit.

OPERATIONES incolarum præcipuæ sunt: 1. *Multiplicare* Speciem, ut negotiis sufficiant. 2. *Auferre* immunda, cadavera, languida, conspurcata, stagnantia, acida, putrida, ut nitor aulæ fulgeat. 3. *Detondere* quotannis vegetabilia, ut renovetur annum theatrum; 4. *Æquilibrium* inter Species Animalium & Vegetabilium servare, ut proportio perennet. 5. *Vindicare* se ipsos ab interitu, ne vacet administratio.

MINISTRI, propriis muniis præfixi, tot sunt, quot animalium Species, singuli ad officia proprio commodo alleciti, quum ex labore sustentationem suam reportent; ne quidquam deficiat, ubi nihil supervacaneum. Ne autem alter alterius negotiis sese immisceat, simulque lucrum alteri præripiat; sub pœna capitali sancita Lex, ipsa sentibus, Olfactus imprimis & Gustus, inscripta, ne transgressores excusabiles evaderent. Sic rapina rerum omnium est, quam Armis, Fulcris, Munimentis, Halitu eludunt vivaciora, dum Languida succumbant, & Vegetiora in motu festinent, ut opus naturæ perenni flore rideat.

IMPULSORES etiam præfixi ad munera promte peragenda: blanda Venus ad propagationem irritat; avara Fames ad sustentationem impellit; atrox Dolor ad conservationem cogit; neque hæc sine Numine.

DIVISIO Naturalis Animalium ab interna structura indicatur:

COR biloculare, biauratum;	{ viviparis	Mammalibus.
Sanguine calido, rubro.	{ oviparis	Avibus.
COR uniloculare, uniauratum;	{ pulmone arbitrario	Amphibiis.
Sanguine frigido, rubro.	{ branchiis externis	Piscibus.
COR uniloculare, inauratum;	{ antennatis	Insectis.
Sanie frigida, albida.	{ tentaculatis	Vermibus.



## I. MAMMALIA.

*Cor* biloculare, biauratum; Sanguine calido, rubro. (\*)

*Pulmones* respirantes reciproce.

*Maxillæ* incumbentes, tectæ.

*Penis* intrans viviparas, lactantes.

*Sensus*: Lingua, Nares, Tactus, Oculi, Aures.

*Tegmenta*: Pili, pauci indicis, paucissimi aquaticis.

*Fulcra*: Pedes quatuor, exceptis mere aquaticis, *in quibus pedes posteriores in caudæ pinnam coaliti.*

## II. AVES.

*Cor* biloculare, biauratum; Sanguine calido, rubro.

*Pulmones* respirantes reciproce.

*Maxillæ* incumbentes, nudæ, exsertæ, edentulæ.

*Penis* subintrans absque scroto oviparas crusta calcarea.

*Sensus*: Lingua, Nares, Oculi, Aures absque auriculis.

*Tegmenta*: Pennæ incumbentes, imbricatæ.

*Fulcra*: Pedes duo. Alæ duæ.

## III. AMPHIBIA.

*Cor* uniloculare, uniauratum; Sanguine frigido, rubro.

*Pulmones* spirantes arbitrarie.

*Maxillæ* incumbentes.

*Penes* bini. Ova plerisque membranacea.

*Sensus*: Lingua, Nares, Oculi, multis Aures.

*Tegmenta* coriacea nuda.

*Fulcra* varia variis, quibusdam nulla.

## IV. PISCES.

*Cor* uniloculare, uniauratum; Sanguine frigido, rubro.

*Branchiæ* extus comprimendæ.

*Maxillæ* incumbentes.

*Penes* nulli. Ova absque albumine.

*Sensus*: Lingua, Nares? Oculi (non Aures).

*Tegmenta*: Squamæ imbricatæ.

*Fulcra*: Pinnæ natantes.

## V. IN-

(\*) In omnibus animalibus, quibus sanguis non calet, ventriculus cordis est unicus. *Hall. Boerb. I. p. 117, 191.* miratus itaque quod 2 ventriculos cordis Crocodilo adscribat *Hasselqvist iter 293.*



## V. INSECTA.

*Cor* uniloculare, inauritum; Sanie frigida.

*Spiracula*: Pori laterales corporis.

*Maxillæ* laterales.

*Penes* intrantes.

*Sensus*: Lingua, Oculi, Antennæ in capite absque cerebro.  
(non Aures, Nares).

*Tegmenta*: cataphracta cute ossea sustentante.

*Fulcra*: Pedes, quibusdam Alæ.

## VI. VERMES.

*Cor* uniloculare, inauritum; Sanie frigida.

*Spiracula* nulla?

*Maxillæ* multifariæ, variæ variis.

*Penes* varii Hermaphroditis Androgynis.

*Sensus*: Tentacula, caput nullum (vix Oculi, non Aures,  
Nares).

*Tegmenta* interdum calcarea vel nulla, nisi Spinæ.

*Fulcra*: nulli Pedes aut Pinnæ.

CLAS-

---

Terribilia sunt opera Tua DOMINE,  
In multitudine virtutis Tuæ, Te metientur  
inimici Tui.

---



## CLASSIS I.

## MAMMALIA.

MAMMALIA hæc & nulla alia mammata Animalia, ex structura, visceribus, organis homini proxima, pleraque *Quadrupedia*, nobiscum Continentem inhabitant, tanquam inter hostes atrocissimos, dum pauca *Pinnata* intra Pelagum se subducunt.

VESTITUS Quadrupedium e *Pilis* flexilibus, mollissimis, distinctis, injuriæ minus obnoxiiis; iisque fertilioribus in frigidis quam æstuantibus terris. Hi vero *Pili* in *Aculeos* coaliti (*Eri-naceo*, *Hystricibus*), aculei explanati in *Squamas* (*Mani*), squamæ coadunatæ in *Scutum* (*Dasydis*); at pilorum vellus sæpe distinctum *Suturis* (*Cani*, *Equo*), quæ elongatæ in *Fubam* (*Equo*, *Sui*); Sed *Aquatica nuda* evasere, ne madeficerent, nisi in terram exire aliquando necesse habeant. Præterea *Facies* sæpe *Verrucis*, *Labia Vibrilis*, *Mentum Barba* (*Homini*, *Simiæ*, *Capræ*) & *Pedes Callis* non raro notata sunt.

FULCRA, motus instrumenta, pro expeditioni fuga in evitando hostem, aut assequendo prædam TERRESTRIBUS sunt *Pedes* IV, quorum anteriores *Palmis* instruuntur interdum tanquam *Manus* remoto pollice divisæ (*Primatibus*, *Dideiphibus*); Posteriores autem *Plantis*, ut validias properarent, & hi vel *Palmati* digitis membrana connexis, ut natarent, vel *Fissi* digitis separatis, ut facilius currerent, aut *Talis* innixi, ut firmiter persistenterent (*Homini*, *Urso*); Ne vero fuga detererentur inter aspera, vel denso vellere manicati (*Lepori timido*, *Vulpi Lagopo*, *Bradypis*), vel *Ungulis* tanquam calceis induti sunt digiti (*bisulcis Pecoribus*, *Suibus*), qui etiam *succenturiatis* muniti talis, vel *Solipedes* indivisis pedibus (*Equis*); sed in *manibus* sæpe ungues plani, orbiculati (*Homini*, *Simiis*, *Lemuribus*); At vero rapaciores *Feræ unguibus* armatæ subulatis ut prædam apprehenderent, lacerarent, terramque foderent; sed *Volantia* vel manibus elongatis palmatisque aëra scandunt (*Vespertiliones*), vel membrana inter palmas plantasque expandenda, velificant (*Lemur*, *Sciurus*, *Mus*). Aliter *AQUATICA*, quorum brachia intra latus retracta, & femora postice coadunata plantis in caudam horizontalem (*Cetis*).



**ARMA** Mammalium præter dictos ungues, nominandosque Dentes, imprimis *Cornua* cartilaginea capiti inserta sunt; hæc vel *solida* perennia (Rhinoceroti), vel *ramosa* annua, primumque pilosa apiceque crescentia (Cervis), vel *cava* vaginantia basi que crescentia (Bobus, Capris, Ovibus).

**CIBARIA** instrumenta *Dentes* audiunt, qui triplices: *Primores* sæpe compressi incisores pro evellendo, rodendo conscindendo; *Laniarii* conici longiores pro lacerando; *Molares* latiores pro conterendo, & hi obtusi phytiphagis, acutiores carnivoris; at *edentula* solæ Myrmecophagæ & Manis evasere.

**UMBRACULUM** est *Cauda*, qua turpissimæ absconduntur partes; hæc paucis *nulla* (Homini, Simiis & Muribus nonnullis), *abbreviata* nec femoribus longior (Lepori, Satyro, Talpæ, Erinaceis), *elongata* ad pedum longitudinem & ultra (Canibus, Muribus, &c); harum singulæ vel *Nudæ* (Muribus), vel *Prehensiles* convolvendæ proque quinta manu inservientes (Simiis, Hystrici, Didelphibus), vel *Comosæ* longis fetis (Equis, Bobus), vel *Floccosæ* apice penicilliformi (Leoni mari, Muri Jaculo), vel *Distichæ* utrinque pilosæ (Sciuris, Myrmecophagæ).

**CUSTODES** Animalium *Sensus* sunt pro conservatione individui; sed terrestribus Aures instructæ *Auriculis* varia figura lobatis, pro acutiore auditu; Aquaticis vero auriculæ nullæ; *Nasus* figura varia interdum elongatus in *proboscidem* (Elephanti, Bestiis), situs supra Labium superius *fissum* (Gliribus) aut *lacunosum* (plerisque).

**GENITALIUM** curiosior indagatio abominabilis displicet, quamvis varia & singularis Clitoride, Nymphis, Scroto, Pene, qui tamen posset ad ordines naturales viam monstrare.

**VENERE** *Vaga* pruriunt pleraque, ubi Mares dimicant inter se, quo valentiores polleant pro sobole vivaciore, incuntes feminas vivipatas foetum intra se excludentes, quem enixum lactant, defendunt, curant in proximas nuptias, adultioremve ætatem. *Polygama* autem nonnullis, ubi Mas gynæceam ex pluribus feminis sibi associatis defendit (Phocæ); paucissimis vero *Monogamia* est, dum Mas & Femina individui socii curam gerant foetus (Simiæ nonnullæ, Lemur, Vespertiones, Erinaceus).



MAMMÆ lactantes feminis omnibus, etiam Maribus (excepto Equo) numero determinatæ: *Pectorales* (Primatibus, Cetis); *Abdominales* (Didelphibus, Phocis); *Inguinales* (Pecoribus, Belluis); *Abdominales Pectoralesque* simul (Gliribus pluribus); *longitudinaliter* digestæ (Suibus aliisque), at sæpius binæ pro singulo fœtu ordinario.

COLUNTUR varia imprimis Pecora ob *Carnes, Lac, Corium, Vellera, Pinguedinem*; ad *Onera* verb Equus, Camelus, Elephas; instituuntur *Feræ* variæ pro *venatu, muribus, serpentibus*; vivariis asservantur rariora.

ORDINES imprimis a dentibus desumuntur:

		nullis utrinque	—	—	<i>Bruta. 2.</i>	
	Quadru- pedia, ( <i>ungvibus</i> <i>armata</i> )	— superioribus, inferioribus	pluribus	—	—	<i>Pecora. 6.</i>
	Dentibus Primori- bus	pluribus; laniariis	solitariis; primori- bus	—	—	<i>Bestia. 4.</i>
MAM- MALIA			superio- ribus	—	—	<i>Bellua. 7.</i>
				—	—	<i>Fera. 3.</i>
	Pinnata ( <i>mutica absque ungvibus</i> )			—	—	<i>Cete. 8.</i>
	loco pedum instructa			—	—	

### I. PRIMATES.

Dentes primores superiores *IV paralleli*. Laniarii *solitarii*.  
Mammæ *pectorales, binæ*.

Palmæ *Manus sunt*.

Brachia *diducta clavicularis, incessu tetrapodo valgo*.

Scandunt *arbores earumque gazas legunt*.

### II. BRUTA.

Dentes primores *nulli superius aut inferius*.

Incessus *ineptior*.

### III. FERÆ.

Dentes primores *utrinque: superiores VI, omnes acutiores*.

Laniarii *solitarii*.

Ungues *pedum acuti*.

Victus *ore savientium e cadaveribus, rapina*.



## IV. BESTIÆ.

Dentes primores *utrinque numero indeterminato*. Laniarii *semper uno plures*.

Nasus *elongatus, fodiens*.

Victus *e succosis radicibus, vermibus*.

## V. GLIRES.

Dentes primores *superius inferiusque 2*. Laniarii *nulli*.

Pedes *cursu salientes*.

Victus *rodendo cortices, radices, vegetabilia, &c.*

## VI. PECORA.

Dentes primores *inferiores plures; superiores nulli*.

Pedes *ungulati, bisulci*.

Victus *evelicando plantas ruminandas*.

Ventriculi 4: *Ingluvies macerans, ruminans; Reticulum cancellatum, recipiens; Omasus multiplicatus, consumens. Abomasus fasciatus, acejens Coagulo pro sebo, ut minus alcaliscant.*

## VII. BELLUÆ.

Dentes primores *plures, obtusi*.

Incessus *gravis*.

Victus *extrahendo vegetabilia*.

## VIII. CETÆ.

Pedum loco *pinnae pectorales & caudæ (plagiura) plana*.

Ungues *nulli*.

Dentes *cartilaginei*. Nasus *frontis saepe fistula*.

Victus *e Molluscis, Piscibus*.

Locus *pelagicus*.

*Hos a Piscibus divulsos jussi Mammalibus associari ob Cor biloculare calidum, Pulmones respirantes, Aures cavas, Penem intrantem Feminam Mammas lactantem, idque ex lege naturæ jure meritoque.*

AUCTORES: *Gesnerus, Aldrovandus diffuse, epitomator ejus Jonstonus, Rajus, paucique alii passim, sed mancam reliquerunt Historiam, de novo ordiendam secundum notas proprias; Descriptionibus attributorum, Dieta varia, Oeconomia propria, reliquis, ut solida grana e furiurum quisquiliis depurentur; exemplaria proposui in Canis domestico, Cervo Rhenone, Mure indico, Ove Ariete.*



## GENERUM Characteres compendiosi.

## I. PRIMATES.

1. HOMO *nosce te ipsum.*
2. Simia *Dentes laniarii, hinc remoti.*
3. Lemur *Dentes primores inferiores 6.*
4. Vespertilio *Manus palmatæ volatiles.*

## II. BRUTA.

5. Elephas *Dentes laniarii & molares; Nasus proboscide elongatus.*
6. Trichechus *Dentes laniarii superiores; molares ex osse rugoso. Pedes postici coadunati.*
7. Bradypus *Dentes laniarii & molares. Nasus obtusus.*
8. Myrmecophaga *Dentes nulli. Corpus pilosum.*
9. Manis *Dentes nulli. Corpus squamatum.*

## III. FERÆ.

10. Phoca *Dentes primores inferiores 4. Auriculæ nullæ.*
11. Canis *Dentes primores superiores intermedii lobati.*
12. Felis *Lingua aculeata. Ungues retractiles.*
13. Viverra *Lingua aculeata. Ungues exserti.*
14. Mustela *Dentes primores inferiores conferti: duobus alternis interioribus.*
15. Ursus *Dentes primores superiores excavati. Penis osse flexuoso.*

## IV. BESTIÆ.

16. Sus *Dentes primores superiores 4, inferiores 8.*
17. Dasypus *Corpus testa zonis intersecta.*
18. Erinaceus *Dentes primores superiores 2, inferiores 2.*
19. Talpa *Dentes primores superiores 6, inferiores 8.*
20. Sorex *Dentes primores superiores 2, inferiores 4.*
21. Didelphis *Dentes primores superiores 10, inferiores 8.*



## V. GLIRES.

22. Rhinoceros *Cornu nasale.*  
 23. Hystrix *carpus Spinis tectum.*  
 24. Lepus *Dentes primores superiores duplicati.*  
 25. Canis *Dentes primores superiores angulo recto excavati.*  
 26. Mus *Dentes primores superiores subulati.*  
 27. Sciurus *Dentes primores superiores cuneati; inferiores compressi.*

## VI. PECORA.

28. Camelus *ecornis dentibus laniariis pluribus.*  
 29. Moschus *ecornis dentibus laniariis solitariis: superioribus exsertis.*  
 30. Cervus *Cornua solida, ramosa, decidua.*  
 31. Capra *Cornua tubulosa erecta.*  
 32. Ovis *Cornua tubulosa reclinata.*  
 33. Bos *Cornua tubulosa perrecta.*

## VII. BELLUÆ.

34. Equus *Dentes primores approximati.*  
 35. Hippopotamus *Dentes primores distantes.*

## VIII. CETÆ.

36. Monodon *Dens in maxilla superiore exsertus.*  
 37. Balæna *Dentes cornei in maxilla superiore.*  
 38. Physeter *Dentes in maxilla tantum inferiore.*  
 39. Delphinus *Dentes in utraque maxilla.*



## I. PRIMATES.

*Dentes Primores superiores IV, paralleli.  
Mammæ Pectorales II.*

## I. HOMO nosce Te ipsum. (\*)

Sapiens. 1. H. diurnus; *varians cultura, loco.*

Ferus. tetrapus, mutus, hirsutus.

*Juvenis Ursinus lithuanus. 1661.*

*Juvenis Lupinus hessensis. 1344.*

*Juvenis Otinus hibernus. Tulp. obs. IV: 9.*

*Juvenis Hannoveranus.*

*Pueri 2 Pyrenaici. 1719.*

*Johannes Leodicensis.*

*America-2. rufus, cholericus, rectus.*

*rus. Pilis nigris, rectis, crassis; Naribus patulis; Facie ephel-  
litica, Mento subimberbi.*

*Pertinax, hilaris, liber.*

*Pingit se lineis dædaleis rubris.*

*Regitur Consuetudine.*

β al-

(\*) Nosse se ipsum gradus est primus sapientiæ, dictumque Soloris, quon-  
dam scriptum literis aureis supra Dianæ Templum. *Mus. ADOLPH.  
FRID. Præfat.*

*Physiologie: Te contextum Nervis, intertextum Fibris, Machina tenella, sed  
adolescente in perfectissimam, facultatibus instructam fere omnibus pluri-  
busque, quam reliqua cuncta. Nudum in nuda humo, natali die, abiecit  
natura ad valetus statim & ploratam, manibus pedibusque devincendum Ani-  
mal cæcis imperatum; cui scire nihil sine doctrina: non fieri, non ingre-  
di, non se ei, non aliud natura sponte. Plin. Vides itaque quædam vitam no-  
bis rerum natura promittit, quæ primum nascentium omen statim esse voluit.  
Seneca.*

*Diatetice: Te sinitate & tranquillitate, si noveris, felicem: Mod. esse conser-  
vandam, Nimis destruendum, Variatis afficiendum, insuetis frangendum,  
Consuetis indurandum; polyphagum Culina instructissima, per errores gra-  
tissima, igne vinoque horrenda. Parvo fames constat, in quo fastidium.  
Seneca.*

*Pathologie. Te tumidam usque dum crepueris bullam, piloque pendulam in  
puncto fugientis temporis. Nihil enim homine inbecillius terra atit. Homer.  
Nulli vita fragilior; nulli tot morbi, tot Cure, tot Pericula. Breve universum  
utique ævi tempus: Pars æqua morti similis exigitur; nec reputatur infantie  
annum, cui sensu carent; nec Senectæ in pœnam vivaces: hebetant Serpens, cor-  
pert Membra, præmoritur: Visus, Auditus, Incessus, Dentis, Ciborum in-  
strumenta. Plin. Sic magna pars mortis jam præterit, quidquid ætatis retro  
est Mors tenet. Totum denique hunc, quem vides populum, quousque cogitas  
esse; cito natura revocavit & conder; Mors omnes æque vocat; iratus Dis pro-  
pitiisque moriendum. Senec. II: 59.*



*Euro-*  $\beta$ . albus, sanguineus, torosus.  
*pæus.* *Pilis* flavescens, prolixis. *Oculis* cæruleis.  
*Levis*, acutissimus, inventor.  
*Tegitur* Vestimentis arctis.  
*Regitur* Ritibus.

*Asiati-*  $\gamma$ . luridus, melancholicus, rigidus.  
*cus.* *Pilis* nigricantibus. *Oculis* fuscis.  
*Severus*, fastuosus, avarus.  
*Tegitur* Indumentis laxis.  
*Regitur* Opinionibus.

B 3

J. ni-

*Naturaliter*: Te audacis naturæ miraculum, Animalium Principem, cujus cuncta sunt natura, esse animal fletus, ridens, melodum, loquens, doctus, iudicans, admirans, sapientissimum; sed fragile, nudum, inapte natura inermis, ad omnem fortunæ contumeliam projectum, alienæ opis indigens, anxie mentis sollicitæque tutelæ, precarii spiritus, pertinacis spei, querente vitæ, tardæ sapientiæ. Temporis annihilati emortui contentum, præteritis vividi diapidatorem, futuri dubii æstimatorem in vita volucem, preciosissima, irrevocabili; sic optima quæque dies miseris mortibus ævi prima fugit; alium ad quotidianum opus laboriosa Egestas vocat: aliam Læmus incarcerat, alulemq; suffecat; alium Ambitio nunquam quæta sollicitat; alius Divitiis, quæ optaverat, incipit. & voto laborat suo; alium Solitudo, alium semper vestibulum condens turba. Hic se habere dolet Libros, hic se perdidisse; Lacrymæ nobis deerunt antequam causæ dolendi. Sed quousque nos malos nostra mala rapere: circumferre pericula, ruere in ignotos, iratos sine injuria, ferarum more occidere quem non oderimus, secundos optare ventos, quorum felicitas est ad bella perferre; parum videlicet ad mortes nostras terra late patet. *Senec. Cæcæ animantia congregari contra dissimilia, ad Homini plurima ex homine mala. Plin.*

*Politice*: Te recti loco tenere errorem publicum fœdum, qui te vix enixum consuetudinis larva induit, nutrit, educat, alit, regit, secundum quam honestus, fortis, sapiens, moratus, pius existimaris; Cum gubernatus Opinione vivas ad Consuetudinem, nec ad Rationem. Te, inter perituros constitutum, cum nulli contigit impune nasci, beneficii loco petere, ut ultimus cervicem præbeas, dum interim, dulci fortuna ebrius, colligendo in crastinum Lapillos fortunæ certas, verbis in furorem ageris, aliter theoreticæ pios odio persequeris, quanteque tumultus excitas, non ut servias, sed cui; nugis irrevocabile tempus consumis; immortalia æternaque animo volutas, de feris nepotibus pronepotibusque disponis, novas spes oblitus conditionis Tux ponis, cum interea longa conantem mors opprimit, at in agone oculos aperiens (*ἀναρωπός*) somnium primo observas; *Sic vivimus ut immortales & morimur ut mortales. Senec.*

*Moraliter*: Te sub rudi larva Ineptum, Lascivum, Imitatorem, Ambitiosum, Prodigum, Solicitum, Asumum, Austerum, Invidum, Avarum, transformari in Attentum, Castum, Consideratum, Modestum, Sobrium, Tranquillum, Sincerrum, Mitem, Beneficum, suis Contentum. *Uti animantium*



*Afer.* ♂. niger, phlegmaticus, laxus.  
*Pilus* atis, contortuplicatis. *Cute* holosericea. *Naso* si-  
 mo *Labiis* tumidis. *Ferrinis* sinus pudoris; *Mammæ*  
 lactantes prolixæ.  
*Vasfer*, segnis, negligens.  
*Ungit* se pingui.  
*Regitur* Arbitrio.

*Monstro-* e. solo (a) arte (b, c).

*Sus.* a. *Alpini* parvi, agiles, timidi.  
*Patagonici* magni, segnes.  
 b. *Monorchides* ut minus fertiles: *Hottentotti*.  
*Junceæ* puellæ abdomine attenuato: *Europææ*.  
 c. *Macrocephali* capite conico: *Chinenses*.  
*Plagiocephali* cœcili antice compresso: *Canadenses*.  
*Habitat* inter Tropicos sponte gratisque; per reliquam  
*Telluris totam continentem coadæ.*  
 CORPUS erectam, nudum, Pilis raris remotissimis ad-  
 spersum, subsexpedale.  
 CAPUT OVOIDEUM: *Pileus* pilosus: *Sincipite* obtuso,  
*Vertice* obtusissimo, *Occipite* gibboso.  
*Facie* nuda: *Frons* planiuscula, quadrata, *Temporibus*  
 compressa, angulis sinu intra Pileum adscendens. *Su-*  
*percilia* prominula pilis extrorsum imbricatis, inter-  
 tinela *Glabella* planiuscula *Palpebra superior* mobilis,  
*inferior* quiescens; utraque *Cilii* exstantibus subrecurvatis  
 pectinata. *Oculi* rotundi: *Pupilla* orbiculata. *Genæ*  
 gibbæ, molliuscule, coloratæ. *Mala* compressiuscula,  
 vi *Rucae* laxiores. *Nasus* prominens, labio brevior,  
 compressus, apice altior gibbiorque: *Naribus* ovalibus,  
 intus

---

*Lusus*, *Luxuria*, *Ambitio*, *Avaritia*, *Vivendique* cupido; curat atque etiam  
 post se de futuro. *Plin.*

*Theologicæ*: Te ultimum finem creationis;

In Telluris globum, omnipotentis magisterium, introductum; ratione sa-  
 piente, secundum sensus concludente, mundi contemplatorem; ut ex ope-  
 re agnosceres Creatorem omnipotentem, omniscium, immentum & sempit-  
 ternum DEUM.

(*Cætera* revelata a *Theologis* explicanda.)

*Deo* namque sunt quæ in cognitionem DEI ducunt, *Creatio* & *Scriptura*,  
*Augustinus.*

DEUS itaque *Natura* cognoscendus, dein *Doctrina* recognoscendus.  
*Tertullian.*

*Homo* solus DEUM contemplatur, *Naturæ* & *Revelationis* eundem Auctorem;  
 quem te DEUS esse

justit, & humana qua parte locatus es in re, discet, *Perf. III; 71.*



intus hirtis, margine crassiusculo. *Labium superius* subperpendicularare, *Lacuna* exaratum; *Labium inferius* erectiusculum, magis gibbum. *Mentum* prominens, obtusum, gibbosum. *Aures* laterales: *Auriculae* rotundato-lunatae, appressiusculae, nude, supra margine fornicatae; infra gibbosae, molles.

**TRUNCUS** constans Collo, Thorace, Dorso, Abdomine.

*Collum* teretiusculum, capite brevius; *Cervicis Nucha* concava; *Gula* supra concava, medio subtus gibba.

*Thorax* antice posticeque depressiusculus. *Pectus* planiusculum, Jugulo excavato, *Axillis* concavis barbatis, *Scrobiculo* planiore. *Mammæ* duæ, pectorales, distantes, gibbæ, rotundatæ: *Papilla* cylindrica, obtusa, rugosa.

*Dorsum Tergo* planiusculo, *Humeris* exstantibus, *Interscapulio* depresso.

*Abdomen* gibbum, laxum: *Umbilico* excavato, *Epigastrio* planiore, *Hypogastrio* gibbosiore, *Hypochondriis* rotundatis, *Inguinibus* planiusculo-concavis. *Fubis* regio barbata. *Genitalia* exserta: *Pene* cylindrico, *Scroto* subrotundo, rugoso cute laxa, *sutura* longitudinali per *Perinauram* excurrente; f. *Vulva* gibba, compressiuscula. *Anus* retractus.

**ARTUS** ex *Manibus* loco pedum anteriorum & *Pedibus* posterioribus.

*Manuum Armi* divaricati, crassiusculi, teretes, longitudine pedum. *Cubitus* obtuso-prominulus. *Lacerta* crassitie armorum, teretes, introrsum planiores. *Palme* rotundatæ, dilatatae, planæ, extus convexæ; *Vola* concava; *Digiti* V: *Pollex* remotus, brevior, crassior. *Digiti* 2, 3, 4, 5 approximati, horum 5 minor reliquis, dein 2, 4, sed 3 paulo longior. *Ungues* omnibus rotundati, plano-convexi, *lunula* pallida.

*Pedum Femora* approximata, *Lumbis* musculosis, *Natibus* gibbis, carnosis, *Genibus* antrorsum versis, obtusissimis, subtus concavis. *Crura* longitudine femorum, pollice musculofo-ventricosa, inferne angustiora, antice macra. *Calcanei Tali* insistentes, prominuli, gibbi: *Malleolis* lateralibus, utrinque oppositis, hemisphæricis, duriusculis. *Plantæ* oblongæ, supra convexiusculæ, subtus planæ, transverse concavæ. *Digiti* V: omnes incurvi, subtus gibbi, approximati. *Pollex* crassior, brevior; 2, 3 subæquales, 4, 5 decrescientes; ultimo minimo. *Ungues* ut in *Manibus* omnes.



Simia Satyrus, Jockoed. Pongo Budon  
hos wara den samme som Troglodytes  
eller Orang-Outang

til Europa forde Orang-Outango, huf-  
wa alla wärit unga och förmodligen

satyri barer, wärit qvintka läragiftige  
men Melancholiske och dödt i ungdomen

äret; ehuru räkenskolike, hufvud och  
ei lärt tala, ty för och wärit hafwa

examinerat dem ut och i wärites ju-  
der wärites

Kallas Pongo i Africa och berättas ha  
3 1/2 aln höga och starka i proportion;

berömda stierkor at skogen, fordrifwa  
med på kar Elefanteyre, från sina

Samhälle; gå raka på 2 fötter

piloso  
xillis,  
toris;  
ma-  
Naso  
pente.

p. 84.

avæ,

inus.

e pu-

Mem-

Actas

idet,

t sui

1782-

## 2. SI-

(\*) Genus Troglodyta ab Homine distinctum, adhibita quamvis omni attentio-  
ne, obtinere non potui, nisi assumerem notam lubricam, in aliis generi-  
bus non contentam. Nec Dentes lanarii, minime a reliquis remoti;  
nec Nymphæ Caffræ, quibus carent Simiæ, hunc ad simias reducere  
admitterent. Inquirant autoptæ in vivo, qua ratione, modo notæ aliquæ  
existant, ab hominis Genere separari queat, nam inter simias verjantem oportet  
esse simiam. Apollodor.

Speciem Troglodyta ab Homine sapiente distinctissimam, nec nostri generis il-  
lam nec sanguinis esse, siatura quamvis simillimam, dubium non est, ne ita-  
que varietatem credas, quam vel sola Membrana nictitans absolute negat.

Afri Piles contortuplicatos, quamvis albos, in hoc miratus sum, collatis im-  
primis Vanetatum caussis in Plantis, in Pullo Gallinaceo, nec tamen  
quidquam de Mauris albis ex nigris statui.

Præcipuus nec dixi hos Troglodytas Plinii, quamvis nos ultimum simus  
Creationis opus.

Hanc candidus lufatus. Manpert. epist. 7. Krop it. 79. Bont. jav. 85, an Aldr.  
dicit. 249? incola orbis antarctici, nobis ignotus, ideoque utrum ad Ho-  
minis aut Simiæ genus pertineat, non determino. Mirum quod ignem ex-  
citer, carnesque affert, quamvis & crudas voret testimonio Peregrinantium.



*Differt* itaque a reliquis Corpore erecto nudo, at piloso Capite, Superciliis, Ciliisque, tandem Pube, Axillis, Naribusque Mento Feminis Nymphæ & Clitoris; Mammæ 2 pectorales. Caput Cerebro omnium maximo; Uvula; Facies abdomini parallela, nuda; Naso prominente, compho. brevior; Mento prominente. Cauda nulla. Fedes Talis incedentes.

## Troglo- 2. H. nocturnus. (\*)

dytes.

Homo sylvestris Orang Outang. *Bont. jav. 84. t. 84. Kakuilacko. Kixp. itin. c. 86. Dalin. orat. 5.*

*Ha' tat in Æthiopiæ conterminis (Plin.), in Javæ, Amboinæ, Ternatæ speluncis.*

Corpus album, incessu erectum, nostro dimidio minus. Pili albi, contortuplicati. Oculi orbiculati: iride pupillaque aurea Palpebræ antice incumbentes cum Membrana nictitante. Visus lateralis, nocturnus. Aetas XXV annorum. Die cæcutit, latet; Noctu videt, exit, furatur. Loquitur sibilo; Cogitat, credit sui causa factam tellurem, se aliquando iterum fore imperantem, si fides peregrinatoribus.

## 2. SI-

(\*) *Genus Trogloodytes ab Homine distinctum, adhibita quamvis omni attentione, obtinere non potui, nisi assumerem notam lubricam, in aliis generibus non constantem. Nec Dentes lanarii, minime a reliquis remoti; nec Nymphæ Castre, quibus carent Simiæ, hunc ad simias reducere admittent. Inquirat autoptæ in vivo, qua ratione, modo notæ aliquæ exstant, ab hominis Genere separari queat, nam inter simias versantem oportet esse simiam. Apollodor.*

*Speciem Trogloodytes ab Homine sapiente distinctissimam, nec nostri generis illam nec sanguinis esse, fractura quamvis simillimam, dubium non est, ne itaque varietatem credas, quam vel sola Membrana nictitans absolute negat.*

*Afri Piles contortuplicatos, quamvis albos, in hoc miratus sum, collatis impennis Varietatum causis in Plantis, in Pullo Gallinaceo, nec tamen quidquam de Mauris albis ex nigris statui.*

*Preadamitis nec dixi hos Trogloodytes Plinii, quamvis nos ultimum simus Creationis opus.*

*Homo conditus luscus. Maupert. epist. 7. Kiop. it. 79. Bont. jav. 85, an Aldr. dig. 299? incola orbis antarctici, nobis ignotus, ideoque utrum ad Hominis aut Simiæ genus pertineat, non determino. Mirum quod ignem exciter, carnesque alit, quamvis & crudas voret testimonio Peregrinantium.*



2. SIMIA, *Dentes Primores IV*, approximati.  
*Laniarii solitarii*, longiores hinc  
 remoti.  
*Molares obtusi.*

\* *Cauda nulla: Simiæ veterum.*

*Satyruſ, Pithecuſ, Gibbon, & Sylvanuſ*

Satyruſ. 1. S. ecaudata ſubtuſ nuda. *Syſt. nat. VI. p. 3. Satyruſ.*

Satyruſ indicuſ. *Tulp. obſ. III. c. 56.*

*Habitat in Africa, Aſia, & Indiarum.*

Magnitudo pueri ſexenniſ. *Dorſum crinibuſ nigris hir- ſutum; ſubtuſ ſ. antice undique glaber.*

*Pithecuſ veteribuſ notuſ deſideratuſ, Gibbon recentior*

Sylva- 2. S. ecaudata, clunibuſ tuberoſo-calloſiſ. *Syſt. nat. 3.*

nuſ. *Simia. Geſn. quadr. 847.*

*Simiuſ cynocephaluſ alter. Alp. aegypt. 241. t. 16.*

*Cercopithecuſ. Forſt. quadr. t. 59. f. 5.*

*Habitat in Africa, Zeylona. Le. Argot & Burgen.*

*Fronſ ad ſuperciliorum regionem tranſverſe gibba. Pellis urſina. Scrotum tamquam intra vulvam reconditum; vel penis intra ſacri foramen; autumno Teſticuli in- tumefcunt. Seceſ femine rapi inſtar extuberant.*

*Minatur mixiſ, cachinnuſ blanditur, caſſrorum more ſalutat. Sorbilia manu haurit. femina menſtruat.*

*Anatome. E. N. C. d. 2. a. 7. obſ. 40.*

\*\* *Cauda abbreviata: Papionuſ.*

*Sphinx, Silenuſ, Mandril, Haimon, & Apedia*

Sphinx. 3. S. femicaudata, ore vibriffato, unguibuſ acuminatiſ.

*Syſt. nat. 3. Neguſ. Sutoruſ. Le. Papionuſ.*

*Papio ſ. Baboon. Geſn. quadr. 352. t. 353. Aldr. digit.*

*260. Forſt. quadr. 145. t. 61. f. 1. Raj. quadr. 158.*

*Habitat in Borneo. etiam in Malaccaſca & Africa*

*Magnitudo Moloffi; incedent quatuor pedibuſ; Scrotum pendulum; Animal libidinoſum, feminis facile vim in- fert; litteraſ tranſferre addiſcit.*

Apedia. 4. S. femicaudata, palmarum pollice approximato, ungui- bus oblongiſ: pollicum omnium rotundatiſ.

*Simia cauda abrupta, unguibuſ compreſſiſ: pollice pal- marum digitiſ adhærente. Amœn. acad. 1. p. 278.*

*Simia quem ſenaliſ turpiſſima beſtia nobiſ Emiliuſ: quod Simiæ Mamma, Uvula, Uteruſ, Cilia, Muſculi Loquelæ, Ungueſ hominiſ ſunt; non veſo Rete mirabile, Clitoriſ, Nymphæ,*



Silenus Ouanderou Bayon,  
deraf nämnes 3<sup>re</sup> Varieteter,  
1<sup>sta</sup> Hel Hvit.

2<sup>dra</sup> Hvit med Swart hår och Skagg  
3<sup>dje</sup> Swart med hvit Skagg och Crimere.  
Rog stark och kätjefull, wäldfören  
Lwingsolk. Med hel kort Swans hörer  
till Panyones när och så rak på 2. fötter.

sciurea.  
es omnes  
, quam  
rix pol-

prolixa.  
alp.  
16. 170

Habitat in Asia: Persia, Java &c.

Species obscurae, agnitis Pedum unguibus aliisque plu-  
rimis attribuitur. Ouanderou Bayon, tom. VII. p. 157

+ ad Panyones pertinet Magni 3<sup>je</sup> Variet. dicitur ab. 1719. p. 157. den idem.

Faunus. 6. S. caudata barbata, cauda apice floccosa. Syst. nat. 3.

Cercopithecus barbatus 1. Clus. exot. 371. t. 371. Nie-  
rumb. nat. 179. Raj. quadr. 155.

Habitat in Asia: Persia, Java &c.  
Corpus nigrum, Barba, Pedes, anteriora abdomi-  
nis alba.

Paniscus. 7. S. caudata barbata, cauda prehensili, palmis subtetra-  
daetylis. Syst. nat. 3.

Sinea sinea major, palmis tetradactylis, cauda prehen-  
sili ad apicem subtus nuda. Brown. jam. 489.

Guariba. Marcgr. bras. 229. t. 226. Raj. quadr. 153.

Habitat in America meridionali: Brasilia.

Corpus nigrum. Pedes & Cauda cinidia exterior brun-  
nea; Caudae extremitas hinc nuda, qua, quicquid e  
terra elevet, prehendit. Digni Pedum 4-5. Z. Hill-  
man; est vero Pollex reliquis minor, introsum a ca-  
teris remotus, Ungue-que nana et rotundata; pedum  
subulati D. d. meo. Pullos in dorso gerit, qui ante mat-  
ris corpus ceteris angustius. Oriente & Occidente  
sole congregantur concionem celebrantes. Marcgr.

Diana. 8. S. caudata barbata, fronte barbaque falligiata. Linn. act.  
Stockh. 1754. p. 210. t. 6.

Cercopithecus barbatus guineensis. Marcgr. bras. 227.  
t. 228. Raj. quadr. 159.

Cercopithecus barbatus 2. Clus. exot. 311.

Habitat in Guinea.

Cauda minima, nuda, hinc nuda, qua, quicquid e  
terra elevet, prehendit. Digni Pedum 4-5. Z. Hill-  
man. Bayon

Magni-



*Habitat in Indiis.*

Magnitudo & color Sciuri subgrisei; similis *S. sciurea*. Pollex manuum anteriorum non remotus. Ungues omnes oblongi, ceteri repsi, sed pollicum tam anteriorum, quam posteriorum humanis similes, Cauda brevissima, vix pollicis transversa.

\* \* \* *Cauda elongata*: Cercopithecii.

Silenus. 5. *S. caudata barbata*, corpore nigro, barba nivea proliva. Simia Castaneus magnitudine cynocephalorum. *Misp. Egypt. 242: nectur. Simia. Indolm. n. 1. no*  
*Habitat in India: Zeylona, Java &c.*

Species obscurior, agilis Pedum unguibus aliisque plumis attingit. *Quandrorum. Zeylon. m. VII. p. 137*

Faunus. 6. *S. caudata barbata*, cauda apice floccosa. *Syst. nat. 3. Cercopithecus barbatus 1. Claf. exot. 371. t. 371. Hieronym. nat. 177. Raj. quadr. 153.*

*Habitat in Zeylona. Le. Misp. Indolm. n. 1. no*  
Corpus nigrum, Barba, Pedes, anteriora abdominis alba.

Paniscus. 7. *S. caudata barbata*, cauda prehensili, palmis subtetradactylis. *Syst. nat. 3.*

Simia fulca major, palmis tetradactylis, cauda prehensili ad apicem lobtus nuda. *Brown. Jan. 409.*

Guariba. *Marcgr. bras. 229. t. 226. Raj. quadr. 153.*

*Habitat in America meridionali: Brasilia.*

Corpus nigrum. Pedes & Cauda cinidia exterior brunnea; Cauda extremitas hinc nuda, qua, quidquid e terra eleuet, prehendit. Digi Pedum 4-5. *Z. Hallman;* est vero Pollex reliquis minor, introrsum a ceteris remotus, Unguesque manuum rotundati, pedum subulati. *D. Simon. Pulos in dorso gerit, qui ambunt matris corpus & ferius anousius. Oriente & Occidente sole congregantur concionem celebrantes. Marcgr.*

Diana. 8. *S. caudata barbata*, fronte barbaque fastigiata. *Linn. act. Stockh. 1754. p. 210. t. 6.*

Cercopithecus barbatus guineensis. *Marcgr. bras. 227. t. 228. Raj. quadr. 159.*

Cercopithecus barbatus 2. *Claf. exot. 311.*

*Habitat in Guinea.*

*Cauda minima, nectur. Indolm. n. 1. no*  
*Saccarina. Zeylon*

Magni-



Magnitudo Felis myotis, nigra parvis albidis. Dorsum postice ferrugineum. Femora subtus beluola. Gula pectusque alba. Frons immo erecta, albis, fastigiatis linea transversa in formam lunæ crescentis. Barba fastigiata, nigra, subtus alba, insidens tuberi adiposo. Linea alba ab ano ad genna ab exteriori latere femorum ducta. Ludibunda omnia dejicit, peregrinos nutritando salutat; inani ore hiat maxillaque exagitat; vocata respondet greck

Cephus. 9. S. caudata, buccis barbatis, vertice flavescente, pedibus nigris, cauda apice ferruginea

Cercopithecus barbatus alius guineensis. *Marcgr. bras.* 223.

*Raj. quadr.* 156.

*Habitat in America.*

Corpus fulvescens, subtus subcaeruleus; Os carulescens: barba flavescens.

Ayguila. 10. S. caudata subbarbata grisea, eminentia pilosa verticis longitudinali. *Osborn. iter.* 99.

*Habitat in India. Osborn. 1872. f. 11. p. 11.*

Corpus grisea, latius albis, subtus gula, pectore, abdomineque albis. Cauda corpore longior, cinerea, attenuata. Facies planifrons, alba, nuda. Nalis depressus, brevissimus, ab ore remotus, lacuna hinc superioris germina. Bucca subbarbata, longiorne menti subcaerenti. Supercilia frontis grava, prominentia. Pedes nigri: Ungues pollicum rotundatis; reliqui oblongi. Auriculæ acutiusculæ.

Hama-dryas. 11. S. caudata imberbis, auribus comosis. *Syst. nat.* 3.

Simius cynocephalus, ad utramque aurem magna coma.

*Alp. aegypt.* 248.

*Habitat in Africa.*

*Hæc etiamnum obscura est.*

Jacchus. 12. S. caudata, auribus villosis patulis, cauda hirsutissima longissima, unguibus subulatis: pollicum rotundatis.

Simia auribus villosis patulis, unguibus pollicum subrotundis. *Syst. nat.* 3.

Cercopithecus brasiliensis 3, Saguin. *Clas. exot.* 372.

*t. 372. Raj. quadr.* 154. 160.

Cagui minor. *Marcgr. bras.* 227. *Pet. gaz.* 26 t. f. 5.

*Klein. tab.* 11. t. 1.

*Habitat in America. Linnæus*



- Cauda denso vellere annulata. Aures villosi, extus albi. Superba, injuriarum impatiens, altissime clamat, delicatula.
- Oedipus. 13. S. caudata imberbis, capillo dependente.  
Cercopithecus minimus mexicanus, capilliceo niveo.  
*Edu. av. 195. t. 195.*  
*Habitat in America. L. Pucheran. Surin.*  
Corpus fuscum, subtus album. Capillitium dependens, humano simile. Cauda longa, nigra, introrsum aurantia.
- Æthiops. 14. S. caudata imberbis, vertice pilis arrectis lunulaque frontis albis.  
Simia æthiops. *Hasselqv. iter. 190.*  
*Habitat in Æthiopia. Hasselqvist. L. Hancock. Surin.*  
Corpus fuscum Dianæ, fuscum, subtus album. Cauda recta, subtus ferruginea. Supercilia s. lunula alba transversa. Palpebra superior nuda, alba. Aures acutiuscula.
- Midas. 15. S. caudata imberbis, labio superiore fisso, auribus quadratis nudis.  
Cercopithecus niger minimus, manibus & pedibus croceis. *Edu. av. 196. t. 196.*  
*Cay. Raj quadr. 155.*  
*Habitat in America. L. Pucheran. Surin.*  
Manus & Pedes nudi aut rubri. Corpus atrum, Cauda longissima. Aures nude, ample, retuse. Ungues omnes subulati s. ferini, exceptis pollicum plantarum rotundatis s. humanis.
- Cyna- 16. S. caudata imberbis, naribus bifidis elatis, clunibus molgos. tuberosis. *Syst. nat. 3.*  
Simia ægyptiaca cauda elongata, clunibus tuberosis nudis. *Hasselqv. iter. 189.*  
Cercopithecus angolensis major. *Marcgr. bras. 227. Raj. quadr. 155.*  
*Habitat in Africa. L. Macartney. L. Pucheran.*  
Color lupi ex fusco viridi - favescent. Statura urfi. Nates calvæ. Cauda arcuata. Abdomen albicans. *Noctu vigilias instituit.*
- Apella. 17. S. caudata imberbis, cauda subprehensili, corpore fusco, pedibus nigris. *Mus. Ad. Fr. 1. t. 1.*



*Habitat in America.*

*Undique circumspiciens, Sono pulli Meleagridis famelici.*

Moita. 18. S. caudata imberbis, ore fusco, corpore spadiceo, cauda nuda subquamotâ.

Cercopithecus americanus minor Monkie dictus. *Sebmus. 1. p. 52. t. 33. f. 1.*

*Habitat in America.*

Capucina. 19. S. caudata imberbis, cauda longa hirsuta, facie flavescente. *Mus. Ad. Fr. 2. t. 2.*

*Habitat in Brasilia de Maracâ & Maranhão.*  
*Clamore horrendo hostes pellit; stridet sæpius uti Cicada; irata latrat more catuli.*

Sciurea. 20. S. caudata imberbis, occipite prominulo, unguibus quatuor plantarum oblongis. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 3.*

*Habitat in India.*

Corpus Scuri, griseo-virens, subtus pallidum. Ulnæ & Tibiæ ferrugineæ. Cauda villosa, corpore duplo longior. Pollicum ungues rotundati.

Syrichta. 21. S. caudata imberbis, ore ciliisque vibrissatis. *Syst. nat. 3.*

Cercopithecus luzonicus minimus. *Pet. gaz. 21. t. 13. t. 11.*

*Habitat in Luzonum insulis.*

3. LEMUR. *Dentes Primores superiores IV: intermediis remotis.*

*Inferiores VI, longiores, perrecti, compressi, paralleli, approximati.*

*Laniarii solitarii, approximati.*

*Molares plures, sublobati; antici longiores acutiores.*

cardigræ- 1. L. ecaudatus. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 3. Nattpyölingen*  
cus. Simia ecaudata, unguibus indicis subulatis. *Syst. nat. 5. n. 2.*

Ani-

Species Simiarum inter Mammalia plurimæ, sed paucissimæ vite descriptæ & cognitæ, plurimæ eorum ignorantur.

Simiæ s. p. d. s. memores, prudentes, imitatores, gesticulatores, indociles, nimis timide, timide, cibos brevia moderant, pediculos tenentur, tactu excellent, et de aliis generibus, menstruant, terrefactæ eant marmidæ, urine vicia sive distipcto a vulva singulares.



Animal cynocephalum tardigradum. *Seb. mus.* 1. p. 55. t. 35. f. 1. 2. & t. 47. f. 1.

Animal elegantissimum robinsoni. *Rej. quadr.* 161.  
*Habitat in Zeylona.*

Statura *Sciuri*, *jaeserruginea*, *linea dorsali subfusca*; *Gula albidiore*. *Linea longitudinalis oculis interjecta* *area*. *Facies tecta*. *Auriculae nuceolatae*. *nares biforbatae*. *Pedum palmae plantaque nuda*. *Ungues rotundati*: *maxima plantarum vero javilati*. *Ungulae fere nulla*. *Mammæ 2 in pectore; 2 in abdomine versus pectus*.

*Animal tardigradum, auditu excellens, monogamum.*

Catta. 2. *L. cauda annulata.*

*Simia-Sciurus madagascariensis, sive Maucauco.* *Elv.* av. 199. t. 199.

*Habitat in Madagascar.*

Statura *Felis*, *juocinerea*. *Oculorum regiones nigrae*. *Caput acuminatum*. *Aures tecta*. *Cauda longa, pectata annulis atris cinerisque*. *Ungues junulati*: *pollicibus plantarum rotundiores; scandit ut Simia, sed tardiuscule*. *Habitu accedit ad Genettam auctorum.*

volans. 3. *L. caudatus, membranâ ambiente volitans.* †.

*Cato-Simius volans camelli.* *Pet. gaz.* 14. t. 9. f. 8. *Act. angl.* 277. n. 1065.

*Vespertilio admirabilis.* *Bont. jav.* 68. t. 69.

*Felis volans ternatea.* *Seb. mus.* 1. p. 93. t. 58. f. 2. 3.

*Habitat in Asia.*

*Membrana more Sciuri volantis s. Muris volantis a capite ad manus, a manibus per latera ad plantas, a plantis ad apicem caudae expansa*. *Ungues acuti*. *Mammæ duæ pectorales*. *Edit fructus arborum*. *Ex mammis videtur Lemuribus s. Simiis proximum Animalculum, sed nobis non visum; ulterius examinent autoptæ.*



4. VESPERTILIO. *Dentes erecti, acuti, approximati; primores 4 æquales. Manus palmatæ volitantes membrana corpus cingente.*

Vampyrus. 1. *V. ecaudatus, naso simplici, membrana inter femora divisa. Gaderinus*

*Vespertilio cauda nulla. Syst. nat. 7.*

*Canis volans ternatanus orientalis. Seb. mus. 1. p. 91. t. 57. f. 1. 2.*

*Vespertilio ingens. Clus. exot. 94. Edv. av. 180. t. 180. f. 2. 4.*

*Habitat in Asia. La Ronette Bayon*

*Noctu haurit sanguinem dormientium, cristas Gallorum & lacrymas palmarum.*

Speetrum. 2. *V. ecaudatus, naso infundibuliformi lanceolato.*

*Canis volans maxima aurita. Seb. mus. 1. p. 92. t. 58. f. 1.*

*Habitat in America australi. Rolander. La Ronette Bayon*

*Nares extus infundibulum referentes, superne ascendentes in folium lanceolatum. Aures ovata, interius laciniis subulata membranacea, longitudine auriculæ. Dentes Primores 4. Laniarii solitarii, magni, approximati reliquis. Molares anteriores breviores, obtusiores. Alarum digiti 4, quorum 1. annexus radio; Pollex brevis ungue arcuato. Pedes digitis 5 equalibus, unguibus arcuatis. Calcaneus exserit tendinem subulatum secundam marginem membrane later pedes posticos, non coeuntem cum opposito. Cauda nulla.*

perspicillatus. 3. *V. ecaudatus, naso foliato plano acuminato. Syst. nat. 7. Mus. Ad. Tr. L. p. 7.*

*Vespertilio americanus vulgaris. Seb. mus. 1. p. 90. t. 55. f. 2. Edv. av. 201. t. 201. f. 1.*

*Vespertilio rostro appendice auriculæ forma donato. Sloan. jam. 2. p. 330*

*Habitat in America.*

*An hæc femina sequentis?*

4. V.

*Vespertilionum genus nocturnum volitat Palmis expansis palmaris membranaque laterali; Phalænis imprimis victitans.*



Spalma. 4. V. caudatus, naso foliato obcordato. *Syst. nat.* 7.  
 Glis volans ternatanus. *Seb. mus.* 1. p. 90. t. 56. f. 1.  
*Habitat in Asia.*

Ieporinus. 5. V. caudatus, labio superiore bifido. *Syst. nat.* 7.\* *Mus.*  
*Ad. Fr.* 1. p. 7.\*  
 Vespertilio, cato similis, americanus. *Seb. mus.* 1. p. 89.  
 t. 55. f. 1.  
*Habitat in America.*

auritus. 6. V. caudatus, naso oreque simplici, auriculis duplicatis  
 capite majoribus.

*L'Oreiller  
 Buffon*

Vespertilio auribus majoribus. *Frisch. av.* t. 103. *Edv.*  
*av.* t. 201. f. 3. *Olear. mus.* t. 15. f. 1.

*Habitat in Europa.*

*Distincta species auriculis, nisi solo sexu a sequenti a-*  
*liena?*

murinus. 7. V. caudatus, naso oreque simplici, auriculis capite mi-  
 noribus. *Faun. svec.* 18. *Syst. nat.* 7.

Vespertilio. *Bell. av.* 147. *Gejn. av.* 604. *Aldr. ornith.*  
 1. p. 571. *Jonst. av.* 53. t. 20. *Alb. av.* 3 p. 95.  
 t. 101. *Raj. quadr.* 243. *Edv. av.* t. 201. f. 2.

Vespertilio auribus minoribus. *Frisch. av.* t. 102.

*Habitat in Europa.*

*Noctu volat, victitat imprimis Phalænis, capitur Arctii  
 Lappæ calycibus, hybernat, de terra non evolat; ve-*  
*nenatus.*

*Anatome. E. N. C. d. 2. a. 1. obs.* 48.

*Septem Vespertilionis Europæos deli-*  
*neavit & descripsit Buffon Tom. II*



## II. BRUTA.

*Dentes Primores nulli utrinque.*

5. ELEPHAS. *Dentes Primores nulli.*  
*Laniarii superiores elongati.*  
*Proboscis longissima, prehensilis.*  
*Corpus nudiusculum.*

maximus. 1. ELEPHAS. *Raj. quadr. 123. Syst. nat. 11. Seb. mus. 1. t. III. f. 1.*

*Elephantus. Gesn. quadr. 377. Aldr. quadr. l. 1. c. 9. Jonst. quadr. 30. t. 78. f. 9.*

*Habitat in Zeylonæ paludosis ad Amnes, edit Ramos, Cocos, Guilandinæ semina, Frumentum.*

*Maximum quadrupes. Oculi parvi. Dentes Laniarii superiores exserti (Ebur). Aures amplissima, pendula, dentata; act. angl. 277. p. 1031. Cutis crassissima, callosa. Mammæ 2 juxta pectus. Ungues in apicibus loborum pedum. Genua flexilia. Collum breve.*

*Proboscis longissima, extensilis, acute odorans, loco manus ipsi inserviens; ea cibum potumque haurit, kasiemque pellit; ea præcipua occiditur; raucem metuit sub somno ob tracheæ infectionem. Retro coit & mingit. Portat domos, rectore collo insidente; in bello armatur faucibus; vulnuscule inter axis & atlancem furiosus occiditur; ceterum prudens, docilis.*

C

6. TRI-

*Paxwax, Linnæus cum solum, ea Caput elephanta & Collum signandum, commune est quadrupetibus; at deest Homini & Simili, cum etiam plantamque sedant & incedant, nec eo indigeant. Rufus.*



6. TRICHECHUS. *Dentes Primores nulli.*  
*Laniarii superiores solitarii.*  
*Molares ex osse rugoso utrinque inferius duo.*  
*Labia geminata.*  
*Pedes posteriores coadunati in pinnam.*

Manatus. 1. TRICHECUS. *Art. gen. 79. syn. 107. Syst. nat. 37.*  
*Manatus. Rond. pisc. 490. Gesn. pisc. 213. Heron. mex. 323.*  
*Manati. Clus. exot. 133. Aldr. pisc. 728.*  
*Manati. S. Vacca marina. Raj. quadr. 193.*  
*Habitat in Mari Americano.*  
*Labium superius muricatum Vibrissis rigidis, incurvis.*  
*Pili corporis remoti, breves. Pedes antici abbreviati, palmati, unguiculati; postici coadunati. Mammæ 2. pectorales.*  
*Edit vegetabilia; mansuescit; musica delectatur. Caro esculenta.*

7. BRADYPUS. *Dentes Laniarii obtusiusculi remotissimi.*  
*Molares utrinque obtusi.*  
*Corpus pilis tectum.*

tridactylus. 1. B. manibus tridactylis, cauda brevi. *Syst. nat. 6. p. 3.*  
*Amœn. acad. 1. p. 487\* Mus. Ad. Fr. 4.*  
*Arctopithæcus. Gesn. quadr. 869. t. 870.*  
*Ai f. Ignavus. Margr. bras. 221. Clus. exot. 110. t. 373. Seb. mus. 1. p. 53. t. 33. f. 2. Olear. mus. 7. t. 6. f. 2.*  
*Habitat in Americæ meridionalis arboribus; Victitat foliis teneris; ~~Ubi~~ bibit; imbres metuit.*  
*Gula flava. Auriculæ nullæ. Cauda subovata. Digiti combinati. Ungues palmarum 3; plantarum 3. Mammæ 2 pectorales. Corpus valde pilosum, vitæ tenax.*

*panne, nomis ræ  
 diibus etc*



Facile scandit, tardissime & vix incedit, attonitus quasi caput flectit; sonus senarius ascendens; clamor horrendus, lacrimæ miseræ. *Marcgr. bras. 225. Butt. 2. 167*

didacty- 2. B. manibus didactylis, cauda nulla. Syst. nat. 3. Mus.  
lus. Ad. Fr. 4.

Tardigradus ceilanicus. Seb. mus. 1. p. 54. t. 34. f. 1.

& t. 33. f. 4. *ai Buttou*

Habitat in Zeylona. *Le Tourmiller Buttou*

Corpus pilis ferrugineis undulatis. Caput rotundatum.

Auriculæ magnæ. Ungues in palmis 2, in plantis 3.

Mammæ 2 pectorales.

## 8. MYRMECOPHAGA. Dentes nulli.

Lingua teres, extensilis.

Corpus pilis rectum.

didactyla. 1. M. palmis didactylis, plantis tetradactylis. Syst. nat. 8.

*Mus. Ad. Fr. 8. Myrstone*

Tamandua S. Coati americana alba. Seb. mus. 1. p.

60. t. 37. f. 3.

Habitat in America australi. *Le Tourmiller Buttou*

tridacty- 2. M. palmis tridactylis, plantis pentadactylis. Syst. nat. 8. *Myr Björn*

la. Tamandua-guacu *Marcgr. bras. 225. Seb. mus. 1. p. 60.*

t. 37. f. 2. & t. 40. f. 1. *Raj. quadr. 241.*

Habitat in America meridionali. *Le Tamanoir Buttou*

Vivitat Formicis, insectis, quorum nidos ungue secat.

Macula nigra a pectore versus latus ducta. Mammæ

Pectorales 2, Abdominales 6; lente currit, cauda lata

instar muscarii se tegit, arbores etiam scandit.

tetradacty- 3. M. palmis tetradactylis, plantis pentadactylis. Syst.  
yla. nat. 8.

Tamandua 1. *Marcgr. bras. 226. Raj. quadr. 242. Seb. mus. 2. t. 47. f. 2.*

Habitat in America meridionali.

Noctu exit; die dormit capite sub brachiis recondito;

irata baculum prebendit, stertit, posterioribus pedibus

insidens. Caudæ extremitas calva, qua se ex ramis

arborum suspendere potest, quod non in precedenti.



9. MANIS. *Dentes* nulli.  
*Lingua* teres, extensilis.  
*Corpus* squamis tectum.

pentada- 1. M. pedibus pentadactylis. *Syst. nat.* 8. *Act. Stockh.* 1749.  
 ctyla. p. 265. t. 6. f. 3.

*Armadillus squamatus major ceylanicus.* *Seb. mus.* 1.  
 p. 88. t. 54. f. 1. *♂.* t. 53. f. 5. *Aldr. quadr.* 657.

*Lacertus squamosus.* *Clus. exot.* 374. *Bont. jav.* 60.  
*Olear. mus.* 8. t. 7. f. 1. *Pet. gaz.* 32. t. 20. f. 1.  
 2. *Raj. quadr.* 274.

*Myrmecophagus squamatus* f. *Dæmon thebaicus.* *Herm.*  
*mus.* 295.

*Habitat in India orientali.* *Vicitat Formicis, Vermibus,*  
*Lacertis.*

*Corpus supra squamis basi striatis setisque interstinctis*  
*vestitum ut strobilus; subtus hirtum est. Sed Cauda*  
*utrinque squamosa, etiam subtus imbricata.*

*Auriculæ nude rotundate. Ungues primores medii ma-*  
*jores, quibus contractis incedit.*

*Myrmecophagis affinis. Irata squamas erigit horrida.*  
*Cauda pinguis in epulis expetita.*

*Le Pangolin est le Phatagin*

*Buffon Tom. IV pag. 72.*

*Dee diverse species hujus Generis*



## III. FERÆ.

*Dentes Primores superiores sex, acutiusculi. Canini solitarii.*

10. PHOCA. *Dentes Primores superiores VI paralleli: exteriores majores. Inferiores IV, paralleli, distincti, æquales, obtusiusculi.*

*Laniarii I: superiores ab incisiforibus, inferiores a molaribus remoti.*

*Molares V s. VI, tricuspидati.*

*Auriculæ nullæ.*

*Pedes postici coaliti.*

Ursina. 1. P. capite auriculato.

*Ursus marinus. Act. petropol. 2. ann. 1749.*

*Habitat in Cainschatcæ maribus inter Asiam & Americam proximam, primario in insula Beringii.*

*Impetuosissime natant, mares polygami gregatim degunt cum uxoribus, filiis, filiabus ad 120; coeunt in litore resupinata femina, vix metuunt hominem, mordent projectum latidem, senes elumbes quiescunt pingues, proprium lapidem pro lecto habent, quem non deserunt; bella instituunt propter uxores, lectum, æquum & justum; succumbente uno accurrit alter opem laturus, mox alteri alius, ne duo contra unum, usque dum omnes prælio involuti: mæsti lacrymas fundunt copiosissimas. Steller.*

Leonina. 2. P. capite antice cristato.

*Leo marinus. Anson. itin. 100. t. 100.*

*Habitat ad polum Antarcticum.*



Mas labio superiore cristato. Dentes 2 fere exserti in maxilla inferiore.

Natant gregatim, pugnant pro feminis, excubias agunt.

Rosmarus. 3. P. dentibus laniariis superioribus exsertis. *Syst. nat.* 6. n. 8.

Rosmarus. *Clear. mus.* 38. t. 23. f. 3. *Jonst. pisc.* t. 44. *Worm. mus.* 289. *Bonon. mus.* 269. f. 27.

Mors f. Morfz, Rosmarus. *Gesn. aqu.* 211.

Wall-Ross. *Martens. Spitsb.* 78. t. 1. P. f. B.

Equus marinus f. Hippopotamus falso dictus. *Raj. quadr.* 191. *Le Morse Biscaya*

Habitat intra Zonam arcticam Europæ, Asiæ, Americæ.

Vitulina. 4. P. dentibus laniariis tectis. *Syst. nat.* 6. n. 1.

Phoca f. Vitulus marinus. *Gesn. aqu.* 702. *Aldr. pisc.* 722. *Jonst. pisc.* 44. *Dodart. act.* 191. t. 191. *Raj. quadr.* 189.

Habitat in mari Europæo. *Sial*

Dormiunt in lapide ex aqua eminente, pariunt in glacie, per quam ascendunt halitus, non descendunt.

Mammæ retrahunt duas abdominis; inter Halecum catervos saginantur, a Laris provocatæ expuunt pisces.

Anatome. *E. N. C. d. 1. a. 9. obs.* 98. & *d. 3. a. 7. app.* 15.

II. CANIS. Dentes Primores superiores VI: laterales longiores distantes: intermedii lobati.

Inferiores VI: laterales lobati.

Laniarii solitarii, incurvati.

Molares VI f. VII (pluresve quam in reliquis.)

familiaris. 1. C. cauda (sinistrorsum) recurvata. *Faun. svec.* 12. *Syst. nat.* 5. *Diff. Canis* 1. t. 1. *Hund*

Canis. *Gesn. quadr.* 91. *Aldr. digit.* 482. *Jonst. quadr.* 122. *Raj. quadr.* 176.



- domestic. α. auriculis erectis, cauda subtus lanata. *Mushund*.  
 sagax. β. auriculis pendulis, digito ipurio ad tibias posticas. *Jagthund*  
 grajus. γ. magnitudine lupi, trunco curvato, rostro attenuato. *Canis scoticus venaticus*. Gesn. quadr. 229. Aldr. 545.  
 Molossus. δ. magnitudine lupi, labiis ad latera pendulis, corpore to- *Wiedohund*  
 roso. *Canis sagax sanguinarius*. Gesn. quadr. 251.  
 aquaticus ε. pilo crispo longo, instar ovis. *Dogg*.  
 meliteus. ζ. magnitudine Sciuri. *Kinshund*.  
 fricator. η. naso resimo, auribus pendulis, corpore quadrato. *Mops*  
 vertagus. θ. pedibus curvatis, trunco longo sæpius variegato.  
 avicular. ι. cauda truncata. *Canis pantherinus*. Aldr. digit. 555.  
 extrarius. κ. auriculis longis lanatis pendulis. Aldr. digit. 561.  
 ægyptius. λ. nudus absque pilis. *Nehet hund*.

Habitat sæpius cum homine passim, etiam spontaneus evasit.

Caput vertice carinatum. Labium inferius lateribus den-  
 tatis nudis occultatum. Myllaces ordinibus 5. f. 6.  
 Nares extrorsum recurvato sinu lunares. Auriculæ  
 margine baseos superiore reflexo; posteriore duplicato;  
 antico trilobo. Verrucæ faciei pilosæ 7. Suture vel-  
 leris 8: collares, sterneæ, cubitales, abdominales, ocu-  
 lares, lumbares, auriculares, anales. Mammæ 10:  
 harum quatuor in pectore. Pedes subpalmati.

Edit carnes, vegetabilia farinosa, non olera. Digerit ossa;  
 Vomitu a gramine purgatur, cacat supra lapidem: Al-  
 bum græcum, septicum summum. Potat lambendo,  
 mingit ad latus, cum hospite sæpe centies, odorat anum  
 alterius, odoratu excellit naso humido. Levissime in-  
 cedit supra digitos, vix sudat, calidus linguam exse-  
 rit, cubitum iturus circumit locum, dormit auditu  
 acutiore, somniat. Procis rixantibus crudelis, catul-  
 lit cum variis, mordet illa illos, cohæret copula jun-  
 ctus; gravida 63 diebus, parit sæpe 4 ad 8, masculis  
 patri similibus, femineis matri. Fidissimus omnium,  
 docilis, odit ignotos, mordet projectum lapidem, ad  
 musicam ululat. Latrat in peregrinos, excepto cane  
 Americæ australis; a Mahometanis rejectus.

- Lupus. 2. C. cauda incurvata. Faun. suec. 13. Syst. nat. 5. *warg*  
 Lupus. Gesn. quadr. 634. Aldr. dig. 144. Forst. quadr.  
 89. Raj. quadr. 173.  
 Habitat in Europæ sylvis, etjam frigidioribus.



*Catervatim incedit, Pecora, Equos, Sues occidit, rarius hominem; in sylvis suspiciocissimus vix audet; tractum funiculum metuit. Oculi noctu lucent.*

Anatome. E. N. C. d. 2. a. 9. obs. 71. & cent. 10. app. 450.

Hyæna. 3. C. cauda recta annulata, pilis cervicis erectis, auriculis nudis. *Syst. nat. 5.*

Lupus maritimus. Bellon. aquat. 33. t. 34. Jonst. quadr. t. 57. Gesn. quadr. 674.

Taxus percinus 1. Hyæna veterum. Kämpf. amœn. 411. t. 407. f. 4.

Habitat in India. *Gilfras.*

M. pinnis suis. Pili dorsi subspithemai, erecti, apicibus nigris. Oculi rostro propinquiores. Auriculæ nude. Cauda annulis nigricantibus verticillata; crura annulis nigris circumdata. Striæ corporis fuscæ & nigre, transversales, a dorso ad ventrem ductæ.

Excavat terram degente in antris, diutius sine cibo vivit, in burana caverna sævit, quæ e tumulis effodit, coemiteriis infesta.

Vulpes. 4. C. cauda recta. apice albo. *Syst. nat. 5.*

Vulpes. Gesn. accer. 965. Alder. dig. 195. Jonst. quadr. 32. Raj. ancar. 177. Raf.

Habitat in Europa, Asia, Africa, antra fodiens.

Corpus glauco natescens. Aures recti. Maxillæ albæ. Pedes antice nigrescentes.

Depit in antris, quæ fodit animal astutissimum; sævit in Agnos, Anseres, Gallinas, Aviculas, non Accipitres fetidioresque; colligit stercore animalium. Fragrat ambrosiaco odore supra basin caudæ.

Alopex. 5. C. cauda recta: apice nigro. *Syst. nat. 5.*

Vulpes campestris vulgo.

Habitat in Europa, Asia.

Lagopus. 6. C. cauda recta: apice concolore. *Syst. nat. 5.*

α. Vulpes alba. Kalm. bahus. 236. *Tia'llraika.*

β. Vulpes cærulefcens. Faun. Sæc. 14. *Ma Ra f.*

Habitat in alpibus Lapponicis, Sibiria.

Pedes densissime pilosi ut in Lepore.

aureus. 7. C. *Lupus aureus dictus. to. Sch. Mats.*

Lupus aureus. Kämpf. amœn. 413. t. 407. f. 3. Raj. quadr. 174.



Felis Historia af Buffon wäl  
utredd, Kommer öfwerens med  
Linnei Leo och Tigris, men Pardus,  
Onca och Pardalis confunderade  
Panthere, L'Once & Leopard,  
hos Buffon, äro gamla werldens  
3<sup>ne</sup> Species Felis, likaså Carual  
Lionets upprättare.  
Men Caguar och Couguar äro  
Amerikas Tigrar, mindre farlige  
än Asiens.  
Lynx är gemensam för gamla  
och nya werlden, likaså Wild.  
och Hus. katten.  
Lionet torde kunna bestås eget  
genus och skiljas från kattsläk-  
tet.



Vulpes indiæ orientalis. *Valent. mus.* 452. t. 452.

*Adill. Bell. itin.* 160.

*Habitat in oriente.*

*Nitide flavus, catervatim incedit, farto deditus; uno clamante clamant remoti alii, ambriante sono nocturno; ululatus execrabilis, quasi exulatus latratu interceptus. Descriptio vera animalis etiamnum desinit.*

12. FELIS. *Dentes Primores æquales.*

*Molares terni.*

*Lingua retrorsum aculeata.*

*Ungues retractiles.*

Leo. 1. F. cauda elongata, corpore helvulo.

*Felis cauda elongata floccosa, thorace pubato. Syst. nat. 6. p. 4. n. 1.*

*Leo. Gesn. quadr. 572. Aldr. dig. 2. Jonst. quadr. 72.*

*Dodart. act. 1. t. 1. & 7. t. 7. Raj. quadr. 162.*

*Habitat in Africa. Sejer*

*Color luteo-rufus. Fons quadrata. Cor maximum. Maris Thorax hirsutus Caudaque floccosa.*

*Segnis, esuriens prædatur de Equis et majoribus quadrupedibus, nec nisi famelicus hominibus; fugatur accensa flamma; canibus coercetur. Retro mingit & coit? Rugitus horrendus a tracheæ annulis integris imbricatis.*

*Anatome. E. N. C. d. 1. a. 2. obs. 6. Earth. act. 1671. n. 17.*

Tigris. 2. F. cauda elongata, corpore maculis omnibus virgatis.

*Syst. nat. 4. n. 2.*

*Tigris. Gesn. quadr. 936. Aldr. dig. 101. Jonst. quadr.*

*84. Bont. jav. 52. t. 53. Raj. quadr. 165.*

*Habitat in Asia. Sejer*

*Magnitudo Leonis. Macule virgatæ, transverse. Pulcherrimum animal tremenda velocitas. homini pessimus, desolat indos; Mas occidit proprios filios.*

*Anatome. E. N. C. d. 1. a. 2. obs. 7. & a 9. obs. 194.*

Pardus. 3. F. cauda elongata, corpore maculis superioribus orbiculatis; inferioribus virgatis. *Syst. nat. 4. n. 3.*

*Panthera, Pardalis, Fardus, Leopardus. Gesn. quadr. 822.*



Pardus mas, Panthera femina. *Alp. ægypt.* 237. t. 15. f. 2.  
 Pardalis. *Raj. quadr.* 166.  
 Tigris mexicana. *Hern. mex.* 498. t. 498.  
 Pinum Dasypus. *Nieremb. nat.* 153. t. 153.  
*Habitat in Indiis. Panther*

Onca. 4. F. cauda elongata, corpore flavescente maculis nigris rotundato angulatis medio flavis.  
 Pardus f. Lynx brasiliensis. *Raj. quadr.* 168.  
 Jaguarã. *Marcgr. bras.* 235.  
*Habitat in America meridionali.*

Pardalis. 5. F. cauda elongata, corpore maculis superioribus virgatis; inferioribus orbiculatis. *Syst. nat.* 4. n. 4.  
 Cato-Pardus mexicanus. *Hern. mex.* 512. t. 512.  
 Catus Pardus f. Catus americanorum. *Raj. quadr.* 169.  
*Habitat in America. Willnatt.*  
 Magnitudo Melis supra fuscus, subtus albicans; Lineæ punctique nigra per totum corpus longitudinaliter sparsa, sed pedes & abdomen tantum præctis; Latera lineis latioribus albis & fuscis pinguntur. Aures breves, margine luteo absque penicillis. Pedes 5-4. Cauda verticillata-variegata proportione Cati. Mystaces 4 ordinum: in singulo ordine setæ 3. s. 5, albæ basi nigra, longitudine capitis.

Catus. 6. F. cauda elongata, corpore fasciis nigricantibus; dorsalibus longitudinalibus tribus; lateralibus spiralis.  
 Felis cauda elongata, auribus æqualibus. *Faun. succ.* 3.  
*Syst. nat.* 4. n. 6.  
 Felis vulgo Catus. *Gesn. quadr.* 98. *Aldr. quadr.* 565.  
*Raj. quadr.* 93.  
 Felis. *Aldr. dig.* 564. *Fonst. quadr.* 180. t. 72..  
*Habitat in Europæ australis sylvis. Kutta.*  
 Moribus congenerum, tranquilla, ore molat, caudam erigit; excitata agilissima, scandit, irata fremit odore ambrosiaco, Murum Leo, in prædam intenta caudam movet, oculi noctu lucent, inhiando prædam habet, clamando rixandoque misere amat. Pupilla interdiu perpendiculari oblonga, noctu tereti ampliata; maxillas complicatis incedit, parce bibit, urina corrosiva sterore sepelit, carnes edit vegetabiliaque respuit, os instante tempestate manu lavat, dorsum in tenebris excubitat; in citum acta decidit in pedes. Pulices non habet. *Delectatur Maro, Nepeta, Valeriana.*



- Lynx. 7. F. cauda abbreviata, apice atra, auriculis apice barbatis. Felis cauda truncata, colore rufescente maculato. *Faun. suec. 4. Syst. nat. 4. n. 7. It. Wgoth. 222.*  
 Lynx cervarius. *Gesn. quadr. 677. Tourn. it. 2. p. 185.*  
 Lynx. *Aldr. dig. 90. Jonst. quadr. 82. t. 31. Raj. quadr. 166.*  
*Habitat in Europæ sylvis & desertis. Linn. Co.*  
 Cauda femoribus paulo brevior apice atra. Palpebra inferior albicans, ut & superior versus canthum majorem. Macula linearis fusca pœne oculos. Auricularum apices nigri. Palpebræ albæ.

*Meles*

13. VIVERRA. *Dentes Primores VI: intermediis brevioribus.*  
*Molares plures quam tres.*  
*Lingua retrorsum aculeata.*  
*Ungues exserti.*

- Ichneumon. 1. V. cauda e basi incrassata sensim attenuata. Meles digitis mediis longioribus: lateralibus æqualibus, unguibus subuniformibus. *Hasselqv. itin. 191.*  
 Meles unguibus uniformibus, leucophæa. *Syst. nat. 6.*  
 Mus pharaonis. *Alpin. ægypt. 14. t. 3.*  
 Ichneumon. *Bellon. itin. 96. p. 44. Gesn. quadr. 568. Aldr. quadr. 300. t. 301.*  
 β. Mustela glauca. *Syst. nat. 5. Amœn. acad. 2. p. 109. t. 574. t. 567.*  
 Mustella f. Viverra indis Mangutia. *Kæmpf. amœn. 574. t. 567.*  
 Quil f. Quirpele. *Garc. arom. 163.*  
 Serpenticida f. Muncos. *Rumpf. herb. 7. p. 69. t. 28. f. 2. 3.*  
 Ichneumon indicus. *Edv. av. 199. t. 199.*  
 Ichneumon f. Vulpecula zeilanica. *Seb. mus. 1. p. 66. t. 41. f. 1.*  
*Habitat in Ægypto ad ripas Nili, & in India primario; mansuescit. Linn. Mangusta, Surron.*  
 Frons plana. Labium superius prominens. Auriculæ rotundatæ. Mystaces simplici serie in omnibus labiis lateralibus ad marginem. Lingua scabra. Pollex a reliquis distinctus. Cauda basi crassa, sensim attenuata, longitudine corporis. Folliculus ante aperturam ani,  
 sub



Bufox har Afst. *distinta Moussetti*  
eller stinkande *Viverne*.

*Le Coase, Le Chinche, Le Forille. &*

*Le Conepate, den sista är wist*

*Putorius, Gecat, Skunk och*

*Fiskatt i Kalms Resa, men owist*

om *Le Coase* är *Memphitis* eller

*Sebas Usquicpatl*.

De 3 första äro alla från *War-*

*matte America*, men den sista

från *Norra, Virginien, Maryland,*

*Pensylvanien, &c.*

alla äro de rätt wackra djur,

men skrämde och jagade, förswär

sig med den wedertwändigaste lug

*Civetta* Clas. cur. 57.

*Animali Zibethicum. Raj. quadr. 178. Dodart. act. 155.*

*Hern. mex. 538. 580. 581. Olear. mus. 7. t. 6. f. 3.*

*Hyena veteribus, nunc Civetta. Bellon itin. 94.*

*Habitat in Indiis. Zibethi*

*nas oolongum. Rostrum obtusum. Dentes Primarii*  
*superiores 6, paralleli: intermedii paulo minores; in-*  
*feriores paralleli: medii paulo breviores: alternis in-*  
*terioribus. Laxiarii solitarii, utrinque distantes. Ino-*  
*lares acuti, denticulati. Aures tectæ, breves. Corp-*  
*ris pili secundum dorsum longiores, cinereo nigri que*  
*undati, rigidi, oculi. Pedes subtus nudi. Ungues 5-5*  
*canini. Cauda felis annulata.*

*Ur. oculus Zibethi inter anam & vulvam in utroque sexu.*

*Anatome. Barth. sent. 4. n. 1. & cent. 5. n. 49.*



*sub æstu apertus. Pili albido & griseo nigrescente ver-  
ticillati. Magnitudo Cati; calcaneis incedit. Victitat  
muribus, avibus, ovis, amphibis, herbis; ova Croco-  
dili effodit & haurit; Serpentum hostis.*

Memphi-2. V. cauda fusca luteo annulata, corpore spadiceo fus-  
tis.

Ysquipatl. *Hern. mex.* 332. *Seb. mus.* 1. p. 68. t. 42.  
f. 1. *Raj. quadr.* 181.

*Habitat in America.*

Magnitudo Martis. Color supra albus, subtus ex albo  
& nigro variegatus. Pedes talis incedentes. Ungues  
5-5: anteriores compressi, longi; posteriores breviores,  
subtus excavati. Dentes Primores superiores in meo  
nulli; Primores inferiores 6, æquales, quorum 2 inte-  
riores; Laniarii supra & infra utrinque approximati.  
*Irritata fundit cum ventris crepitu halitum fetidissi-  
mum, ut nihil cum eo comparari queat.*

Putorius 3. V. fusca lineis quatuor albidis dorsalibus parallelis.

Putorius americanus striatus. *Catesb. carol.* 2. p. 62. t. 62.

Polcat, Skunk, Fiskatta. *Kalm. itin.* 2. p. 378.

*Habitat in America septentrionali.*

Cauda longitudine corporis, villosa.

*Irritata ut antecedens halitum explodit, quo nihil fœ-  
tidius. Le Compté Oron*

Zibetha 4. V. cauda annulata, dorso cinereo nigroque undatim  
striato.

Civetta *Clus. cur.* 57.

Arhna Zibethicum. *Raj. quadr.* 178. *Dodart. act.* 155.

*Hern. mex.* 538. 580. 581. *Olear. mus.* 7. t. 6. f. 3.

Hyena veteribus, nunc Civetta. *Bellon itin.* 94.

*Habitat in Indiis. Zibeth*

nas oolongam. Rostrum obtusum. Dentes Primores  
superiores 6, paralleli: intermedii paulo minores; in-  
feriores paralleli: medii paulo breviores: alternis in-  
terioribus. Laniarii solitarii, utrinque distantes. Mo-  
lures acuti, denticulati. Aures tectæ, breves. Cor-  
poris pile secundum dorsum longiores, cinereo nigroque  
undati, rigidiusculi. Pedes subtus nudi. Ungues 5-5,  
canini. Cauda felis annulata.

Ungulus Zibethi inter anam & vulvam in utroque sexu.  
*Anatome. Barth. sent.* 4. n. 1. & cent. 5. n. 49.



*Cinereis*

Genetta. 5. V. cauda annulata, corpore fulvo-nigricante maculato. †  
Genetta f. Ginetta. Raj. quadr. 201. Bell. itin. 76. Gesn.  
quadr. 550.

Habitat in Oriente juxta rivos. *et Hippocria.*

Caudæ annuli 8 nigri; totidemque albicantes. Corpus  
croceo-nigricans, bene olens, maculis nigris ordine  
dispositis; mihi generis obscuri.

*Co. ... mansuescit, murum hostio.*

14. MUSTELA. Dentes Primores superiores VI, ere-  
cti, acutiores, distincti.  
Inferiores VI obtusio-  
res conferti: duo in-  
teriores.

Lingua lævis.

Lutris. 1. M. plantis palmatis pilosis, cauda corpore quadruplo  
breviore

Lutra marina. Act. petropol. 1749. p. 267.

Lutra brasiliensis. Raj. quadr. 187.

Habitat in Asia & America septentrionali.

Lutra. 2. M. plantis palmatis nudis, cauda corpore dimidio bre-  
viore.

Lutra digitis æqualibus. Faun. suec. 10.

Lutra. Bell. aquat. 31. t. 32. Gesn. aquat. 515. Aldr.  
quadr. 294. Dodart. act. 147. t. 147. Raj. quadr. 187.

Habitat in Europæ aquis dulcibus, fluvius, stagnis,  
piscinis.

Videtur piscibus, ranis, cancris. Utler

Anatome E. N. C. d. 1. a. 3. obs. 195 & d. 2. a. 10.  
obs. 112. G. cent. 10. app. 468.

Gulo. 3. M. plantis fissis corpore rufo-fusco medio dorsi nigro.  
Faun. suec. 6. Syst. nat. 5. n. 1.

Gulo. Ol. Magn. Scheff. lapp. 339. Racz. polon. 339.

Habitat in assibus Lapponicæ, Rusiæ, Sibiæ silvis ex-  
stissimis. Gars

Videtur leporibus, aribus, Rangiferis, cadaveribus, ad-  
mittit vulpem; voracior arso; fetidus; Penis præstan-  
tissima, pretiosissima.

Anatome. Barth. cent. 4. obs. 30.



- barbara. 4. *M. atra*, collo subtus macula alba triloba.  
*Habitat in Brasilia. Ac. Holmens.*  
 Confer. *Brown. jam.* 485. t. 49. f. 1. *Galera?*  
*Statura Martis at nigra pilis rigidioribus; auriculæ ro-*  
*tundæ, villosæ. Area ante oculos cinerascens. Macu-*  
*læ sub medio collo, non vero sub gula. Mammæ po-*  
*ne umbilicum 4.*
- Martes. 5. *M. plantis fissis*, corpore fulvo nigricante, gula pallida.  
*Mustela fulvo-nigricans, gula pallida. Faun. Suec. 7.*  
*Syst. nat. 5. n. 2.*  
*Martes. Gesn. quadr. 151. Jonst. quadr. t. 64. Raj.*  
*quadr. 200.*  
*Habitat in sylvis antiquis.*  
*Vicitat Sciuris, Muribus, Avibus. & Alard.*
- Putorius. 6. *M. plantis fissis*, corpore flavo nigricante, ore auricu-  
 lisque albis.  
*Mustela flavescente nigricans, ore albo, collari flavo.*  
*Faun. suec. 8. Syst. nat. 5. n. 3.*  
*Putorius. Gesn. quadr. 767. Aldr. ungu. 330. Jonst.*  
*quadr. t. 64. Raj. quadr. 199.*  
*Habitat inter Europæ rupes & lapidum acervos. Mer-*  
*Noctu prædatur Cuniculos, Gallinas, Aviculas, Ova re-*  
*pit; ano halitu foetidissima.*
- Furo. 7. *M. plantis fissis*, oculis rubicundis. †  
*Mustela sylvestris Viverra dicta. Raj. quadr. 199.*  
*Habitat in Africa. Curiæ & Hæmæ. Hoffm.*  
*Putorio minor; Auriculæ arrectæ patulæ breves; Oculi*  
*rubicundi. Raj.*
- Zibellina. 8. *M. plantis fissis*, corpore obscure fulvo, fronte exal-  
 bida, gutture cinereo. †  
*Mustela Sibellina. Raj. quadr. 201.*  
*Habitat in Asia septentrionali. Sibeli.*  
*Color fulvo-obscurus gutture cinereo; anterior pars ca-*  
*pitis & auriculæ exalbido-cinereæ. Raj. Vibrissæ ad*  
*supercilia, nares, os longissima.*
- Erminea. 9. *M. plantis fissis*, caudæ apice atro.  
*Mustela vulgaris. Gesn. quadr. 129. Aldr. ungu. 307.*  
*Jonst. quadr. t. 74. Raj. quadr. 195.*

β Mu-

*Mustelæ genus corpore elongato pedibusque brevibus est, currit cuncto incurvato, scan-*  
*dit arbores, salit ex arbore in arborem.*



- β. *Mustela candida* f. *Ermineum*. *Raj. quadr.* 128.  
*Mustela alpina candida*. *Vagn. helvet.* 180.  
*Habitat in Europa & Asia frigidiorē; hyemē præsertim  
 in alpinis regionibus nivea. Hermelin*  
*Confer.* *Mustela javanica*. *Seb. mus.* 1. p. 77. t. 48. f. 4.  
*Cauda dimidia extrorsum nigra; corpus hyemē album,  
 æstate rufum excepto abdomine, pectore, gula. Pellis  
 pretiosa hodie feminis nostratibus.*  
*Edit Pisces, carnes, Mures, ova, Fungos, non vegeta-  
 bilia; acutissima, foetida, siticulosa, noctu prædatur;  
 terrefacta epilepsia corripitur.*

15. **URSUS.** *Dentes Primores superiores VI, intus  
 excavati alterni.*  
*Inferiores VI; laterales 2  
 longiores lobati; secunda-  
 rii basi interiores.*  
*Laniarii solitarii, conici.*  
*Molares V f. VI: primo lania-  
 riis approximato.*  
*Lingua lævis.*  
*Membrana nictitans. Nasus promi-  
 nens.*  
*Penis scatens osse recurvaro.*

- Arctos.** 1. *U. cauda abrupta. Faun. suec.* 2. *Syst. nat.* 4. n. 1.  
*Ursus. Gesn. quadr.* 14. *Aldr. digit.* 117. *Forst. quadr.*  
*t. 55. Dodon. act.* 67. t. 67. *Raj. quadr.* 171.  
*Habitat in sive Europæ frigida. Björn.*  
*Irrequietus; æstivius hibernat intra Muscos; lambit  
 pedes (Barth. act. 1674. p. 34); insat prædam.*  
*Ursus maritimus albus major, arcticus. Martens. Spitzb.*  
*73. t. O. f. C. forte distincta species est, ac is  
 non visa.*
- luscus.** 2. *U. cauda elongata, corpore ferrugineo, rostro rufes-  
 fronte fasciâque laterali longitudinali albida.*  
*Ursulus lupi æstivus americanus. Bur. av.* 1. p. 103. t. 110.  
*Habitat ad sinum Hudsonis.*



Meles. 3. U. cauda concolore, corpore supra cinereo subtus nigro, fascia longitudinali per oculos auresque nigra.

Meles unguibus anticis longissimis. Faun. suec. 15.

Syst. nat. 6.

Meles. Gesn. quadr. 686. Crass. in.

Taxus. Aldr. digit. 264. Jonst. quadr. t. 64. Raj. quadr. 155.

Habitat in Europa inter rimas rupium & lapidum.

Venatur cuniculos, antra sedit inhabitatque; sterces in eodem loco deponunt inhabitantes extra antrum; die latet, corradit Lathyrum in hyemem, folliculum putentem supra unum haurit liberans.

Anatome. E. N. C. d. 2. a. 5. obs. 32. & d. 3. a. 3. obs. 103.

Lotor. 4. U. cauda annulata, fascia per oculos transversali.

Ursus cauda elongata. Syst. nat. 4. Act. Stockb. 1747. t. 9. f. 1.

Mus indicus alius. Gesn. quadr. 741.

Vulp. anas americana. Raj. quadr. 179.

Raccon. Kalm. it. 2. p. 228. ~~no~~

Cori-morde. Marcgr. bras. 228. Jonst. quadr. 159.

in mus. 319. Dodart. act. 181. t. 181. Major. mosc. 30. Raj. quadr. 180.

Felis montana americana. Seb. mus. 1. p. 68. t. 42. f. 1.

Habitat in Americæ maritimis. Le-Raton. Sutton

Cauda cresta, ferruginea anales nigris.

Elit lubenter ova, Gallinas; cibum lavat; odoratu tactuque excellit; mentis tenacissimus, dormit a 12 noctis in 12 die; pellitur setis porcinis. Penis osse incurvato scatet.

#### IV. BE-

Ursi genus scandit incedit in antra, ac non sicut, sed descendit posterioribus precum-  
tionibus. Talis committer incedit. Penis osse curvato scatet.



## IV. BESTIÆ.

*Dentes Primores utrinque: intermediis distantibus.*

*Laniarii semper uno plures utrinque:  
Nasus ultra os prominens.*

16. SUS. *Dentes Primores Superiores IV, convergentes.  
Inferiores VIII patuli.  
Laniarii Superiores II breviores,  
Inferiores II exserti.*

Scrofa. 1. S. dorso antice setoso, cauda pilosa. *Fn. svec. 36. Syst. nat. 12.*

*Aper. Gesn. quadr. 146. Aldr. bisulc. 1013. Jonst. quadr. 74. Raj. quadr. 96. willswir*

β. Sus. *Gesn. quadr. 872. Aldr. bisulc. 937. Jonst. quadr. t. 47. Raj. quadr. 92.*

γ. Sus chinensis. *It. Wgoth 62. It. Scan. 72.*

*Habitat in Europa australiore.*

*Aper vix differt a Sue domestico, nisi quod lanam inter setas non habeat.*

*Chinensis dorso subnudo, abdomine ad terram usque dependente differt.*

*Varietas frequens Upsalæ Suis domestici semper monunguli, in cæteris eadem species.*

*Animal odore pollens, naribus fodiens: tendinibus truncandis; quisquillas, stercus, succulenta, variaque spurcata vorans; multa seligens; pinguisimum, stupidum, somnolentum, tempestatum præcuncium & impatient; apricatur in sole, in cæno se volutat. immundum, grunniens, accurrit clamanti adversus hostem spumante ore dentibusque horrens, Crotalis infestum; tardum venere: pene laxo longo; mammis numerosissimis, prole innumera; laborat pediculis, scabie, scrophulis, pipere. Ganæa numerosa materies, Atletis & exercitatis salubris, non vero criticis; saccharo s. ficu inprimis altis laudatur: inde Pernæ, Sincipitia, Trunculi, Costæ, Sumina, Vulvæ, Isicia, Betali, Juscula; at stercus in fluxu sanguineo valet.*



- Porcus. 2. S. Dorso postice setoso, cauda longitudine pedum, umbilico cystifero. *Syst. nat.* 12.  
 Porcus guineensis. *Raj. quadr.* 96.  
*Habitat in Africa.*  
*Affinis priori. Corpus rufum. Auriculæ acuminatissimæ.*  
*Cauda longa, nuda.*  
*Vellus setis caret, nisi supra clunes.*
- Tajacu. 3. S. dorso cystifero, cauda nulla. *Syst. nat.* 12.  
 Tajacu. *Pis. Ind.* 98.  
 Tajacu f. Aper mexicanus moschiferus. *Tyson. act. n.* 153. *Raj. quadr.* 97.  
 Cuaiguara. *Marsgr. bras.* 229. *Barth. cent.* 3. n. 44.  
 Quavhila cognati Quapizott. *Hern. mex.* 637. t. 637.  
*Habitat in Mexici, Panamæ, Brasiliæ montibus, sylvis;*  
*edit Ranas, Serpentes.*  
 Corpus cinereum; fascia flava circum humores; ciux nigra supra nasum.  
 Pedes nigri: macula alba supra genua antica. Setæ fastigiatae nigrae inter breves aures, nec in dorso. Rotuberantia ad latera oris & supra nasum. Glanacula secretoria supra clunes, secernens odoratum liquorem ambrosiacum. Z. Haliman.
- Babyrus. 4. S. dentibus duobus caninis fronti innatis. *Syst. nat.* 12, 1a.  
 Babyrouila. *Bont. jav.* 61. *Barth. cent.* 2. ois. 90.  
*Grew. mus. t. 1. Seb. mus. 1. p. 80. t. 50. j. 2. Raj. quadr.* 96.  
*Habitat in Borneo Indiae orientalis.*  
 Magnitudine Cervi. Dentes Laniarii superiores 2. recurvantes forantes cranium frontis, recurvati ut 2 cornua; inferiores utrinque solitarii, magni, s.

17. DASYPUS. *Dentes . . .*

*Corpus testa ossea cataphractum. Zonis intersecta.*

- Unicin- 1. D. tegmine tripartito, pedibus pentadactylis. *Syst. nat.* 6.  
 Etus. Tatu f. Armadillo africanus. *Seb. mus.* 1. p. 47. t. 30. f. 3. 4.  
 β. Dasypus cingulo simplici. *Syst. nat.* 6.  
 Tatu mustelinus. *Raj. quadr.* 235. *Grew. mus.* 19. t. 1.  
*Habitat in Africa.*



- tricin-  
ctus. 2. D. cingulis tribus, pedibus pentadactylis.  
Dasypus cingulis tribus. *Syst. nat.* 6.  
Tatou f. Armadillo. *Red. exper.* 91. t. 92.  
Tatu f. Armadillo orientalis. *Seb. mus.* 1. p. 62. t. 38.  
f. 2. 3.  
Tatu apara. *Marcgr. bras.* 232. *Pis. bras.* 100. *Raj.*  
*quadr.* 234.  
Armadillo f. Tatou genus alterum. *Clus. exot.* 107.  
Armadillo. *Grew. m. j.* 17. *Olear. mus.* 3. t. 6. f. 4.  
*Habitat in India orientali. & Occidentali vide. Bayon*
- quadri-  
cinctus. 3. D. cingulis quatuor. *Syst. nat.* 6. *Tom IV pag 90.*  
*Cheloniscus. Column. aquat.* 2. p. 15. t. 16.  
*Habitat. forte in China*
- sexcin-  
ctus. 4. D. cingulis senis, pedibus pentadactylis. *Mus. Ad. Fr.* 7.  
Dasypus cingulis sex. *Syst. nat.* 6.  
Tatu f. Armadillo primus. *Raj. quadr.* 233.  
Tatu f. Tatu-pera. *Marcgr. bras.* 231.  
Armadillo f. Tatou. *Clus. exot.* 230.  
*Habitat in America Meridionali.*
- septem-  
cinctus. 5. D. Ungulis septenis, palmis tetradactylis, plantis pen-  
tadactylis. *Amœn. acad.* 1. p. 281. *Tatue & Cinctus*  
Dasypus cingulis septem. *Syst. nat.* 6. *Bayon p: 99*  
*Habitat in Indiis.*  
*An sufficienter a sequente distinctus?*
- novem-  
cinctus. 6. D. cingulis novem, palmis tetradactylis, plantis penta-  
dactylis. *Mus. Ad. Fr.* 6.  
Dasypus cingulis novem. *Syst. nat.* 6.  
Tatou f. Armadillo americanus. *Seb. mus.* 1. p. 45.  
t. 29. f. 1. *S.* t. 53. f. 6.  
Tatue brasiliensis. *Marcgr. bras.* 231. *Raj. 9. quadr.*  
*233.*  
*B. Dasypus. Hern. mex.* 314. *Le Cachiana Bayon*  
*Habitat in America meridionali. pag. 103.*
- Habit etiam Bayon 12. & 18 Cincti Dasypus*  
*Kabaton & Carquinson dicit.*



18. ERINACEUS. *Dentes Primores* II, paralleli, subcuneati, longiores, distantes : superiores remotiores.

*Laniarii* II ubique, anteriorum decumbentes, parvi.

*Molares* III f. IV acuti, lobati.

*Corpus* spinis obtectum.

europæus. 1. ERINACEUS. *Fn. sv. 16. Syst. nat. 6. It. Goth. 264. Echinus* f. Erinaceus terrestris. *Gesn. quadr. 368. Aldr. quadr. 459. Jonst. quadr. 119. t. 68. Raj. quadr. 231. Seb. mus. 1. p. 78. t. 49. f. 1. 8.*

*Habitat in Europa. igu. h. att.*

*Mitis, ambrosiacus, polyphagus, nocturnus, monogamus, hybernans, nidificans e Musco in fruticibus, metu se contrahens, naribus cristatis.*

*Anatome E. N. C. d. 2. an. obs. 65. & an. 6. obs. 105. & cent. 10. app. 447. Barth. act. 1671. n. 90.*

19. TALPA. *Dentes Primores superiores* VI. Inferiores VIII. *Laniarii* major I, & minores IV. *Molares* acuminati.

europæa. 1. T. caudata, pedibus pentadactylis. *mu. v. 1.*

*Talpa caudata. Syst. nat. 7. Faun. suec. 17. It. Scan. 332.*

*Talpa. Gesn. quadr. 931. Aldrov. digit. 451. Raj. quadr. 236. Seb. mus. 1. p. 68. t. 41. fig. 1, 4.*

*Habitat in Europæ humosis sub terra, victitans e Lumbricis, non plantis, noctu prædatur.*

*Anatome. E. N. C. d. 1. a 2. obs. 51. & d 2. a 1. obs. 130.*

*Penis omnium animalium longissimus. Pellis delicatula.*



asiatica. 2. *T. ecaudata*, palmis tridactylis.

*Talpa sibirica* versicolor. *Seb. mus.* 1. p. 51. t. 32.

f. 4, 5.

*Habitat in* Sibiria.

20. SOREX. *Dentes Primores* Superiores II, bifidi.

Inferiores IV: interme-  
diis 2 brevioribus.

*Laniarii* utrinque plures.

Araneus. 1. *S. cauda* corpore longiore.

*Sorex. Faun. svec.* 33.\* *Syst. nat.* 10.

*Mus araneus. Gesn. quadr.* 741. *Aldr. digit.* 441. t. 442.

*Fonst. quadr.* t. 66. *Raj. quadr.* 239.

*Habitat in* Europæ cryptis. *Nalbinus*

*Auriculæ breves, amplæ. Cauda longa.*

cristatus. 2. *S. naribus* cristatis, cauda corpore brevior.

*Habitat in* Pennsylvania. *P. Kalm.*

*Facies Talpæ, colore atro, palmis niveis.*

*Auriculæ nullæ. Rostrum longissimum. Cauda subnu-  
da, corpore dimidio brevior, concolor. Nares sin-  
gulæ stella palmata radiis 10. s. 15. subulatis, nudis  
ut in Erinaceo. Dentes primores superiores 2; in-  
feriores 4. Laniarii utrinque plures.*

aquaticus. 3. *S. plantis* palmatis, palmis caudaque corpore brevio-  
re albis.

*Talpa virginianus niger. Seb. mus.* 1. p. 51. t. 32. f. 3.

*Habitat in* America septentrionali. *P. Kalm.*

*Facies præcedentis, sed cinerea aut fusca, palmis albis.*

*Cauda corpore quadruplo brevior, alba. Dentes primo-  
res superiores 2; inferiores 4: intermediis brevissimis.*

*Laniarii utrinque plures, discreti.*



21. DIDELPHIS. *Dentes Primores Superiores X.*  
*Inferiores VIII: inter-*  
*mediis 2 brevissimis.*  
*Laniarii longi.*  
*Molares denticulati.*  
*Lingua subciliata.*  
*Folliculus abdominalis mamma-*  
*rum.*

mar-  
 pialis. 1. D. mammis 8 intra abdomen. *Amœn. acad. 1. p. 279.*  
*Syst. nat. 10. Mus. Ad. rr. 10.*

*Philander. Seb. mus. 1. p. 64. t. 39.*

*Oposthum. Tab. an. 290. p. 1565.*

*Carigue. Tab. amer. 351.*

*Carigue, a brasiliensibus. Marcgr. bras. 222. Pis. bras.*  
*323. Jonst. quadr. 136. t. 63.*

*Martiacœ. Pis. bras. 223. Raj. quadr. 182.*

*Tlaquazina. Bernard. mex. 330.*

*Habitat in America.*

*Corpus hinc is, magnitudine Felis majoris. Rostrum co-*  
*nicum, organum suis instar, carinatum, rictu longissi-*  
*mo sulis. Nares perpendiculares, lunares. Vioillæ*  
*5 orationem, longæ; setæ pœ oris rictum 8, sub gu-*  
*la 5. Auriculæ rotundatæ, atræ apicibus albis. Den-*  
*tes molares lobati: anteriores simplices: primi mini-*  
*mi; reliqui ut in charactere Tibiæ nigra, lares*  
*talis locibus. Cauda nuda, orgitua ne corporis, quasi*  
*segmentis ex rugis, prebens. Manus 5 dactyle,*  
*pilis. Digi teretes, nudi, æquales. Ungues com-*  
*prosi, acuti. Planta ut in palmis: Pollex omni-*  
*no muticus.*

*Pulos lactantes territosque intra abdomen recipit mater.*

Philan- 2. D. cauda basi pilosa, auriculis pendulis, mammis qua-  
 der. terms.

*Tlaquazin f. Tai-ibi brasiliensibus. Seb. mus. 1. p. 57.*  
*t. 36. f. 4.*

*Habitat in America.*

*Figur-*



*Figura Sebæ aliena rostro rotundiore, fascia fusca trans oculos, pollice postico unguiculato, quod non in nostro. Ubra duo: mammis in singulis 2.*

Opos-  
sum.

3. D. cauda semipilosa, superciliarum regione pallidiore, mammis binis.

Philander, Opossum f. Carigueja. *Seb. mus. 1. p. 56. t. 36. f. 1, 2.*

*Habitat in America.*

*Abdomen circa mammas contrahitur in marsupium; pollices postici mutici.*

*Le Sanguier*

*Buget*

*Tom IV*

*pag. 134*

murina.

4. D. cauda semipilosa, mammis fenis. *Amœnit. acad. l. 279.*

*Mus sylvestris americanus. Seb. mus. 1. p. 48. t. 31. f. 12, 36.*

*Habitat in Asia, America.*

*Ungues digitis omnibus acuti, exceptis pollicibus posticis. Numerus mammarum Variatus.*

dorsige-  
ra.

5. D. cauda basi pilosa corpore longiore, digitis manuum muticis. †

*Mus sylvestris americana. Seb. mus. 1. p. 49. t. 31. f. 5, 4. & 2. p. 90. t. 84. f. 4. Merian. Jurin.*

*Habitat in America.*

*Pallos in dorso gerit caudis cirrhi instar convolutis.*

*Arceus de Surinam dicta*



## V. GLIRES.

*Dentes Primores bini supra & infra, a  
molâribus remoti.*

*Laniarii nulli.*

22. RHINOCEROS. *Dentes Primores II.  
Cornu naso insidens.*

unicor-  
nis.

1. R. cornu unico conico. *Syst. nat. 11. n. 1.*  
Rhinoceros. *Fonst. quadr. 98. t. 38. Bont. jav. 50.*  
*t. 51. Bergen. orat. 1746. t. 1. Gesn. quadr. 842.*  
*Aldr. bisulc. 878. Orientali*

*Patria huius  
forte est Asia  
nec Africa ubi  
hinc us.*

*Habitat in Africa, India, cæpo se volutans, victitans  
vepretibus. Pukirring Naskörning*

*Statura prioris fere Elephantis.*

*Cornu in rostro, solidum, recurvum, perpetuum, conicum.*  
*Labium superius acuminatum aduncum.*

*Oculi & Aures parvæ.*

*Cutis nuda. Rugæ transversales: 1. Capitis postica. 2.*  
*Scapularis: 3. Abdominalis ante femora. 4. Femora-*  
*lis trans femora. Ungulæ tres.*

*Cauda attenuata pedibus brevior,*

*Animal mite, ni laceffetur, tum arbores fragore pro-*  
*sternit, cornu ejicit omnia. secundum Kolbius*

*Quantus erat cornu, cui pila Taurus erat. Martialis.*

bicornis. 2. R. cornibus duobus cuneiformibus. *Syst. nat. 11. n. 2.*

*Habitat in India Kolbius, Jacobæus, Schroeckius.*  
*Africa Australia. Species obscura, cranium tantum cum cornibus duobus*  
*compressis altero minori supra alterum nobis visum.*  
*vide Buffon Tom. X pag. 148.*

23. HYSTRIX. *Dentes Primores II oblique scis-*  
*si. (Raj.)*

*Molares octo.*

*Corpus spinis tectum.*

*cristata. 1. H. palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, capite*  
*cristato, cauda abbreviata. Syst. nat. 9. n. 1.*



Hystrix. Gesn. quadr. 563. Aldrov. digit. 471. Jonst. quadr. 119. t. 68. Dodart. act. 233. Raj. quadr. 206.  
 Hystrix orientalis cristata. Seb. mus. 1. p. 79. t. 50. f. 1.  
*Habitat in Asia. Piggswin Porc Epic.*

prehensi- 2. H. pedibus tetradactylis, cauda elongata prehensili fe-  
 lis. minuda. Syst. nat. 9. n. 2.

Hystrix. Bont. jav. 54.

Cuandu brasiliensibus. Marcgr. bras. 233. Pis. amer. 99. Raj. quadr. 208.

Hoitztlacuatzin. Hern. mex. 322.

*Habitat in Asia, America meridionali, et in Louisiana, & Canada australi.*

dorsata. 3. H. palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, cauda elongata, dorso solo spinoso.

Hystrix canadensis. Edw. av. 52. t. 52.

*Habitat in Canada. Lillison Bont.*

Corpus ferrugineum, Cauda apice subtus alba.

macrou- 4. H. pedibus pentadactylis, cauda elongata: aculeis cla-  
 ra. vatis. Syst. nat. 9. n. 3.

Porcus aculeatus f. Hystrix orientalis. Seb. mus. 1. p. 84. t. 52. f. 1.

*Habitat in Asia.*

brachyu- 5. H. pedibus pentadactylis, cauda abbreviata. Syst. nat.  
 ra. 9. n. 4.

Porcus aculeatus f. Hystrix malaccensis. Seb. mus. 1. p. 81. t. 51. f. 1.

*Habitat in Asia.*

## 24. LEPUS. Dentes Primores II: superiores duplicati: interioribus minoribus.

timidus. 1. L. cauda abbreviata, auribus apice nigris. Syst. nat. 9. n. 2. Faun. suec. 19.

Lepus. Gesn. quadr. 69. Aldr. dig. 247. Jonst. quadr. t. 65. Raj. quadr. 204.

*Habitat in Europa.*

*Hyeme in frigidis niveus, exceptis auribus nigris. Cauda etiam aestate alba. Aures longae. Oculi exstantes membrana nictitante, somno aperti. Femora postica crassa Pedibus lanatis 5-4, & dorsum constituunt*

D 5

præ-

Lepus cornutus, si non hybridus, certe fabulosus sit.



præstantissimam partem. Nares humidi, motitantes. Inermis cursu valet, timidus, currit gyros sensim breviores, retro deviat exsiliendo; a Canibus, Felibus, Accipitribus, Noctuis venatur; cavitas utrinque e regione pubis; mordet truncum transcendendum; delectatur tympano; cervice fragili; immensus parturitione; urina fœtida non in cubile; pulcherrime obnoxius.

Anatome. E. N. C. d. 1. a. 2. obs. 251. & a. 3. obs. 93. & d. 3. a. 5. obs. 225. Barth. act. 1671. n. 136.

Cuniculus. 2. L. cauda abbreviata, auriculis nudatis. Syst. nat. 9. n. 3. Faun. suec. 20.

Cuniculus. Gesn. quadr. 72. Aldr. digit. 382. Jonst. quadr. t. 65. Raj. quadr. 205.

Habitat in Europa australi, antra fodiens in arenosis.

Hostes ipsi Falcones, Meles, Putorius, imprimis *Felis*. Species facilis agnoscitur, quam differentia specifica determinatur. Kunin.

Anatome. Parv. obs. 10.

capensis. 3. L. cauda longitudine capitis, pedibus rubris.

Habitat ad Cap. b. Spei. Sodians. J. Burmannus.

brasiliensis. 4. L. cauda nulla. Syst. nat. 9. n. 1.

Cuniculus brasiliensis Tapeti. Marcgr. bras. 223. Raj. quadr. 205. *Iter Kalmii pag. 236.*

Habitat in America meridionali.

25. CASTOR. Dentes Primores Superiores truncati; angulo transverso excavati; inferiores apice transversi.

Cauda depressa.

Fiber. 1. C. cauda ovata plana. Faun. suec. 23. Syst. nat. 10. n. 1.

Castor. Gesn. pisc. 185. Rond. pisc. 236. Jonst. pisc. t. 68. Dodart. act. 131. Raj. quadr. 209. Alar. quadr. 706.

Fiber. Bellon. aqu. 30. *Båfwer*

Habitat in Europæ, Asiæ, Americæ borealibus ad ripas fluviorum locumque, victitans corticibus imprimis Populi tremulæ; Domos mire exstruit.



*Oeconomia animalis data a D. Gislero, aët. Stockh. 1756. p. 207.*  
*Anatome. E. N. C. d. 1. a. 2. obs. 251.*

moscha- 2. C. cauda longa lanceolata plana. *Faun. svec. 24. Syst. nat. 10. n. 2.*  
 tus. *Mus aquaticus exoticus. Clus. exot. 375. Worm. mus. ... Raj. quadr. 217.*  
*Habitat in Russiæ aquosis, America. Desman.*  
*Pedes postici, ut in antecedente palmati; victitat Acoro.*

26. MUS. *Dentes Primores inferiores subulati.*

Porcel- 1. M. cauda nulla, palmis tetradactylis, plantis tridacty-  
 lus. *lis. It. Wgoth. 224. Syst. nat. 10. n. 1.*  
*Caniculus indians C. S. ...*

*Linnæi större mures med kort eller  
 aldeles utan svans, till och med 70: 6  
 års livie recentiorum, lever långt  
 flere nu års känd, jäsom Aguti  
 ifrån Södra Amerika, Pava;  
 Lne Damans, Daman d'Israel  
 ifrån Palestina, Arabiska  
 och Abyssiniska Bergstrakterne,  
 Daman du Cay ifrån Södra  
 Africa. Den första Daman aldeles utan  
 klor, den sista en klor på hvardera bakfoten af  
 Särdeles constructione.*

lepori-  
 nus.

Lem-  
 mus.

*Faun. svec. 26. Aët. Stockh. 1740. p. 207.*  
*Syst. nat. 10. n. 2.*  
*Mus montanus. Scheff. lapp. 346.*  
*Lemming. Olear. mus. 21. t. 12. f. 6.*

Lem-



*Oeconomia animalis data a D. Gislero, act. Stockh.*  
1756. p. 207.

Anatome. *E. N. C. d. 1. a. 2. obs. 251.*

moscha- 2. C. cauda longa lanceolata plana. *Faun. suec. 24. Syst.*  
tus. *nat. 10. n. 2.*

Mus aquaticus exoticus. *Clus. exot. 375. Worm. mus. ...*  
*Raj. quadr. 217.*

*Habitat in Russiae aquosis, America. Desjman.*

*Pedes postici, ut in antecedente palmati; victitat Acoro.*

## 26. MUS. *Dentes Primores inferiores subulati.*

Porcel- 1. M. cauda nulla, palmis tetradactylis, plantis tridacty-  
lus. *It. Wgoth. 224. Syst. nat. 10. n. 1.*

Cuniculus indicus. *Gesn. quadr. 307. Aldr. digit. 391. 393.*

Porcellus indicus s. Cuniculus indicus. *Jonst. quadr.*  
*161. t. 63. f. 6.*

Mus s. Cuniculus americanus guineensis porcelli pilis &  
voce. *Raj. quadr. 223.*

Cavia Cambaya *Marcgr. bras. 224. Pis. bras. 102.*

*Habitat in Brasilia. Marswin*

*Historia hujus habetur in Dissertatione de Mure indico.*

*Conf. Caybara. Marcgr. bras. 230. huic appais, sed ma-*  
*ior, coloris ignoti.*

*Pipientes, loquaces, inquieti, sequaces, calcitrantes, at-*  
*tenti, comantes, masticantes, edunt vegetabilia variata;*  
*potant lympham puram, calorec amant; semina man-*  
*mis duabus, parit pullos perfectissimos, mox coit; mas*  
*bombylans juniores masculos mordet paraplecticos. Co-*  
*lor varius etjam spontaneis.*

lepori- 2. M. cauda abbreviata, palmis tetradactylis, plantis tri-  
nus. *daetylus.*

*Lepus javensis. Catesb. carol. 3. p. 18. t. 18.*

*Habitat in Java, Sumatra.*

*Aures subrotundae, Color rufus, abdomine albo.*

Lem- 3. M. cauda abbreviata, pedibus pentadactylis.

mus. *Mus cauda abrupta, corpore fulvo nigroque vario.*

*Faun. suec. 26. Act. Stockh. 1740. p. 326. t. 6. f. 45.*

*Syst. nat. 10. n. 2.*

*Mus montanus. Scheff. lapp. 346.*

*Lemming. Olear. mus. 21. t. 12. f. 6.*



Lemmus. *Ol. Magn. sept.* 18: 20.

Mus norvagicus. *Worm. mus.* 322. t. 325. *monogr.* 6.  
*Raj. quadr.* 227.

*Habitat in alpibus Lapponicis. Semmel*

*Gregatim fugiunt quibusdam annis ex alpibus, recta via  
iter instituentes; edunt Lichenem rangiferinum, amen-  
ta Betulae nanæ, non carnes.*

*Wormii Historia Muris norvagici. Haffn.* 1653 *quart.*  
*hunc sistit.*

*Anatome. Barth. cent.* 2. p. 301.

Marmo- 4. M. cauda abbreviata subnuda, auriculis rotundatis, buc-  
ta. cis gibbis.

Mus cauda elongata nuda, corpore rufo. *Syst. nat.* 10.  
n. 11.

Mus montanus. *Matth. diosc.* 2. c. 63.

Mus alpinus. *Raj. quadr.* 221. *Wagn. helv.* 179. *Do-  
dant. mem.* 3. p. 31. t. 31. *Gesn. quadr.* 743. *Aldr.  
quadr.* 445.

*Habitat in alpibus Helveticis, Tridentinis.*

*Dentes primores inferiores apice divergentes.*

*Mustaces utrinque serie sextuplici. Aures parvæ, ve-  
stitæ. Bucca utrinque: admodum gibba. Cauda pal-  
maris, nigra. Verruca supra oculos setis 6; sub oculis  
setis 7. Dorsum cinereum. Inguina & pedes cinereo  
flavescentia. Sutura a gula ad anum. Pedes 4-5. H.  
Z. Hallman.*

*Profunde & celerrime fodit; hybernat alto somno, ma-  
nibus cibum ori admovet, sæpe erecta incedit; facilius  
in planitie, quam sub terra assequitur.*

Monax. 5. M. cauda mediocri pilosa, corpore griseo, auriculis sub-  
rotundis, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis.

Monax f. Marmota americana. *Edu. av.* 104. t. 104.

*Habitat in America septentrionali.*

*Auriculæ subrotundæ.*

Cricetus. 6. M. cauda subabbreviata, auriculis rotundatis, corpore  
subtus nigro, lateribus rufescentibus.

Mus cauda elongata, corpore cinereo rutilo nigroque  
longitudinaliter vario. *Syst. nat.* 10. n. 10.

Cricetus. *Raj. quadr.* 221. *E. N. C. d.* 2. a. 5. *obs.* 186.  
*Gesn. quadr.* 738.

*Hamster. Meijer. thier. (Norib. 1748. fol.) t.* 81. 82.

*Habitat in Germania.*



*Numerus digitorum pedum in hac & antecedente nobis ignotus. Cuniculo minor, cauda pedibus fere brevior. Bucca utrinque saccata.*

*Cavernas fodit sub terra plurimis concamerationibus, duplici foramine: altero obliqua aditu, altero perpendiculari specula. Colligit Frumentum, Pifa, Fabas, fructus, in distinctis cameris servanda, adportat ea in bucca; parit bis in anno sex pullos, itidem in propria camera servandos, uti etiam sterquilinum in distincta.*

*Venatur ob carnes, pelles, frumentum collectum; occiditur pulvere Veratri, farina & melle in panes coctis. Citillus auctorum, si ab hoc diversus, probe observandus.*

terrestris. 7. M. cauda mediocri subpilosa, palmis subtetradactylis, plantis pentadactylis, auriculis vellere brevioribus.

Mus cauda longissima pilosa, auribus subrotundis vellere brevioribus. *Fn. suec. 29. Syst. nat. 10. n. 5.*

Mus agrestis, capite grandi, brachiuros. *Raj. quadr. 218.*

*Habitat in Europæ terra & aqua. Linn.*

*Corpus fuscum subtus pallidum, at non albicans. Caput crassius, ore gibbo. Cauda magis pilosa, quam in Ratto, sed corpore dimidio brevior, a pedibus fere longior.*

*Hortos Talpæ instar misere effodit palmis licet parvis; natat in fossis & urinatur plantis licet fissis; Radices arborum decorticat, plantarum consumit s. aufert; Pullos anatum in piscinis occidit.*

amphibius. 8. M. cauda elongata pilosa, plantis palmatis. †

Mus major aquaticus s. Rattus aquaticus. *Raj. quadr. 217.*

Mus aquaticus. *Bell. aquat. 35. t. 36.*

*Habitat in Europæ, Africæ fossis, ripis, piscinis, hortis.*

*Species mihi non rite cognita.*

*Fodit ad fossas & radices arborum, natat, urinatur, consumit radices, Hortis & satis infestus, capitur Nassis e virguis confectis sub aqua demersis.*

Rattus. 9. M. cauda elongata subnuda, palmis tetradactylis cum unguiculo pollicari, plantis pentadactylis.



Mus Quercinus förmodeligen Le Loir  
 hos Buffon, fins i Södra Europa.  
 Skogar, mest få stor som Korn och  
 Swansen nästan så liden, sofwer  
 om wintern och är då mycket fet,  
 jagas och ätes. De Romare  
 gäddde dem uti inrättade hus  
 Gliriarum.

erascence.

dr. quadr.

Marmota

lis, plan-

abdomine

8.

Jonst.

. 218.

o differt.

lyphagus.

albicante.

tr. digit.

Buffons Lerot liknar den nu  
 men är mindre, håller till i  
 Trädgårdar och odlade ställen  
 i Södrare delen af Europa,  
 Lärer wara Auctoresnes Mus  
 Avellanarius Major.

s penta-  
line albi-

L. Mulet.  
 79

do. Faun. Suec. 30. Syst. nat. 10. n. 7.

Mus domesticus medius. Raj. quadr. 218.

Habitat in Hortis & sylvis Europæ. *Skog. Måka*

Asseres durissimas, saepe uno die perforat.

striatus. 13. M. cauda elongata subnuda, palmis tetradactylis, plan-  
tis pentadactylis, corporis striis punctatis

Mus cauda longa, striis corporis longitudinalibus & pun-  
ctis albis. Mus. Ad. Fr. 10.\*

Mus orientalis. Seb. mus. 2. p. 22. t. 21. f. 2.

Habitat in India.

longipes. 14. M. cauda elongata vestita, palmis tetradactylis, plan-  
tis pentadactylis, femoribus longissimis.

Mus



3<sup>re</sup> Species Jerbua äro redan  
kände

1<sup>sta</sup> Mus Jaulus Linnei, för som  
en skogblaka

Jaculus

2<sup>da</sup> från Södra Afrika, för som  
en Camin, med lång och ganska  
turfwig swans

3<sup>de</sup> från Nya Holland, för  
som ett får, se Cooks 1<sup>sta</sup> resa.  
Jerbua hafwa stora äjne öron  
ganska långa bak men korta  
framfötter

movet.

volans. 16. M. cauda elongata villosa, palmis tetradactylis, plan-  
tis pentadactylis, lateribus extensis volitans.

Sciurus americanus volans. Raj. quadr. 215. Seb. mus.

1. p. 72. t. 44. f. 3. Edv. av. 191. t. 191.

Habitat in Virginia, Mexico.

Cutis ab auribus ad brachia & femora & caudam extensa  
margine plicato nigro.

27. SCIURUS. Dentes Primores II: Superiores cu-  
neati ;  
Inferiores compressi.

vulgaris. 1. S. auriculis apice barbatis, palmis tetradactylis, plantis  
pentadactylis.

Sciurus palmis folis foliens. Faun. suec. 21. Syst. nat. 9. n. 1.

Sciurus. Gesn. quadr. 13. Aldr. quadr. 398. Jonst.  
quadr. t. 66.

Sciurus vulgaris. Raj. quadr. 214.

Habitat in Europæ arboribus.

Æstate ruber abdomine albo, hyeme cinereus. Victitat  
nucibus, strobilis &c. sedens. Superfluum cibum  
desouit; Cortice interdum navigat. Nidus globosus  
e muscis.

Anatome. E. N. C. cent. 10. app. 449.



Mus cauda elongata subnuda, corpore fusco cinerascete.  
*Faun. suec.* 28. *Syst. nat.* 10. n. 6.

Mus domesticus major. *Gejn. quadr.* 109. *Aldr. quadr.* 417. *Raj. quadr.* 217.

Glis. *Jonst. quadr.* f. 66.

Habitat in domibus Europæ.

Cautum animal, utensilibus infestum.

Glirem veterum me ignorare agnosco, nisi sit *Marmota* aut *Cricetus*.

Muscus 10. M. cauda elongata subnuda, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis.

Mus cauda nodulifera, corpore cinereo-fusco, abdomine subalbescete. *Faun. suec.* 31. *Syst. nat.* n. 8.

Mus. *Gejn. quadr.* 714. *Aldr. quadr.* 417. *Jonst. quadr.* t. 66.

Mus domesticus vulgaris s. minor. *Raj. quadr.* 218.

Habitat in domibus.

Unguis pollicaris palmarum nullus, quo a Ratto differt. Delectatur musica; non facile incarceratur; polyphagus.

avellana- 11. M. cauda elongata pilosa, corpore rufo, gula albicante.  
 rius. *Faun. suec.* 32.

Mus avellanarum minor. *Raj. quadr.* 220. *Aldr. digit.* 440.

Habitat in Europæ sylvis.

Colligit nuces, glandes; superfluas defodit.

sylvaticus. 12. M. cauda longa, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, corpore griseo pilis nigris, abdomine albidulo. *Faun. suec.* 30. *Syst. nat.* 10. n. 7.

Mus domesticus medius. *Raj. quadr.* 218.

Habitat in Hortis & sylvis Europæ. *Raj. quadr.*

Afferes durissimas, saepe uno die perforat.

striatus. 13. M. cauda elongata subnuda, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, corporis luteis punctatis.

Mus cauda longa, striis corporis longitudinalibus & punctis albis. *Mus. Ad. Fr.* 10.\*

Mus orientalis. *Seb. mus.* 2. p. 22. t. 21. f. 2.

Habitat in India.

longipes. 14. M. cauda elongata vestita, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, femoribus longissimis.



Mus cauda longa vestita, pedibus posticis longitudine corporis flavi. *Mus. Ad. Fr. 9.\**  
*Habitat in torridis regionibus.*

Jaculus. 15. M. cauda elongata floccosa, palmis pentadactylis, plantis tridactylis, femoribus longissimis, brachiis brevissimis.

Mus *jaculus* pedibus posticis longissimis, cauda extremo villosa. *Hasselq. itin. 178. act. Stock. 1752. p. 123 t. 4. f. 1.*

Mus *ægyptius*. *Hasselq. act. Ups. 1750. p. 17.*

Cuniculus minor caudatus dauricus. *Mus. Petrop. 1. p. 344. n. 123.*

Cuniculus s. Lepus indicus Utias dictus. *Aldr. quadr. 395. fig. bon.*

Lepus cauda elongata. *Syst. nat. 9. n. 4. Ge. 1. 1. 1.*

*Habitat in Arabia, Calmukia.*  
*Plantis tantum incedit, & quiescit; palmis cibum ori ad-*  
*movet.*

volans. 16. M. cauda elongata villosa, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, lateribus extensis volitans.

Sciurus americanus volans. *Raj. quadr. 215. Seb. mus. 1. p. 72. t. 41. f. 3. Edv. av. 191. t. 191.*

*Habitat in Virginia, Mexico.*

*Cutis ab auribus ad brachia & femora & caudam extensa margine plicato nigro.*

## 27. SCIURUS. Dentes Primores II: Superiores cuneati; Inferiores compressi.

vulgaris. 1. S. auriculis apice barbatis, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis.

Sciurus palmis folis saliens. *Faun. suec. 21. Syst. nat. 9. n. 1.*

Sciurus. *Gesn. quadr. 13. Aldr. quadr. 398. Jonst. quadr. t. 66.*

Sciurus vulgaris. *Raj. quadr. 214.*

*Habitat in Europæ arboribus.*

*Æstate ruber abdomine albo, hyeme cinereus. Vitat nucibus, strobilis &c. sedens. Superfluum cibum defodit; Cortice interdum navigat. Nidus globosus e muscis.*

Anatome. *E. N. C. cent. 10. app. 449.*



- niger. 2. *S. niger*. *Catesb. carol.* 2. p. 73. t. 73.  
*Habitat in America septentrionali.*
- cinereus. 3. *S. virginianus cinereus major*. *Raj. quadr.* 215. *Catesb. car.* 2. p. 74. 174. *Kalm. itin.* 2. p. 49.  
*Habitat in America septentrionali.*  
*Magnitudo tripla aut quadrupla Sc. vulgaris.*
- flavus. 4. *S. auriculis subrotundis, pedibus pentadactylis.*  
*Sciurus cauda tereti, pilis brevibus, auriculis subrotundis.*  
*Amœn. acad.* 1. p. 281.  
*Habitat in America.*  
*Magnitudine dimidio minor Sc. vulgari, luteus, apicibus pilorum albis. Pollex anticus solo fere ungue constat.*
- getulus. 5. *S. fuscus, striis quatuor albidis longitudinalibus.*  
*Sciurus getulus.* *Raj. quadr.* 216. *Edu. av.* 198. t. 198.  
*Seb. mus.* 1. p. 76. t. 47. f. 3.  
*Habitat in Africa.*
- striatus. 6. *S. flavus striis quatuor fuscis longitudinalibus.* *Mus. Ad. Fr.* 8.\*  
*Sciurus striatus.* *Catesb. car.* 2. p. 75. t. 75. *Edu. av.* 181. t. 181.  
*Rœsselvisla.* *Kalm. itin.* 2. p. 419.  
*Habitat in America septentrionali sub terra.*  
*Magnitudine Muris musculi vel paulo major. Palmæ tetradactylæ, plantæ pentadactylæ.*
- volans. 7. *S. hypochondriis prolixis volitans.* *Faun. suec.* 22. *Syst. nat.* 9.  
*Sciurus volans.* *Seb. mus.* 1. p. 67. t. 41. f. 3. *Catesb. car.* 2. p. 76. & 77. *Edu. av.* 191. t. 191.  
*Mus ponticus s. icythicus.* *Gesn. quadr.* 743.  
*Quadrupes volatile russiæ.* *Act. petr.* 5. p. 218.  
*Habitat in borealibus Europæ, Asiæ, Americæ.*  
*Extensa cute inter brachia & femora volitat.*



## VI. PECORA.

*Dentes Primores superiores nulli.*

*Inferiores VI aut VIII, a  
molaribus remotissimi.*

*Pedes ungulati.*

*Mammæ inguinales.*

28. CAMELUS. *Cornua nulla.*

*Dentes Primores inferiores VI,  
spathiformes.*

*Laniarii distantes: supe-  
riores III, inferiores II.*

*Labium superius fissum.*

Dromedarius. 1. C. topho dorsi unico. *Syst. nat. 13. n. 1.*  
Camelus unico in dorso gibbo. *Raj. quadr. 143.*  
Camelus. *Fonst. quadr. t. 41. Gesn. quadr. 159. Aldr. bis. 908. t. camel.*

*Habitat in Africæ desertis arenosis siticulosis.*

*Callos in pedibus anterioribus 4, in posterioribus 2, in  
sterno 1, gerit. Ventriculus secundus cellulosus pro aqua  
pura diutius asservanda per siticulosa deserta. Onera  
portat, lente festinat, lassus jacet super pectus.*

Bactrianas. 2. C. tophis dorsi duobus. *Syst. nat. 13. n. 2.*  
Dromedarius. *Fonst. quadr. 1. 44. f. 1.*

Camelus. *Gesn. quadr. 151. Aldr. bis. 907.*

*Habitat in Africa.*

*Cursu antecedente celertor, pro magnatibus, varior.*

Glama. 3. C. dorso lævi, topho pectorali. *Syst. nat. 13. n. 3.*

Camelus peruvianus Glama dictus. *Raj. quadr. 145.*

Pelon ichiatloquitli. *Hern. mex. 660.*

*Habitat in America meridionali. Frigoris impatiens.*

*Cicuratur, onera portat, fatigata succumbit, compressis  
testiculis obstinax compellitur; vomitu hostem pellit,  
sepe Catocho obnoxia.*



- Pacos. 4. *C. tophis nullis, corpore lanato. Syst. nat. 13. n. 4.*  
*Camelus peruvianus laniger Pacos dictus. Raj. quadr.*  
 147.

*Habitat in America meridionali.*

*Totus sanguineus, subtus albus; Pedes didactyli. Priori minor, magis lanatus, nec oneribus portandis par.*

29. MOSCHUS. *Cornua nulla.*

*Dentes Laniarii superiores solitarii exserti.*

- moschi- 1. Moschus. *Syst. nat. 13. Norra Americas Muskoxe*  
 ferus. *Animal moschiferum. Raj. quadr. 127. annat Djur*  
*Capreolus moschi. Gesn. quadr 695. Je Hearnus Rosa*  
*Capra moschus. Aldr. bisulc. 743. Jonst. quadr. 55.*  
*t. 39.*

*Moschus. Schröck. monogr. t. 44.*

*Habitat in Tataria versus Chinam.*

*Moschus substantia unctuosa ambrosiaca e folliculo prope umbilicum.*

*Schröcki Historia Moschi. Wien. 1682. quart.*

30. CERVUS. *Cornua solida, tenera corio hirto*  
*tecta apiceque crescentia,*  
*denudata, annua.*

*Dentes Primores inferiores VIII.*  
*Laniarii nulli (interdum solitarii superius).*

- Camelo- 1. *C. cornibus simplicissimis, pedibus anticis longissimis.*  
 pardalis. *Syst. nat. 13. n. 1. Proprii Generis, nec Cervus as.*

*lociandum* *Camelo-pardalis. Bellon. itin. 119. Raj. quadr. 90.*  
*Hasselqv. act. Ups. 1750. p. 15. it. n. 203.*

*Habitat in Æthiopia & Sennar.*

*Pronus cubat more Cameli; Gramen depascitur divaricatis pedibus anticis, sed arborum imprimis vescitur foliis.*

*rectius dentatis*

- Alces. 2. *C. cornibus acaulibus palmatis, caruncula gutturali.*  
*Syst. nat. 13. n. 2. Fn. suec. 37.*



Alce. Gesn. quadr. 1, 3, 4. Aldr. bisulc. 876. Forst. quadr. t. 30. Bonan. mus. t. 295. Olear. mus. t. 9. f. 2. Raj. quadr. 39.

Habitat in borealibus Europæ, Asiæque Populetis. Atq. Unguia ferit; 50 milliaria de die percurrit; cornum globum plumbeum fere eludit.

Elaphus. 3. C. cornibus ramosis teretibus incurvis. Faun. suec. 38. Syst. nat. 13. n. 3.

Cervus. Gesn. quadr. 1, 3, 4. Aldr. bisulc. 774. Forst. quadr. t. 31. Raj. quadr. 84.

Habitat in Europa, Asia. *Hort*

Ætas Bovis tantum; fabula est longævitatatis cervi. Cystide fellea caret Cervi genus.

Anatome. E. N. C. cent. 10. app. 448.

Tarandus. 4. C. cornibus ramosis teretibus: summitatibus palmatis. Faun. suec. 39. Syst. nat. 13. n. 4.

Rangifer. Gesn. quadr. 141. Olear. mus. 16. t. 10. f. 3. Raj. quadr. 83.

Tarandus. Aldr. bisulc. 859. t. 861.

Rheno. Amœn. acad. 4. p. *Rhen*

Habitat in Alpibus Europæ & Asiæ maxime septentrionalibus; victitat Lichene rangiferino.

Uterque sexus cernutus est ut in Camelopardale, ramo infimo etiam palmato; castratus quædam cornua deponit. Vellus denissimum. Pulices, Oestrea, Tabani ad alpes cogunt, crepitantibus ungulis. Pecora Lapponum capiosa. Ætas XVI annorum. *+ et per totam Americam*

Anatome. Barth. act. 1671. n. 135. *maxime Borealem copiose*

Dama. 5. C. cornibus ramosis compressis: summitatibus palmatis. Faun. suec. 40. Syst. nat. 13. n. 5.

Dama. Bell. itin. 57. Gesn. quadr. 84. Aldr. bisulc. 741. Forst. quadr. 82.

Cervus platyceros. Raj. quadr. 85.

Habitat in Europa. *Dof*

Arcetur filo horizontali.

Bezoar- 6. C. cornibus ramosis teretibus erectis: ramis tribus. †  
ticus. Mazama. Hern. mex. 324.

Caguacu- &c. Marcgr. Bras. 235. Pis. bras. 98. Raj. quadr. 90.

Habitat in America australi.



Capreo- 7. C. cornibus ramosis teretibus erectis: summitate bifida.  
lus. *Faun. suec. 41. Syst. nat. 13. n. 6.*  
Capra, Capreolus, Dorcas. *Gesn. quadr. 64. Jonst. quadr. 33. t. 33.*  
Caprea plinii, Capreolus. *Aldr. bisulc. 738. Raj. quadr. 89.*  
*Habitat in Europa, Asia. Ra*

guineen- 8. C. griseus subtus nigricans. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 12.*  
sis. *Habitat in Guinea.*  
*Cornua non vidi, tamen hujus generis.*

31. CAPRA. Cornua concava, sursum versa, erecta, scabra.

*Dentes Primores inferiores VIII.*  
*Laniarii nulli.*

Hircus. 1. C. cornibus carinatis arcuatis. *Faun. suec. 42.*  
*Capra. Gesn. quadr. 242. Aldr. bisulc. 635. Jonst. quadr. 47. Raj. quadr. 77.*  
β. Capra angolensis. *Hasselq. iter. 206.*  
*Habitat in montosis, victitans ex ramulis variis frondibusque arborum, Lichenibus.*  
*Pecus barbatum infidum, saliens, salax, hircum olens, decorticans; corio tenaci indutum, lana caprina tectum, arunco barbatum, bellicosum, caseosum; Pedum castratio singularis. Edit etiam Cicutam.*  
C. Angolensis Lana ad pedes usque dependet nivea, sericum provocante camelina dicta.

Ibex. 2. C. cornibus nodosis in dorsum reclinatis. *Syst. nat. 14 n. 6.*  
*Ibex. Olear. mus. t. 10. f. 1. Raj. quadr. 79. Wagn. helv. 176. Le Bouquetin (Buffon)*  
*Habitat in Wallesiæ præruptis inaccessis.*  
*Cornibus vastis reclinatis, corpore fulvo, arunco nigro.*

Rupica- 3. C. cornibus erectis uncinatis. *Syst. nat. 14. n. 5.*  
pra. *Rupicapra. Bell. itin. 126. Olear. mus. t. 9. f. 3. Gesn. quadr. 40. Aldr. bisulc. 727. Dodart. act. 225. Scheuch. alp. 155. Wagn. helv. 183. Menget*  
*Habitat in alpihus Helveticis summis inaccessis.*  
*Ruffo-fusca, sed alba fronte, vertice, gula, auribus intus.*  
*Le Chamois (Buffon)*



depressa. 4. C. cornibus depressis incurvis minimis cranio incumbentibus. Syst. nat. 14. n. 2.

Habitat in America.

Magnitudo hædi Hirci. Pili longi, penduli. Cornua lunata, crassa, vix digitum longa, cranio adpressa ut fere cutem perforent.

reversa. 5. C. cornibus erectis apice recurvis. Syst. nat. 14. n. 3.

Habitat in America.

Magnitudo hædi Hirci unius anni. Pili breves, cervini. Cornua vix digitum longa, antrosum recurvata apice. Hæc cum præcedenti combat & pullum non diu superstitem in vivario Cliffortiano producebat. Facies utriusque adeo aliena, ut vix speciem eandem,

pygmea.

Le Quib wæcker Gazell. från  
wärmaste Afrika, Brändgul  
med hvita ränder och hvit  
under halsen, 2 1/2 aln lång  
1 1/2 aln hög, af Eldarsjön  
beskrifwen.

Gazella.

Cervica-  
pra.

Gazellerna äro många slag  
och kan hända de mäst äro  
okända.

Dorcas.

Chitiloper torde så räknas  
Babaliseller Hertebeckens,  
Cafske. Stånd, Coëdous, Con-  
dona och kanske de Nizaud  
om ej den sista, med litt oelika  
hufvud och hornar ej Genus.



depressa. 4. C. cornibus depressis incurvis minimis cranio incumbentibus. *Syst. nat.* 14. n. 2.

*Habitat in America.*

Magnitudo hædi Hirci. Pili longi, penduli. Cornua lunata, crassa, vix digitum longa, cranio adpressa ut fere cutem perforent.

reversa. 5. C. cornibus erectis apice recurvis. *Syst. nat.* 14. n. 3.

*Habitat in America.*

Magnitudo hædi Hirci unius anni. Pili breves, cervini. Cornua vix digitum longa, antrosum recurvata apice. Hæc cum precedenti coibat & pullum non diu superstitem in vivario Cliffortiano producebat. Facies utriusque adeo aliena, ut vix speciem eandem, at diversissimam argueret.

pygmea. 6. C. cornibus teretibus conicis obtusis curvis: latere incurvato rugoso.

Capra pedibus digito humano angustioribus. *Syst. nat.* 14. n. 4.

Cervus pusillus guineensis. *Seb. mus.* 1. p. 10. t. 43 f. 3.

*Habitat in Guinea, India.*

Gazella. 7. C. cornibus teretibus rectissimis longissimis: basi annulatis. *Syst. nat.* 14. n. 8.

Gazella indica, cornibus rectis longissimis nigris prope caput tantum annulatis. *Raj. quadr.* 79.

*Habitat in India.*

Cervica-8. C. cornibus teretibus dimidiato-annulatis contortis. *Syst. nat.* 14. n. 7.

Gazella africana. *Raj. quadr.* 79.

Capri-Cerva. *Kæmph. amœn.* 398. t. 407. f. 1.

*Habitat in India, Asia.*

Color Capreoli, ventre albo, Cauda nigra.

Bezoar orientale sæpe in hujus quarto ventriculo.

Dorcas. 9. C. cornibus teretibus perfecte annulatis contortis. *Syst. nat.* 14. n. 9.

Gazella africana, cornibus brevibus ab imo ad summum fere annulatis, circa medium inflexis. *Raj. quadr.* 80.

*Habitat in Africa.* *le Bubale* *Budon*

*Hartebeest Vulgo*

*le Cerin* *Antelope* *10. C.*

*Antelope Bubala*



grimmia. 10. C. capite fasciculo tophoso, cavitate infra oculos. *Syst. nat.* 14. n. 10.

Capra sylvestris africana grimmii. *Raj. quadr.* 80.  
*Habitat in Africa.*

mambri- 11. C. auribus pendulis longissimis. *Syst. nat.* 14.

ca. Capra mambriaca s. syriaca. *Gesn. quadr.* 153. *Raj. quadr.* 81. *Alp. aegypt.* 229.  
*Habitat in India.*

Ammon. 12. C. cornibus arcuatis, collo subtus barbato, cauda nigra. †

Tryelaphus & Musimon. *Gesn. quadr.* 155.

*Habitat in Sibiria. Gemelin. etiam in Sardinia &*

*Medium quasi inter Capras & Oves.*

*Animalis hujus historia desideratur. v. le Gemelin*

*Arctique Montyon Buffon*

32. OVIS. Cornua concava, retrorsum versa, intorta, rugosa.

Dentes Primaries inferiores VIII.

Laniarii nulli.

Aries. 1. O. cornibus compressis lunatis. *Faun. suec.* 43. *Syst. nat.* 15. n. 1.

Ovis. *Gesn. quadr.* 138. *Aldr. bisulc.* 370. *Fonst. quadr.* t. 22. f. 1. 2. 3. *Raj. quadr.* 73.

rustica. c. cornuta.

anglica. B. mutica, cauda scrotoque ad genua pendulis.

hispanica. γ. cornuta cornuum spiram extrorsum tracta.

lycerat. δ. Polycerata e gotlandia 248. *Aldr. bisulc.* 397.

aricana. ε. africana. *Raj.* 75. pro lana pilis brevibus hirta.

laticornis ζ. platyura arabica.

data.

*Habitat in siccis apricis calidis.*

Ovis cum Ariete Vervece Agnoque edit imprimis Fescucam ovnam, in arvis Bursam pastoris, leditur a Pruno spinosa. Equisetis, Flammula, Antherico, Galina, Myoside aquatica, Anemone nemorosa. Parum bibi, ab aqua stagnante vermes Duodeni Hepaticae; praecuratur mellea; mutat aetate dentes; fert Lanam; latet pascua; timida pellit hostem calcitracione, urina. Mas unus sufficit 20 feminis, gravidis 150 diebus. Opilio pera vedoque instructus & cane, e caula minus clausa educat balantes greges in campos



*pos siticulosos, apricos. Infestatur Hippobosca, Pediculo, Oestro, Acaro; Laborat Vertigine, Hydrope, Phthisi, Ictero, Hepatitide. Omnes res carum, Ammonia creta creditur.*

guineen- 2. O. auribus pendulis, palearibus laxis, occipite prominentis. *Syst. nat. 15. n. 3.*

*Aries guineensis s. angolensis. Marcgr. bras. 264. Raj. quadr. 75.*

*Habitat in Guinea.*

*Cornua parva, deorsum usque ad oculos torta. Juba sub collo pendula. Pili breves, hircini.*

Strepsiceros. 3. O. cornibus rectis spiralibus. *Syst. nat. 15. n. 2. †*  
Strepsiceros cretentis. *Bellon. itin. 20. Aldr. bisulc. 407. Raj. quadr. 75.*

*Habitat in Ida monte.*

33. BOS. *Cornua concava, antrorsum versa, lunata, lævia.*

*Dentes Primores inferiores VIII.*

*Lanarii nulli.*

Taurus. 1. B. cornibus teretibus extrorsum curvatis, palearibus laxis. *Faun. svec. 44. Syst. nat. 15. n. 1.*

β. Bos. *Gesn. quadr. 25. Aldr. bisulc. 13. t. 36. Jonst. quadr. t. 14. Raj. quadr. 70.*

α. Urus. *Cæsar bell. gall. VI. c. 5.*

*Habitat in Poloniæ depressis graminosis ferus Urus.*

*Mugiens boansque Bos: Taurus, Vacca, Vitulo, homini utilissimus pro agris letificandis, colendis sub jugo; pollet carne, lacte, caseo, butyro, sebo, corio; infestatur Oestris, Tabanis, Cynipe, Ricinis, Pediculis; læditur a Cicuta, Accento, Anemone Vitulus tendinosus brevioris ævi singularis.*

Bonafus. 2. B. cornibus in se flexis, juba longissima. *Syst. nat. 15. n. 2.*

*Bonafus. Raj. quadr. 71. Jonst. quadr. t. 18. f. i.*

*Habitat in Africa, Asia.*

*Defendit se stercore, ad aliquot passus dejecto, comburente.*



- Bison. 3. B. cornibus divaricatis, juba longissima, dorso gibbofo.  
*Syst. nat.* 15. n. 3.  
 Bison. *Raj. quadr.* 71. *Gesn. quadr.* 296. *Junst. quadr.*  
*t.* 17. f. 2.  
 Bison americanus. *Catesb. carol.* 3. p. 20.  
 Taurus mexicanus. *Hern. mex.* 587. *Gesn. quadr.*  
 301.  
*Habitat in Mexico, Florida.*  
 Collum & Pectus undique urfi instar hirsuta.
- Bubalis. 4. B. cornibus resupinatis intortis antice planis, *Syst. nat.*  
 15. n. 4.  
 Bubalus. *Raj. quadr.* 72. *Gesn. quadr.* 58. *Aldr.*  
*bifulc.* l. 1. c. 6. *ad Prædæ Pontinas*  
*Habitat in Asia, cultus in Italia. Musfel.*  
 Lana duriuscula in dorso, cæterum pili rari. Regitur  
 annulo narium; trahit currus; oryzam colit; caseum  
 di cavallo præbet.
- indicus, 5. B. cornibus aure brevioribus, dorso gibbo, juba nulla. †  
 Bubalus parvus indicus. *Edw. av.* 200. t. 200.  
*Habitat in China.*  
*Utrum hæc species distincta a præcedentibus, nec ne,*  
*dubito.*



## VII. BELLUA.

*Dentes Primores obtuse truncati  
Mammæ duæ inguinales.*

34. EQVUS. *Dentes Primores superiores VI erecto - paralleli.  
Inferiores VI prominentiores.  
Laniarii solitarii, inclusi, utriusque remoti.  
Pedes ungula indivisa.*

Caballus. 1. E. cauda undique setosa. *Faun. suec. 34. Syst. nat. 11.  
Equus. Gesn. quadr. 132. Aldr. ungu. 12. Jonst. quadr.  
1. t. 1. 2. 3. 4. Raj. quadr. 62.  
Habitat in Europa.*

*Animal generosum, superbum, fortissimum in currendo, portando, trabendo, aptissimum equitando, cursu furens; sylvis aelectatur; posteriora curat; cauda muscas abigit; alterum scalpit; pullum injuriæ obnoxium reponit; hinnitu socium vocat; dormit post noctem; calcitrando pugnat; sudans se volutat; vegetabilia edit bove propius, semina disseminat; stercus incalescit; cystide fellea caret; non vomit; Equuleus Hippomane natus, pedibus elongatis; læditur globulo auris, acicula pedis, nasi capistro, dentibus sebo illitis, Padi herba, Phellandrii Curcalione. Laborat hernia mediastini, polypo cordis, orthopnoea, æstro faucium anique, scabiæ, tartaroque pedum, Bubone colli; Hippocomia instruitur.*

- Asinus. 2. E. cauda extremitate setosa, cruce nigra supra humeros.  
*Faun. suec. 35. Syst. nat. 11.  
Asinus. Gesn. quadr. 4. Aldr. ungu. 295. Jonst. quadr.  
12. t. 6. Raj. quadr. 63.  
Onager. Raj. quadr. 63. sylvestris est.  
β. Mulus. Raj. quadr. 64. ab Equæ & Asino.  
γ. Hinnus. Raj. quadr. 64. ab Asina & Equo.*

E 5

Habi-



*Habitat. in oriente, frigoris impatiens.*  
*Vivitat spinis; tardus, stupidus, rudens, libidinosus;*  
*auriculæ magnæ*

Zebra. 3. E. fasciis fuscis versicolor. Syst. nat. 11.  
 Zebra. Edw. av. tab. duæ ultimæ. Raj. quadr. 69.  
 Fonst. quadr. t. 5. f. 1. Aldr. quadr. l. 1. c. 8.  
*Habitat in India, Africa, uellâna.*  
 Color albidus seu rufescens fasciis nigris digitos tres la-  
 tus per totum corpus transversis. Cauda Asini.

35. HIPPOPOTAMUS, Dentes Primores superio-  
 res VI, per pa-  
 ria remoti.  
 Inferiores IV pro-  
 minentes: in-  
 mediis recta  
 tensis.

*Le Cabiai hos Bugon, Kan*  
*wara ex Genere Hippopotami,*  
*detta Amerikaniska Watten;*  
*djer, har Bugon sedt hos*  
*Duy de Bouillon, men ofull-*  
*komligt beskriwit.*  
*Salig Linné lärer ei kända*  
*Fredr. Therenghis artiga*  
*Beskrifning på Hippopoten*  
*hwarefter Aldrovandi och*  
*flere compilerat.*

ii solitarii,  
 que truncati.  
 unguiculati.

ev. mus. t. 1.  
 25. Matth.  
 quadr. t. 49.

ostia fluvio-

mitudine Uri,  
 mobili; den-  
 ; incedit nec  
 pabulatur in  
 unum adfert.

126.

imum, præ-

VIII. CE-



*Habitat. in oriente, frigoris impatiens.*

*Victitat spinis; tardus, stupidus, rudens, libidinosus; auriculæ magnæ*

- Zebra. 3. *E. fasciis fuscis versicolor. Syst. nat. II.*  
*Zebra. Edw. av. tab. duæ ultimæ. Raj. quadr. 69.*  
*Fonst. quadr. t. 5. f. 1. Aldr. quadr. l. 1. c. 8.*  
*Habitat in India, Africa, uellâna.*  
*Color albidus seu rufescens fasciis nigris digitos tres la-*  
*tis per totum corpus transuersis. Cauda Asini.*

35. HIPPOPOTAMUS. *Dentes Primores superio-*  
*res VI, per pa-*  
*ria remoti.*

*Inferiores IV pro-*  
*minentes: in-*  
*termediis recta*  
*protensis.*

*Laniarii solitarii,*  
*oblique truncati.*

*Pedes margine unguiculati.*

- amphi- 1. *H. pedibus quadrilobis.*  
 bius. *Hippopotamus. Bell. aquat. 28. t. 30. Grev. mus. t. 1.*  
*f. 5. Alp. ægypt. 245. t. 22, 23, 24, 25. Matth.*  
*diosc. 2. c. 22. Raj. quadr. 123. Fonst. quadr. t. 49.*  
*Syst. nat. II.*  
*Habitat in Nilo & Bambolo Africæ & ad ostia fluvio-*  
*rum Asiæ, amphibus.*  
*Corpus Suis, nullum præter vibrissas, magnitudine Uri,*  
*Pedibus brevibus, Mandibula superiore mobili; den-*  
*tibus sciattans. Mammæ 1, 1, inguinales; incedit nec*  
*natat; humiles aggeres vix adscendit; pabulatur in*  
*fundo & sicco; Oryzæ & Colocasiæ damnum adfert.*  
*Lupino pellitur. Behemot Jobi.*

- terrestris. 2. *H. pedibus posticis trifulcis. †*  
*Tapirierete. Marcgr. bras. 229. Raj. quadr. 126.*  
*Habitat in Brasilia.*  
*Animal dubium, Hippopotamo genere proximum, præ-*  
*eunte Rajo.*

*Proprii generis vid. Buffon VIII. CE-*  
*Tom. X au le Tapir naque pro-*  
*bede*



## VIII. CETE.

*Spiracula supra Caput.*

*Pinnæ Pectorales caudalisque horizontalis absque unguibus.*

36. MONODON. *Dens* in maxilla superiore exsertus, prælongus, rectus.  
*Fistula* in vertice.

Mono- 1. MONODON. *Art. gen.* 78. *syn.* 103. *Faun. suec.* 263.  
ceros. *Syst. nat.* 39.  
Monoceros piscis. *Will. icht.* 42. *Raj. pisc.* 11.  
Unicornu marinum. *Tulp. obs.* 375. *in hominum.*  
*Habitat in Oceano septentrionali Americæ, Eurōpæ.*  
*Cornu Monocerotis spirale hujus Dens est.*

37. BALÆNA. *Dentium* loco in maxilla superiore  
laminæ corneæ.  
*Fistula* duplex.

Mystice- 1. B. naribus flexuosis in medio capite, dorso impenni. *Art.*  
tus. *gen.* 76. *syn.* 106. *Faun. suec.* 264. *Syst. nat.* 39. n. 1.  
*Balæna Will. icht.* 35.  
*Balæna vulgo f. Musculus. Rond. pisc.* 475.  
*Balæna vulgo f. Mysticetus aristotelis. Gesn. pisc.* 114.  
*Balæna vulgaris edentula, dorso non pinnato. Raj. pisc.* 6.  
*Balæna spitsbergensis. Mar. spitsb.* 98. t. Q. f. A. B. C.  
*Habitat in Oceano Groenlandico. Gronlandisval.*  
*Maximus omnium animalium; sæpe 100 pedum, victi-*  
*tat medusis. Caput grande; Dorsum impenne.*  
*Fistula nulla, sed 2 foramina flexuosa.*  
*Mammæ abdominales ante vulvam; Maxillofi Dentes*  
*flexiles fissilesque usuales. Pinguedo copiosissima, ut*  
*ex unico sæpe oneretur navis.*

Phyfa- 2. B. naribus in medio capite, dorso extremo pinna adi-  
lus. posa. *Art. gen.* 77. *syn.* 107. *Faun. suec.* 265. *Syst.*  
*nat.* 39. 2.

Balæ-

Cetis quibusdam pinna dorsalis, omnibus pinna caudæ & pectorales; nullis P. ani,  
aut ventrales, cum pedes in caudam coadunati.



Balæna edentula, corpore strictiore, dorso pinnato. *Raj. pisc. 9.*

Physalis bellua f. Physeter. *Gesn. pisc. 723.*

Physeter. *Rond. pisc. 485. Will. icht. 41.*

Finfisch. *Martens. spitsb. 125. t. Q. f. C.*

*Habitat in Oceano Europæo. Finnfisch*

Boops. 3. B. fistula duplici in rostro, dorso extremo protuberantia cornea. *Art. gen. 77. syn. 107. Mus. Ad. Frid. 1. p. 50.*

Balæna tripinnis nares habens cum rostro acuto & plicis in ventre. *Raj. pisc. 16.*

*Habitat in Oceano septentrionali.*

Muscus. 4. B. fistula duplici in fronte, maxilla inferiore multo latiore. *Art. gen. 78. syn. 107. Syst. nat. 39. n. 3. †*

Balæna tripinnis, maxillam inferiorem rotundam & superiore multo latiore habens. *Raj. pisc. 17.*

*Habitat in mari Scotico.*

*Modo hic a Mysticeto sufficienter distinctus; conferatur. Mus. Ad. Fr. 51.*

### 38. PHYSETER. *Dentes in maxilla inferiore. Fistula in capite f. fronte.*

Catodon. 1. P. dorso impenni, fistula in rostro.

Catodon fistula in rostro. *Art. gen. 78. syn. 108. Syst. nat. 39. n. 1.*

Balæna minor in inferiore maxilla tantum dentata, sine penna aut spina in dorso. *Raj. pisc. 15.*

*Habitat in Oceano septentrionali.*

macrocephalus. 2. P. dorso impenni, fistula in cervice.

Catodon fistula in cervice. *Art. gen. 78. syn. 108. Faun. suec. 262. Syst. nat. 39. n. 2.*

Cete. *Clus. exot. 131.*

Cete Clusio descriptum. *Will. icht. 41.*

Balæna major in inferiore tantum maxilla dentata macrocephala bipinnis. *Raj. pisc. 15; 11.*

*Habitat in Oceano Europæo.*

*Longitudo saepe sexaginta pedum.*

*Sperma Ceti e ventriculis cerebri.*

microps 3. P. dorso spina longa, maxilla superiore longiore. *Art. gen. 74. syn. 104. Syst. nat. 39. n. 1.*

Balæ-



Balæna major inferiore tantum maxilla dentata, dentibus arcuatis falciformibus, pinnam s. spinam in dorso habens. *Raj. pisc. 15.*

*Habitat in Oceano septentrionali.*

Tursio. 4. B. dorsi pinna altissima, apice dentium plano. *Art. gen. 74. syn. 104. Syst. nat. 39. n. 2.*

Balæna macrocephala tripinnis, quæ in mandibula inferiore dentes habet minus inflexos & in planum desinentes. *Raj. pisc. 16.*

*Habitat in Oceano septentrionali.*

### 39. DELPHINUS. *Dentes in maxilla utraque.* *Fistula in capite.*

Phocæna. 1. D. corpore subconiformi, dorso lato, rostro subobtusulo. *Art. gen. 75. syn. 104. Faun. suec. 266. Syst. nat. 39. n. 1.*

Phocæna s. Tursio. *Bell. pisc. 16. Gesn. pisc. 711.*

Phocæna. *Rond. pisc. 473. Will. icht. 31. Raj. pisc. 13.*

*Habitat in Oceano Europæo, & Balthico. Sumblare*

Delphis. 2. D. corpore oblongo subtereti, rostro attenuato acuto. *Art. gen. 76. syn. 105. Syst. nat. 39. n. 2.*

Delphinus. *Bell. pisc. 9. Rond. pisc. 459.*

Delphinus antiquorum. *Raj. pisc. 12. Will. pisc. 28.*

*Habitat in Oceano Europæo. Marsuin*

Orca. 3. D. rostro sursum repando, dentibus latis ferratis. *Art. gen. 76. syn. 106. Faun. suec. 267. Syst. nat. 39. n. 3.*

Orca. *Bell. pisc. 18. Rond. pisc. 483. Gesn. pisc. 635.*

*Will. icht. 40.*

*Lispare*

Balæna minor, utraque maxilla dentata. *Raj. pisc. 15.*

*Habitat in Oceano Europæo.*

CLAS-

SIREN *Barth. cent. 2. obs. 11. t. 188. e Brasilia Cultro anatomico Leydæ subjecta, mihi paradoxa ob Antea exstantes, Collumque angustum in aquatico Mammali, nec a peregrinatoribus ulterius confirmata.*



## CLASSIS II.

## AVES.

**AERÆ** vocales Volucres pulcherrimæ, *Mandibulis protractis nudis, Corpore pennis imbricato, Alis duabus pennatis volitantes bipedes* dignoscuntur.

**AVES** levissimæ modicæ magnitudinis, *testæ pennis plumisque, destitutæ Auriculis, Labiis, Cauda, Scroto, Dentibus, Utero, Epiglottide, Fornice, Corpore calloso, Diaphragmate.*

**PENNÆ** avibus propriæ imbricatim in quincuncem dispositæ, interstinctæ *Plumis*, distinctæ a *Remigibus Rectricibusque*, omnes, e basi cylindro concavo vasi lymphaticis simili, elongatæ bifariam radiis parallelis approximatis distinctis itidem pinnatis.

*Colore* ludunt, sed variant ætate, sexu, tempestate; constantiores *Remiges & Rectrices*, quæ attente notandæ. (\*)

**OVA** his, animalibus communia (pag. 9. n. 3.) numero diversis vario, sed majora pro mora exclusionis siccæ, semper putamine calcareo oblecta, incubatu calido excludenda plerumque Parentis.

**DIVIDITUR** Avium corpus in *Caput, Truncum, Artus.*

**CAPUT** impositum *Collo* elongato, erectiusculo, teretiusculo.

*Mandibulæ* nudæ, edentulæ, exprorectæ in *Rostrum* corneum, *Naribus* pertusum, basi quibusdam *Cera* nuda vestitam, *Vibrissis* pectinatim digestis ad faucis exterioris margines.

*Lingua* carnosæ, cartilaginea, emarginata, lacera, ciliata, integra s. acuta.

*Oculi* laterales *palpebris, Membranaque* nictitante.

*Aures* truncatæ absque auriculis

Ornamenta verticis e *Crista* pennacea s. *Caruncula* frontis gulæve.

TRUN-

(\*) *Aff. Stöckh. 1740. p. 370. t. 1. f. 102. 11.*



**TRUNCUS** ovatus constans *Dorso* coadunato macro, subtus *Sterno* magno carinato musculosissimo, *Claviculis* coadunatis in *Furcam*, *Abdomine* minore postice sub uropygio perforato *ano*, genitalibus communi.

**ARTUS** comprehendunt *Alas*, *Caudam*, *Pedes*.

**ALÆ** 2 ex Brachio & Cubito manibus privato constant, quæ postice fornicato - ciliatæ Pennis *Remigibus*: exterioribus *Primoribus* Cubiti, posterioribus *Secundariis* brachii, *alanotha* supplente rudimentum Pollicis. Hæ remiges proxime teguntur *Tectricibus* alarum proximis & ultra.

**CAUDA** ex *Uropygio* cordato, gemina glandula foeto, supra pertuso, poro penicillo cincto, ambitu ciliato Pennis *Rectricibus* sæpius 12: pede longioribus in *Macrouris*, brevioribus in *Brachyuris*, suntque vel æquales (*C. integra*), vel ad latera breviores (*cuneata*), vel ad latera longiores (*forficata*).

**PEDES** 2, ex Femore, Tibia, Digitis & Unguibus.

*Femora* carnosæ, pennis tectæ, sed seminuda in Grallis.

*Tibiæ* tendinosæ, plerisque nudæ, angustæ, rarius hirsutæ, paucis *Calcari* postice cornutæ.

*Digitis* pedes insistentes sæpius 4, anterioribus plerisque tribus, pollice unico postico, nisi in *scandentibus* digitis anticis duobus totidemque posticis, vel *cursoriis* absque postico. *Fissi* sunt & distincti *Digiti* in plerisque terrestribus (*Fissipedes*); *semipalmati* in palustribus; membranis vel *Lobati*, aut membrana toti *Palmati* (*Palmipedes*) in natantibus.

*Unguibus* instruuntur *Digiti* plerumque, rarius posticus absque articulo est.

**VOLATILIA** hæc, Telluris vigiles libidinosique musci, plerumque inermia sunt, cum Alarum remigibus se facili in æthera recipiant ab hostibus terrestribus, & Caudæ rectricibus aëreos diverso volatu eludant, nisi in terra negotiari necesse sit, dum odor vel ingratus hostes arcet, vel abolitus occultat; dum aliæ speculantur hostemque appropinquantem indicantque aliis.

**ARMA** paucis: *Cornua* Meleagridi cornutæ, Anhimæ.

*Calcariæ* Pavoni, Phasianæ.

*Spinæ* (axillares) Struthione Camelo, Fulicæ spinosæ, Charadrio spinosi, Anhimæ.



**VENERE** *monogama* junguntur pleræque Aves, *polygama* pauciores, ut Gallinæ, Anates. Illæ utriusque sexus conjunctis viribus struunt nidum sæpe artificiosissimum, uteri succedaneum, incubant sedulæ ovis, pullos famelicæ alunt, fovent, curant, pro aris & focus defendunt (\*), dum in his otientur mares.

**MIGRATIONES** annuas inter septentrionales æstivas & australes hybernas plagas arcticæ Telluris instituunt non paucæ, ne hyeme demergerentur boreales omnes apud nos insectivoræ; sic migrant plurimi *Passeres*, imperant *rostræ* ob defectum insectorum; *Grallæ* ob æneam glacie aditum vermibus & amphibiiis; *Anseres* ob æneam aquas includentes pisces &c. Revocant vero ad nos Dies æstatis longiores, ciborum copia, densiores venæ, nuptiæ paratæ.

**OPERA** nec sine fructu peragunt sua singulæ: sedentes *Accipitres* cadavera auferunt, ut vivis parcant; incedentes *Picæ* quisquillas impuras verminosasque devorant; natantes *Anseres* aquarum nimios hospites minuunt; vadantes *Grallæ* inquirent in paludum animalcula; currentes *Gallinæ* decidua Grana legunt; salientes *Passeres* arbuistarum herbarumque semina insectaque carpunt; eoque varia semina Piscium, Insectorum Plantarumque sæpius in remotissima loca ferunt. Conquiruntur *venatu*, *Falconaria*; *Aucupio* instituntur *Falcones* ad *venatum*, *Diomedæ* ad *piscaturam*, *Fallices* ad *Muscam*. Mansuescunt *Gallinæ*, *Anates*, *Passeresque* varii: in ornithone s. Aviario coluntur ob *carnes*, *ova*, *plumas*, *pennas*, pulchritudinem, sonum. Asservantur *exuvia*, *siccata*, *spiritu* contentæ.

**ORNITHOLOGI** eminent inter veteres *Bellonius*, *Gesnerus*, *Aldrovandus*; inter recentiores *Willughbæus*; inter recentissimos *Marsigli*, *Albinus*, *Seba*, *Catesbæus*, eximiusque *Edwardus*. Systematici *Rajus*, *Barrere*, *Kleinus*, *Mæhringius*.

ORDI-

(\*) *Mos. Deuter. XXII: 6, 7.*



## ORDINUM Characteres.

## I. ACCIPITRES.

ROSTRUM (*Uncus trahens*) subincurvatum: *Mandibula* superiore pone apicem utrinque dente armata: *Naribus* patulis.

PEDES insidentes, breves, robusti: *Digitis* sub geniculis verrucosis; *Unguibus* arcuatis, acutissimis.

CORPUS capite Colloque musculosis; *Cute* tenaci. Impurum.

VICTUS: Laniena rapinaque e cadaveribus.

NIDUS in altis; *Ova* circiter 4; *Femina* præstantior; Monogamia.

## II. PICÆ.

ROSTRUM (*Cuneus sarriens*) cultratum dorso convexo.

PEDES ambulantes, breves, validiusculi.

CORPUS tenaciufculum, Impurum.

VICTUS e Quisquiliis.

NIDUS in Arboribus; *Mas* alens feminam incubantem; Monogamia.

## III. ANSERES.

ROSTRUM (*Cribrum colans*) læve, epidermide tectum; apice auctum.

PEDES natatorii digitis membrana palmatis; *Tibiis* compressis, brevibus.

CORPUS pingue, *Cute* tenaci, Plumis præstantioribus. Rancescens.

VICTUS in Aquis ex plantis, piscibus, &c.

NIDUS sæpius terrestris; *Mater* non porrigit pullis; frequentius Polygamia.



## IV. GRALLÆ.

ROSTRUM (*Bacillus tentans*) subcylindricum.

PEDES vadantes *Femoribus* seminudis.

CORPUS compressum pelle tenuissima ; *Canda* brevi.  
Sapidum.

VICTUS in Paludibus ex Animalculis.

NIDUS in terra sæpius ; Nuptiis variis.

## V. GALLINÆ.

ROSTRUM (*Harpa colligens*) convexum : *Mandibula* superiore fornicata supra inferiorem ; *Naribus* membrana cartilaginea fornicatis.

PEDES cursorii *Digitis* subtus scabris.

CORPUS sebaceum, musculosum. Purum.

VICTUS e Granis in ingluvie macerandis *Pulveratrices*.

NIDUS in Terra absque arte. *Ovis* numerosis. *Pullis* cibus demonstrandus. Polygamia.

## VI. PASSERES.

ROSTRUM (*Forceps excipiens*) conico-acuminatum.

PEDES salientes, teneri, fissi.

CORPUS tenellum : *Granivoris* Purum. *Insectivoris* Impurum.

VICTUS e Seminibus aut Insectis.

NIDUS artificiosus ; *Pullis* cibus inculcandus. Monogamia.



## CHARACTERES AVIUM.

## I. ACCIPITRES.

40. VULTUR Rostrum *aduncum*. Caput *denudatum*.  
 41. FALCO Rostrum *aduncum* basi Cera *tectum*.  
 42. STRIX Rostrum *aduncum* basi Setis *tectum*.  
 43. LANIUS Rostrum *rectiusculum*.

## II. PICÆ.

\* Digitis anticis 2, posticis 2.

44. PSITTACUS Lingua *carnosa*. Mandibula *superior adunca*.  
 45. RAMPHASTOS Lingua *pennacea*. Mandibula *superior inanis*.  
 52. CUCULUS Lingua *cartilaginea*. Mandibula *superior naribus marginatis*.  
 53. JYNX Lingua *lumbriciformis*. Mandibula *superior teretiuscula*.  
 54. PICUS Lingua *lumbriciformis*. Mandibula *superior prismatica*.

\* Digitis anticis 3, postico 1. Lingua *incisa*.

48. CORVUS Mandibula *superior cultrata* basi setis *tecta*.  
 49. CORACIAS Mandibula *superior cultrata* basi *nuda*.  
 55. SITTA Rostrum *porrectum, rectum*.  
 57. MEROPS Rostrum *arcuatum, carinatum*.  
 60. TROCHILUS Rostrum *pliforme, capite longius*.

\* Digitis anticis 3, postico 1, Lingua *integra*.

46. BUCFERS Mandibula *superior fronte gibbosa*.  
 47. CROTOPHAGA Mandibula *superior compressa, infra, transverse sulcata*.  
 50. GRACULA Mandibula *superior compressa, levis, basi nuda*.  
 51. PARADISEA Mandibula *superior ad medium usque plumoso-holosericæ*.  
 56. ALCEDO Mandibula *superior angulata*. Lingua *brevis*.  
 58. UPUPA Rostrum *arcuatum*. Lingua *obtusæ*.  
 59. CERTHIA Rostrum *arcuatum*. Lingua *acuta*.



## III. ANSERES.

\* Rostro apice unguiculato.

61. ANAS Nares ovales. Dentes lamellofi.  
 62. MERGUS Nares ovales. Dentes subulati.  
 64. PROCELLARIA Nares in cylindrum connatae.  
 65. DIOMEDEA Nares subcylindrica, distantes.  
 66. PELICANUS Nares lineares. Facies nuda. Pedes  
 Digitis omnibus palmatis.

\* Rostro apice simplici.

67. PHÆTHON Rostrum cultrato-subulatum, fauce ampliore. Pedes Digitis 4 anticis.  
 63. ALCA Rostrum transverse fasciatum. Pedes absque postico.  
 68. COLUMBUS Rostrum subulatum, capite longius. Pedes pone æquilibrium.  
 69. LARUS Rostrum subtus pone apicem gibbum.  
 70. STERNA. Rostrum subulatum.  
 71. RHYNCOPS Rostri maxilla superior brevior.

## IV. GRALLÆ.

\* Rostro magno capite longiore.

72. PHOENICOPTERUS Rostrum infractum, denticulatum. Pedes palmati.  
 73. PLATALEA Rostrum depressum: apice rotundato-dilatato.  
 74. MYCTERIA Rostrum mandibulis adscendentibus.  
 75. TANTALUS Rostrum arcuatum sacco gulari.  
 76. ARDEA Rostrum rectum, acutiusculum.  
 80. RECURVIROSTRA Rostrum subulato-attenuatum, recurvum.  
 77. SCOLOPAX Rostrum rectum, teretiusculum, obtusiusculum.

\* Rostro capite vix longiore. Pedibus tetradactylis.

78. TRINGA Rostrum teretiusculum, obtusum. Pollex vix insistens.  
 82. FULICA Rostri basis fronte calva.  
 83. RALLUS Rostrum subcarinatum. Corpus compressiusculum.  
 84. PSOPHIA Rostrum subfornicatum. Nares ovatae.

\* Ro-



- \* Rostro capite vix longiore. Pedibus tridactylis.
81. HÆMATOPUS Rostrium *compressiusculum apice cuneo.*
79. CHARADRIUS Rostrium *teretiusculum, obtusum.*
85. OTIS Rostrium *subforficatum. Lingua emarginata.*
86. SIRUTHIO Rostrium *conicum. Alæ non volitantes.*

## V. GALLINÆ.

87. PAVO Vertex *pennis revolutis. Rostrium nudum.*
88. MELEAGRIS Facies *carunculis verrucosa.*
89. CRAX Basis rostri *Cera obtecta.*
90. PHASIANUS Genæ *nudæ, læves.*
91. TETRAO Supercilia *nuda, papillosa.*

## VI. PASSERES.

\* Graminivori crassirostres.

92. COLUMBA Rostrium *cera obliterated naribus tumidis.*
93. ALAUDA Rostrium *porrectum. Ungvis pollicis longissimus.*
95. TURDUS Rostrium *naribus membrana semitectis.*
96. LOXIA Rostrium *conico-gibbum. Lingua integra.*
97. EMBERIZA Rostrium *mandibula inferiore latiore, lateribus sursum coarctata.*
98. FRINGILLA Rostrium *conicum, rectum, æquale.*

\* Insectivori tenuirostres.

94. STURNUS Rostrium *mandibula superiore planiuscula undique marginata.*
99. MOTACILLA Rostrium *subulatum. Lingua lacera.*
100. PARUS Rostrium *subulatum. Lingua truncata, quadrifeta.*
101. HIRUNDO Rostrium *depressum, incurvatum. Faux imberbis.*
102. CAPRIMULGUS Rostrium *depressum, incurvatum. Faux vibrissis ciliata.*



I. ACCIPITRES. *Rof Joyla*

*Rostrum e Mandibula superiore denticulum utrinque exserens.*

40. VULTUR. *Rostrum rectum, apice aduncum. Caput impenne, antice nuda cute. Lingua bifida.*

Gryphus. 1. V. maximus, caruncula verticali longitudine capitis. †  
Vultur Gryps Gryphus. *Klein. av. 45.*

Cuntur. *Raj. av. 11.*

*Habitare fertur Chili.*

*Rara avis in terris; mihi ignota; videsis Kleinium.*

Harpyja. 2. V. occipite subcristato. †

*Yzquauhtli. Hern. mex. pp. 34.*

*Aquilæ cristatæ genus. Raj. av. 161.*

*Habitat in Mexico.*

*Magnitudo arietis. Collum, Dorsum, Cauda, Crista jurecti nigra; Subtus nigro candidæque fulvo mixta. Homines etiam adoritur. Hernand.*

*Cfr. Aquila mexicana coronata. Rostrum Vulturis. Oculi membrana nictitante. Sub ingluvie pennæ albæ, quas tratus dimittit usque ad pedum digitos. Alæ Caudæque jnotus albo nigroque punctate colore Tigrinis. Erectus confidet. Pennas occipitis sæpius erigit in formam coronæ. Fertur unico ictu cranium hominis iratus findere. Visus Madriti in Vivario Regio a Z. Hallman.*

Papa. 3. V. naribus carunculatis, vertice colloque denudato.

*Vultur elegans. Edv. av. 2 t. 2.*

*Vultur. Alb. av. 2. p. 4. t. 4.*

*Habitat in India occidentali.*

*Obs. Vultur. Alb. av. 3. p. 1. t. 1. an femina hujus?*

*Caput & Collum quasi excoriata retrahere potest intra vaginam cutis plumosæ colli inferioris.*

Aura. 4. V. fuscogriseus, remigibus nigris, rostro albo.

*Tzopilotle s. Aura. Hernand. mex. 331.*



Urubu brasiliensibus. *Marcgr. bras.* 207. *Willugb. orn.* 68. *Raj. av.* 10. 180.

Buteo specie gallo - pavonis. *Catesb. car.* 1. p. 6. t. 6.

Vultur gallinæ africanæ facie. *Sloan. jam.* 2. p. 294. t. 254.

Vultur pullus, capite implumi, cute crassa rugosa ultra aperturas nasales laxata. *Brown. jam.* 471.

*Habitat in America calidiore.*

*Privilegio munitus in Jamaica.*

barbatus. 5. V. albidus, dorso fusco, jugulo barbato, rostro incarnato, capite linea nigra cincto.

Vultur aureus. *Gesn. av.* 783. t. 781.

Vultur barbatus. *Edv. av.* 106. t. 106.

*Habitat in Africa.*

*Ad basin maxillæ inferioris barba dependet; frons oculorumque regio atra.*

Perenopter. 6. V. remigibus nigris margine exteriori (præter extimas) canis.

Perenopterus f. Gypaëtos. *Aldr. orn. t.* 2. c. 10. *Raj. av.* 8.

Falco montanus ægyptiacus. *Hasselqv. act. Stockh.* 1751. p. 196.

Vultur, *Perenopterus*, capite nudo, gula plumosa. *Hasselqv. itin.* 209.

Vultur niger. *Raj. av.* 9.

Vultur bæticus. *Raj. av.* 10.

Vultur albus. *Raj. av.* 10.

Vultur aquilina. *Aldr. orn. Alb. av.* 2. p. 3. t. 3.

Vultur fulvus, bætico bellonii congener. *Raj. av.* 10.

*Habitat in Ægypto.*

Mas totus albus: Remigibus atris margine exteriori canis, exceptis duabus primis unicoloribus: Femina tota fusca: Remigibus quatuor extimis concoloribus. Rostrium atrum cera flava. *Hasselqv. Nares perpetuo stillant. Raj.*

Purgat Cauri terram a cadaverum foetore, stipendiis allectus. *Hasselqv.*

*Historia Vulturis obscuræ, Sigeni  
enumerat S. Sp. Europæas, æ. Perenoptere,  
Orizon, Grand l'aigle, Uauai. FAL-  
four, L'iglette, et Elite. Vultur  
l'ita creditur.*



Orätt tillägnar Linné. Swänska Örnen till.  
namnet Chrysolotos, som bör tillräcka den stora  
Brandgula, bättre med. Därför nämna honom  
Havnia. L'Alena, den som är mindre Ornen  
dessa för mig i boken, som ock är yr på Örnberg  
med en del mindre svart, stora Brandgula  
Örn eller Chrysolotos, måtte icke vara samma  
i Sverige.

Att Örnerna tillräcka många Varieteter,  
som icke skilja, Sagen för ikas att  
Ornen i Sverige är Halvvetus eller  
Barbularde och producerar Batarden.  
S. 11. märkt att Baron de la Peyronie  
säger att i Frankrike och Suedis, finnes  
allena 2 slags Hökar eller jakar, se  
i Wallerströmsk. Handl. 1782, men  
Her Sagen finnes allena 4 alla Swänska  
utanom. Stora Brandgula. Örnen,  
Citrinagus, Jean le Blanc och L'Eme-  
rillon, den ista ej förre ären kladdra  
men ganska och hindring jagare.

Hos Linné finnes Swarcken Jean le  
Blanc, L'Emerillon eller Le Vaire.

Falco tunetanus. Alb. av. 3. p. 2. t. 2.  
Habitat in Barbaria.

cærule- 7. F. cera palpebris pedibus subtusque luteus, dorso nigro  
scens. cærulescente, temporibus linea alba inclusis.

Accipiter minimus benghalensis. Edv. av. 108. t. 108  
Habitat in Asia.

Aquila dicta suere Falcones majores, pedibus hirsutis.



Stygnen äro af Gyrfalco icke få, jagare  
uti särskiliga ställen. Sålunda heter jagare, Gyr-falk  
Gyrfalk, contra. Gyrfalk.

Såsom har Gyrfalcones, scriblaud den  
Hvit prälimet Gyr-falk, uti ifrån kalas  
länder, Grönland, Island, Nörige och Ryss-  
land; samt på de Fjällbergen, såsom  
som i stället många ställen i svenska Malla,  
Särmodligen ett par, såsom de i Sverige  
utkast i färger, således för Linnæus i Gyr-falk  
gäret, om Gyrfalco bibehållas

jagare och, uti Sverige uträknas mer  
än 20 falksorter ifrån differente orter, men  
som de i Sverige kan icke vara som i Sverige  
som deras naturliga tillstånd är i Sverige  
orter, som människans gärna kyr, blir  
de i ganska snart utströmda, emellertid  
göra flere species. Sålunda utom  
färgen lika, i Sverige liknats till och med  
född habitat, tycket denna falk kan  
både ett species Gyrfalcones

Huru den dock icke begripes, andre vill jag  
dessa rade. Hökar, såsom Örnen, Tårn,  
cylus, Vexus, Emerillon, de rade  
etc. Sålunda huru länge Falkfågeln  
varit i bruk, om den var känd af de Ro-  
mare? Kan hävdas att Sæver och Lanarius  
varit de gamlas jaktfalkar, som nu äro  
föga kända.  
Palumbarius churu snäll jagare för sig själv



41. FALCO. *Rostrum* aduncum, basi cera instructum.

*Caput* pennis arcte tectum.

*Lingua* bifida.

*Coronatus* *F. ex Guinea.*  
\* *Cera* lutea.

Melanæ-1. *F. cera* lutea, pedibus semilanatis, corpore ferrugineo-  
tus. nigricante striis flavis.

Melanæus s. Aquila valeria. *Raj. av. 7. n. 4. Will. orn.*  
30. t. 2. *Alb. av. 2. p. 2. t. 2.*

*Habitat in* Europa, *Australiore*

Chrysaë-2. *F. cera* lutea, pedibus lanatis, corpore fusco ferrugi-  
ros. neo vario, cauda nigra basi cinereo-undulata. *Faun.*  
*Svec. 56.*

Aquila chrysaëtos. *Will. orn. 27. t. 1. Raj. av. 6. n.*  
1. *Aldr. orn. 2. t. 2. p. 2.*

*Habitat in* Europa, *Orni*

*Cyathus* *F. Coraculæ. ped. lanatis, Corpore ferrug. in Europa.*  
fulvus 3. *F. cera* flava, pedibus lanatis, dorso fusco, cauda fa-  
scia alba.

Aquila fulva s. Chrysaëtos, cauda annulo albo cincta.  
*Will. orn. 28. t. 1. Raj. av. 6. n. 2.*

*Habitat in* Europa.

canaden-4. *cera* flava pedibusque lanatis, corpore fusco, cauda al-  
fis. ba apice fusco.

Aquila cauda alba. *Edw. av. 1. t. 1.*

*Habitat in* Canada.

*Pectus punctis* trigonis adpersum.

rustico-5. *F. cera* palpebris pedibusque luteis, corpore cinereo al-  
lus. boque undulato, collari albo.

*Habitat in* Svecia.

barbarus. 6. *F. cera* pedibusque luteis, corpore cærulescente fusco-  
que maculato, pectore immaculato, cauda fasciata.

Falco tunetanus. *Alb. av. 3. p. 2. t. 2.*

*Habitat in* Barbaria.

cærule-7. *F. cera* palpebris pedibus subtusque luteus, dorso nigro-  
fcens. cærulescente, temporibus linea alba inclusis.

Accipiter minimus benghalensis. *Edw. av. 108. t. 108.*

*Habitat in* Asia.

8. F.



Albicilla. 8. F. cera flava, rectricibus albis: intermediis apice nigris.  
*Fn. suec. 58.*

Pygargus, Albicilla, Hinnularia. *Bell. av. 15. Gesn. av. 205. Aldr. orn. 1. 2. 6. 5. Will. ornith. 31. Raj. av. 7. n. 5.*

♁. Aquila, capite albo. *Catesb. car. 1. p. 1. t. 1.*  
*Habitat in Europa, America.*

Pygar- 9. F. cera flava, corpore cinereo, abdomine pallido ma-  
gus. culis oblongis rufis, oculorum orbita alba.

Pygargus. *Ab. av. 2. p. 5 t. 5. femina; ♂ 3. p. 3. t. 3. mas. Raj. av. 17. n. 5.*

*Habitat in Europa. albicat, ab omnibus hominibus. Ceres, in agro, in agro, in agro.*

Milvus. 10. F. cera flava, cauda forficata, corpore ferrugineo, ca-  
pite albidiore. *Fn. suec. 59.*

Milvus. *Gesn. av. 610. Aldr. ornith. 368. t. 1. Will. ornith. 41. t. 6. Raj. av. 17. Albin. av. 1. p. 4. t. 4.*

*Habitat in Europa, Asia, Africa. Glaca*

*Migrat trans pontum Euxinum in Asiam; privilegio munita Londini. Bell. itin. 108. Vorat quisquillas, pullos gallinacos; tempestates praesagit.*

forfica- 11. F. cera flava, cauda forficata longissima, corpore su-  
tus. pra fusco subtus albido.

*Accipiter cauda furcata. Catesb. car. 1. p. 4. t. 4. Habitat in America.*

gentilis. 12. F. cera pedibusque flavis, corpore cinereo maculis fu-  
fcis, cauda falciis quatuor nigricantibus. *Fn. suec. 60.*

Falco gentilis. *Will. ornith. 46. Raj. av. 13.*

Falco montanus. *Will. ornith. 45. t. 5. Raj. av. 13.*

*Habitat in Alpibus, visitans Tetrannibus. Falco*

*Ars capiendi Falcones Columbis & Laniis, instituendi, his venandi Gazellas, Ardeas, Aviculas &c. propriis artificibus.*

Subbu- 13. F. cera pedibusque flavis, dorso fusco, nucha alba,  
teo. abdomine pallido maculis oblongis fuscis. *Fn. suec. 64.*

*Le. Hobrean Buffon.*



Subbuteo. *Alb. av. 1. p. 6. t. 6. Raj. av. 15.*  
*Habitat in Europa, Alaudis infestus.*

Buteo. 14. F. cera pedibusque luteis, corpore fusco, abdomine pallido maculis fuscis.

*La Buse*  
*Saxon* Buteo vulgaris. *Gesn. av. 46. Will. ornith. 33. t. 6. Raj. av. 16.*

Buteo. *Alb. av. 1. p. 1. t. 1.*  
*Habitat in Europa, Cuniculis & Bufonibus infestus.*  
*Egregius Venator Serpentum in Sylvis Valdaais*

Tinnunculus. 15. F. cera pedibusque flavis, dorso rufo punctis nigris, pectore maculis longitudinalibus fuscis, cauda rotundata. *Fn. svec. 67.*

*La Courcelle*  
*Boston* Tinnunculus s. Cenchris. *Gesn. av. 54. Aldr. ornith. 1. 5. p. 395 Will. orn. 50. t. 5. Raj. av. 16. Alb. av. 1. p. 7. t. 7. (femina) & 3. p. 5. t. 5.*

*Habitat in Europæ turribus, aviculis muribusque infestus. In cauda fascia unica lata nigra versus apices. Nigricolater.*

sufflator. 16. F. cera pedibusque luteis, corpore fusco albido, oculorum operculis offeis.

*Habitat Surinami. Rolander.*

*Corpus supra fuscum plumis basi albis; subtus lateo albo fuscoque maculatum, uti etiam rectrices. Nares lobis carneo intercalari. Iratus aut territus caput inflat ad magnitudinem corporis.*

cachinnans. 17. F. cera pedibus luteis, palpebris albis, corpore fusco albidoque vario, annulo nigro verticem album cingente. *Rolander.*

*Habitat in America meridionali.*

*Corpus supra Dorsum, Alas, uropygium fuscum; sed Alba sunt collum, gula, pectus, abdomen, alae subtus. Cauda fasciis luteis nigrisque. Hominem observans cachinnos edit.*

sparverius. 18. F. cera lutea, capite fusco, vertice abdomineque rubro, alis cærulescentibus.

*Accipiter minor. Catesb. carol. 1. p. 5. t. 5.*

*Habitat in America.*

columbarius. 19. F. cera lutea, corpore fusco-subtus albido, cauda fusca fasciis linearibus quatuor albis.

*Accipiter palumbarius. Catesb. car. 1. p. 3. t. 3.*

*Habitat in America.*



Lanarius. 20 F cera lutea. pedibus rostroque caruleis corpore sub-

Haliætus.

Gyrfal-  
co.

apivorus.

ærugino-  
sus.

palumba-  
rius.

• Linné har confunderat Palu-  
barius och Gyrfalco, den förre allmän  
på öftröta Ståland in Burson  
L'Autour, ganska wacker fogel, och  
nog lika Nisus, fastän dubbelt större,  
bägge hafwa längre stjärt och ben  
än andre Hökar.

Burson har förträffeligen ritat och  
beskrifwit sin Autour, kallad Han-  
delstörna, lång tid i swande, fun-  
nit dem wilda och oläglige.

Gyrfalco måtte finnas i Sveriges  
Norra del, Burson har fått  
kunna från Is- och Grönland.  
L'Autour eller Palumbarius är  
duswors kraftige förfoljare,  
djärf och wägar allt för sådan  
jakt.

Belloni berättelse om Fogel-  
fångaren vid Constantinopol  
är ganska märkwärdige

Ormwaken allmänaste Höken  
i våra skogar och mörkast till  
färgen, skall wal <sup>wara</sup> samma Buteo  
och la Buse hos Burson!

Palumbarius & Nisus accipi-  
tres ~~numm.~~



Lanarius. 20. F. cera lutea, pedibus rostroque cæruleis, corpore sub-  
tus maculis nigris longitudinalibus. *Fn. svec.* 61.

Lanarius. *Gesn. av.* 76. *Aldr. ornith.* l. 5. c. 11. *Will. orn.* 48. *Raj. av.* 15. *Alb. av.* 2. p. 7. t. 7.

*Habitat in Europa; migratorius.*

\* \* Cera obscura.

Haliætus. 21. F. cera pedibusque cæruleis, corpore supra fusco sub-  
tus albo, capite alido. *Fn. svec.* 57.

Falco cyanopoda. *Gesn. av.* 74.

Haliætus. *Aldr. ornith.* l. 2. c. 3.

Morphnos. *Aldr. ornith.* l. 2. c. 8.

Calentardus. *Will. ornith.* 37. t. 6. *Raj. av.* 16.

*Habitat in Europa, hami inter arundines. Insectis, Blâs*

*Vicitat piscibus majoribus, Anatibus Pes sinister sub-*

*palmatus. ~~nest~~ ~~Lat~~ ~~Falco~~ ~~Onitragus~~ ~~delid~~*

Gyrfal- 22. F. cera cærulea, pedibus luteis, corpore fusco: sub-  
co. tus fasciis cinereis, caudæ lateribus albis. *Faun.*

*svec.* 62.

Gyrfalco. *Will. ornith.* 44? *Raj. av.* 13.?

*Habitat in Europa; Columbis infestus.*

*coram nigro cinereo. <sup>raies</sup> center albo cinereus maculis*

*transversis. <sup>magnitudo Galli</sup>*

apivorus. 23. F. cera nigra, pedibus seminudis flavis, capite cine-  
reo, caudæ fascia cinerea apice albo. *Fn. svec.* 66.

Buteo apivorus s. vespivorus. *Will. ornith.* 38. t. 3.

*Raj. av.* 16. *Zwidfogel La Bonaric Buffon*

*Habitat in Europa; vicitans Muribus, Lacertis, In-*

*sectis. Pulli modio Julii mensis Septembri nostris*

*insident, continuo julatu,*

ærugino- 24. F. cera fusca, corpore griseo, vertice gula axillis pe-  
sus. dibusque luteis.

Falco cera luteo-viridi, pedibus luteis, corpore ferru-  
gineo, vertice fulvo. *Fn. svec.* 63.

Milvus æruginosus. *Will. orn.* 42. t. 7. *Raj. av.* 17.

*Alb. av.* 1. p. 3. t. 3.

*Habitat in Europa. Hons Gius.*

palumba- 25. F. cera nigra margine pedibusque flavis, corpore fu-  
rius. sco, rectricibus fasciis pallidis, superciliis albis.

Accipiter palumbarius. *Aldr. ornith.* l. 5. c. 2. *Raj. av.*

18. n. 1. *Alb. av.* 2. p. 8. t. 8.

*Habitat in Europa, Gallinis infestus. Stag Hôk*

*Subtus totus albus nigro uncinatus. Rectrices apice albæ.*



- Nifus. 26. F. cera viridi, pedibus flavis, pectore albo fusco undulato, cauda fasciis nigricantibus. *Fn. svec.* 68.  
 Accipiter fringillarius. *Gesn. av.* 51. *Aldr. ornith* l. 5. c. 3 *Bell. av.* 19. b. *Will. ornith.* 51. t. 5. *Raj. av.* 18. *Alb. av.* 3. p. 4. t. 4. ♂ 1. p. 5. t. 5. femina.  
 Moscheutus. *Aldr. ornith.* 345. *Sparshöfn*  
*Habitat in Europa; Columbibus Passeribusque infestus; venatur egregie Alaudas, eoque utimur in aucupiiis.*

42. STRIX. *Rostrum* aduncum (absque cera) basi pennis fetaceis tectum.  
*Caput* grande auribus oculisque magnis.  
*Lingua* bifida.

*Auriculatae.*

- Bubo. 1. S. capite auriculato, corpore ruffo. *Fn. svec.* 45.  
 Bubo. *Bell. av.* 25. a. *Gesn. av.* 234. *Aldr. orn.* l. 8. c. 2. *Will. orn.* 62. *Alb. av.* 2. p. 9. t. 9. *Frisch. av. t.* 93.  
*Habitat in Europa. us.*
- Scandia- 2. S. capite auriculato, corpore albido. *Fn. svec.* 46.  
 ca. *Habitat in Alpibus Lapponiæ, magnitudo meleagridis*
- Asio. 3. S. capite aurito, corpore supra ferrugineo subtus cinereo, alis punctis quinque albis.  
 Noctua aurita minor. *Catesb. car.* l. p. 7. t. 7.  
*Habitat in America.*
- Otus. 4. S. capite auriculato pennis senis. *Faun. svec.* 47.  
 Otus s. Asio. *Bell. av.* 25. 6. *Aldr. orn.* l. 8. c. 3. *Will. ornith.* 64. t. 12. *Raj. av.* 25. *Frisch. av. t.* 99. *Alb. av.* 2. p. 10. t. 10.  
*Habitat in Europa. Hornugla.*  
*Cristæ auritæ albide fasciis sex fuscis.*
- Scops. 5. S. capite auriculato penna solitaria.  
 Scops. *Aldr. ornith.* l. 8. c. 4. *Raj. av.* 25.  
*Habitat in Europa.*

\*\* In-

Strix differt a Falcone ut Phalena a Papilione; altera enim diurna, alter nocturnus est. Noctu prædantur aviculis, muribus; die cecutiunt; pedes lanati ne frigescant; aures amplæ ut percipiant; die aviculis opprobrio expositæ.



\* \* *Inauriculata.*

- Aluco. 6. S. capite lævi, corpore ferrugineo, iridibus atris, remigibus primoribus ferratis. *Fn. suec. 48. It. æl. 69.\**  
 Aluco minor. *Will. ornith. 67. t. 13. Raj. av. 25. n. 1.*  
*Alb. av. 2. p. 11. t. 11.*  
*Habitat in Europa.*
- funerea. 7. S. capite lævi, corpore fusco, iridibus flavis. *Fn. suec. 51.*  
*Ulula flammeata. Frisch. av. t. 98?*  
*Habitat in Europa.*
- Nyctea. 8. S. capite lævi, corpore albido maculis lunatis distantibus fuscis. *Fn. suec. 54.*  
*Aluco albus diurnus. Edw. av. 61. t. 61.*  
*Habitat in Europa & America septentrionali. Karfång.*  
*Alba fereque immaculata in Alpibus Lapponicis.*
- stridula. 9. S. capite lævi, corpore ferrugineo, remige tertia longiore. *Fn. suec. 55.*  
*Strix. Aldr. ornith. 561. t. 563. Will. ornith. 65. Raj. av. 25.*  
*Habitat in Europa.*
- Ulula. 10. S. capite lævi, corpore supra fusco albo maculato, rectricibus fasciis albis. *Fn. suec. 52.*  
*Ulula. Gesn. av. 773. Aldr. ornith. l. 8. c. 6. Will. ornith. 68. t. 13. Raj. av. 26. n. 4.*  
*Habitat in Europa.*
- passerina. 11. S. capite lævi, remigibus albis: maculis quinque ordinum. *Fn. Suec. 53.*  
*Noctua minima. Gesn. av. 620. Aldr. ornith. l. 8. c. 7. Will. ornith. 69. t. 13. Raj. av. 26. n. 6. Alb. av. 2. p. 12. t. 12. Frisch. av. t. 100.*  
*Habitat in Europa. in cavis arborum.*

43. LANIUS. *Rostrum* rectiusculum, dente utrinque versus apicem, basi nudum.  
*Lingua* lacera.

- cristatus. 1. L. cauda cuneiformi, capite cristato, corpore rufescente, subtus fulvo fuscoque undulato.  
*Lanius fulvus cristatus. Edw. av. 54. t. 54.*  
*Habitat in Benghala.*



Excubi- 2. L. cauda cuneiformi lateribus alba, dorso cano, alis  
tor. nigris macula alba

Ampelis cærulescens, alis caudaque nigricantibus. *Fn.*  
*Jv.* 181.

*L. Pie-Griecher  
(Arije) Bussen*

Lanius cinereus major. *Aldr. orn.* l. 5. p. 386. *Will.*  
*orn.* 53. t. 10. *Raj. av.* 18. *Alb. av.* 2. p. 13. t. 13.

Pica cinerea. *Frisch. av.* t. 59.

*Habitat in Europa. Warvogel in Scania r. v.*

*Accipitres adventantes observat & aviculis indicat.*

Collurio 3. L. cauda subcuneiformi, dorso griseo, rectricibus qua-  
tuor intermediis unicoloribus, resto plumbeo.

*L. Pie-Griecher  
Könige*

Ampelis dorso griseo, macula ad oculos longitudinali.  
*Fn. spec.* 150. t. 2. f. 150.

Lanius tertius. *Will. ornith.* 54. *Raj. av.* 18. *Alb. av.* 2.  
p. 14. t. 14. 15.

Pica media Lanius medius. *Frisch. av.* t. 60.

*Habitat in Europa. in arboribus pratorum, upsalie*

*Scarabæos Prun. spinosa perforat; cerebra avicularum  
effodit earum Simia.*

Tyran- 4. L. vertice nigro: stria longitudinali fulva.

nus.

Muscicapa corona rubra. *Catesb. car.* 1. p. 55. t. 55.

Pica americana cristata. *Frisch. av.* 4. t. 62.

*Habitat in America septentrionali.*

*Color obscure cinereus, abdomine albo.*

Carnifex. 5. L. corpore rubro, fascia oculari remigum rectricumque  
apicibus nigris.

Garrulus ruber surinamensis. *Edv. av.* 39. t. 39.

*Habitat Surinami.*

Schach. 6. L. corpore lutescente, fronte alisque nigris.

Lanius A-schack. *Osbeck. iter.* 227.

*Habitat in China. P. Osbeck.*

*Magnitudo præcedentium. Caput & Collum supra gri-  
seum. Collum subtus testaceo-albidum. Dorsum &  
Abdomen pallide testacea. Remiges nigrae: primores  
basi albæ; secundarie apice albicantes.*

Senator. 7. L. cauda integra, corpore supra nigro subtus albo, oc-  
cipite purpureo.

Lanius rufo capite. *Alb. av.* 2. p. 15. t. 16.

*Habitat in Indiis.*



*Fascia frontis & baseos alarum alba. Macula alba in remigibus.*

cærule- 8. L. cauda forficata, corpore nigro cærulefcente, abdo-  
fcens. mine albo.

Lanius cauda forcipata. *Edv. av. 56. t. 56.*

*Habitat in Benghala.*

jocosus. 9. L. cauda integra, corpore griseo, palpebra inferiore  
purpurea, ano sanguineo. *Amœn. acad. 4. p. . .*

*Habitat in China. Osbeck.*

*Caput nigrum. Gula alba. Abdomen albicans.*

*Rostrum rectum: quam in reliquis, sed utriusque intra a-  
picem emarginatum.*

Garrulus. 10. L. remigibus secundariis apice membranaceo colorato,  
cauda integra.

*Ampelis remigibus quibusdam apice membranaceo ter-  
minatis. Fn. suec. 179.*

*Garrulus bohemicus. Gesn. av. 703. Aldr. orn. l. 12.  
c. 18. Will. orn. 90. t. 20. Raj. av. 85. Alb. av. 2.  
p. 25. t. 26. Frisch. av. 32. f. 1.*

β. Garrulus carolinensis. *Catesb. car. 1. p. 46. t. 46.*

*Habitat in Europa & America boreali; æstivat supra  
Sveciam. Sidenstrants.*

*Vibrissæ ad rostrum nullæ, quemadmodum in Turdis,  
a quibus etiam Rostrum brevius apice magis incurvo  
differt; Nares setis tectæ ut in Corvis; proxime au-  
tem dubia avis Laniis accedit; facies ex fascia ocu-  
lari non repugnat, sed baccivora, nec rapax. Remi-  
ges secundariæ squama colorata terminatæ. Nutritur  
Baccis Sorbi.*

*Pic-Grieches de Bufon & Le vaillant  
magnam cohortem Laniis constituent  
nec Genus augendum Garrulo, sed  
hæc avis Oriolis adsocianda.  
Cotingas Bufon, ex Orioli vel  
proximo Genere.*



## II. PICÆ. PSITTAC.

*Rostrum subcompressum, convexum.*

44. PSITTACUS. *Rostrum* aduncum: mandibula superiore mobili cera instructa. *Lingua* carnosa, obtusa, integra. *Pedum* digiti antici 2, posticique 2.

\* *Macrouri cauda cuneiformi.*

- Macao. 1. *P. macrourus* ruber, remigibus supra cæruleis, subtus rufis, genis nudis rugosis.

*Psittacus cauda cuneiformi*, temporibus nudis rugosis. *Syst. nat.* 18.

*Psittacus maximus alter.* *Aldr. ornith.* l. II. c. 3. *Will. ornith.* 73. *Raj. av.* 29. *Alb. av.* I. p. II. t. II. *Edv. av.* 158. t. 158.

*Psittacus erythrocyaneus.* *Gesn. av.* 721.

Araracanga. *Marcgr. bras.* 206.

*Habitat in America meridionali.*

*Corpus magnitudinis Gallinæ, coccineum. Rostrum maxilla superior alba; inferior nigra. Tempora nuda, alba, rugosa. Remiges imprimis anteriores cæruleæ: rectricibus pluribus luteis. Cauda cuneiformis, longissima. Rectrices rubræ, lateralibus cæruleis.*

- Ararauna. 2. *P. macrourus* supra cæruleus, genis nudis; lineis plumosis.

*Psittacus cauda cuneiformi*, temporibus nudis: lineis plumosis. *Syst. nat.* 18.

*Psittacus maximus cyano-croceus.* *Aldr. ornith.* l. II. c. 2. *Will. ornith.* 110. t. 15. *Raj. av.* 28. 181. *Sloan. jam.* 2. p. 296. *Edv. av.* 159. t. 159.

Ararauna. *Marcgr. bras.* 206. *Will. ornith.* III. *Alb. av.* 3. p. 10. t. 10. *fem. ♂* 2. p. 16. t. 17. *mas.*

*Habitat in America meridionali.*



Cæruica supra Collum, Dorsum, Alas, Caudam. Subtus Collo, Pectore, Abdomine, Cauda Lutea feminae, s. Rubra Maris. Nigra Rostrum & Gula. Palpebræ serrate papillis nigris. Tempora nuda, lineata punctis plumosis cæruleo-nigris.

- obscurus. 3. P. macrourus niger, genis nudis, vertice cinereo-nigrescente vario, cauda cinerea. *Hasselq. iter. 236.*  
*Habitat in Africa?*
- nobilis. 4. P. macrourus viridis, genis nudis, humeris coccineis. *Mus. Ad. Fr. 2. p.*  
Psittacus viridis, alarum costa superne rubente. *Aldr. orn. l. 11. c. 5. Raj. av. 30, 181. Sloan. jam. 2. p. 297.*  
Psittacus mediæ magnitudinis. *Will. orn. 112. t. 16.*  
*Habitat in America meridionali.*
- feverus. 5. P. macrourus viridis, genis nudis, remigibus rectricibusque cæruleis subtus purpurascens. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 13.*  
*Habitat in Indiis.*
- borneus. 6. P. macrourus ruber, remigibus rectricibusque apice viridibus, alis macula cærulea.  
Psittacus coccineus, cauda longiore. *Edw. av. 173. t. 173.*  
*Habitat in India: Borneo.*
- solstitialis. 7. P. macrourus luteus, alarum rectricibus viridibus, cauda forficata.  
Psittacus angolensis. *Alb. av. 3. p. 13. t. 13.*  
*Habitat in Guinea.*
- carolinensis. 8. P. macrourus viridis, capite collo genibusque luteis.  
Psittacus carolinensis. *Catesb. car. 1. p. 11. t. 11.*  
*Habitat in Carolina, Virginia.*
- alexandri. 9. P. macrourus viridis, collari pectoreque rubro, gula nigra. *Anœn. acad. 4. p.*  
Psittacus cubicularius, cauda cuneiformi, digito interiore postice truncato. *Hasselq. itin. 235.*  
Psittacus javanicus. *Osbeck. iter. 101.*  
Psittacus torquatus macrourus antiquorum. *Will. orn. 77. t. 16. f. 3.*



- Psittacus viridis ex ind. orientali. *Alb. av. 2. t. 18. & 3. t. 14.*  
 Psittacus torquatus macrourus antiquorum. *Aldr. av. 1. 11. c. 12. Raj. av. 33.*  
 Perrocello. *Olin. av. 24. t. 24.*  
*Habitat in China, Benghala, Æthiopia.*  
*Primus (totus viridis torque miniato) innotuit sub expeditione Alexandri magni. Plin.*
- pertinax. 10. P. macrourus viridis, genis fulvis, remigibus rectricibusque canescentibus. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 14.*  
 Psittacus minor viridis, cauda longa & malis croceis. *Frisch. av. 4. t. 54.*  
*Habitat in Indiis.*
- canicula-  
ris. 11. P. macrourus viridis, fronte rubra, occipite remigibusque extimis cæruleis.  
 Psittacus capite rubro cæruleoque. *Edw. av. 176. t. 176.*  
 Tui-apute-juba. *Marcgr. bras. 206. n. 2.*  
*Habitat in America.*  
*Magnitudo Turdi. Cauda corpore longior.*
- ærugino-  
fus. 12. P. macrourus viridis, vertice remigibusque primoribus cæruleis.  
 Psittacus minor, gutture fusco, occidentalis. *Edw. av. 177. t. 177.*  
*Habitat in America.*  
*Cauda corpore brevior.*
- rufiro-  
stris. 13. P. macrourus viridis, rostro pedibusque rubris, rectricibus apice cærulescentibus. *Mus. Ad. Fr. 2. p. . .*  
 Psittacus minor macrourus totus viridis. *Aldr. ornith. 1. 2. c. 13. Raj. av. 33. Sloan. jam. 2. p. 297.*  
 Psittacus minor viridis, cauda longiore. *Edw. av. 175. t. 175.*  
 Tujaputejuba. *Marcgr. bras. 206. n. 3. Will. ornith. 116. Raj. av. 34.*  
*Habitat in America.*
- ornatus. 14. P. macrourus luteo-viridis, occipite gula pectoreque rubris, vertice auribusque cæruleis.



Psittacus minor e coccineo viridis. *Edw. av.* 174.  
*t.* 174.  
*Habitat in America.*

agilis. 15. P. submacrourus viridis, rectricibus remigum primorum cæruleo-fulvis, cauda subtus rubra.  
 Psittacus minor viridis. *Edw. av.* 168. *t.* 168.  
*Habitat in America.*  
*Magnitudo Coccythraustis. Cauda cuneiformis, sed non elongata.*  
 \* \* *Brachyuri cauda equali.*

cristatus. 16. P. brachyurus albus, crista dependente flava.  
 Psittacus albus cristatus. *Aldr. ornith.* l. 11. c. 4. *Will. ornith.* . . *Raj. av.* 30. *Seb. mus.* 1. p. 94. *t.* 59. f. 1. *Alb. av.* 3. p. 12. *t.* 12. *Edw. av.* 160. *t.* 160. *Frisch. av.* 4. *t.* 50.  
*Habitat in China.*

niger. 17. P. brachyurus niger.  
 Psittacus niger. *Edw. av.* 5. *t.* 5.  
*Habitat in Madagascar.*  
*Cauda longa, sed equalis.*

sordidus. 18. P. brachyurus subfuscus, gula cærulea, alis caudaque viridibus, rostro anoque rubris.  
 Psittacus fuscus. *Edw. av.* 167. *t.* 167.  
*Habitat in Mexico.*

erythro-leucus. 19. P. brachyurus cinereus, uropygio, rectricibus remigibusque coccineis. †  
 Psittacus erythroleucus. *Aldr. orn.* l. 11. c. 11. *Will. orn.* 76. *Raj. av.* 31.  
*Habitat. . .*  
*Magnitudo Gallinae.*

erithacus. 20. P. brachyurus canus, temporibus albis, cauda coccinea.  
*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 146  
 Psittacus cinereus s. subcæruleus. *Aldr. ornith.* l. 11. c. 10. *Raj. av.* 31. *Alb. av.* 1. p. 12. *t.* 12. *Frisch. av.* 4. *t.* 51.  
*Habitat in Guinea.*



- garrulus. 21. *P. brachyurus ruber*, genibus alisque viridibus, rectricibus medietate postica cæruleis. *Mus. Ad. Fr. 2. p.*  
*Psittacus ruber*, remigibus rectricibusque interiorum purpureis. *It. Wgot. 137.*  
*Psittacus rufus*, femoribus & alis viridibus. *Frisch. av. 4. t. 45.*  
*Psittacus coccineus*, alis e viridi & nigro variis. *Edw. av. 172. t. 172.*  
*Habitat in Asia.*
- auroræ. 22. *P. brachyurus coccineus*, alis viridibus nigrisque, rectricibus flavis medietate postica virescentibus.  
*Psittacus coccineus orientalis*, alis ex viridi & nigro variis. *Raj. av. 31.*  
*Habitat in India orientali.*  
*Corpus coccineum, magnitudinæ Turdi. Alarum tectrices virides. Remiges nigre margine exteriori viridi; subtus purpurascens. Annulus viridis supra genua. Pedes nigri. Rostrum flavum. Raj.*
- Domicella. 23. *P. brachyurus ruber*, pileo fusco, alis viridibus, humeris genibusque cæruleis.  
*Psittacus coccineus orientalis*, vertice nigro. *Edw. av. 171. t. 171.*  
*Psittacus brasiliensis. Alb. av. 1. p. 13. t. 13?*  
*Habitat in Asia.*
- Lory. 24. *P. brachyurus purpureus*, pileo nigro, alis viridibus, pectore genibus caudaque cæruleis.  
*Psittacus coccineus orientalis*, vertice nigro. *Edw. av. 170. t. 170. Frisch. av. 4. t. 44?*  
*Habitat in India orientali.*
- cæruleo-  
cephalus. 25. *P. brachyurus*, capite pectore dorsoque cæruleis, ventre uropygio caudaque viridibus, vertice flavo.†  
*Psittacus versicolor s. erythrocyaneus. Aldr. orn. l. 11. c. 9. Will. orn. 75. Raj. av. 31.*  
*Habitat. . .*
- leucocephalus. 26. *P. brachyurus viridis*, remigibus cæruleis, fronte alba.  
*Psittacus leucocephalus. Aldr. ornith. l. 11. c. 8. Raj. av. 31.*  
*Psittacus viridis*, fronte alba, collo rubro. *Frisch. av. 4. t. 46.*



Psittacus viridis, capite albo. *Edw. av. 166. t. 166.*  
*Habitat in America.*

Corpus magnitudine Cuculi, viride pennis margine nigris. Caput supra & ad latera cæruleum; fronte oculorumque regione alba. Gula tota rubra. Remiges nigrae latere exteriori denudato cærulea. Rectrices æquales, virides, basi rubra, apice flavescens; at 1. 1. latere exteriori cæruleo; 6. 6. unicolores. Abdomen postice ferrugineum.

æstivus. 27. P. brachyurus viridis, fronte cærulea, humeris sanguineis.

Psittacus viridis melanorrhynchos. *Aldr. av. l. 11. c. 7.*

*Raj. av. 30.*

Pappagallo. *Olin. av. 23. t. 22.*

Psittacus viridis & luteus barbadosis. *Alb. av. 3. p. 11. t. 11. male.*

Psittacus viridis major occidentalis. *Edw. av. 162. t. 162.*

Psittacus viridis, capite luteo, fronte cærulea. *Frisch. av. 4. t. 4. ?*

*Habitat in America.*

Corpus magnitudine Columbæ, viride, dorso adsperso pennis luteis. Facies flava. Frons cærulea. Vertex albidus. Rectrices virides apice pallidiores: 1. 2. 3. basi interiore rubrae; at 1 et am latere exteriori cærulea. Humeri fulvi s. sanguinei. Remiges primores nigrae apice cærulescentes, latere exteriori virides; secundarie anteriores latere exteriori versus basin rubrae. Rostrum nigrum.

paradisi. 28. P. brachyurus luteus, angulo abdominis reatricibusque basi rubris.

Psittacus paradisi ex cuba. *Catesb. car. 1. p. 10. t. 10.*

*Habitat in America.*

festivus. 39. P. brachyurus viridis, fronte purpurascens, superciliis gulaque cæruleis, dorso sanguineo.

*Habitat in Indiis.*

Corpus magnitudine Columbæ.

Psittaci mangani, per parva incedunt, garrulae, loquaces, dociles, longæva, victitant in primis nucibus, granis, sem. cucurbitarum, Carthami; scandunt rostro, irati pennas erigunt, meditantur.



- brafilien- 30. *P. brachyurus viridis*, facie rubra, temporibus cæruleis.  
 sis. *Psittacus viridis brasiliensis. Edw. av. 161. t. 161.*  
*Habitat in Brasilia.*  
*Avis viridis flavo contaminata. Rubrum infra flexu-*  
*ram alæ & in exteriori latere rectricum 2. 2; cæ-*  
*ruleum in latere exteriori remigum rectricumque pri-*  
*morum.*
- autum- 31. *P. brachyurus viridis*, fronte remigumque macula coc-  
 nalis. cinea, vertice remigibusque primoribus cæruleis.  
*Psittacus viridis minor occidentalis. Ldw. av. 164.*  
*t. 164.*  
*Habitat in America.*  
*Magnitud. Columbæ. Corpus viride. Oculorum regio*  
*cærulea. Alarum rectrices primores cæruleæ, basi ru-*  
*bræ. Remiges primores cæruleæ, posteriores virides.*  
*Rectrices supra virides, apice flavescentes: extimo*  
*latere exteriori cæruleo; subtus flavæ, basi rufescent-*  
*es, medio macula viridi.*
- accipitri- 32. *P. brachyurus viridis*, capite griseo, collo pectoreque  
 nus. subviolaceo vario, remigibus rectricibusque apice cæ-  
 ruleis.  
*Psittacus orientalis capite accipitris. Edw. av. 165. t.*  
*165.*  
*Psittacus elegans. Clus. exot. 365. Raj. av. 32. 1700.*  
*ornith. . . .*  
*Habitat in India.*
- melano- 33. *P. brachyurus viridis subtus luteus*, pileo nigro, pecto-  
 cephalus. re albo. *Mus. Ad. Fr. 2. p.*  
*Psittacus coccineus, ventre albo. Edw. av. 169. t. 169.*  
*Habitat in Mexico.*
- collarius. 34. *P. brachyurus viridis*, collo rubente.  
*Psittacus minor, collo miniaceo. Sloan. jam. 2. p. 297.*  
*Raj. av. 181.*  
*Habitat in America.*
- pullarius. 35. *P. brachyurus viridis*, fronte rubra, cauda fulva fascia  
 nigra. *Mus. Ad. Fr. 2. p.*  
*Psittacus parvus viridis, ex india orientali. Alb. av. 3.*  
*p. 15. t. 15.*  
*Psittacus minimus viridis, cum fronte & gula rubra.*  
*Frisch. av. 4. t. 54.*



Psittacus pusillus viridis æthiopicus. *Raj. av.* 31.

Psittacus minimus. *Clus. exot.* 365.

Psittacus minor versicolor. *Seb. mus.* 2. p. 40. t. 40. f. 1.

*Habitat in Asia, Æthiopia.*

Galgu-  
lus.

36. P. brachyurus viridis, uropygio pectoreque coccineis, vertice cæruleo. *Amœn. acad.* 4. p. . *Osborn. iter* 101.

Psittacus minimus viridis ruber indicus. *Edw. av.* 6. t. 6.

Avicula cechini. *Aldr. orn.* 1. 20. p. 560.

*Habitat in India.*

*Pede altero suspensus dormit. Plin. X, 33: Galgulos ipsos dependentes pedibus somnum capere confirmat, quia tutiores ita se sperent.*

passeri-  
nus.

37. P. brachyurus luteo virens, macula alarum alisque subtus cæruleis. *Mus. Ad. Fr.* 1. p. 14.

*Habitat in America.*

*Magnitudo Passeris.*

*Remiges subtus & tectrices alarum primariæ cæuleæ.*

45. RAMPHASTOS. *Rostrum* maximum, inane, convexum, extrorsum serratum.

*Nares* pone maxillas.

*Lingua* pennacea.

*Pedum* digiti antici postici-  
que gemini.

piperivo-  
rus.

1. R. rostro nigro: carina crassissima.

*Habitat in America meridionali.*

Tuca-  
nus.

2. R. rostro rubro: carina obtusa alba.

*Habitat in America meridionali.*

*Maxillæ versus basin fascia nigra.*

picatus.

3. R. rostro rubro: apice nigro: carina compressa.

*Pica brasiliensis. Alb. av.* 2. p. 24. t. 25. *Aldr. orn.* 1. 20. c. 19.

*Habitat in America meridionali.*

*Rostrum magnum inter congeneres; etiam basi nigricans.*



Aracari. 4. R. rostro nigro : maxilla superiore lateribus alba , basi triloba.

Toucan. *Edw. av.* 64 t. 64.

Aracari. *Marcgr. bras.* 217. *Raj, av.* 44.

*Habitat in America meridionali.*

Maxilla superior ad nares triloba, quod non in reliquis, fascia abdominis anoque sanguineis.

46. BUCEROS, *Rostrum convexum, cultratum, magnum; Frontis calvaria nuda, osseo-gibbosa.*

*Nares in basi rostri.*

*Lingua acuta, brevis.*

bicornis. 1. B. fronte ossea plana antrosum bicorni. *Amœn. acad.* 4. p. . .

Calao *Pet. gaz.* 43. t. 28. f. 6. & t. 31. f. 1. *Will. Ornith.* t. 17. f. 1.

*Habitat in China.*

Corpus magnitudine Gallinæ, nigrum; subtus pectore, abdomine, femoribus album. Macula alba in remigibus alarum. Cauda longiuscula. Rectrices 10, nigrae, extremis utrinque albis. Pedes virescentes: digitis 3 anticis; 1 postico.

Rhino- 2. B. cornu maxillari frontis recurvato.†

ceros.

Rhinoceros. *Bont. jav.* 63. t. 64. *Olear. mus.* t. 15. f. 4. *Will. orn.* t. 17. f. 3. *Worm. mus.* 293. *Aldr. orn.* l. 12. c. 20.

*Habitat in India.*

Cum Willugbaeus alique rostrum extrorsum serratum sistant, videtur Ramphasti potius generis avis esse. Fœda foetidaque cadaveribus victitans venatores comitatur.



47. CROTOPHAGA. *Rostrum* compressum, femio-  
vatum, arcuatum, sulco u-  
trinque exaratum; Man-  
dibula superiore margine  
utrinque angulata.  
*Nares* perviæ.

Ani. 1. CROTOPHAGA.

*Crotophaga ater*, rostro brevior compresso arcuato-cul-  
trato. *Brown. jam. 474.*

Mandibula tota nigra major garrula, mandibula superio-  
re arcuata. *Siom. jam. 2. p. 298. t. 256. f. 1. Catesb.  
car. 3. p. 3. t. 3.*

Ani. *Micogr. bras. 193. Will. orn. 120. Raj. av. 35.  
n. 10. & 185. n. 29.*

*Habitat in America, Africa; victitans gryllis.*

48. CORVUS. *Rostrum* convexum, cultratum, basi  
pennis setaceis tectum.  
*Lingua* cartilaginea bifida.

Corax. 1. *C. ater*, dorso cærulescente, cauda subrotundata. *Fn.  
succ. 69.*

*Corvus. Gesn. av. 334. Aldr. orn. l. 12. c. . Joust. av.  
38. t. 16. Will. ornith. 82. t. 18. Raj. av. 39. Alb.  
av. 2. p. 19. t. 20. Frisch, av. t. 63. SV Korp*

*Habitat in Europa, victit cadaveribus, furto deditus,  
loqui addiscit, feris convivialis, clamitans.*

Corone. 2. *C. atro-cærulescens*, cauda rotundata: rectricibus a-  
cutis.

*Cornix. Raj. av. 39. n. 2. Alb. av. 2. p. 20. t. 21.*

*Habitat in Europa.*

frugile- 3. *C. ater*, fronte cinerascens. *Fn. succ. 70.*

gus.

*Cornix frugilega. Aldr. orn. l. 12. c. 3. Will. ornith.  
84. t. 18. Raj. av. 39. Alb. av. 2. p. 21. t. 22. Frisch,  
av. t. 64. Råka Habitat in Celandia, Scania.*

*Habitat in Europa, agris infesta, gregaria.*

Cornix. 4. *C. cinerascens*, capite gula alis caudaque nigris. *Fn.  
succ. 71.*



- Cornix cinerea frugilega.* Aldr. ornith. l. 12. c. 4. Will. ornith. 84. t. 77. Raj. av. 39. Alb. av. 2. p. 22. t. 23. Frisch. av. t. 65. *Кіака*  
*Habitat in Europa, videtur Larvis Tipularum, quisquiliis; apud nos relegata, at inaudita & indefensa. Ventis adversa confidet.*
- Monedula. 5. *C. fusca, occipite incano, fronte alis caudaque nigris.* Fn. suec. 72.  
 Monedula f. *Lupus.* Aldr. orn. l. 12. c. 9. Will. ornith. 85. t. 19. Raj. av. 40. Alb. av. 1. p. 14. t. 14. Frisch. av. t. 67.  
*Habitat in Europæ agris; gregaria. Кaja.*
- benghalensis. 6. *C. vertice alis caudaque cæruleis, collo griseo.*  
*Pica glandaria benghalensis.* Alb. av. 1. p. 17. t. 17.  
*Habitat in Benghala.*
- glandarius. 7. *C. tetricibus alarum cæruleis: lineis transversis albis nigrisque, corpore ferrugineo variegato.* Fn. suec. 74.  
*Pica glandaria.* Gesn. av. 700. Aldr. ornith. l. 12. c. 14. Will. orn. 88. t. 19. Raj. av. 41. Alb. av. 1. p. 16. t. 16. Frisch. av. t. 55. Olin. av. 35.  
*Habitat in Europa; colligit nuces, glandes; superfluas dejectit. Нѣшкіа.*
- cristatus. 8. *C. tetricibus alarum lineis transversis nigris, corpore cæruleo, collari nigro.*  
*Pica glandaria cærulea cristata.* Catesb. car. p. 15. t. 15.  
*Habitat in America septentrionali. Præcedenti in multis assimilans.*
- Caryocatactes. 9. *C. fuscus alboque punctatus, alis caudaque nigris: tetricibus apice albis: intermediis apice detritis.*  
*Corvus cinereus, cauda alisque nigris.* Fn. suec. 75.  
*Caryocatactes.* Gesn. av. 245. Will. ornith. 90. t. 20. Raj. av. 42.  
*Pica abietum nigra guttata.* Frisch. av. t. 56.  
*Habitat in Europa; edit nuces. Нѣшкіа.*
- Pica. 10. *C. albo nigroque varius, cauda cuneiformi.* Fn. suec. 76.  
*Pica varia f. caudata.* Gesn. av. 695. Aldr. orn. l. 12. c. 12. Jonst. av. 44. t. 17. Will. ornith. 87. t. 19. Raj. av. 41. Alb. av. t. 1. p. 15. t. 15. Frisch. av. t. 58.



*Habitat in Europa nido artificioso. Srata*

*Degit ad pagos, inter hostes offensos sylvarum osor; legit quisquiliis.*

paradisi. 11. C. albo nigroque varius, cauda cuneiformi, remigibus intermediis longissimis, capite nigro cristato:

Manucodiota cristata ex albo nigroque variata. *Raj. av. 195. t. 2. f. 13.*

Avis paradisi. *Seb. mus. 1 p. 85. t. 52. f. 3. & t. 30. f. 5.*

Pica orientalis, cauda duabus pennis longissimis. *Edw. av. 113. t. 113.*

*Habitat in India.*

infaustus. 12. C. dorso cinereo, rectricibus rufis: intermediis duabus cinereis, fascia nigricante.

Turdus rectricibus rufis: duabus intermediis cinereis fascia nigricante; proximis apice cinereis. *Fn. svec. 187.*

Merula saxatilis. *Will. orn. 145. t. 36. Raj. av. 65. Alb. av. 3. p. 51. t. 55.*

*Habitat in Europæ alpinis sylvis. Merle de Roche*

*Avis proterva, saepe carnivora.*

*Buccon*

49. CORACIAS. *Rostrum* cultratum apice incurvato, basi pennis denudatum.

*Lingua* cartilaginea, bifida.

Garrulus. 1. C. cærulea, dorso rubro, remigibus nigris.

Corvus dorso sanguineo, remigibus nigris, rectricibus viridibus. *Fn. svec. 73.*

Cornix cærulea. *Gesn. av. 335. Alar. ornith. l. 12. c. 18. & 5. Will. orn. 85. t. 20.*

Garrulus argentoratensis. *Raj. av. 41. Edw. av. 109. t. 109.*

*Habitat in Europa, victitans Scarabæis, Ranis. Plákrana.*

caffra. 2. C. cærulea, remigibus margine exteriori luteis.

*Habitat in Æthiopia. J. Burmannus.*

*Femina cærulescente-nigra est.*

Oriolus. 3. C. flava alis caudaque nigris.

Ampelis flava, artibus nigris, rectricibus quinque exterioribus retrorsum flavis. *Act. Stockh. 1750. p. 127.*

*t. 3. f. 5.*

Oriolus. *Gesn. av. . . .*



Galbula. *Aldr. orn.* 854. t. 857. 858.

Galbula benghalensis. *Edw. av.* 185. t. 185.

Picus nidum suspendens. *Will. orn.*... t. 36. f. 6. & t. 38.

f. 7. *Forst. av.* 112. t. 41 f. 5. *Raj. av.* 68.

Flava avis benghalensis. *Alb. av.* 3. p. 19. t. 20.

*Habitat in Europa, Asia, migratoria avis.*

Galbula. 4. C. fulva, capite dorso remigibusque nigris.

Icterus ex aureo nigroque varius. *Catesb. car.* 1. p. 48.  
t. 48.

*Habitat in America.*

aurea. 5. C. flavo-fulva, gula rectricibus primariis extremitateque  
rectricum nigris.

Paradisea flavo-fulva. *Mrs. Ad. Fr.* 1. p. 15.

Paradisea aurea. *Edw. Av.* 112. t. 112.

*Habitat in Asia.*

Xanthor- 6. C. flava, capite remigibusque primariis nigris.

mus. Icterus indicus, capite nigro. *Edw. av.* 77. t. 77.

Xanthornis maior, nigro varius. *Bronn. jam.* 477.

Pica luteo nigra varia. *Catesb. car.* 3. p. 5. t. 5.

*Habitat in America.*

50. GRACULA. *Rostrum* convexo-cultratum, basi  
nudiusculum.

*Lingua* integra, acutiuscula, carnosa.

*Pedes* digitis anticis 3, postico 1.

religio- 1. G. nigro violacea, macula alarum alba, fascia occipi-  
sa. tis nuda flava.

*Corvus javanensis.* *Osborn. iter.* 102.

*Sturnus indicus.* *Bont. jav.* 67. *Will. orn.* 145. t. 38. *Raj.*  
*av.* 63

Mior s. Mino. *Edw. av.* 17. t. 17. *Alb. av.* 2. p. 35.  
t. 38.

*Habitat in Asia.*

familia. 2. G. nigra, remigibus extus cærulescentibus, fascia collari  
nuda.

*Habitat in America. Rolander.*



Magnitudo *Picæ*. Corpus *nigrum*, at *Alæ* *compositis* *remigibus* *extus* *cærulescentes* *absque* *alba* *macula*. *Rectrices* *æquales*. *Caput* *nigrum*, *plumis* *ereclis* *brevissimis* *quasi* *holosericeum*. *Rostrum* *fere* *Cuculi*. *Nares* *oræ* *nudæ*. *Lingua* *integra* *carnosa* *acuta*. *Pedes* *tetradactyli* : *uno* *post* *co*.

- Barita. 3. *G. subgrisea*, *humeris* *cæruleis*, *remigibus* *extus* *viridibus*.  
*Habitat in Americæ Musis, cujus fructus detestat. Rolander.*  
*Rostrum breviusculum, cuneatum, nigricans, basi nudam, subtus alvicans. Alæ complicatis remigibus virides; externæ remiges intus nigre. Cauda rotundata, viridis dum complicata.*
- crissatella. 4. *G. nigra*, *remigibus* *primoribus* *basi* *rectricibusque* *apice* *albis*, *rostro* *flavo*.  
*Sturnus chinensis niger. Edw. av. 19. t. 19.*  
*Habitat in China.*
- Saularis. 5. *G. nigro-cærulescens*, *abdomine* *macula* *alarum* *rectricibusque* *lateralibus* *albis*.  
*Pica minor benghalensis. Edw. av. 181. t. 181.*  
*Dialbird. Alb. av. 3. p. 17. t. 17. 18.*  
*Saularis maderaspatanus. Raj. av. 197. t. 2. f. 19. 20.*  
*Habitat in Asia.*
- Quisculla. 6. *G. nigro-violacea*, *cauda* *subcuneiformi*.  
*Monedula purpurea. Catesb. car. 1. p. 12. t. 12.*  
*Mergus niger, viridi-argentea. Brown. jam. 476.*  
*Habitat in America septentrionali.*  
*Virginianis invisa avis; aqua & igne interdicta, sed injuste.*
- Atthis. 7. *G. viridi-cærulea*, *abdomine* *ferrugineo*, *pedibus* *sanguineis*.  
*Corvus (ægyptius) viridi maculatus, dorso medio cæruleo.*  
*Hasselq. iter. 140. n. 20.*  
*Habitat in Ægypto.*



51. PARADISÆA. *Rostrum* basi plumis tomentosis  
tectum.

*Pennæ* hypochondriorum lon-  
giores.

apoda. 1. *P. pennis* hypochondriis corpore longioribus, rectrici-  
bus intermediis longis setaceis.\*

*Paradisæa* lutea, cauda pectore abdomineque brunneis, gu-  
la azurea. *It. Wgoth.* 139. *Mus. Ad. Fr.* 1. p. 15.

*Paradisæa* avis. *Clus. exot.* 360. t. 360. *Olear. mus.* 24.  
t. 13. f. 1. *Seb. mus.* 1. p. 24. t. 13. f. 1. *Hern.*  
*mex.* 317. t. 318. *Worm. mus.* 294. f. 294. *Bradl.*  
*nat.* t. 12. f. 1. 2.

*Manucodiata* major. *Edw. av.* 110. t. 110. *Marcgr.*  
*bras.* 201. *Raj. av.* 21. n. 7.

*Habitat* in India; gregaria. *Paradisæa* *Jogel.*

*Cirrho* 2 caudæ apice attenuati, nudi, recti.

*Apodam* perperam dixere veteres; videtur *Papilionis*  
*bus* maximis.

regia. 2. *P. cirrhis* caudalibus filiformibus apice lunato-penna-  
ceis. *Mus. Ad. Fr.* 1. p. 15.

*Rex* avium paradisæarum. *Pet. gaz.* 1. t. 53. f. 2.

*Clus. exot.* 362. t. 362. *Olear. mus.* 24. t. 13. f. 2.

*Raj. av.* 22. n. 10. *Seb. mus.* 1. t. 38. f. 5. *Edw.*  
*av.* 111. t. 111.

*Habitat* in India orientali.

*Purpurea* pectorali cerulescente; *cirrho* caudæ longissi-  
mi; *Pennæ* sub alis sunt reliquis longiores, licet  
cauda breviores. (\*)

52. CUCULUS. *Rostrum* teretiufculum.

*Nares* margine prominulæ.

*Lingua* sagittata, plana, integra.

canorus. 1. *C. cauda* aequali nigricante albo punctata. *Fn. svec.* 77.

*Cuculus.* *Gesn. av.* 363. *Aldr. ornith.* l. 5. c. 107.

*Bell. av.* 22: 6. *Will. ornith.* 62. t. 77. *Frisch. av.*

4. t. 40, 41, 42. *Raj. av.* 23. *Alb. av.* 1. p. 8. t. 8.

*Olin. av.* 38.

*Habi-*

(\*) *Paradisæas* fictas (*Seb. mus.* 1. t. 60. f. 1, 2, 3), e *Pittacis* aliisque vendi-  
dit sæpe *Museis* astus chinensium.



*Habitat in Europa; victitat Larvis. Göt.*

*Ova sua aliarum avicularum nidis imponit, cubandi impotens; variat etate, sexu; tempore frondescentiæ, florescentiæ, grossificationis cuculat; occultatur caniculæ ortu; in falconem transformari perperam asseritur.*

Perfa. 2. C. cauda æquali, capite crista erecta, remigibus primoribus rubris.

Touraco. *Alb. av. 2. p. 19. t. 19. Edw. av. 7. t. 7.*

*Habitat in Africa.*

*Antice viridis, postice subviolaceus, remigibus primoribus rubris; linea alba supra & infra palpebras sanguineas.*

Vetula. 3. C. cauda cuneiformi, corpore subfusco: subtus testaceo, ciliis rubris.

Cuculus major. *Sloan. jam. 2. p. 312. t. 258. f. 1, 2.*

Cuculus major olivaceus, cauda longiore, ciliis rubris.

*Brown. jam. 476.*

Picus major leucophæus s. canescens, pluviae avis & Senex dictus. *Raj. av. 182.*

*Habitat in Jamaica.*

*Voce clamosiore pluviam præfagit.*

glandarius. 4. C. cauda cuneiformi, capite subcristato, fascia oculari nigra.

Cuculus fulvus maculatus. *Edw. av. 57. t. 57.*

*Habitat in Africa septentrionali & Europa australi.*

*Dorsum fuscum. Alæ albo punctatæ. Subtus testaceus est. Caput cinereum, subcristatum. Linea nigra trans oculos.*

scolopaceus. 5. C. cauda cuneiformi, corpore undique griseo fuscoque nebuloso.

Cuculus indicus fuscus maculatus. *Edw. av. 59. t. 59.*

*Habitat in Benghala.*

niger. 6. C. cauda cuneiformi, corpore nigro nitido, rostro flavo.

Cuculus indicus niger. *Edw. av. 58. t. 58.*

*Habitat in Benghala.*

americanus. 7. C. cauda cuneiformi, corpore supra cinereo: subtus albo, maxilla inferiore lutea



Cuculus carolinianus. *Catesb. car. 9. t. 9.*  
*Habitat in Carolina.*

auratus. 8. C. cauda subforcipata, gula pectoreque nigra, nucha rubra.

Picus major, alis aureis. *Catesb. car. 1. p. 18. t. 18.*  
*Habitat in Carolina.*

*Caeca refert Picum. Avis varia pulchra; rachis remigum primorum aurea.*

53. JYNNX. *Rostrum* teretiufculum, acuminatum.

*Nares* concavæ.

*Lingua* teres, lumbriciformis, longissima, apice mucronata.

Torquil-1. JYNNX.

la. Cuculus subgriseus maculatus, rectricibus nigris fasciis undulatis. *Fn. suec. 78. t. 1. f. 78.*

*Jynn. 1. Torquila. Bel. av. 76. a. Gesn. av. 577. Aldr. ornith. 1. 12. c. 42. Jonst. av. . . t. 42. Will. orn. 95. t. 22. Raj. av. 44. Rudb. lapp. 66. t. 66. Alb. av. 1. p. 11. t. 21. Frisch. av. . . t. 38.*

*Habitat in Europa. Гіоксісса*

54. PICUS. *Rostrum* polyedrum, rectum: apice cuneato.

*Nares* pennis fetaccis obtectæ.

*Lingua* teres, lumbriciformis, longissima, mucronata, apice retrorsum aculeata fetis.

martius. 1. P. niger, pileo coccineo. *Faun. suec. 79.*

Picus niger maximus. *Gesn. av. 708. Aldr. orn. 1. 12. c. 31. Will. ornith. 22. t. 21. Raj. av. 42. Alb. av. 2. p. 26. t. 27. Frisch. av. t. 34. f. 1.*

*Habitat in Europa, vix in Anglia. Спілкіна. Arbores emortuas conscindit.*



- principa- 2. P. niger, crista coccinea, linea utrinque collari remigi-  
lis. busque secundariis albis.  
Picus maximus, rostro albo, *Catesb. car. 1. p. 16. t. 16.*  
*Habitat in America septentrionali.*
- pileatus. 3. P. niger, capite cristato rubro, temporibus alisque al-  
bis maculis.  
Picus niger maximus, capite rubro. *Catesb. car. 2. p.*  
*17. t. 17. Kalin. itin. 2. p. 271.*  
*Ipecu. Marcgr. bras. 207.*  
*Habitat in America,*  
*Differt a P. cornicino, quod tempora alba; maculae ali-*  
*quot parvæ in alis albæ; caput magis late coccineum.*
- hirundi- 4. P. niger, occipite coccineo, humeris albido punctatis.  
naceus. Picus secundus niger. *Alb. av. 3. p. 22. t. 23.*  
*Habitat in America septentrionali.*  
*Magnitudine vix Hirundinem superat.*
- erythro- 5. P. capite toto rubro, alis caudaque nigris, abdomi-  
cephalus. ne albo.  
Picus capite toto rubro. *Catesb. car. 1. p. 20. t. 20.*  
*Habitat in America.*
- caroli- 6. P. pileo menaque rubris, dorso fasciis nigris, rectrici-  
nus. bus mediis albis nigro punctatis.  
Picus ventre rubro. *Catesb. car. 1. p. 19. t. 19. f. 2.*  
*Habitat in America septentrionali.*  
*Ani regio rubra punctata.*
- viridis. 7. P. viridis, vertex coccineo. *Fn. suec. 80.*  
Picus viridis. *Gesn. av. 710. Aldr. ornith. 1. 12. c. 34.*  
*Will. ornith. 93. t. 21. Raj. av. 42. Alb. av. 1. p.*  
*18. t. 18. Frisch. av. . . t. 35. f. 1.*  
*Habitat in Europa. Wedk. narr*
- bengha- 8. viridis, occipite rubro, nuca nigra, subtus anticeque  
lentis, albus nigro maculatus.  
Picus benghalensis. *Alb. av. 3. p. 21. t. 22. Edw. av.*  
*182. l. 182.*  
*Habitat in Benghala.*

H

Habi-

Pici Larvas inestruunt lignum utrus videntium rostro secante, sono terrefacientis, an-  
ditu percipientis, lingua acuta bifida intrante extrahunt, de qua Act. angl.  
350. p. 309.



Habitus *P. viridis* sed dilutior; facie antice, collo sub-  
tus, pectore albis maculis nigris. Cauda nigra. Oc-  
ciput crista rubra.

- semiro- 9. *P. maxilla superiore brevior.* *Mus. Ad. Fr. 1. p. 16.*  
stris. *Habitat in India.*
- major. 10. *P. albo nigroque varius, ano occipiteque rubro.*  
*Picus albo nigroque varius, rectricibus tribus laterali-*  
*bus utrinque albescentibus.* *Fn. suec. 81.*  
*Picus varius major.* *Gesn. av. 708. Aldr. ornith. l. 12.*  
*c. 32. Will. c. n. 94. t. 21. Raj. av. 43. Alb. av. 1.*  
*p. 19. t. 19. Frisch. av. . . t. 36. f. 1.*  
*Habitat in Europa. Gyllenrenna*
- medius. 11. *P. albo nigroque varius, ano verticeque rubris.*  
*Picus albo nigroque varius, rectricibus tribus lateralibus*  
*apice albo variegatis.* *Fn. suec. 82.*  
*Picus varius minor.* *Gesn. av. 708. Aldr. orn. l. 12.*  
*c. 33. Will. ornith. 92. t. 21. Raj. av. 43. Has-*  
*selqv. iter. 242.*  
*Habitat in Europa.*
- minor. 12. *P. albo nigroque varius vertice rubro, ano albido.*  
*Picus albo nigroque varius, rectricibus tribus laterali-*  
*bus feminigris.* *Fn. suec. 83. Hasselqv. iter. 242.*  
*Picus varius tertius.* *Raj. av. 43.*  
*Picus varius minor.* *Alb. av. 1. p. 20. t. 20.*  
*Habitat in Europa. cum præcedenti in Scania*
- tridacty- 13. *P. albo nigroque varius, pedibus tridactylis.* *Fn. suec.*  
lus. *84. Act. Stockh. 1740. p. 222.*  
*Picus tridactylus.* *Edw. av. 114. t. 114.*  
*Picus tridactylos anomalus.* *Mus. petrop. 368.*  
*Habitat in Svecia ad Alpes Lapponicas, Dalekarlicas*  
*frequens & ad sinum Hudsonis nec non in Sibiria.*  
*Europæus vertice flavo, Americanus rubro est. Ani*  
*regio albida.*



55. SITTA. *Rostrum* subcultrato - conicum, rectum, porrectum: integerrimum, mandibula superiore obtusifutcula.  
*Lingua* lacero - emarginata.

europæa. 1. S. reatricibus nigris: lateralibus quatuor infra apicem albis. *Fn. suec.* 182.

Sitta f. Picus cinereus. *Gesn. av.* 711. *Aldr. orn.* l. 12. c. 38. *Will. ornith.* 98. t. 33. *Raj. av.* 47. *Alb. av.* 2. p. 27. t. 28. *Frisch. av.* . . . t. 39. f. 2.

β. Sitta capite nigro & Sitta capite fulco. *Catesb. carol.* 1. p. 22. t. 22. *Sr. Nólwáika, Nólwáika*

*Habitat in Europæ, Americæ truncis arborum larvas sub cortice effodiens; Noces rostro perforat & edit. Nidum struens reperto congruo foramine arboris, illud limo oblinat pro capacitare ingressus.*

56. ALCEDO. *Rostrum* trigonum, crassum, rectum, longum.  
*Lingua* carnosissima, brevissima, plana, acuta.

Ispida. 1. A. brachyura, supra cærulea, subtus fulva.

Ispida supra cærulea, subtus ferruginea. *Mus. Ad F.* 1. p. 16.

Ispida. *Raj. av.* 48. n. 1. *Olin. av.* 39. *Aldr. orn.* l. 20. c. 61.

Ispida indica minor. *Edw. av.* 11. t. 11. *Alb. av.* 1. p. 51. t. 54

Alcedo americana f. Apiastra. *Seb. mus.* 1. p. 87. t. 53. f. 3.

*Habitat ad maris littora in Europa, Asia.*

erithaca. 2. A. brachyura, dorso cæruleo, abdomine luteo, capite uropygioque purpureo, gula nuchaque albis.

Alcedo benghalensis. *Alb. av.* 3. p. 28. t. 29.

*Habitat in Benghala,*

Alcyon. 3. A. brachyura nigra, abdomine albo, pectore ferrugineo.

Alcyon. *Catesb. car.* 1. p. 69. t. 69. *Raj. av.* 49. n. 2. & 184. n. 14.



*Ispida caroliniensis.* *Edw. av. 115. t. 115.*

*Jaguacati guacu.* *Marcgr. bras. 194.*

*Habitat in America.*

*Rostrum capite longius, validum s. Picæ. Macula alba ante & post oculos. Lingua brevissima, carnosæ, acuta, plana. Corpus nigrum. Pennæ capitis longiores. Remiges nigre, apice albæ: exterioribus minoribus; omnes latere inferiore albo maculatæ. Rectrices 12, æquales, utrinque albo maculatæ. Gula alba. Pectus & Abdomen alba, sed Pectus antice fascia ferruginea. Femora ferruginea. Tibiæ brevissimæ. Digitus extimus connexus cum intermedio.*

- Todus.* 4. *A. brachyura viridis, gula sanguinea, abdomine albo. Rubecula viridis elegantissima. Edw. av. 121. t. 121. f. 1. Sloan. jam. 2. p. 306. t. 263. f. 1. Raj. av 187. Todus viridis, pectore rubro, rostro recto. Brown. jam. 476.*

*Habitat in America.*

*Genus dubium & quasi medium inter Alcedinem & Trochilum.*

- Smyrnen-* 5. *A. macroura ferruginea, alis cauda dorsoque viridibus, fis.*

*Alcedo smyrnensis. Alb. av. 3. p. 26. t. 27.*

*Ispida major africana. Edw. av. 8. t. 8.*

*Habitat in Africa & Asia.*

*Confer. Alcedo major benghalensis. Alb. av. 3. p. 271. 28.*

- rudis.* 6. *A. macroura fusca albido varia.*

*Alcedo rudis. Hasselq. iter 243. n. 22.*

*Ispida ex albo & nigro varius. Edw. av. 9. t. 9.*

*Habitat in Persia, Ægypto.*

*Cauda æqualis albida fascia lineari lataque nigra.*

- Dea.* 7. *A. rectricibus duabus longissimis, corpore nigro-cærulescente, alis virescentibus.*

*Alcedo binis plumis in cauda longissimis. Edw. av. 10. t. 10.*

*Avis paradisiaca ternatana. Seb. mus. 1. p. 74. t. 46. f. 3?*

*Habitat Surinami.*



57. MEROPS. *Rostrum* curvatum, compressum, carinatum.

*Lingua* apice laciniata.

*Digiti* infimo articulo coadunati: postico distincto.

Apiaster. 1. M. dorso ferrugineo, abdomine caudaque viridi-cærulefcente, rectricibus duabus longioribus.

Merops. *Bell. av.* 16. *Gesn. av.* 599. *Aldr. ornith.* 1. 12. c. 45. *Will. ornith.* 102. t. 24. *Raj. av.* 49. *Alb. av.* 2. p. 40. t. 44. *Charl. onom.* 87. t. 87.

Merops galilæus. *Hasselq. iter.* 247.

Ispida. *Fn. Svec.* 86.

*Habitat in Europa australi, Oriente. ad littora maris rarij*  
*Gregaria victitat Cicadis, Apibus.*

viridis. 2. M. dorso ferrugineo, abdomine alisque viridibus, gula caudaque cæruleis.

Ispida viridis, supra ferruginea. *Osborn. iter.* 96.

Merops viridis, supra ferruginea. *Chin. lagerstr.* 5.

Merops benghalensis. *Alb. av.* 3. p. 29. t. 50.

Merops minor, caudæ 2. pennis longioribus & tenuioribus. *Edw. av.* 183. t. 183.

*Habitat in Java, Benghala.*

cinereus. 3. M. rubro flavoque variegatus, subtus flavo-rubescens, rectricibus duabus longissimis rubris.

Avicula de gvauchilui. *Seb. mus.* 1. p. 50. t. 30. f. 10.

*Habitat in America.*

cafer. 4. M. griseus, ani regione flava, cauda longissima.

*Habitat in Æthiopia.*

*Inter pulchre delineatos icones animalium ultra 150, quas misit amicissimus J. Burmannus, visa est.*

58. UPUPA. *Rostrum* arcuatum, convexum, subcompressum.

*Lingua* obtusa, integerrima, triquetra, brevissima.

Epops. 1. U. cristata variegata.



Upupa. *Fn. svec.* 85. *Bell. av.* 72: a. *Gesn. av.* 776.  
*Aldr. ornith.* l. 17. c. 11. *Fonst. av.* . . . t. 42. *Will.*  
*ornith.* 100. t. 24. *Raj. av.* 48. *Alb. av.* 2. p. 39. t.  
 42. 43. *Frisch. av.* t. 43. *Charl. onom.* 63. t. 63.  
*Olin. av.* 36.

*Habitat in Europæ sylvis. hærfoegel.*  
*Terresacta cristam erigit.*

paradi- 2. U. reëtricibus duabus longissimis.  
 fea. *Avis paraditiaca Manucodiata cristata orientalis. Seb.*  
*mus.* 1. p. 40. t. 30. f. 5.  
*Habitat in Asia.*

Eremita. 3. U. viridis, capite flavo, cervice jubata.  
*Corvus sylvaticus. Gesn. av.* 351. *Aldr. orn.* l. 19. c. 57.  
*Eremita montanus helveticus. Alb. av.* 3. p. 16. t. 16.  
*Habitat in Helvetia.*

Pyrrho- 4. U. atra, rostro pedibusque rubris.  
 corax. *Monedula Pyrrhocorax. Hasselq. iter.* 238.  
*Coracias f. Pyrrhocorax. Aldr. orn.* l. 12. c. 8. *Will. orn.*  
*86. l. 19. Raj. av.* 40. n. 6. *Alb. av.* 2. p. 23. t. 24.  
*Habitat in Angliæ, Ægypti maritimis, in montibus*  
*Helvetiæ, Galliæ &c. Grave. f. Coracias Buz.*

59. CERTHIA, *Rostrum* arcuatum, tenue, sub-  
 trigonum.  
*Lingua* acuta.

familia- 1. C. supra grisea, subtus alba, remigibus fuscis: decem  
 ris. macula alba.  
*Certhia. Fn. svec.* 213. *Gesn. av.* 251. *Aldr. ornith.*  
*l. 12. c. 44. Bell. av.* 98. a. *Will. orn.* 100. t. 23.  
*Raj. av.* 47. n. 5. *Alb. av.* 3. p. 24. t. 25. *Frisch. av.*  
*39. f. 1. tingere*  
*Habitat in Europæ arboribus reptans; ova 20. parit.*  
*Remiges 4 - 14. macula transversa alba notata.*

pufilla. 2. C. supra grisea, subtus alba, reëtricibus fuscis: extimis  
 apice albis.  
*Certhia fusca minor. Edw. av.* 26. l. 26.  
*Habitat in India.*

cærulea. 3. C. cærulea, remigibus reëtricibusque nigris.  
*Certhia cærulea. Edw. av.* 21. t. 21.

*Habi-*



*Habitat* Surinami.

*Rostrum* huic longius quam in congeneribus.

- cruenta- 4. *C. nigro-cærulescens*, subtus alba, vertice, cervice, dor-  
ta. fo uropygioque rubris.

*Certhia* minor, ex albo nigro & rubro varia. *Edw. av.* 81.  
*t.* 81.

*Habitat* in Benghala.

- flaveola. 5. *C. nigra*, uropygio pectoreque luteo, superciliis macu-  
la alarum rectricumque apicibus albis.

*Luscinia* f. *Philomela* e fusco & luteo varia. *Sloan. jam.*  
*2. p.* 307. *t.* 259. *Raj. av.* 187. *n.* 45. *Edw. av.* 122.  
*t.* 122.

*Habitat* in America.

60. TROCHILUS. *Rostrum* subulato-filiforme, in-  
curvatum, capite longius :  
Mandibula superior vaginans  
inferiorem.

*Lingua* filiformis, bipartito-tu-  
bulosa.

\* *Macrouri* 1-5.

- paradi- 1. *T. curvirostris* ruber, alis cæruleis, capite cristato, re-  
seus. ctricibus duabus longissimis.

*Mellivora* avis cristata cum duobus pennis longis in cau-  
da. *Seb. mus.* 1. *p.* 97. *t.* 61. *f.* 4.

*Habitat* in Mexico.

- afer, 2. *T. curvirostris*, corpore viridi, alis cæruleis, rectricibus  
nigris: intermediis longissimis.

*Habitat* in Æthiopia. *J. Burmannus.*

- Pella. 3. *T. curvirostris*, rectricibus intermediis longissimis, cor-  
pore rubro, capite fusco, gula aurata uropygioque  
viridi.

*Mellivora* major rubra, cauda longa. *Edw. av.* 32. *t.* 32.  
*f.* 2.

*Habitat* in Indiis.



- Polytmus. 4. T. curvirostris, rectricibus lateralibus longissimis, corpore virescente, pileo rectricibusque fuscis.  
 Polytmus viridans aureo varie splendens, pinnis binis uropygii longissimis. *Brown. jam. 475.*  
 Mellivora capite nigro, cauda longa. *Edw. av. 34. t. 34. Alb. av. 3. p. 45. t. 49. f. 1?*  
 Mellivora avis maxima. *Sloan. jam. 2. p. 309. t. 264. f. 4.*  
*Habitat in America.*
- forficatus. 5. T. curvirostris, rectricibus lateralibus longissimis, corpore viridi, pileo rectricibusque cæruleis.  
 Polytmus major nigricans aureo varie splendens, pennis binis uropygii longissimis. *Brown jam. p. 475.*  
 Mellivora viridis, cauda longa. *Edw. av. 33. t. 33.*  
 Mellivora avis minima. *Sloan. jam. 2. p. 307. t. 264. f. 1. Raj. av. 187.*  
*Habitat in Jamaica.*  
*Pennæ longissimæ basi suffultæ supra & infra pennula rigida.*  
 \*\* *Brachyuri 6 + 18.*
- Colubris. 6. T. rectricibus nigris: lateralibus tribus apice albis, gula rubra.  
 Mellivora avis carolinensis. *Catesb. car. 1. p. 65. t. 65.*  
 Mellivora gula rubra. *Edw. av. 38. t. 38.*  
*Habitat in America, in rivis septentrionali.*
- Ourissia. 7. T. rectricibus subæqualibus fusco-aureis, corpore aurato, remigibus nigris.  
*Habitat in Indiis.*
- Mosquitus. 8. T. rectricibus æqualibus ferrugineis: extremis apice fuscis, corpore nigro-aureo, remigibus nigris. *Mus. Ad. Fr. 2. p.*  
*Habitat in Indiis.*
- holosericeus. 9. T. curvirostris rectricibus æqualibus supra nigris, corpore supra viridi, pectore cæruleo, abdomine nigro.  
 Mellivora viridis, ventre nigro. *Edw. av. 36. t. 36.*  
*Habitat in America.*



- mellifugus, 10. T. rectricibus æqualibus cæruleis, corpore viride aureo, remigibus atro-cærulescentibus. *Mus. Ad. Fr. 2. p.*  
*Habitat in Indiis.*
- Tomineo. 11. T. rectricibus subæqualibus basi ferrugineis apice albis, corpore supra fusco subtus albo. *Mus. Ad. Fr. 2. p.*  
Ourissia f. Tomineo. *Clus. exot. 96.*  
*Habitat in America.*  
*Hanc feminam T. colubris (6.) putat Edw. av. t. 38.*
- surinamensis. 12. T. rectricibus ferrugineis, remigibus nigris, corpore aureo subtus albicante.  
*Habitat in America.*
- niger. 13. T. rectricibus subæqualibus, corpore nigro subtus aurato, ano albo.  
Trochilus niger. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 18.*  
*Habitat in Indiis.*
- mellivorus. 14. T. rectirostris, rectricibus nigris: lateralibus albis, capite cæruleo, dorso viridi, abdomine albo.  
Mellivora ventre albo. *Edw. av. 35. t. 35. f. 1.*  
*Habitat in India.*  
*Rectrices laterales albæ; Collum a tergo lunula alba.*
- ruber. 15. T. rectricibus lateralibus violaceis, corpore testaceo fusco submaculato.  
Mellivora parva purpurea. *Edw. av. 32. t. 32. f. 1.*  
*Habitat Surinami.*  
*Rectrices intermediæ testaceæ.*
- Mango. 16. T. rectricibus subæqualibus ferrugineis, corpore testaceo, abdomine atro.  
Mellivora Mango. *Alb. av. 3. p. 45. t. 49. f. 2.*  
*Habitat in Jamaica.*
- cristatus. 17. T. rectirostris viridis, alis fuscis, abdomine cinereo, crista cærulescente.  
Mellivora minor cristata. *Edw. av. 37. t. 37.*  
*Habitat in America.*
- minimus. 18. T. rectricibus lateralibus margine exteriori albis, corpore fusco nitente, subtus albidus.  
Avis mellivora minima. *Edw. av. 105. t. 105. f. infima.*  
*Habitat in America.*  
*Avis minima inter omnes notas.*



III. ANSERES. *Stylfoget*

*Rostrum obtusiusculum, epidermide tectum, sub basi gibbum, apice auctum.*

*Lingua carnosula, obtusiuscula.*

*Pedes palmati, natatorii.*

61. ANAS. *Rostrum lamelloso - dentatum, convexum, obtusum.*

*Lingua ciliata, obtusa.*

\* *Rostrum basi gibbo.*

Cygnus. 1. A. rostro semicylindrico atro, cera flava, corpore albo. *Fn. succ. 88. It. Wgot. 143.*

Cygnus ferus. *Bell. av. 30. a. Gesn. av. 372. Aldr. ornith. l. 19. c. 1. Will. orn. 212. . . Raj. av. 136.*

*Alb. av. 3. p. 91. t. 95. Edw. av. 150. t. 150.*

β. Cygnus mansuetus. *Will. orn. 271. t. 69. Raj. av. 136.*

*Svan Habitat in Europa, America septentrionali. T.*

*Accedit ad nos ultimo die revelationis. Piscatur poma.*

*It. scan. 186. 228.*

Cygnoid. 2. A. rostro semicylindrico basi gibbo. *Fn. succ. 89.*

*australis. . Anser cygneus guineensis. Raj. av. 138. Will. orn. 275.*

*Anser cygnoides. Alb. av. 1. p. 89. t. 91.*

orienta- β. Anser, rostro semicylindrico atro basi gibbo, minor.

*lis. . . Anser chinensis, It. Wgot. 145.*

*Anser moschoviticus. Alb. av. 2. p. 83. t. 91. 92.*

*Habitat in Asia. Turkisk gas*

*Varietas orientalis β. ab australi α. parum differt; imprimis quod illa minor.*

Tador- 3. A. rostro simo, fronte compressa, corpore albo va-  
na. riegato.

*Anas albo - variegata, pectoris lateribus ferrugineis, abdomine longitudinaliter cinereo-maculato. Fn. succ. 93.*

*Anas Tadorna dicta. It. scan. 212.\* It. Wgot. 214.*

*Tadorna s. Vulpanser. Will. orn. 278. t. 70. 71. Raj. av. 140. . .*

*Vulpanser. Alb. av. 1. p. 90. t. 94.*



Brandgaas. *Clus. exot.* 368.

*Habitat in Europæ maritimis. Jugas Sola Gothlandia*

spectabi- 4. A. rostro basi gibbo compresso: carina pennacea nigra,  
lis. capite canescente. *Mus. Ad. Fr.* 2. p.

*Anas canadensis, capite griseo caeruleo. Edw. av.* 154.  
t. 154.

*Habitat in Canada, Svecia.*

fusca. 5. A. nigricans, macula pone oculos lineaque alarum albis.  
Anas corpore obscuro, macula alba pone oculos, line-  
aque alba. *Fn. svec.* 106. *It. gotl.* 215. 271.

*Anas fera fusca. Jonst. av.* t. 44.

*Anas niger. Will. orn.* 278. t. 10. *Raj. av.* 141.

*Habitat in oceano Europæo. Swärla*  
*Mas ad basin rostri gibbositate notatus.*

nigra. 6. A. tota nigra, basi rostri gibba.

*Anas niger minor. Will. orn.* 280. t. 74. *Raj. av.* 141.

*Habitat in Lapponia, Anglia.*

*Cauda subcuneiformis. Femina fusca est.*

*\*\* Leves rostro basi æquali.*

Anser. 7. A. rostro semicylindrico, corpore supra cinereo subtus  
pallidiore, collo striato. *Fn. svec.* 90.

α. *Anser ferus. Gesn. av.* 158. *Aldr. orn.* l. 19. c. 18.  
*Will. orn.* 274. t. 69. *Raj. av.* 136.

β. *Anser domesticus. Gesn. av.* 141. *Will. orn.* 273. t.  
75. *Raj. av.* 136.

γ. *Anser canadensis fuscus maculatus. Edw. av.* 153. t. 153.

*Habitat in Europa & America maxime boreali. Gās.*

*Collum striatum. Annulus albus ad basin rostri in spon-  
taneo; migrat per phalanges; filo arcetur. Mas 1  
femina 4; inde Fenna, Plumæ, Anser durateus, Jus  
spartanum, Jecur ficatum.*

erythro- 8. A. cinerea, fronte alba. *Fn. svec.* 92.

pus. *Anser helsingicus. Clus. exot.* 363.

*Habitat in Europa septentrionali. Helsingia*

canaden- 9. A. fusca, capite colloque nigro, gula alba.

lis. *Anser canadensis. Will. ornith.* 276. t. 70. f. 1. & t. 71.

f. 3. *Raj. av.* 139. t. 10. *Catesb. car.* 1. p. 92. t. 92.

*Edw. av.* 151. t. 151.

*Habitat in Canada.*



- cærule- 10. A. grisea, subtus alba, tectricibus alarum dorsoque po-  
fcens. stico cærulescentibus.  
Anser canadensis, alis cæruleis. *Edw. av. 152. t. 152.*  
*Habitat in Canada.*
- Bernicla. 11. A. fusca, capite collo pectoreque nigris, collari albo.  
Anas capite colloque nigris. *Fn. svec. 91.*  
Bianta i. Bernicla. *Gesn. av. 110. Aldr. orn. l. 19.*  
*c. 3. Just. av. t. 49. Will. orn. 274. 275. t. 10.*  
*Rv. av. 137. Valent. mus. 495. Alb. av. 1. p. 89.*  
*t. 93.*  
*Habitat in Europa boreali; migrat supra Sueciam.*
- mollissi- 12. A. rostro cylindrico, cera postice bifida rugosa. *Fn.*  
ma. *svec. 94.*  
Anas plumis mollissimis. *Bartb. act. 1. p. 90. Worm.*  
*mus. 310. Will. orn. 277. Raj. av. 141.*  
Anas magna nigra & alba. *Edw. av. 98. t. 98.*  
*Habitat in Europa boreali, pelagica. It. gotl. 213. de-*  
*plumatur in vicia: plumis mollissimis, præstantissimis,*  
*pretiosissimis. Ratgans Habitat Sicania*  
*Mas albus, subtus posticeque niger. Femina grisea.*
- moscha- 13. A. facie nuda papillosa. *Fn. svec. 98.*  
ta. Anas moschata. *Raj. av. 150. Alb. av. 3. p. 92. t.*  
*97. 98.*  
Anas indica. *Gesn. av. 122. Aldr. orn. l. 19. c. 26.*  
Anas libyca. *Will. orn. 294.*  
*Habitat in India.*  
*Alba hujus forte varietas minor. It. Wgoth. 143.*
- bahamen- 14. A. grisea, rostro plumbeo: macula laterali fulva, ma-  
fis. cula alarum viridi luteaque.  
Anas bahamensis; rostro plumbeo, macula aurantii co-  
loris. *Catesb. car. 1. p. 63. t. 93.*  
*Habitat in Bahama.*
- Albeola. 15. A. alba, dorso remigibusque nigris, capite cærulescen-  
te, occipite albo.  
Anas minor albus & fuscus. *Edw. av. 100. t. 100.*  
*Habitat in America.*
- clypeata. 16. A. rostri extremo dilatato rotundato, ungue incurvo.  
*Fn. svec. 102. It. gotl. 167.*



Anas latirostra major. *Gesn. av.* 120. *Aldr. orn.* 3. p. 227.

Anas platyrhynchos altera. *Will. orn.* 283. t. 74. *Raj. av.* 143.

Anas clypeata germanica. *Alb. av.* l. p. 93. t. 97. 98.  
*Habitat in Europæ maritimis.*

platyrhynchos. 17. A. macula alari purpurea utrinque nigra albaque, pectore rufescente. *Fn. svec.* 103.

Anas platyrhynchos, pedibus luteis. *Aldr. orn.* l. 19. c. 32.  
*Will. orn.* 284. *Raj. av.* 144.

*Habitat in Europæ maritimis.*

strepera. 18. A. macula alarum rufa nigra alba. *Fn. svec.* 101.

Anas strepera. *Gesn. av.* 121.

Anas platyrhynchos, rostro nigro & plano. *Aldr. orn.* l. 19. c. 32. *Raj. av.* 145.

The godwall or gray. *Will. orn.* 287. t. 72.

*Habitat in Europæ aquis dulcibus.*

bucephala. 19. A. albida, dorso remigibusque nigris, capite supra infraque tumido sericeo nitente.

Anas minor, purpureo capite. *Catesb. car.* 1. p. 95. t. 95.

*Habitat in aquis dulcibus Americæ septentrionalis.*

Clangula. 20. A. nigro alboque varia, capite tumido nigro-viridi: sinu oris macula alba. *Fn. svec.* 100. *It. æl.* 49.

Clangula. *Gesn. av.* 119. *Alb. av.* 1. p. 92. t. 96.

Anas platyrhynchos mas. *Aldr. orn.* l. 19. c. 42. *Will. orn.* 282. t. 73. *Raj. av.* 142.

*Habitat in Europa; sæpius maritima. Scripsit in cavis arborum.*

*Urinator egregie, quæsitura cochleas, trachea ventricosa, oculis aeneis.*

rustica. 21. A. fusco cinerea, macula aurium alarumque alba.

Anas minor ex albo & fusco varia. *Catesb. car.* 1. p. 98. t. 98.

*Habitat in America septentrionali.*

perspicillata. 22. A. nigra, vertice nucaque albis, macula nigra rostri pone nares.

Anas canadensis major niger. *Edw. av.* 155. t. 155.

*Habitat in Canada.*



- Glaucion. 23. *A. iridibus flavis, capite griseo, collari albo.* *Faun. svec. 104.*  
*Glaucion. Bell. av. 33: b. Aldr. orn. l. 13. r. 38.*  
*Will. orn. 231. Raj. av. 144.*  
*Habitat in Europæ maritimis. Brunnacke*
- Penelope. 24. *A. cauda acutiuscula subtus nigra, capite brunneo, fronte alba.* *Fn. svec. 105.*  
*Penelope. Gesn. av. 108. Aldr. orn. l. 19. c. 38. Jonst. av. l. 49. Will. orn. 288. t. 72. Raj. av. 146:*  
*Anas fistularis. Alb. av. 2. p. 88. t. 99.*  
*Habitat in Europæ maritimis & paludibus. Wriano.*
- acuta. 25. *A. cauda acuminata elongata subtus nigra, occipite utrinque linea alba.*  
*Anas cauda cuneiformi acuta. Fn. svec. 96.*  
*Anas cauda acuta. Gesn. av. 121. Will. orn. 289. t. 73.*  
*Raj. av. 147. Alb. av. 2. p. 84. t. 94.*  
*Habitat in Europæ maritimis. Ahler. Eihlfogel*
- hyemalis. 26. *A. cauda cuneata: reſtricibus intermediis longis, corpore griseo, temporibus albis.* *Fn. svec. 95.*  
*Anas islandica. Worm. mus. 302.*  
*Anas cauda acuta canadensis. Edw. av. 156. t. 156.*  
*Habitat in Europa & America arctica. Writeland*  
*Hieme ad nos migrat; æstate versus septentrionem ulterius pergit.*
- ferina. 27. *A. alis cinereis immaculatis, uropygio nigro.* *Faun. svec. 107.*  
*Anas fera fusca. Gesn. av. 116. Aldr. orn. l. 19. c. 40. Will. orn. 288. t. 72. Raj. av. 143. Alb. av. 2. p. 87. t. 98.*  
*Habitat in Europæ maritimis.*
- Querquedula. 28. *A. macula alarum viridi, linea alba supra oculos.* *Fn. svec. 108.*  
*Kernell. Gesn. av. 107. Aldr. orn. l. 19. c. 33.*  
*Querquedula prima. Will. ornith. 291. t. 74. Raj. av. 148.*  
*Habitat in Europæ aquis dulcibus.*
- Crecca. 29. *A. macula alarum viridi, linea alba supra infraque oculos.* *Fn. svec. 109.*



Querquedula secunda s. minor. *Gesn. av. 105. Aldr. orn. 1. 19. c. 31. Will. orn. 290. t. 74. Raj. av. 147.*

Querquedula francia. *Alb. av. 1. p. 95. t. 100. & 2. p. 91. t. 102.*

*Habitat in Europæ aquis dulcibus. Arta.*

histrioni- 30. A. fusca albo cæruleoque varia, auribus, temporibus  
ca. linea gemina, collari fasciaque pectorali albis.

Anas fuscus maculatus. *Edw. av. 99. t. 99.*

*Habitat in America.*

minuta. 31. A. grisea, auribus albis, remigibus primoribus nigrican-  
tibus.

Anas canadensis minor fuscus. *Edw. av. 157. t. 157.*

*Habitat in Canada.*

*Parva admodum, tota grisea. Punctum album ad au-  
res utrinque. An prioris femina?*

Circia. 32. A. macula alarum varia, linea alba supra oculos, ro-  
stro pedibusque cinereis. *Fn. Svec. 111.*

Anas Circia. *Alb. av. 2. p. 92. t. 103. 104. Raj. av. 148.*

*Habitat in Europæ paludibus.*

autumna- 33. A. grisea, remigibus cauda ventreque nigris, area ala-  
lis: rum fulva albaque.

Anas fistularis rufus, rostro rubro, occidentalis. *Edw. av. 194. t. 194.*

*Habitat in America.*

\* \* \* *Pennis aliquot recurvis.*

Boschas. 34. A. rectricibus intermediis (maris) recurvatis, rostro re-  
cto. *Fn. Svec. 97.*

Anas fera torqvata minor. *Gesn. av. 114. Aldr. orn. 1. 19. c. 25. Raj. av. 145.*

Boschas major. *Will. orn. 284. t. 72. Alb. av. 2. p. 89. t. 100.*

β. Anas domestica. *Fonst. av. 141. t. 49. Will. orn. 293. t. 75. Aldr. orn. 1. 19. c. 35. Gesn. av. 96.*

*Raj. av. 150.*

*Habitat in Europæ lacubus; & mansueta. Græci an.*

*Mas autumno feminis similis, ova numerosa parere in-  
cipit florescente Hepatica. Viuat Ranis, Culicibus,  
Lemna.*



- adunca. 35. A. reſtricibus intermediis (maris) recurvatis, roſtro incurvato.  
 Anas domeſtica, roſtro adunco. *Will. orn.* 280. *Raj. av.* 150. *Alb. av.* 2. p. 86. t. 97. 96.  
*Habitat in . ; hodie uti præcedens domeſtica.*  
*Quomodo hæc a priori exorta ſit me fugit.*
- galericu- 36. A. criſta dependente, dorſoque poſtico utrinque penna  
 lata. recurvata cõmpreſſa elevata.  
*Querquedula ſincenſis elegans. Edw. av.* 102, t. 102.  
*Kinmodſuis. Kæmph. jap.* 129. t. 10.  
*Habitat in China.*  
*Criſta viridis rubraque. Roſtrum & Pedes rubri. Dorſum fuſcum maculis cæruleis. Pennæ aorj erectæ ruſe obtuſæ. Remex intimus, clauſis alis, altero margine erigitur ſupra dorſum, ruſus, antroſum falcatus.*  
 \* \* \* \* *Criſtata.*
- Sponſa. 37. A. criſta dependente duplici viridi cæruleo alboque varia.  
 Anas criſtatus elegans. *Catesb. car.* 1. p. 97. t. 97.  
*Edw. av.* 101. t. 101.  
 Anas tuſca criſtata, ad gulam alba, iride flammea. *Brown. jam.* 481.  
*Habitat in America ſeptentrionali.*  
*Criſta dependens viridi alboque cærulea, uti & dorſum. Pectus griſeum, albo maculatum. Gula alba.*
- arborea. 38. A. griſea, capite ſubcriſtato, abdomine albo nigroque maculato.  
 Anas ſittularis ruſus, roſtro nigro, occidentalis. *Edw. av.* 193. t. 193.  
 Anas ſittularis arboribus inſidens. *Sloan. jam.* 2. p. 324. t. 272. *Raj. av.* 192.  
*Habitat in America.*
- Fuligula. 39. A. criſta dependente, corpore nigro, ventre maculataque alarum albis. *Fn. Svec.* 99.  
 Anas Fuligula. *Gefn. av.* 107. *Will. orn.* 280. t. 73. *Alb. av.* 1. p. 91. t. 95.  
 Anas criſtata. *Raj. av.* 142.  
*Habitat in Europæ maritimis. Wigge.*  
*Mas, incubante femina, nos deſerit.*



62. MERGUS. *Rostrum denticulatum, subulato-cylindricum apice adunco.*

cuculla- 1. M. crista globosa utrinque alba, corpore supra fusco,  
tus, subtus albo.

Anas cristatus. *Catesb. car. 1. p. 94. t. 94.*  
*Habitat in America.*

Mergan- 2. M. crista dependente, capite nigro-carulescente, colla-  
ier. ri albo. *It. gottl. 166. pl. 20. Fn. suec. 113.*

Merganser. *Gesn. av. 134. Aldr. orn. l. 19. c. 63.*  
*Will. orn. 253. t. 64. Raj. av. 134. Mars. danub.*  
*70. t. 37.*

β. Mergus major, pectore rubro. *Alb. av. 1. p. 83. t. 87.*  
*Edw. av. 95. t. 95.*  
*Habitat in Europa. Ard. Sv: wra k fogel.*

Serrator. 3. M. crista dependente, capite nigro maculis ferrugineis.  
*Fn. suec. 114. It. gottl. 271.*

Anas longirostra. *Gesn. av. 135. Aldr. orn. l. 19. c. 60.*  
Mergus cirrhatus fuscus. *Will. orn. 255. t. 64. Raj.*  
*av. 135.*

*Habitat in Europa. Pracka.*

*Hujus methodus piscandi habetur in Actis Stockh. 1749.*  
*p. 190; rubro allicitur.*

Albellus. 4. M. crista dependente subtus nigra, corpore albo, dorso  
nigro, alis variegatis.

Mergus Tinnus. *Maguelq. iter. 268.*

Mergus major cirrhatus. *Raj. av. 135.*

Serrator minimus, capite niveo, cervice genisque nigris.  
*Klein. av. 140.*

Albellus alter. *Aldr. orn. l. 19. p. 378. Alb. av. 1. p.*  
*85. t. 89. Will. orn. 254. t. 64.*

*Habitat in Europa.*

minutus. 5. M. capite griseo lævi. *Fn. suec. 115.*

Te wezel-coot. *Alb. av. l. p. 84. t. 88.*

*Habitat in Europa.*

*In alis macula atra, antice & postice alba.*



63. ALCA. *Rostrum* edentulum, breve, compressum, convexum, sulcatum læpius transverse: Mandibula inferior ante basin gibba.

*Pedes* plerisque tridactyli.

Torda. 1. A. rostri fulcis quatuor, linea utrinque alba a rostro ad oculos. *It. gottl.* 286. *Fn. svec.* 120.

Alca. *Clus. exot.* 367. *Worm. mus.* 363. *Will. orn.*

*Endast Swånke* 243. t. 64. f. 1. & t. 65. f. 2. *Raj. av.* 119. *Alb.* av. 3. p. 90. t. 95.

*Magr. Cöman* *Habitat in Europæ borealis oceano. Gesh. Tord.*

*Plures ova solitaria simul in antro rupium pariunt, conjunctis viribus alternatis excludunt, unica excubias agente; erectæ incedunt.*

impen- 2. A. rostro compresso - ancipiti sulcato, macula ovata u-  
nis. tringue ante oculos. *Fn. Svec.* 119.

*Anser magellanicus. Worm. mus.* 300. t. 301.

*Penguin. Will. ornith.* 244. t. 65. *Edw. av.* 147. t. 147.

*Habitat in Europa arctica, in mari Norvegico rarij*

arctica. 3. A. rostro compresso - ancipiti sulcato fulcis quatuor, o-  
culorum orbita temporibusque albis. *Fn. svec.* 118.

*Anas arctica. Clus. exot.* 104. *Raj. av.* 120. *Worm.*

*mus.* 302. *Olear. mus.* t. 15. f. 5. *Will. orn.* 244. t.

65. *Raj. av.* 120. *Alb. av.* 2. p. 73. t. 78. 79.

*Lunda. Gesn. av.* 725. *Oelig. mus.* 2. f. 11. t. 11.

f. 21. *hab. in rupibus precipitibus montium mans*

*Habitat in Europæ borealis oceano.*

Lomvia. 4. A. rostro lævi oblongo: mandibula superiore margine  
flavescente.

Lomvia. *Clus. exot.* 367. *Will. orn.* 244. t. 65. *Raj.*  
*av.* 120.

*Gvillemot. Alb. av.* 1. p. 80. t. 84.

*Habitat in Europa boreali.*

Grylle. 5. A. rostro lævi subulato, abdomine maculaque alarum  
alba, pedibus rubris.

*Colymbus pedibus tridactylis palmatis. Fn. svec.* 124.

Colum-



*Columba græniclandica.* *Mart. spitzb.* 56. t. L. f. 11.  
*Will. oraitb.* 245. *Raj. av.* 121. n. 6. *Alb. av.* 2  
 p. 73. t. 80. *Edw. av.* 50. t. 50.

*Habitat in Europæ borealis oceano. Sió Orre*

*Rostrum hujus longitudine fere capitis, sequentis vero brevissimum.*

6. A. rostro lævi conico, abdomine fasciaque alarum alba, pedibus nigris.

*Columba græniclandica.* *Alb. av. l. p.* 81. t. 85. *Edw. av.* 91. t. 91.

*Mergus melanoleucus*, rostro acuto brevi. *Will. orn.* 261. t. 59. *Raj. av.* 125. n. 5.

*Habitat in Europæ, Americæ arcticæ oceano.*

*Præcedentis feminam esse statuit Albinus, negant Edwardus & nostrates.*

64. PROCELLARIA. *Rostrum edentulum, subcompressum: Mandibulis æqualibus: superiore apice adunca; inferiore apice compresso - canaliculata.*

*Nares cylindro supra basin rostri decumbente, truncato.*

*Pedes palmati: ungue postico fessili absque digito.*

*pelagica. i. P. nigra, uropygio albo.* *Fn. svec.* 249. *Act. Stockh.* 1745. p. 93. t. . .

*Peteril. Clus. exot.* 368. *Damp. itin.* 3. p. 97. *Alb. av.* 3. p. 87. t. 92. *Edw. av.* 90. t. 90. f. 1.

*Hirundo marina major apus, rostro adunco.* *Barr. æquin.* 134.

*Larus minimus, naribus tubulosis.* *Catesb. carol.* 3 p. 14. t. 14.

*Fregata marina apus subtus alba, superne nigra.* *Barr. av.* 73.

*Habitat in albo Oceano.*



- æquino- 2. *P. fusca immaculata*, rostro flavo.  
ctialis. Peteril magna nigra *Edw. av. 89. t. 89.*  
*Habitat ad Cap. b. Spei.*
- capensis. 3. *P. albo fuscoque varia.* *Amœn. acad. 4. p. . . Osb. it. 76.*  
*Anas alia indica. Gesn. av. 803. t. 804. f. 2.*  
*Peteril media maculata. Edw. av. 90. t. 90. f. 2.*  
*Habitat ad Cap. b. Spei.*

65. **DIOMEDEA.** *Rostrum* rectum; maxilla superiore apice adunca; inferiore truncata.

*Nares* ovatæ, patulæ, prominulæ, laterales.

- exulans. 1. *D. alis pennatis*, pedibus tridactylis.  
*Albatros. Edw. av. 88. t. 88. Alb. av. 3. p. 76. t. 81. Grew. mus. t. 6. f. 1.*  
*Habitat intra tropicos Pelagi & ad Cap. b. Spei, æthera altissime scandens; vicinans e Triglis volantibus a Coryphæna exagitatis.*  
*Statura Pelecani Aquili, naribus ovatis prominulis, non vero linearibus; cauda rotundata brevi nec forficata. Rostrum in hac quadruplo majus.*
- demersa. 2. *D. alis impennibus*, pedibus tetradactylis.  
*Penguin pedibus nigris. Edw. av. 94. t. 94.*  
*Habitat ad Cap. b. Spei.*  
*Statura Phaëthontis demersi, sed rostrum diversissimum.*

66. **PELECANUS.** *Rostrum* edentulum, rectum: apice adunco, unguiculato.  
*Nares* lineares, obliteratedæ.  
*Facies* nudiuscula.  
*Pedes* digitis omnibus quatuor simul palmatis.

\* *Rostrum edentulo.*

- Onocro- 1. *P. gula faccata. Syst. nat. 23.*  
talus. *Onocrotalus. Olear. mus. t. 13. f. 1. Dod. mem. 3. p. 86.*



Onocrotalus f. Pelecanus. Aldr. orn. l. 19. c. 2. Will. orn. 246. t. 63. Raj. av. 121. Marsil. danub. 6. t. 35. Edw. av. 92. t. 92. Bont. jav. 68.

β. Onocrotalus f. Pelecanus fuscus. Sloan. jam. 2. p. 322. Raj. av. 191.

Onocrotalus americanus. Edw. av. 93. t. 93.

Habitat in Africa, Asia, β in America. *Watu drag aren*  
Remiges nigrae. *ad Danubium flumen frequens, in Europa*

An americanus β fuscus ab orientali albo specie suf-rara avis  
ficienter distinctus? *Saxicus piscibus repleto*

Sacco gulari aquam siticulosis pullis adfert, ut & con-  
terranei sitim expleant intactis pullis. *arbores insidet nativus*  
*Pelecanus mansuetus, egregius piscator. Cygnio maior, pomus*

Aquilus. 2. P. cauda forficata, corpore nigro, capite abdomineque  
albis. *Amœn. acad. 4. p. . .*

Pelecanus Aquilus. Osb. iter. 292.

Alcyon major pulla, cauda longiore bifurca. Brown.  
jam. 483.

Cari pira. Laët. amer. 575.

Man of war. Sloan. jam. 1. p. 30.

Avis Rabo focardo. Pet. gaz. t. 45. f. 1. ?

Frigate bird. Alb. av. 3. p. 75: t. 80. male.

Habitat in Insula Adscensionis aliisque pelagicis, vitam  
agens Diomedæ exulis, cui similis. *La Fregate Buff.*

Carbo. 3. P. cauda æquali, corpore nigro, rostro edentulo.

Pelecanus corpore atro, subtus albicante, rectricibus qua-  
tuordecim. *Fw. svec. 116.*

Carbo aquaticus. Gesn. av. 137.

Cervus aquaticus. Aldr. orn. l. 19. c. 55. Jonst. av.  
t. 47. Will. orn. 248. t. 63. Raj. av. 122. Mars.  
danub. 16. t. 36. Alb. av. 2. p. 74. t. 81.

Habitat in Europa; nidificat in altis arboribus. *Hafsiäder.*  
Cauda longior & laxior quam in reliquis aquaticis.

\* \* Mandibulis serratis. *Le Cormoran Buffon*

Bassanus. 4. P. cauda cuneiformi, rostro ferrato, remigibus primo-  
ribus nigris.

Anser Bassanus. Will. orn. 247. t. 63. Raj. av. 122.  
Alb. av. 1. p. 82. t. 86.

Anseri bassano congener cinereo albus. Sloan. jam. præf.  
31. t. 6. f. 1. Raj. av. 191.

Habitat in Scotia, America. *Le Foc de Bassanus*



Magnitudo *Anseris*. Ad nares, supra oculos, pone sinum oris, linea lateralis sub gula, nuda.  
Mandibula scabra, non serrata.

Piscator. 5. P. cauda cuneiformi, rostro serrato, remigibus omnibus nigris. *Chia. Lagerstr. 8. Osb. iter. 85.*

Anathetus major melius subtus albidus, rostro serrato dentato. *Brown. jam. 481.*

*The Booby* Anseri bassiano affinis. *Catesb. car. 1. p. 87. t. 87. Sloan. jam. 2. p. 322. t. 271. f. 2. Raj. av. 191.*

Habitat in India utraque, Europa.

Alter sexus albus remigibus nigris, alter niger abdomine canescente. *Osbeck.*

Mandibula superior versus basin margine quasi dente utrinque mutata. Nares clausæ. Remiges in albo primores nigri; secundariæ albæ, sed apicibus extrorsum nigri. *ic Javo Cominum (Buffon)*

7. PHAËTHON. Rostrum cultratum, rectum, acuminatum. Fauce pone rostrum hiantem.

Nares oblongæ, postice membrana semitectæ.

Digitus posticus articulatione

æthereus. 1. PH. rectricibus duabus longissimis, rostro serrato, digito postico adnato.

Avis tropicorum. *Catesb. car. 3. p. 14. t. 14. Raj. av. 123. Will. orn. 250. t. 76. Edw. av. 149. t. 149. f. 1. Sloan. jam. 1. p. 22. Kalm. iter. 2. p. 149. Osb. iter. 291.*

Avis Rabes forcades. *Aldr. orn. l. 20. p. 544.*

Habitat in Pelago inter tropicos. *Osbeck.*

Magnitudo *Anatis*, alba supra lineis nigricantibus undulata tota; subtus immaculata. Falcia nigra per oculos. Rostrum sanguineum, compressum, rectius quam P. Piscatoris, retrorsum serratum. Pedes pallidi, extrorsum nigri, digito quarto etiam membrana affixo. Remiges omnes subtus albæ: primores supra latere exteriori nigri; secundariæ supra linea longitudinali nigra. Rectrices albæ in cauda cuneiformi, versus apicem lineola subsagittata fusca; omnes supra rachi niveæ.



demer- 2. PH. alis impennibus, rostro mandibulis edentulis, digi-  
sus. to postico distincto.

Penguin. *Edw. av.* 49. t. 49.

*Habitat ad Tropicum capricorni.*

*Remigibus destituitur, adeoque volatus nescia avis.*

68. COLYMBUS. *Rostrum* edentulum, subulatum,  
rectum, acuminatum.

*Pedes* pone æquilibrium.

arcticus. 1. C. pedibus palmatis indivisis, gutture nigro-purpurascen-  
te. *Fn. suec.* 121. *It. gotl.* 341.

*Colymbus arcticus* Linnæ. *Worm. mus.* 304. t. 305.

*Will. orn.* 259. t. 62. *Raj. av.* 125. *Oelig. mus.* 1.  
f. 11. t. 1. f. 2.

*Mergus maximus ferroensis* f. *arcticus.* *Clus. exot.* 102.

*Colymbus collo rubro.* *Edw. av.* 97. t. 97. & 146.  
t. 140.

*Habitat in Europa & America boreali; lacustris.*

*Mas sub gula purpurascens, Femina vero nigra; monoga-  
ma; ova 2. in littore; nequit incedere; feris exosa;  
clamitando tempestates præfagit; migrat in proximam  
Germaniam.*

*Confr. Colymbus maximus caudatus.* *Alb. av.* 1. p. 78.

t. 82. *Raj. av.* 125. n. 4. *Will. orn.* 258. t. 62. f.  
1. femina. *Linnæ*

cristatus. 2. C. pedibus lobato-fissis, capite rufo, collari nigro, re-  
migibus secundariis albis. *Fn. suec.* 122.

*Colymbus major cristatus* f. *cornutus.* *Gesn. av.* 139.

*Aldr. ornith.* l. 19. c. 52. *Will. orn.* 257. t. 61. *Raj.*  
*av.* 124. *Marsil. danub.* 80. t. 38.

*Habitat in Europa.*

auritus. 3. C. pedibus lobatis, capite nigro, auribus cristato-ferru-  
gineis. *Fn. Suec.* 123. *Siorna*

*Colymbus* f. *Podiceps minor.* *Aldr. orn.* l. 19. c. 52.

*Will. orn.* 258. t. 61. *Sloan. jam.* 2. p. 322. t. 271.

f. 1. *Raj. av.* 125. *Marsil. danub.* 82. t. 39. *Alb.*

*av.* 2. p. 70. t. 76. *Edw. av.* 145. t. 145. & 96.  
l. 96.



*Habitat in summis Europæ & Americæ lacubus.*  
*Nidum natantem conficit.*

- Podi- 4. C. pedibus lobatis, corpore fusco, rostro fascia sesqui  
 ceps, altera.  
 Podiceps minor, rostro vario. *Catesb. car. 1. p. 91.*  
*t. 91.*  
*Habitat in America septentrionali.*

69. LARUS. *Rostrum* edentulum, rectum, cultratum,  
 apice declive: Mandibula inferior  
 infra apicem gibba.  
*Nares* lineares, antice latiores.

- tridacty- 1. L. albicans dorso canescente, rectricibus excepto ex-  
 lus. timo nigris, pedibus tridactylis.  
 Larus hyperius. *Alb. av. 2. p. 80. t. 87.*  
 Larus cinereus. *Bell. av. . . Raj. av. 128. n. 4.*  
*Habitat in Europa septentrionali.*

- canus. 2. L. albus, dorso cano. *Fn. suec. 125.*  
 Larus albus. *Alb. av. 2. p. 77. t. 84.*  
*Habitat in Europa. Sv: Kornåka*  
*Agitati Lari evomunt aut explodunt cibum.*

- marinus. 3. L. albus, dorso nigro. *It. Gottl. 214. It. Wgot. 156.*  
 Larus nigrescens marinus. *Clus. exot. 104. Alb. av. 3.*  
*p. 89. t. 94.*  
*Habitat in Europa.*

- fuscus. 4. L. albus, dorso fusco. *Fn. suec. 126.*  
*Habitat in Europa. Le Goeland varie Buffon*  
*Borgmästare på Grönland.*

- Aticilla. 5. L. albus, capite alarumque apicibus nigris, rostro ru-  
 bio.  
 Larus major. *Catesb. car. 1. p. 89. t. 89.*  
*Habitat in America.*

- parasiti- 6. L. rectricibus duabus intermediis longissimis.  
 cus. Sterna rectricibus maximis nigris. *Fn. suec. 129. It.*  
*Wgot. 182. Act. Stockh. 1753. p. 291.*

*Labben.*

*Avis*



Avis norvegica Kyuffia. *Oel. mus.* 1. f. 11. n. 20.

Truen f. Fur. *Barth. act.* 1. p. 91.

Coprotheres. *Raj. av.* 127. n. 2. *Martens. spitz.* 63.  
t. L. f. D.

Avis arctica. *Edw. av.* 148. t. 149. & t. 149. f. 2.

Habitat intra tropicum Cancræ, Europæ, Americæ,  
Alia. *Swartkase.*

Piscaturæ ineptus agitatur congeneres, vomituque ejectum  
cibum arripit.

70. STERNA. *Rostrum* edentulum, subulatum, rectum,  
acutum apice compressiusculo.  
*Nares* lineares.

stolida. 1. S. cauda cuneiformi, corpore nigro, fronte albicante.  
*Amœn. acad.* 3. p.

Hirundo marina major, capite albo. *Sloan jam.* 1. p.  
31. t. 6. f. 2. *Catesb. carol.* 1. p. 88. t. 88.

Anæthetus minor fulvus, vertice cinereo, rostro glabro.  
*Brown. jam.* 481.

Habitat in Americæ Pelago.

*Pelagicæ aves vix homines adventantes metunt.*

*Le Noddi Bayson*

Hirundo. 2. S. cauda forficata: rectricibus duabus extremis albo ni-  
groque dimidiatis. *Fn. suec.* 127.

Sterna. *Gesn. av.* 53. *Aldr. orn.* 1. 19. c. 7. *Fonst.*  
*av.* 130. t. 46.

Hirundo marina. *Will. orn.* 268. t. 68. *Raj. av.* 131.  
*Alb. av.* 2. p. 79. t. 90.

Habitat in Europa. *Sarna*

*Mas & Femina indissolubiles socii monogami.*

nigra. 3. S. cauda subforficata, corpore cano, capite rostroque  
nigro, pedibus rubris. *Fn. suec.* 128.

Hirundo marina minor. *Alb. av.* 2. p. 82. t. 89.

Sterna fusca. *Raj. av.* 131.

Larus cinereus minor. *Aldr. orn.* . . .

Habitat in Europa; vivit in societate.



71. RYNCHOPS. *Rostrum* rectum: mandibula superiore multo brevior.

nigra. 1. R. nigra, subtus alba, rostro basi rubro.  
Rynchopsalia dorso nigro, ventre albo. *Barr. av. 20.*  
Larus major, rostro inæquali. *Catesb. car. 1. p. 90.*  
*t. 90. Le Bec en Ciseaux*  
Plotus rostro conico inæquali. *Klein. av. 142.*

*Habitat in America.*

fulva. 2. R. fulva, rostro nigro. †  
Rynchopsalia fulva, rostro nigro. *Barr. av. 20.*  
*Habitat in America.*

*Genus proxima affinitate Laris junctum.*



## IV. GRALLÆ. SNAPPER.

*Rostrum subcylindricum, obtusiusculum.*

*Lingua integra, carnosæ.*

*Femora supra genua denudata.*

72. PHOENICOPTERUS. *Rostrum denudatum, infracto-incurvatum.*

*Tamungos, hwiwa*

*Pedes palmati, tetra-*

*med Rosenröda strimor*

*daetyli.*

*Norrån Franc. Sparman*

ruber. 1. P. ruber, remigibus primoribus nigris.

Phœnicopterus. Bell. av. l. 8. c. 8. Gesn. av. . . Aldr. orn. 2. l. 20. c. 4. Will. orn. 260. t. 60. Raj. av. 117. Tetr. itin. 300. Worm. mus. 200. Grew. mus. 67. t. 5. Sloan. jam. 2. p. 321. Act. angl. 350 p. 523. Seb. mus. 1. p. 123 t. 67. f. 1. Catesb. car. 1. p. 73. t. 73. 74. Alb. av. 2. p. 71. t. 77.

*Habitat in Africa, America, rarius in Europa.*

*Dat mihi penna rubens nomen, sed lingua guisfis: Apicio, Caligulae, Vitellio, Cleopatrae expetita fuit, testantibus Plinio, Martiali, Svetonio, Lampridio.*

73. PLATALEA. *Rostrum planiusculum: apice dilatato, orbiculato, plano.*

*Pedes tetradactyli, semipalmati.*

Leuco- 1. P. corpore albo.

rodia. Anas rostro plano, apice dilatato rotundatoque. *Fn. suec.* 87.

Platea f. Pelecanus. Gesn. av. 666. Forst. av. . . t. 46. Will. orn. 212. t. 52. Raj. av. 102. Worm. mus. 1. f. 2. t. 11. f. 10.

Leucorodias. Aldr. orn. l. 20. c. 13.

Platina f. Cochlearia. Olear. mus. 23. t. 13. f. 4.

Albardiola. Alb. av. 2. p. 61. t. 66.

*Habitat in Europa, nidificat in Arboribus. Pelecan.*

*Rostrum & Pedes nigri. In Westrobothnia & Lapponia æstate varius*



- Ajaja. 2. P. corpore sanguineo.  
 Platea incarnata. *Sloan. jam. 2. p. 316.*  
 Platea brasiliensis Ajaja dicta. *Marcgr. bras. 204. Raj. av. 102.*  
 β. Tlahquechul s. Platea mexicana. *Hern. mex. 49. Raj. av. 102.*  
*Habitat in America australi.*
- pygmea. 3. P. corpore supra fusco, subtus albo. *Mus. Ad. Fr. 2. p. . . .*  
*Habitat Surinami.*  
*Magnitudo Passeris.*

74. MYCTERIA. *Rostrum* maxilla superiore triquetra rectissima subaducens, acutum, Maxilla inferiore trigona acuminata aducens.

*Nares* lineares.

*Lingua* nulla. *Marcgr.*

*Mycteria est Tantalus, Fabria  
 est Couricaca. Buffon, hafwa  
 mycket entlighet med Cionu  
 till lefnadsfattet.  
 Dese. store, foglar med lange  
 narke. flabbar, forstora. S.  
 siliens öfverflödige. Ormus*

*af. 87. Raj.*

*ricibusque ni-  
 sissima vis  
 occidit dedit.*

*ulatum, ob-  
 tum, tereti-*

*us.*

Locula. 1. TANTALUS. *Klein. av. 127.*

tor. Pelicanus americanus. *Catesb. car. 1. p. 81. t. 81.*

Tacab, Mife persis. *Chardin. itin. 3. p. 40.*

*Habi-*



- Ajaja. 2. *P. corpore sanguineo.*  
*Platea incarnata. Sloan. jam. 2. p. 316.*  
*Platea brasiliensis Ajaja dicta. Marcgr. bras. 204. Raj.*  
*av. 102.*
- β. *Tlahquechul f. Platea mexicana. Hern. mex. 49.*  
*Raj. av. 102.*  
*Habitat in America australi.*
- pygmea. 3. *P. corpore supra fusco, subtus albo. Mus. Ad. Fr.*  
*2. p. . . .*  
*Habitat Surinami.*  
*Magnitudo Passeris.*

74. MYCTERIA. *Rostrum* maxilla superiore trique-  
 tra rectissima subadscendens,  
 acutum, Maxilla inferiore tri-  
 gona acuminata adscendens.

*Nares* lineares.

*Lingua* nulla. *Marcgr.*

*Pedes* tetradactyli.

america- 1. MYCTERIA.

na. *Jabiru-guacu. Marcgr. bras. 201. Pis. bras. 87. Raj.*  
*av. 96. Will. orn. 202. t. 47. f. 2. 4.*

*Habitat in America calidiore.*

*Magnitudo Ciconiæ, alba, remigibus rectricibusque ni-*  
*gro-purpurascens. Maxilla et tertissima alba.*

*Conf. Grew. mus. t. 5. f. i. Serrantes occidet credit.*

75. TANTALUS. *Rostrum* longum, subulatum, ob-  
 tusum, subarcuatum, tereti-  
 usculum.

*Saccus* jugularis nudus.

*Nares* ovatæ.

*Pedes* tetradactyli.

Locula- 1. TANTALUS. *Klein. av. 127.*

tor. *Pelicanus americanus. Catesb. car. 1. p. 81. t. 81.*

*Tacab, Mife persis. Chardin. itin. 3. p. 40.*

*Habi-*



*Habitat in America, Asia.*

*Tibiæ longa. Femora seminuda, Pedes tetradactyli: digitis 3 anterioribus tantum basi palmatis.*

76. ARDEA. *Rostrum rectum, acutum, longum, subcompressum, sulco e naribus, versus apicem exaratum.*

*Pedes tetradactyli.*

\* *Cristatæ: rostro vix capite longiore.*

pavoni- 1. A. crista setosa erecta, temporibus palearibusque binis  
na. nudis.

*Grus balearica. Aldr. orn. l. 20. c. 6. Will. orn. 201. t. 48. Raj. av. 95. Dodart. mem. 3. p. 199.*

*Grus cristata africana. Edw. av. 192. t. 192.*

*Pavo marinus. Clus. exot. 105.*

*Grus capensis fusca, capite aureo galeato. Pet. gaz. t. 76. f. 9.*

*Habitat in Africa.*

*Caput nigrum. Crista flavescens. Alæ albæ. Cauda nigra aequalis.*

Virgo. 2. A. superciliis albis retrorsum longe cristatis.

*Virgo numidica. Edw. av. 134. t. 134. Dodart. mem. 3. p. 1.*

*Grus numidica. Alb. av. 3. p. 78. t. 83.*

*Habitat in Oriente.*

*Corpus magnitudine Ciconiæ ceruleo-cinereum; capite collo remigibusque primariis nigris. Pennæ paleares nigrae pendulae. Oculi rubri pupilla cinerea. Pone oculos utrinque crista pennacea recurvata longa alba.*

\* \* *Grues: capite calvo.*

canaden- 3. A. sincipite nudo papilloso, corpore cinereo, alis ex-  
fis. tus testaceis.

*Grus fusca canadensis. Edw. av. 133. t. 133.*

*Habitat in America septentrionali.*

Grus. 4. A. vertice nudo papilloso, fronte remigibus occipiteque nigris, corpore cinereo.

*Ardea vertice papilloso. Fn. suec. 131.*



Grus. Bell. av. 41. 6. Gesn. av. 529. Aldr. orn. l. 20. c. 5. Jonst. av. 166. t. 44. Will. orn. 200. t. 48. Raj. av. 95. Mars. danub. 5. p. 6. t. 1. Alb. av. 2. p. 60. t. 65. *V. Trana*

*Habitat in Europæ, Africæ campis subhumidis.*

*Trans pontum fugat & terris immittit apricis. Virg.*

americana- 5. A. vertice temporibusque nudis papillofis, fronte nu-  
na. cha remigibusque primariis nigris, corpore albo.

Grus americana alba. Catesb. carol. 1. p. 75. t. 75. Edw. av. 1:2. t. 132.

*Habitat in America septentrionali.*

*Caput subtus ad maxillam inferiorem rubrum est.*

Antigo- 6. A. capite nudo collarique papilloso, corpore cinereo,  
ne. remigibus nigris.

Grus major indica. Edw. av. 45. t. 45.

*Habitat in Asia.*

*Pone oculos macula parva alba, & vertex albus.*

\* \* \* *Ciconiæ.*

Ciconia. 7. A. alba, remigibus nigris, cute sanguinea.

Ardea alba, remigibus rubris. *Fn. svec. 136.*

Ciconia. Bell. av. 45. a. Gesn. av. 262. Aldr. orn. l. 20. c. 1. Jonst. av. 147 t. 50. Marsil. danub. 5. p. 26. t. 11.

Ciconia alba. Will. orn. 210. Raj. av. 97. Alb. av. 2. p. 59. t. 64.

*Habitat in Europa, Asia, Africa. Storck.*

*Cutis corporis sub pennis sanguinea. Nidus ad pagos in altis, resonans Passeribus; huic honos serpentum exitio tantus, ut occidere nefas; noctu iridet; migrat trans pontum in Ægyptum, Æthiopiam; astitat inter Sveciam & Italiam.*

nigra. 8. A. nigra, pectore abdomineque albo. *Fn. svec. 135.*

Ciconia nigra. Gesn. av. 97. Aldr. orn. l. 20. c. 2. Will. orn. 211. Alb. av. 3. p. 77. t. 82.

*Habitat in Europa boreali. Svenswala.*

*Migrat æstate supra Sveciam.*

\* \* \* \* *Ardeæ.*

Nycti- 9. A. crista occipitis tripenni dependente, dorso nigro,  
corax. abdomine flavescente.



Nycticorax. *Gesn. av.* 628. *Aldr. orn.* l. 19. c. 57.  
p. 272.

Ardea cinerea minor. *Will. orn.* 204. t. 49. *Raj. av.*  
99. n. 3. *Mars. danub.* 5. t. 3. *Alb. av.* 2. p. 62.  
t. 67. *Aldr. orn.* l. 20. c. 10.

*Habitat in Europa australi.*

Frons alba circum rostrum. Dorsum nigrum, abdo-  
men album. Pennæ crinæ 3, teretiusculæ, albæ, ad  
medium dorsi dependentes.

cinerea. 10. A. occipite crista pendula, dorso cærulescente, subtus  
albida, pectore maculis oblongis nigris.

Ardea crista dependente. *Fm. junc.* 133.

Ardea cinerea major. *Aldr. orn.* l. 20. c. 9. *Gesn. av.*  
212. *Joyt. av.* 151. t. 50. *Will. orn.* 203. t. 49.  
*Raj. av.* 98. *Mars. danub.* 5. p. 8. t. 2. *Alb. av.*  
1. p. 64. t. 67. & 3. p. . . t. 78.

*Habitat in Europa; nidificant in arboribus plures si-  
mul. Hæger.*

Herodias. 11. A. occipite cristato, dorso cinereo, femoribus ruffis,  
pectore maculis oblongis nigris.

Ardea fusca canadensis. *Edw. av.* 135. t. 135.

Ardea cristata maxima americana. *Catesb. carol.* 3. p.  
10. t. 10?

*Habitat in America.*

Tempora alba. Capitis pennæ longiores nigrae, unde  
postice crista evadit. Collum subtus albedo-testaceum,  
fusco maculatum. Brachia antice rufescentia. Corpus  
supra fuscum.

violacea. 12. A. crista nava, corpore nigro-cærulescente, fascia tem-  
porali alba.

Ardea stellaris cristata americana. *Catesb. car.* 1. p. 79.  
t. 79.

*Habitat in America septentrionali.*

cærulea. 13. A. occipite cristato, corpore cæruleo.

Ardea major grisea cristata, capite nigro, vertice & ci-  
liis albicantibus. *Brown. jam.* 478.

Ardea cærulea. *Catesb. car.* 1. p. 76. t. 76. *Alb. av.*  
3. p. 74. t. 79. *Sloan. junc.* 2. p. 314. t. 264. f. 5.  
*Raj. av.* 189.

*Habitat in America septentrionali.*



friata. 14. A. occipite subcristato, dorso cano friato, collo fectus ferrugineo, remigibus secundariis apice albis. *Rolander.*

*Habitat Surinami.*

*Vertex niger nucha subcristata. Remiges fusca, sed secundaria tantum margine apicis alba.*

virescens. 15. A. occipite subcristato, dorso viridi, pectore rufescente.

*Ardea stellaris minor. Sloan. jam. 3. p. 315. t. 263.*

*Raj. av. 189. n. 2. Catesb. car. 1. p. 80. t. 80.*

*Habitat in America.*

stellaris. 16. A. capite læviusculo, supra testacea maculis transversis, subtus pallidior maculis oblongis fuscis.

*Ardea vertice nigro, pectore pallido maculis longitudinalibus nigricantibus. Fn. suec. 134.*

*Ardea stellaris minor. Geshn av. 215. Aldr. orn. l. 20.*

*c. 16. Will. orn. 207. t. 50. 52. Raj av. 100. n.*

*II. Mars. danub. 5. p. 16. t. 6. Alb. av. 1 p. 65.*

*t. 68.*

*Habitat in Europa. <sup>172</sup> Rodrum*

*Venatus falconibus magnatibus placet; Mugitus stentorii impares; terrefacta spiritaliter athera scandit.*

alba. 17. A. capite lævi, corpore albo, rostro rubro.

*Ardea tota alba, capite lævi. Fn. suec. 132.*

*Ardea alba major. Will. orn. 205. t. 43. Raj. av. 99.*

*n. 4.*

*Habitat in Europa. in Scania visa e ad Araslof.*

Ibis. 18. A. capite lævi, corpore albo, rostro flavescente apice pedibusque nigris.

*Ardea Ibis tota alba, pedibus atris, unguibus arcuatis maximis. Hasselqv. itin. 248.*

*β Ibis nigra. Raj. av. 98.*

*Habitat in Ægypto; regionis purificator.*

*Bellonii Ibis rostro arcuato, nigra est; at Plinius X: 30.*

*Ibis circa peluscum tantum nigra est, cæteris omnibus locis candida.*

æquino- 19. A. capite lævi, corpore albo, remigibus duabus pri-  
ctialis. malis margine exteriori fuscis. *Rolander.*

*Habitat in America,*



*Simillima Ibidi tota structura; at vero Remiges primores omnes apice fuscescentes, & 1, 2 etiam margine exteriori longitudinali fusce, ceterum eadem, ut facile pro varietate agnoscatur.*

77. SCOLOPAX. *Rostrum teretiuseculum, obtusum, capite longius.*

*Pedes tetradactyli: postico pluribus articulis insistente.*

rubra. 1. *S. rostro arcuato, pedibus rubris, corpore sanguineo, alarum apicibus nigris.*

*Porphyrio amboinentis f. Ardea rubra corallina. Seb. mus. 1. p. 98. t. 62. f. 3.*

*Numenius ruber. Catesb. car. 1. p. 84. t. 84.*

*Numenius indicus. Clus. exot. 366.*

*Guara. Martogr. bras. 203. Will. orn. 239. Raj. av. 104. n. 6.*

*Habitat in America.*

alba. 2. *S. rostro arcuato, pedibus rubris, corpore albo, alarum apicibus viridibus.*

*Numenius albus. Catesb. car. 1. p. 82. t. 82.*

*Habitat in America.*

fusca. 3. *S. rostro arcuato, pedibus rubris, corpore fusco, cauda basi alba.*

*Numenius fuscus. Catesb. car. 1. p. 83. t. 83.*

*Habitat in America.*

*Antecedentes 1. 2. 3. structura nimis affines, sed colore corporis diversa.*

Totanus. 4. *S. rostro recto basi rubro, pedibus coccineis, remigibus secundariis albis. Fn. svec. 149.*

*Totanus. Gejn av. 518. Aldr. orn. l. 20. c. 24. Will. orn. 220. t. 53. f. 4. Raj. av. 107. Alb. av. 3. p. 82. t. 87.*

*Habitat in Europa.*

Arquata 5. *S. rostro arcuato, pedibus cærulefcentibus, alis nigris maculis niveis. Fn. svec. 139.*



Numenius f. Arquata. *Gesn. av.* 222. *Aldr. orn.* l. 20. c. 21. *Will. orn.* 216. t. 54. f. 1. 2. *Raj. av.* 103. *Alb. av.* 1. p. 75. t. 79. *Mars. danub.* . . . t. 17.

*Habitat in Europa. ad Paludes.*

Phæopus. 6. S. rostro arcuato, pedibus cærulescentibus, maculis dorsalibus fuscis rhomboidalibus. *Fn. swec.* 140.

Phæopus altera f. Arquata minor. *Gesn. av.* 500. *Aldr. orn.* l. 20. c. 21.

Arquata minor nostras. *Raj. av.* 103. n. 2. *Will. orn.* 217.

*Habitat in Europa. ad Paludes*

*Sursum recta evolans clamando tempestates prænuncians.*

Rustico- 7. S. rostro recto lævi, pedibus cinereis, femoribus testis, fascia frontis nigra.

Numenius rostri apice lævi, capite linea utrinque nigra, rectricibus nigris apice albis. *Fn. swec.* 141.

Scolopax f. Perdix rustica. *Gesn. av.* 502.

Scolopax. *Aldr. orn.* l. 20. c. 51. *Will. orn.* 213. *Raj. av.* 104 n. 1. *Alb. av.* 1. p. 67. t. 70.

*Habitat in Europa. Markullen*

*Noctū volitat reditque iterato eadem via aërea.*

Fedoa. 8. S. rostro recto longo, pedibus fuscis, remigibus secundariis rufis nigro punctatis.

Fedoa americana. *Edw. av.* 137. t. 137.

*Habitat in America septentrionali.*

Corpus griseum. Remiges primores fuscae. Linea superciliarum alba.

Glottis. 9. S. rostro recto basi inferiori rubro, pedibus virescentibus.

Numenius pedibus virescentibus, uropygio albo, remigibus lineis albis fuscisque undulatis. *Fann. swec.* 142.

Pluvialis major. *Aldr. orn.* l. 20. c. 66. *Will. orn.* 220. t. 55. *Raj. av.* 106.

Glottis. *Gesn. av.* 520.

*Habitat in Europa. Sv. Glott. ad Paludes*



Limosa. 10. S. rostro recto lævi, pedibus fuscis, remigibus macula alba: quatuor primis immaculatis.

Numenius uropygio albo, rectricibus nigris basi albis, remigibus transversa alba macula: exceptis quatuor primis. *Fn. suec. 144.*

*Habitat in Europa.*

Gallina<sup>a</sup> 11. S. rostro recto apice tuberculato, pedibus fuscis, lineis frontis fuscis quaternis.

Numenius capite lineis 4. fuscis longitudinalibus, rostri apice tuberculoso, femoribus seminudis. *Faun. suec. 143.*

Gallinago minor. *Gesn. av. 503. Aldr. orn. l. 20. c. 53. Will. orn. 214. Raj. av. 105. n. 2. Alb. av. 1. p. 68. t. 71.*

*Habitat in Europa. àû carectis Sv. Cwaldsnäppa*

*Hæc Capella cœlestis cuius mas tam alte celerrimeque volitat, ut audiri, non vero oculis attingi possit.*

Lapponi- 12. S. rostro subrecurvato, pedibusque nigris, pectore ferrugineo.

*Recurvirostra pectore croceo. Fn. suec. 138.*

*Habitat in Lapponia. Rudbeck.*

Ægoce- 13. S. rostro recto, pedibus virescentibus, capite colloque phala. rufescentibus, remigibus tribus nigris basi albis.

Barge s. Ægocephalus. *Will. orn. 215. Raj. av. 105. n. 4. Alb. av. 2. p. 64. t. 70.*

*Habitat in Europa australi.*

Hæma- 14. S. rostro recto flavescente, pedibus fuscis, corpore subtus fulvo fusco-undato.

*Fedoa americana, pectore rufo. Edw. av. 138. t. 138.*

*Habitat in America septentrionali.*

*Corpus griseum subtus rubro-fulvescens.*

*Rectrices primores nigrae apice albae.*



78. TRINGA. *Rostrum* teretiufculum, longitudine capitis.

*Pedes* tetradactyli: postico uniarticulato a terra elevato.

- Pugnax. 1. T. pedibus rubris, rectricibus tribus lateralibus immaculatis, facie papillis granulatis carneis. *Fn. svec.* 145.  
*Avis pugnax. Aldr. orn. l. 20. c. 19. f. 1-8. Jonst. av. 152. t. 51. 52. Will. orn. 224. t. 56. Raj. av. 107. Mars. danub. 52. t. 24. Alb. av. 1. p. 69 t. 72. 73. Habitat in Europa minus boreali. v. Brouhane. Mares dissimiles, pugnacissimi. præsertim in Scandinavia.*
- Vanel-  
lus. 2. T. pedibus rubris, crista dependente, pectore nigro. *Fn. svec.* 148.  
*Capella f. Vanellus. Bell. av. 49. a. Gesn. av. 764. Aldr. orn. l. 20. c. 63. Will. orn. 228. t. 57. Jonst. av. 164. t. 53. 27. Raj. av. 110. Alb. av. 1. p. 70. t. 74. Habitat in Europa, Africa. Wija. Migrat forte in Ægyptum. Ova Belgis in deliciis.*
- Gambet-  
ta. 3. T. rostro pedibusque rubris, corpore luteo cinereoque variegato, subtus albo. *Fn. svec.* 153.  
*Gambetta. Aldr. orn. l. 20. c. 26. Raj. av. 107. Habitat in Europa.*
- Interpres. 4. T. pedibus rubris, corpore nigro albo ferrugineoque vario, pectore abdomineque albo. *It. gottl.* 217. *Fn. svec.* 154.  
*Morinellus canadensis. Edw. av. 141. t. 141. Habitat in Europa & America septentrionali.*
- tobata. 5. T. rostro subulato apice inflexo, pedibus virescentibus lobatis, abdomine albido.  
*Tringa fusca, pedibus fulicæ. Edw. av. 143. t. 143. & 46. t. 46. Habitat in America septentrionali, Lapponia. Rostrum tenuissimum est; procellosa tempestate natat gregaria.*
- Fulicaria. 6. T. rostro recto, pedibus lobatis subfuscis, abdomine ferrugineo.



Tringa fusca canadensis, membranis ad digitorum articulos. *Edw. av.* 142. *t.* 142.

*Habitat in America.*

alpina. 7. T. testaceo-fusca, pectore nigricante, rectricibus cinereo-albidis, pedibus fulcescentibus.

*Habitat in Lapponia. Adlerheim.*

*Magnitudo Sturni; Abdomen album.*

Ocrophus. 8. Tringa rostri apice punctato, pedibus virescentibus, dorso fusco-viridi nitido. *Fn. svec.* 146.

Tringa. *Aldr. orn.* l. 20. c. 54. *Will. orn.* 222. *t.* 55. *Raj. av.* 108.

Rhodophus s. Ocrophus. *Gesn. av.* 508. 511. *Aldr. orn.* l. 20. c. 39.

*Habitat in Europa. Horigiör.*

Hypoleucos. 9. T. rostro lævi, pedibus lividis, corpore cinereo lituris nigris: subtus albo. *Fn. svec.* 147.

Tringa minor. *Will. orn.* 223. *t.* 35. *Raj. av.* 108.

Gallinula hypoleucos. *Gesn. av.* 509. *Aldr. orn.* 3. p. 469.

*Habitat in Europa. Beccasin.*

Canutus. 10. T. rostro lævi, pedibus cinerascens, remigibus primoribus ferratis.

Tringa cinerea, remigibus secundariis basi albis, rectricibus quatuor mediis immaculatis. *Fn. svec.* 150.

Canuti avis. *Raj. av.* 108.

*Habitat in Europa.*

Glareola. 11. T. rostro lævi, pedibus virescentibus, corpore albo punctato, pectore subalbido. *Fn. svec.* 152.

*Habitat in Europa. in sylvis uliginosis.*

littorea. 12. T. rostro lævi, pedibus fuscis, remigibus fuscis: rachi primæ nivea. *Fn. svec.* 151.

*Habitat in Europa. in paludibus.*

Squatarola. 13. T. rostro nigro, pedibus virescentibus, corpore griseo subtus albido. *Fn. svec.* 155.

Pluvialis cinerea. *Raj. av.* 111. *Alb. av.* 1. p. 72. *t.* 76.

*Habitat in Europa. in Scania.*



79. CHARADRIUS. *Rostrum* teretiusculum, obtusum.

*Pedes* tridactyli.

cristatus. 1. C. gula pileo pectoreque nigris, occipite cristato, dorso testaceo, pedibus nigris.

Pluvialis indicus, pectore nigro. *Edw. av.* 47. *t.* 47.

*Habitat in Persia.*

*Simillimus est Tringæ Vanello.*

Hiaticula. 2. C. pectore nigro, fronte nigricante fasciola alba, vertice fusco, pedibus luteis. *Fn. svec.* 159.

Charadrius f. Hiaticula. *Aldr. orn. l.* 20. *c.* 67. *Just.*

*av.* 166. *t.* 53. *Will. orn.* 230. *t.* 57. *Raj. av.* 112.

*Sloan. jam.* 2. *p.* 314. *t.* 169 *f.* 2. *Alb. av.* 1. *p.*

*76. t.* 80.

*Habitat in Europa & America ad ripas.*

alexandrinus. 3. C. fuscus, fronte collarique dorsali abdomineque albis, rectricibus lateralibus utrinque candidis, pedibus nigris.

Charadrius alexandrinus. *Hasselq. iter.* 255. *n.* 30.

*Habitat ad Ægypti ex Nilæ canalē.*

vociferus. 4. C. fasciis pectoris colli frontis genarumque nigris, cauda lutea fascia nigra, pedibus pallidis.

Pluvialis vociferus. *Catesb. car.* 1. *p.* 71. *t.* 71.

*Habitat in America septentrionali.*

ægyptius. 5. C. fascia pectorali nigra, superciliis albis, rectricibus apice albis fascia nigra, pedibus cæruleis.

Charadrius ægyptius. *Hasselq. iter.* 256. *n.* 31.

*Habitat in Ægypti apricis.*

Morinellus. 6. C. pectore ferrugineo, fascia superciliarum pectorisque lineari alba, pedibus nigris. *Fn. svec.* 158. 160.

Morinellus. *Alb. av.* 2. *p.* 57. *t.* 61. 62. *Raj. av.* 111.

*Habitat in Europa: ad Alpes migrans per Upsaliam medio maji septentrionem versus.*

*Mas ad scrobiculum abdominis niger, femina non.*

apricarius. 7. C. pectore nigro, rostro basi gibbo, pedibus cinereis.

Charadrius nigro-lutescente variegatus, pectore nigro.

*Fn. svec.* 156. *Iter. œl.* 72.



Pluvialis viridis maculatus, ventre nigro. *Edw. av.*  
140. t. 140.  
*Habitat in Orundia, Canada. Arerions*

Pluvialis. 8. C. pedibus cinereis, corpore nigro viridique maculato,  
subtus albido. *Fn. swec. 157.*  
Pluvialis viridis. *Will. orn. 229. t. 57. Raj. av. 111.*  
*Sloan. jam. 2. p. 113. t. 269. f. 1. Alb. av. 1. p. 71.*  
t. 75.  
*Habitat in Europa. justa alpes Dalekronicas.*

Oedicnemus. 9. C. griseus, remigibus primoribus duabus nigris medio  
mus. albis, rostro acuto, pedibus cinereis.  
Oedicnemus. *Bell. av. . . Raj. av. 108. n. 4. Alb.*  
*av. 1. p. 66. t. 69.*  
Charadrius. *Gesn. av. 256.*  
Charadrius Kervari. *Hasselq. iter. 210. n. 32. an?*  
*Habitat in Anglia.*

Himantopus. 10. C. supra niger, subtus albus, rostro nigro capite lon-  
gioris, pedibus rubris longissimis.  
Charadrius autumnalis. *Hasselq. iter. 253. n. 29.*  
Himantopus. *Sibb. fest. . . t. 11. 13. Raj. av. 106. Aldr.*  
*orn. 1. 20. c. 30. Gesn. av. . .*  
*Habitat in Europa australiore.*

Spinosus. 11. C. remigibus pectore abdomine pedibusque atris, re-  
stricibus dimidiato-albis, humeris spinosis.  
Charadrius spinosus. *Hasselq. itin. 260. 270.*  
*Habitat in Ægypto.*  
*Humeri spinosi, ut in Fulica spinosa, singulares sunt.*

80. RECURVIROSTRA. *Rostrum* depresso-planum,  
acuminatum, recurvatum.  
*Pedes* palmati, tetradactyli.

Avosetta. 1. R. albo nigroque varia. *It. æl. 89. Fn. swec 137.*  
Avosetta f. Recurvirostra. *Gesn. av. 232. Aldr. orn.*  
*1. 19. c. 64. Will. orn. 240. t. 60. Raj. av. 117.*  
*Mars. danub. 5. p. 72. t. 34. Alb. av. 1. p. 96. t. 101.*  
*Habitat in Europa australiore. Sv. Svårsläcka*  
*Migrat in Italiam, rarissima apud nos.*



81. HÆMATOPUS. *Rostrum* compressum: apice  
cuneo æquali.

*Pedes* tridactyli, fissi.

Ostrale- 1. HÆMATOPUS. *It. æl.* 83. *Fn. suec.* 161. *Bell. av.*  
gus. 18. *Aldr. orn.* l. 20. c. 31. *Will. orn.* 220. t. 56.  
*Raj. av.* 105. *Alb. av.* 1. p. 74. t. 78. *Catesb. car.*  
1. p. 85. t. 85.

*Habitat in Europæ, Americæ septentrionalis littoribus  
marinis; victitat conchis. Island: Strandkura.*

82. FULICA. *Rostrum* convexum: Mandibula supe-  
riore margine supra inferiorem for-  
nicata; Mandibula inferior, pone  
apicem gibba.

*Frons* calva.

*Pedes* tetradactyli, sublobati.

atra. 1. F. fronte calva, corpore nigro, digitis lobatis.  
*Fulica fronte calva æquali. Fn. suec.* 130.  
*Fulica. Bell. av.* 36. b. *Gesn. av.* 390. *Aldr. orn.* l.  
19. c. 13. *Will. orn.* 239. t. 59. *Raj. av.* 116.  
*Marsil. danub.* 70. t. 33. *Alb. av.* 1. p. 79. t. 83.  
*Hasselt. v. act. nps.* 1751. p. 22. itin. 262.  
*Habitat in Europa; hybernatur in Gallia. Sv. Blåsklacka.*  
*Edit Semina, Herbas; natat supraque aquam currit.*

Chloro- 2. F. fronte calva, corpore nigro, digitis simplicibus.  
pus. *Gallinula Chloropus. Alb. av.* 2. p. 66. t. 72. & 3.  
p. 86. t. 91. *Raj. av.* 113.  
*Habitat in Europa.*

Porphy- 3. F. fronte calva, corpore violaceo, digitis simplicibus.  
rio. *Fulica major pulla, fronte cera coccinea oblongo-qua-*  
*drata. Brown. jam.* 479.  
*Porphyrio. Alb. av.* 3. p. 79. t. 84. *Raj. av.* 116. n.  
13. *Edw. av.* 87. t. 87. *Dodart. act.* 3. p. 30?  
*Habitat in Asia, America.*

spinosa. 4. F. fronte carunculata, corpore variegato, humeris spi-  
nolis, digitis simplicibus, ungue postico longissimo.



Gallinula alis cornubus donatis. *Edw. av. 48. t. 48.*  
*Habitat in America australi.*  
*Unguis posticus rectus, digito longior. Pollex unius ar-*  
*ticuli insistens. Remiges virides.*

83. RALLUS. *Rostrum* basi crassius, compressum,  
 dorso attenuatum apicem versus,  
 æquale, acutum.  
*Pedes* tetradactyli, fissi.  
*Corpus* compressum.

- Crex. 1. R. alis rufo-ferrugineis.  
 Ortygometra alis rufo-ferrugineis. *Fn. swec. 162.*  
 Ortygometra. *Aldr. orn. l. 13. c. 23. Will. orn. 522.*  
*t. 29. Km. av. 78. Alb. av. 1. p. 20. t. 32.*  
*Habitat in Europæ agris, carectis; vicinat Lumbri-*  
*cis. Angsuärpa.*  
*Corpus valde compressum; vesperi & nocte sonorus voce*  
*ingeminata crex.*
- aquati- 2. R. alis griseis fusco-maculatis, hypochondriis albo-ma-  
 cus. culatis, rostro luteo.  
 Rallus aquaticus. *Alb. av. 1. p. 73. t. 77. Will. orn.*  
*234. Aldr. orn. . . Raj. av. 113. n. 2.2*  
 Ortygometra alis fuscis. *Syst. nat. 25. Angsuärpa. Korn-*  
*Habitat in Europa. Knarren.*
- lariformis. 3. R. subtus albido-flavescens, cervice cærulescenti ma-  
 culato, digitis marginatis.†  
 Larus fissipes. *Alb. av. 2. p. 75. t. 82.*  
 Rallus cinereus facie Lari. *Klein. av. 103.*  
*Habitat in Europa.*  
*Cauda huic longiuscula; ideoque anceps genus.*
- bengha- 4. R. corpore vertice oculisque albis, capite colloque ni-  
 lenis. gris, alis dorsoque viridibus, remigiis primariis ru-  
 bro-maculatis.  
 Rallus benghalensis. *Alb. av. 3. p. 85. t. 90.*  
*Habitat in Asia.*
- carolinus. 5. R. grisea, fronte nigra, pectore plumbeo, rostro flavo,  
 pedibus virescentibus.



Gallinula minor canadensis. *Edw.* av. 144. t. 144.  
*Catesb. car.* 1. p. 70. t. 70.  
*Habitat in America septentrionali.*

84. PSOPHIA. *Rostrum* cylindrico-conicum, convexum, acutiusculum, mandibula superiore longiore.  
*Nares* ovatae patulae.

crepitans, 1. PSOPHIA.

Psophia crepitans nigra, pectore columbino. *Barr. av.* 62.  
 Gallina sylvatica crepitans, pectore columbino. *Barr. av.* 132.  
 Gallina sylvestris Macucagua. *Raj. av.* 53.  
 Macucagua. *Marcgr. bras.* 213. *Pis. bras.* 88.  
*Habitat in America meridionali.*  
*Rostro* mussitans respondet per anum.

85. OTIS. *Rostrum* mandibula superiore fornicata.  
*Lingua* bifida.  
*Pedes* tridactyli absque postico.

Tarda 1. O. jugulo utrinque cristato.

Tarda. *Dodart. mem.* 3. p. 309. *Edw. av.* 73. t. 73.  
 74. *Alb. av.* 3. p. 36. t. 38. 39. *L. Outarde de Buffon*  
 Otis f. Tarda avis. *Raj. av.* 38. *Aldr. orn.* l. 13. c. 12.  
*Edw. av.* 73. t. 73. 74. *Tropeus Germanis*  
*Habitat in Poloniae, Orientis campis; migrat per Belgium, Angliam. Mensis eximia.*

arabs.

2. O. auribus erecto-cristatis.

Otis arabica. *Edw. av.* 12. t. 12.  
*Habitat in Oriente.*

*Supra* scolopacina, *subtus* albida. *Aures* nigrae. *Cauda* fascia fusca.

Tetrax 3. O. capite juguloque laevi.

Anas campestris. *Alb. av.* 3. p. 33. t. 41. *Raj. av.* 59.

Tetrax. *Bell. av.* . . . *Aldr. orn.* l. 13. c. 13.

*Habitat in Europa, imprimis in Gallia.*

*Hac dimidiata minor prima. J. L. G. 4. O.*  
*Outarde de Buffon.*



- afra. 4. O nigra, dorso cinereo, auribus albis.  
*Habitat in Æthiopia I. Burmannus*  
 Nasis Rosstrum & Pedes naci. Vertex cinereus. Al-  
 larum margo exterior albus. Femina tota cinerea,  
 exceptis femoribus abdomineque atris.

86. STRUTHIO. *Rostrum conicum.*  
*Alæ ad volandum ineptæ.*

- Came- 1. S. pedibus didactylis.  
 lus. Struthio-Camelus. *Aldr. orn. l. 9. c. 2. Dodart. mem.*  
*335. Seb. mus. 1. t. 51. f. 6. Will. ornith. 104. t. 25.*  
*Raj. av. 35. Alb. av. 3. p. 30. t. 31.*  
*Habitat in Syria, Arabia. Lybia, Africa. Strids*  
*Spina sub humeris armatur, maxima Avium; Palpebra*  
*utraque ciliata. Exterior digitus muticus. Penne la-*  
*nate pro galeis bellicis cristaque castrensi. Ova sape*  
*50, candida, læcia, in arena excludenda deserta. Job.*  
*39: 16.*

- Casua- 2. S. pedibus tridactylis, vertice palcaribusque nudis.  
 rius. Casuarius. *Olear. mus. 23. t. 13. f. 2. Alb. av. 2.*  
*p. 56. t. 60.*  
*Emeu. Dodart. mem. 377. Raj. av. 36. Clus. exot.*  
*98. Bont. jav. 71. Will. ornith. 105. t. 25. Worm.*  
*mus. . . Jonst. av. 172. t. 56. Aldr. orn. l. 20.*  
*t. 541.*  
*Habitat in Asia, Sumatra, Molucca, Banda. Emc*  
*Callus elevatus quasi diadema verticis. Palcaria 2 sub*  
*collo; Collum a tergo nudum. Ungue intermedio ma-*  
*jore ferit; ova punctis excavatis.*

- america- 3. S. digito postico rotundato mutico.  
 nus. Struthio Camelus americanus. *Raj. av. 36.*  
*Nhanduguacu brasiliensibus. Marcgr. bras. 190. Pis.*  
*bras. 84. Le Touyou Buffon.*  
*Habitat in America australi.*

- cuculla- 4. S. pedibus tetradactylis, omnibus unguiculatis.  
 tus. Gallus gallinaceus peregrinus. *Clus. exot. 99. t. 100.*  
*Olear. mus. 23. t. 13. f. 5.*

- Dronte* Cygnus cucullatus. *Nteremb. nat. 231. Raj. av. 37.*  
*Dronte. Bont. jav. 70.*  
*Habitat in India, Isle de France, Rodrigue etc*  
 V. GAL-



V. GALLINÆ. *Höns.*

*Rostrum convexum: mandibula superiore fornicata, margine extra inferiorem dilatato.*

*Nares membrana cartilaginea convexa semitectæ.*

87. PAVO. *Caput pennis rectis revolutis tectum. Pennæ dorsales elongatæ.*

cristatus. 1. P. capite crista erecta.

Pavo cauda longa. *Fn. suec. 163.*

Pavo. *Gesn. av. 656. Aldr. orn. l. 13. c. 1. Jonst. av. 56. t. 22. Will. orn. 112. t. 27. Raj. av. 51.*

*Habitat in India orientali, Zeylona. Pafogel.*

*Has remigibus primariis ferrugineis, ejulans, vindicans, superbus, togam dorsalem gemmantibus ocellis, nature miraculo pictam erigendamque, tertio anno acquirit, qua nihil pulchrius, sub canicula dejicit. Femina curat pullos in proximas nuptias. Sambuci floribus occiditur.*

bicalcaratus. 2. P. capite lævi, calcaribus duobus.

*Phasianus pavonicus chinensis. Edw. av. 67. t. 67. & t. 69. f. 1.*

*Habitat in China.*

*Pennæ verticis revolutæ. Pennæ posterioris dorsi longæ ocellis pavoninis indicant hoc genus.*

88. MELEAGRIS. *Caput carunculis spongiosis tectum.*

Gallo-pavo. 1. M. capite caruncula frontali, cristaque gulari, maris petore barbato.

*Meleagris. Fn. suec. 164.*

*Gallo-pavo sylvestris novæ anglæ. Raj. av. 51. Alb. av. 3. p. 33. t. 35.*

2. Gallopavo. *Gesn. av. 482. Aldr. orn. l. 13. c. 4. Bell. av. 60. a. Jonst. av. 58. t. 24. Will. orn. 113. t. 27. Raj. av. 51.*



γ. Gallopavo cristatus. *Alb. av. 2. p. 30. t. 33.*  
*Habitat in America septentrionali. Falcon.*  
*Mas exasuat inflato pectore, expansa cauda, sangui-*  
*nea facie, relaxata frontis caruncula: ira tenax; Sa-*  
*pida caro. Redrices XVIII. Barba pectoris tertio*  
*anno excrescit.*

cristata. 2. M. capite pennis erectis cristato, temporibus viola-  
 ceis.

Quan f. Guan. *Edw. av. 13. t. 13.*

Jacupema. *Marcgr. bras. 193.*

Coxolitli. *Hern. mex. . .*

Phasianus brasiliensis. *Raj. av. 56.*

*Habitat in America australi.*

*Gula caruncula compressa rubra ut in antecedente, ca-*  
*pite supra crista oblonga pennacea.*

Satyra. 3. M. capite cornibus duobus, corpore rubro punctis  
 nigris albo foetis. †

Phasianus cornutus. *Edw. av. 116. t. 116.*

*Habitat in Benghala.*

*Frons nigra. Caruncula gularis cerulea rufa variegata.*

*Cornua duo cerulea pone oculos enata.*

89. CRAX. *Rostrum basi cera obtectum.*

*Pennæ caput tegentes revolutæ.*

nigra. 1. C. nigra. *Syst. nat. 27.*

*Gallus indicus. Sloan. jam. 2. p. 302. t. 260. Dodart.*  
*mem. 146.*

*Gallus indicus alius. Aldr. orn. . .*

*Mitu f. Mlutu. Will. orn. . . t. 28. Raj. av. 52.*

*Marcgr. bras. 194, 195.*

*Gallus carassavicus. Aldr. av. 2. p. 29. t. 31. 32.*

*Habitat in America australi.*

rubra. 2. C. rubra, capite cærulescente. †

*Gallina peruviana rubra. Alb. av. 3. p. 37. t. 40.*

*Habitat in America.*

*An varietas præcedentis?*



90. PHASIANUS. *Genæ cute nuda lævigata.*

- Gallus. 1. P. cauda compressa adscendente. *Fn. spec. 165.*  
 Gallus gallinaceus f. Gallina. *Gesn. av. 395. 340. Aldr. orn. l. 14. c. 1. Will. orn. 109. t. 26. Raj. av. 51.*  
*orn. l. 14. c. 1. Will. orn. 109. t. 26. Raj. av. 51.*
- cristatus. 2. Gallina crista in vertice plumosa densissima. *Raj. av. 51. Johnston.*
- ecaudatus. 3. Gallina cauda f. uropygio carens. *Gurushona Raj. av. 51.*
- crispus. 4. Gallina frislandica. *Will. orn. 110. Krollhons*  
 Gallina crispa. *Raj. av. 51. Aldr. orn. l. 14 p. 329.*
- pusillus. 5. Gallus tibiis pennatis.  
 Gallina bentamensis. *Alb. av. 3. p. 33. t. 33. 34.*  
*Habitat in India Orientali: Pouli candor, &c.*  
 Gallus pugnax, superius celsa crista, erecta falcataque cauda, vigil, plaudentibus lateribus canens gallicinia, falax 10. feminis succit. Gallina pultratrix ova copiosa ponit, raro subventanea, nisi Capis associata; cibus expetita ova, caro, juscula galli senioris. Leditur bacci Sambuci; a pediculis liberatur pipere.
- Meleagris. 2. P. vertice calloso, temporibus carunculatis.  
 Gallina vertice corneo. *Hoffelqv. iter. 274.*  
 Gallus vertice corneo. *Syst. nat. 28.*  
 Gallina guinea. *Worm mus. 297. Perllions*  
 Gallina africana. *Manegr. bras. 79. La Peinture de Buffon*  
 Gallus niger, maculis ovalibus & orbiculatis. *Barr. av. 79.\**  
 Gallina guineensis. *Worm. mus. 297. t. 297. Olear. mat. . t. 15. f. 3. Raj. av 52. Alb. av. 2. p. 32. t. 35. Will. orn. 162. t. 26. Aldr. av. l. 14. c. 13.*  
*Habitat in Africa.*
- colchicus. 3. P. rufus, capite cæruleo.  
 Phasianus. *Raj. av 56. Alb. av. i. p. 24. t. 25. 26.*  
*Olin. av. 49. Aldr. orn. l. 13. c. 5.*  
*Habitat in Africa, Asia.*  
*Principum mensis dicatus.*
- pictus. 4. P. crista flava, pectore coccineo, remigibus secundariis cæruleis. *Amœn. acad. 1. p. 282. t. 13.*  
 Phasianus variis coloribus splendidus. *Edw. av. 68. t. 68. & t. 69. f. 2.*  
 Phasianus ruber, e china. *Alb. av. 3. p. 34. t. 36.*  
*Habitat in China.*



- nycthe- 5. P. albus, crista abdomineque nigris.  
merus. Phasianus sinensis albus e nigro cæruleus. *Alb. av. 3.*  
*p. 35. t. 37. Edw. av. 66. t. 66.*  
*Habitat in China.*  
Tempora *nuda rubra.* Maris *crista nigra.* Femina  
*grisea est.*

91. TETRAO. *Supercilia nuda, papillosa.*\* *Pedibus hirsutis.*

- Urogal- 1. T. pedibus hirsutis, reſtricibus exterioribus subbreviori-  
lus. bus, axillis albis. *Fn. ſvec. 166.*  
Urogallus ſ. Tetrao major. *Gefn. av. 491. Aldr. orn.*  
*l. 13. c. 6. Will. orn. 123. t. 30. Raj. av. 53.*  
Muscovian. *Alb. av. 2. p. 25. t. 29 30.*  
*Habitat in Europæ frigida pinetis paludofis. Siæder.*  
*Exæſtuat in arboribus, efflans tinnitu tamquam ecſtaſi*  
*corripitur.*
- Tetrix. 2. T. pedibus hirsutis, cauda bifurcata, remigibus ſecun-  
dariis baſin verſus albis. *Fn. ſvec. 168.*  
Tetrao ſ. Urogallus minor. *Gefn. av. 494. Aldr. orn.*  
*l. c. 7. Will. orn. 124. t. 31. Raj. av. 53. Alb.*  
*av. 1. p. 22. t. 22.*  
*Habitat in Europæ frigida Ericetis, Betuletis. Orre.*  
*Exæſtuat in campis obmurmurans erecta cauda tumidis-*  
*que ſuperciliis, ſibilo efflans; hieme ſæpe nive ſepelitur;*  
*ova excludens odore privatur.*
- canaden- 3. T. pedibus hirsutis, reſtricibus nigris apice fulvis, litu-  
ſis. ris duabus albis ad oculos.  
Urogallus maculatus canadensis. *Edw. av. 118. t. 118.*  
*mas. ♂ 71. t. 71. femina.*  
*Habitat in Canada.*
- Lagopus. 4. T. pedibus lanatis, remigibus albis, reſtricibus nigris a-  
pice albis: intermediis totis albis.  
Tetrao reſtricibus albis: intermediis nigris apice albis.  
*Fn. ſvec. 169.*  
Lagopus. *Gefn. av. 577. Aldr. orn. l. 13. c. 21. Will.*  
*orn. 127. t. 32. Raj. av. 55. Edw. av. 72. t. 72.*  
*Habitat in Europæ alpinis, ex Betula nana rictitans. Snortipa.*



*Pedibus lamatis leporis; hyeme albus exceptis rectricibus, sub nive sapius cuculos agens; in sylvis loquax cachinnis. Habitat in Lapponia et Norland.*

Phasianellus. 5. T. pedibus hirsutis, cauda cuneiformi, rectricibus tribus lateralibus albis.  
Urogallus minor, cauda longiore. *Edw. av. 117. t. 117.*  
*Habitat in Canada.*

Cupido. 6. T. pedibus hirsutis, alis succenturiatis cervicalibus.  
Urogallus minor fuscus, cervice plumis alas imitantibus donata. *Catesb. car. 3. p. 1. t. 1.*  
*Habitat in Virginia.*  
Color *Tetricis feminae*; vertex *subcristatus*; a tergo colli due parvae alae: singulae pennis quinque.  
Contr. Phasianus Pennsylvanicus. *Act. angl. 48. p. 499. t. 15.*

Bonasia. 7. T. pedibus hirsutis, rectricibus cinereis punctis nigris fascia nigra: exceptis intermediis duabus. *Fn. svec. 170.*  
*Gallina corylorum. Gesn. av. 229. Aldr. orn. l. 13. c. 11. Will. orn. 126. t. 21. Raj. av. 55.*  
*Habitat in Europæ Coryletis. Hierpe.*  
*Fistula dulce canit volucrem dum decipit auceps.*  
\* \* *Pedibus nudis.*

rufus. 8. T. rostro pedibusque sanguineis, gula alba cincta fascia nigra albo-punctata  
Tetrao rectricibus cinereis: superiore medietate hinc inde rufis. *Fn. svec. 171.*  
*Perdix rufa l. major. Gesn. av. 682. Aldr. orn. l. 13. c. 18. Jonst. av. 68. t. 27. Will. orn. 118. t. 29. Raj. av. 57. Alb. av. l. p. 29. t. 29.*  
*Habitat in Europa australiori. Arctioma.*

Perdix. 9. T. pedibus nudis, macula nuda coccinea pone oculos, cauda ferruginea, sterno brunneo. *Fn. svec. 172.*  
*Perdix cinerea. Aldr. orn. l. 13. c. 19. Jonst. av. 68. t. 27. f. 1. Will. orn. 119. t. 29. Raj. av. 57. Alb. av. l. p. 25. t. 27.*  
*Habitat in Europæ agris. Rapphona.*  
*Hyeme habitat intra fossas nivis utraque extremitate a-*  
*pertas.*



- virginia- 10. T. pedibus nudis, fascia nigra supra & infra oculos,  
nus. linea verticali fulva.  
Perdix virginiana. *Catesb. car. 3. p. 12. t. 12.*  
*Habitat in America.*
- marilan- 11. T. pedibus nudis, cervice albo nigroque punctata.  
dicus. Perdix novæ anglia. *Alb. av. 1. p. 26. t. 28.*  
*Habitat in America.*  
*In Perdice rufa sunt puncta alba in disco nigro infra  
guttur versus pectus, in hac vero ejusmodi a tergo  
colli, nec pedes rubri.*
- orienta- 12. T. pedibus antice pilosis: abdomine gulaque atra, col-  
lis. lari ferrugineo, cauda cuneiformi.  
Tetrao orientalis. *Hasselq. it. 278. n. 43. L. Atlasas Bunn*  
Perdix damascena. *Will. orn. 128*  
Francolin. *Tournef. it. 1. p. 158. t. 158.*  
*Habitat in Oriente. e' Europa. tuffraici*
- Cotur- 13. T. pedibus nudis, corpore griseo-maculato, superciliis  
nix. albis, rectricibus margine lunulaque ferruginea. *Fn.*  
*svec. -173.*  
Coturnix. *Gesn. av. 353. Aldr. orn. l. 13. c. 22. Jonst.*  
*av. 69. t. 28. Raj. av. 58. Alb. av. 1. p. 28. t. 30.*  
Tetrao israelitarum. *Hasselq. it. 279. n. 44. M.*  
*Habitat in Europa, Asia, Africa.*  
*Pennæ corporis ferruginæ linea longitudinali albida.*  
*Chinenses vivum portando manus calefaciunt. Osb. itin.*  
*190.*

L

VI. PAS-



## VI. PASSERES. STAFFWAR

*Rostrum conicum, acuminatum.*

*Nares ovatae, patulae, nude.*

92. COLUMBA. *Rostrum rectum, versus apicem descendens:*

*Nares oblongae, membrana molli tumida semitectae.*

*Lingua integra.*

Oenas. 1. *C. caerulea*, collo supra viridi-nitente, fascia alarum apiceque caudae nigricante. *Fr. suec.* 174.

Oenas f. *Vinago*. *Aldr. orn.* 1. 15. c. 7. *Will. orn.* 126. t. 35. *Raj. av.* 62. *Alb. av.* 3. p. 39. t. 42. 44.

domestica. 2. *Columba domestica*. *Will. orn.* 130. t. 32. *Raj. av.* 59. *Habitat in Europa. Disswa.*

*Domestica parit quovis mense pullos duos, per 9. partus annuos, quod intra 4 annos adscenderet ultra 15000; vetita melancholicis; Antequam cocant prius osculantur; intra ingluviem macerata grana in os pulli evomunt; Mas & femina alternis vicibus incubant; alterque alteram compellit.*

gutturo- 2. *C. pectore inflato.*  
sa. *Columba gutturosa*. *Will. orn.* 121. t. 34. *Raj. av.* 60. *Habitat. . .*

cuculla- 3. *C. pennis occipitis reflexo- erectis.*  
ta. *Columba cucullata* f. *Jacobæa*. *Raj. av.* 60. *Alb. av.* 3. p. t. 43.  
*Columba anglica* f. *russica*. *Gesn. av.* 279. *Habitat. . .*

Turbita. 4. *C. pennis in pectore recurvatis.*  
*Columba turbita dicta*. *Raj. av.* 60. *Will. orn.* 132. *Habitat. . .*

tremula. 5. *C. cauda erecta multipenni patula.*  
*Columba tremula laticauda*. *Raj. av.* 60. *Habitat. . .*



- tabellaria. 6. *C. cera lata verrucosa, palpebris nudis.*  
*Columba equestris. Alb. av. 2. p. 30. t. 45.*  
*Columba tabellaria. Raj. av. 65.*  
*Habitat. . .*  
*Longissime licet deportata festinanter domum redit, hinc olim literas affigerunt per coelum eunti nuncio.*  
*Utrum antecessores omnes species vere distinctae sint, docebit aliquando Anatomia.*
- montana. 7. *C. obscure rufa, subtus flava, orbita oculorum nuda sanguinea.*  
*Columba minor fulva. Edw. av. 119. t. 119. Sloan. jam. 2. p. 304. t. 261. f. 1.*  
*Perdix montana. Raj. av. 183.*  
*Habitat in Jamaica.*  
*Macula alba sub oculis, gula & ad axillas.*
- asiatica. 8. *C. rectricibus cinereis apice albis: intermediis fuscis, orbita oculorum nuda caerulea.*  
*Turtur indicus fuscus. Edw. av. 75 t. 76.*  
*Columba asiatica media, iride crocea, palpebris imprimis caeruleis. Brown. jam. 468.*  
*Habitat in Indiis.*
- guinea. 9. *C. rectricibus cinereis apice nigris, orbita oculorum nuda rubra.*  
*Columba maculis triquetris. Edw. av. 75. t. 75.*  
*Habitat in Africa.*
- hispanica. 10. *C. cinerea, remigibus rectricibus plumis pedum rostroque albis. It. Wgot. 8.*  
*Habitat. . .*
- Palumbus. 11. *C. rectricibus postice atris, remigibus primoribus margine exteriori albidis, collo utriusque albo.*  
*Columba collo utrinque albo, postice inacula fusca. In. svec. 175.*  
*Palumbus torquatus. Aldr. orn. 1. 15. c. 5. Will. orn. 135. t. 15. Raj. av. 62. Alb. av. 2. p. 42. t. 46.*  
*Habitat in Europa, Asia. Ringduswa.*  
*Gregatim volant, agris satis infestae.*
- cyanoccephala. 12. *C. capite caeruleo.*  
*Turtur jamaicensis. Alb. av. 2. p. 45. t. 49.*  
*Habitat in America.*



- leucoce- 13. *C. cærulefcens*, vertice depresso albo.  
phala. *Columba capite albo. Catesb. car. 1. p. t. 25. Sloan. jam. 2. p. 303. t. 261.*  
*Columba minor leucocoryphos. Raj. av. 184.*  
*Habitat in America feptentrionali.*
- leucopte- 14. *C. palpebris nudis cæruleis, iridibus oculorum fulvis.*  
ra. *Turtur indicus fufcus. Edw. av. 76. t. 76.*  
*Columba fubfufca media, iride crocea, palpebris impin-*  
*nis cæruleis. Brown. jam. 468.*  
*Habitat in America.*
- nicobari- 15. *C. cauda alba, corpore nigro, remigibus cæruleis,*  
ca. *dorfo viridi-nitente, pennis colli elongatis.*  
*Columba e nicombar. Alb. av. 3. p. 44. t. 47. 48.*  
*Habitat in infula Nicombar prope Pegu indicum.*
- macrou- 16. *C. cauda cuneiformi longa, pectore purpurafcente.*  
ra. *Columba macroura. Edw. av. 15. t. 15.*  
*Palumbus migratorius. Catesb. car. 1. p. 23. t. 23.*  
*Habitat in Canada; bybernat in Carolina.*
- finica. 17. *C. reëtricibus dorfoque fufcis, abdomine fanguineo,*  
*alis flavis, remigibus nigris.*  
*Columba finica. Alb. av. 3. p. 43. t. 46.*  
*Habitat in China.*
- indica. 18. *C. corpore purpureo, humeris viridibus, fuperciliis*  
*albis.*  
*Columba alis viridibus. Edw. av. 14. t. 14.*  
*Habitat in India orientali.*  
*Pileus cærulefcens. Remiges primores nigræ. Reëtrices*  
*nigræ, fed laterales cinereæ. Flexura alarum nigra*  
*albo punctata.*
- hifpida. 19. *C. plumis minimis erectis per dorfum alasque di-*  
*fperfis.*  
*Habitat in Africa?*
- Turtur. 20. *C. reëtricibus apice albis, dorfo grifeo, pectore incar-*  
*nato, macula laterali colli.*  
*Turtur. Will. orn. 134. t. 35. Raj. av. 61. Alb. av.*  
*2. p. 43. t. 47.*  
*Habitat in India.*



- riforma. 21. C. supra lutescens, lunula cervicali nigra.  
 Turtur indicus. Aldr. orn. t. 15. c. 9. Will. orn. 134  
 t. . . Raj. av. 61. n. 3. Alb. av. 3. p. 42. t. 45.  
 Habitat in India, nobis communis Turtur.
- passerina. 22. C. rectricibus remigibusque obscurioribus, corpore  
 purpurascente, rostro pedibusque flavis.  
 Turtur minimus guttatus. Sloan. jam. 2. p. 305. t.  
 261. f. 3. Catesb. car. 1. p. 26. t. 26.  
 Turtur minimus, alis maculosis. Raj. av. 184. n. 25.  
 Turtur barbadensis minimus. Raj. av. 62. n. 5. Will.  
 orn. 135. t. 36.  
 Columba sylvestris minima brasiliensis. Raj. av. 62. n. 6.  
 Picuipinima. Marcgr. bras. 204.  
 Habitat in America inter tropicos.  
 Alæ extus in rectricibus punctis s. maculis fuscis ad-  
 spersæ.

93. ALAUDA. Rostrum cylindrico - subulatum, re-  
 ctum, recta protensum: Man-  
 dibulis æqualibus, basi deor-  
 sum dehiscentibus.

Lingua bifida.

Unguis posticus rectior, digito lon-  
 gior.

- arvensis. 1. A. rectricibus extimis duabus extrorsum longitudinally-  
 ter albis: intermediis interiori latere ferrugineis. Fr.  
 svec. 190.  
 Alauda non cristata. Gesn. av. 78. Aldr. orn. 1. 3. t. 12.  
 Alauda vulgaris. Will. orn. 149. t. 40. Raj. av. 69.  
 n. 1. Alb. av. 1. p. 39. t. 41.  
 Alauda arborum. Frisch. av. 3. t. 15. f. 1.  
 Alauda cœlipeta. Klein. av. 712.  
 Habitat in Europæ apricis. Larva  
 Volata perpendiculari in aëre suspensa cantillat:  
 Ecce suum tirile, tirile, suum tirile tractat;  
 Autumno sole occidente in retia compellitur.  
 Hyeme pinguescit in australioribus carne sapidissima zj.  
 Calculosis noxia.

L 3

2. A.

Columbas ad Passeres nec ad Gallinas pe. . . . . ecet monogamia, . . . . .  
 batus alternus, nutritio pulli, Ova pauca, nidificatio, locus in altis.



- pratensis. 2. A. rectricibus extimis duabus extrorsum albis, linea superciliarum alba. *Fn. suec. 191.*  
 Alauda pratorum. *Adr. orn. l. 18. c. 15. Will. orn. 150. Raj. av. 69. n. 3. Olin. av. 27.*  
 Alauda sylvestris. *Alb. av. 1. p. 40. t. 42.*  
*Habitat in Europæ pratis, arboribus et jam insidet*
- arborea. 3. A. capite vitta annulari alba cincto.  
 Alauda rectricibus fuscis: prima oblique dimidiato-alba, secunda tertia quarta macula alba cuneiformi.  
*Fn. suec. 192.*  
 Alauda arborea. *Will. orn. 149. Raj. av. 69. n. 2.*  
*Habitat in Europa, gregaria volitans.*
- campestris. 4. A. rectricibus fuscis inferiori medietate, exceptis intermediis duabus, albis, gula pectoreque flavescente.  
*Fn. suec. 193.*  
 Alauda minor campestris. *Will. orn. 150. Raj. av. 70. n. 6.*  
*Habitat in Europa.*
- trivialis. 5. A. rectricibus fuscis: extrema dimidiato alba, secunda apice cuneiformi alba, linea alarum duplici albida.  
*Habitat in Svecia, in arborum summitate.*
- cristata. 6. A. rectricibus nigris: extimis duabus margine exteriori albis, capite cristato.  
 Alauda cristata major. *Raj. av. 69. Will. orn. 151. t. 40. Olin. av. 13. Alb. av. 3. p. 48. t. 52. Adr. orn. l. 18. c. 18.*  
*Habitat in Europæ viis.*
- Spinoletta. 7. A. rectricibus fuscis: extimis duabus oblique dimidiato-albis †  
 Spinoletta florentinis. *Raj. av. 70. Will. orn. 152.*  
*Habitat in Italia.*
- alpestris. 8. A. rectricibus dimidio inferiore albis, gula flava, fascia suboculari pectoralique nigra.  
 Alauda gutture flavo. *Catesb. car. 1. p. 32. t. 32.*  
*Habitat in America septentrionali, & visa a Kleinio Gedani.*  
 Corpus supra fuscum. Guttur ad pectus usque flavum. Abdomen album. Pectorale transversum nigrum. Fascia nigra, obtusa, pone sinum oris.



magna. 9. A. subtus flava, fascia pectorali curvâ nigra : rectricibus tribus lateralibus albis.

Alauda magna. *Catesb. car. 1. p. 33. t. 33.*

*Habitat in America, Africa.*

Corpus scolopacinum, magnitudine Turli, totum subtus flavissimum. Pectus macula magna nigricante lunari.

Remiges fuscae : secundariæ testaceo maculatae.

Cauda rotundata : Rectrices 3 laterales maximum partem albe. Unguis robustus penam aequans, et magis curvus quam in reliquis. Rostrum rectum : Maxilla superior teretiuscula, basi nuda.

94. STURNUS. Rostrum subulatum, angulato-depressum, obtusiusculum : Mandibula superiore integerrima, marginibus parviusculis.

*Nares supra marginatæ.*

*Lingua emarginata, acuta.*

vulgaris. 1. S. rostro flavescente, corpore nigro punctis albis.

*Fn. juv. 183.*

Sturnus. *Gesn. av. 747. Bell. av. 81. a. Aldr.*

*orn. 1. 16. c. 19. Will. orn. 144. t. 37. Raj. av. 67.*

*n. 1. Alb. av. 1. p. 38. t. 40. Olin. av. 18. Has-*

*selqv. itin. 284. Stare.*

*Habitat in Europa, Africa, victitans insectis. Nidificat in cavis arborum; migrat in Scaniam; garrula imitatrix; Mas nitens; gregaria avis.*

Luteolus. 2. S. luteus, capite fusco, pectore maculato, alis fuscoluteis.

Sturnus luteus benghalensis. *Edw. av. 106 t. 186.*

Pica maderapataua sturni ad instar maculata. *Raj. av.*

*195. n. 7. t. 1. f. 7.*

*Habitat in India.*

Contra. 3. S. fuscus, macula oculari fascia alari abdomineque albis.

Sturnus ex albo & fusco varius benghalensis. *Edw.*

*av. 187. Alb. av. 3. p. 20. t. 21.*

*Habitat in India.*



Cinclus. 4. *S. niger*, pectore albo.

*Motacilla* pectore albo, corpore nigro. *Fn. suec.* 216.

*Merula aquatica.* *Gesn. av.* 609. *Aldr. orn.* l. 20. c.

54. *Will. orn.* 104. t. 24. *Raj. av.* 66. n. 7. *Alb.*

*av.* 2. p. 36. t. 39. *Walnflare.*

*Habitat in Europa ad aquas: Hyeme ad cataractas, fontesque non congelandos, ubi descendit per voragine voratura Oniscos aquaticos Insectaque alia: emergitque non palmipes, hyeme solitaria, æstate plerunque gemina versatur. Mere insectivora nec granivora, naribus lamina fere clausis distincta a Motacillis.*

95. TURDUS. *Rostrum* tereti - cultratum, maxilla superiore apice deflexo.

*Nares* nudæ, superne membranula semitectæ.

*Lingua* lacero - emarginata.

viscivo- 1. *T. dorso* fusco, collo maculis albis, rostro flavescente.

rus. *Turdus viscivorus major.* *Raj. av.* 64. n. 1. *Will.*

*La Draine* *orn.* 137. *Aldr. orn.* l. 16. c. 1.

*Habitat in Europa.*

*Buffon* *Sibimet ipsi malum cacat disseminator Visci, Ilicisque.*

pilaris. 2. *T. rectricibus* nigris: extimis margine interiore apice albicantibus, capite uropygioque cano. *Fn. suec.* 188.

*La Létome* *Turdus pilaris.* *Gesn. av.* 753. *Aldr. orn.* l. 16. c. 3.

*Buffon* *Will. orn.* 138. t. 37. *Raj. av.* 64. n. 3. *Alb. av.*

1. p. 34. t. 36. *Frisch. av.* . . t. 26. f. 1. 2. *Olin.*

*av.* 25.

*Habitat in Europa. Kramvogel, Snöskata.*

*Romani in ornithone maxima diligentia alebant Turdos, altilis reddebant, care pendebant, teste Varrone, Plutarcho.*

*Nil melius Turdo, nil vulva pulchrius ampla. Horat.*

iliacus. 3. *T. alis* subtus flavescantibus, rectricibus tribus laterali- bus apice utrinque albis.

*Turdus iliacus.* *Raj. av.* 64. n. 4. *Klein. av.* 66.

*Aldr. orn.* l. 16. c. 4.

*Turdus viscivorus maurus.* *Alb. av.* 1. p. 31. t. 33.

*Habitat in Europa.*



*Linea nulla superciliarum alba. Caro ob amaritiam minus accepta.*

musicus. 4. T. alis subtus ferrugineis, linea superciliarum albicante. *Fn. suec. 189.*

Turdus simpliciter dictus viscivorus minor. *Will. orn. 135. t. 37. Raj. av. 64. n. 2.*

Turdus musicus. *Frisch. av. t. 27. f. 1. 2. Alb. av. 1. p. 32, 33. t. 35, 34.*

*Habitat in Europæ sylvis; nido ex luto. Kladrá La Grive Bay. E summitate arboris verè Lusciniam cantilena imitatur, Disseminator cum præcedentibus Juniperi.*

Canorus. 5. T. griseus, subtus ferrugineus, linea alba ad latera capitis, cauda rotundata. *Chin. Lagerstr. 11.*

Turdus chinensis. *Osborn. it. 309.*

Turdus fuscus benghalensis non maculatus. *Edw. av. 184. t. 184.*

Baniah bove benghala. *Alb. av. 3. p. 18. t. 19.*

*Habitat in Benghala, China.*

rufus. 6. T. ferrugineus subtus dilutior maculatus, remigibus unicoloribus, cauda rotundata.

Turdus rufus. *Catesb. car. 1. p. 28. t. 28.*

*Habitat in America septentrionali & meridionali.*

polyglot-7. T. obscure cinereus, subtus pallide cinereus, macularum albida.

Turdus minor cæruleo-albus immaculatus. *Sloan. jam. 2. p. 306. t. 256. f. 3. Catesb. car. 1. p. 27. t. 27.*

*Raj. av. 185. n. 31.*

Mocking-bird. *Kalm. itin. 2. p. 335.*

*Habitat in Virginia. Carolina, Jamaica.*

*Eximia voce cantillat & cantu destruitur.*

Orpheus. 8. T. dorso fusco, pectore rectricibusque lateralibus albidis, alis fascia alba. *Brown. jam. 469.*

Turdus cinereus minor. *Edw. av. 78. t. 78.*

*Habitat in America.*

*Cauda longa rotundata. Rectrices extimæ albæ. E terra elevatus cantilena spectatorem rapit in sui admirationem.*

plumbeus. 9. S. cærulescens, gula atra.

Turdus viscivorus plumbeus. *Catesb. car. 1. p. 30. t. 30.*

*Habitat in America.*



crinitus. 10. T. capite colloque cærulescente, abdomine flavescen-  
te, dorso virescente, rectricibus remigibusque rufis,  
capite cristato.

*Le Mouchevole  
à huppe verte.*

*Buffon Tom VIII  
pag. 379.*

Muscicapa cristata, ventre luteo. Catesb. car. 1. p. 52.

t. 52.

Habitat in America.

*Le Gobe Mouche huppé  
de Virginie Buffon*

roseus. 11. T. subincarnatus, capite alis caudaque nigris, occipi-  
te cristato.

Merula rosea, Aldr. orn. l. 16. c. 15. Will. orn. 143.

Raj. av. 67. Edw. av. 20. t. 20.

Turdus roseus, capite ex nigro cæruleo & cirrho retro  
compto, alis & cauda nigris. Klein. av. 71.

Habitat in Lapponia, Helvetia.

Merula. 12. T. ater, rostro palpebrisque fulvis. Fn. suec. 184.

Merula, Bell. av. 30. b. Gesn. av. 603. Aldr. orn.

l. 16. c. 6. Will. orn. 140. t. 37. Raj. av. 65. n.

1. Alb. av. 1. 35. t. 37. Frisch. av. 27. f. 1. 2.

Olin. av. 29.

Habitat in Europæ sylvis, Juniperi disseminator.

Femina fusca est. Pullus primo anno, etiam masculus,  
rostro nigro. *Kältraft.*

torqua- 13. T. nigricans, torque albo, rostro flavescente. Fann.  
tus. suec. 185.

Merula torquata. Gesn. av. 607. Aldr. orn. l. 16. c.

11. Will. orn. 143. t. 37. Raj. av. 65. n. 2. Alb.

av. 1. p. 37. t. 39. Frisch. av. 30. f. 1. 2.

Habitat in Europa. in sylvis montanis.

solitarius. 14. T. cæruleus, remigibus rectricibusque nigris, abdomi-  
ne lineolis cinereis undulato.

Passer solitarius. Willing. orn. 191. Raj. av. 66. Edw.

av. 18. t. 18. Olin. av. 14. Act. Ups. 1750. p. 21.

Habitat in Oriente. *et Australi Europa*

Mas cæruleus; Femina cinerea, subtus lineolis albis &  
cinereis undulata. *Le. Merle Bleu Buffon*

arundina- 15. T. griseus, subtus albidus lineolis transversis lunatis  
ccus. fuscis, pedibus cærulescentibus.†

Turdus mulicus palustris dumetorum arundinum. Klein.  
av. 179. f. 3.

Habitat in Arundinetis Europæ septentrionalis.



*Mas indefinenter cantillans, toto die, sub incubatu Fe-  
minæ in terra nidulantis. Klein.*

virens. 16. T. nigro-virens, subtus lutescens, superciliis albis.  
Oenanthe americana, pectore luteo. *Catesb. car. 1. p.  
50. t. 50.*  
*Habitat in America.*

96. LOXIA. *Rostrum* conico-gibbum, fronte sub-  
calvum: Mandibula inferior margi-  
ne laterali inflexa.  
*Nares* in basi rostri.  
*Lingua* integra,

Curviro- 1. L. rostro forficato. *Fn. svec. 177. Korsnäs*.  
ltra. *Loxia. Gesn. av. 592. Aldr. orn l. 12. c. 47. Charl.  
onom. 68. t. 68. Will. orn. 181. t. 44. Raj. av. 86.  
Alb. orn. 1. p. 58. t. 61. Frisch. av. 2. t. 11.  
f. 3. 4.*  
*Habitat in Europæ Abietis, strobilos enucleans, at non  
in ipsa arbore, disseminator Abietis rostro singulari.*

Cocco- 2. L. linea alarum simplici alba, rectricibus latere tenuiore  
thraustes. baseos albis.  
*Coccothraustes. Gesn. av. 276. Aldr. ornith. l. 16. c.  
20. Forst. av. . . t. 37. Charlet. onom. 84. t. 85.  
Olin. av. 37. Raj. av. 85. Alb. orn. 1. p. 54. t.  
56. Edw. av. 188. t. 188. It. scan. 332. n. 1.\*  
Frisch. av. 1. t. 4. f. 2. 3.*  
*Habitat in Europa australiori, Cerasa enucleans, dis-  
seminans.*

Enuclea- 3. L. linea alarum duplici alba, rectricibus totis nigrican-  
tor. tibus. *Fn. svec. 176. Srenok Papegoja, Parisfogel*  
*Rubicilla maxima canadensis. Edw. av. 123. t. 123.  
124.*  
*Habitat in Sveciæ summa, Canadæ Pinetis, visitans  
strobilis; disseminator Pini. Noctu egregie canorus;  
migrat hyeme ad australes Sveciæ provincias, Uplän-  
liam transit sine octobris. Junior ruber, Senior flavus.*

Pyrrhula. 4. L. artubus nigris. tectricibus caudæ remigumque postri-  
carum albis. *Fn. svec. 178. Domstierre*.



- Rubicilla s. Pyrrhula. *Gesn. av.* 733. *Aldr. orn.* l. 17. c. 31. *Fonst. av.* . . t. 43. *Will. ornith.* 130. t. 43. *Raj. av.* 86. *Alb. orn.* 1. t. 59. 60. *Frisch. av.* . . t. 2. f. 1. 2. *Olin. av.* 40.  
*Habitat in Europæ sylvis, Sorbi disseminator.*  
*Mas subtus ruber, Femina subtus fusco-cinerea.*
- Cardina- 5. L. rubra, facie nigra. *Chin. Lagerstr.* 13.  
 lis. *Cardinalis.* *Will. orn.* 245. t. 44. f. 8.  
*Coccothraustes capensis ruber, rostro hiante.* *Pet. gaz.* 16. t. 16. f. 7.  
*Coccothraustes rubra.* *Catesb. car.* 1. p. 38. t. 38.  
*Frisch. ornith.* 1. t. 4. f. 1.  
*Coccothraustes indica cristata.* *Alb. orn.* 1. p. 55. t. 57. & 3. t. 61. *Aldr. orn.* l. 16. c. 21. *Raj. av.* 85.  
*Psittacus cristatus ruber.* *Seb. mus.* 1. p. 96. t. 60. f. 4.  
*Habitat in America septentrionali.*
- Domini- 6. L. nigra, capite gulaque coccineis, pectore abdomine  
 cana. remigumque margine albis. *Chin. Lagerstr.* 14.  
*Rubicilla americana.* *Will. orn.* 180. *Raj. av.* 86.  
*Cardinalis dominicanus.* *Edw. av.* 127. t. 127.  
*Gviralivica.* *Marcgr. bras.* 211.  
*Habitat in Brasilia.*
- cristata. 7. L. albicans, fronte cristata, uropygio pedibusque rubris, rectricibus intermediis longissimis.  
*Habitat in Æthiopia.* *J. Burmannus.*  
*Avis inter maximas sui generis. Crista Maris rubra, Feminae alba. Pectus in mare rubrum. Rectrices cinereae: intermediae duae duplo longiores.*
- mexica- 8. L. rubra, alis nigris.  
 na. *Avis mexicana rubra passeris species.* *Seb. mus.* 1. p. 101. t. 95. f. 1.  
*Habitat in America australi.*
- eryoce- 9. L. cinerascens, capite purpurascente, pectore albo maculato.  
 phala. *Passer paradisaus, capite rubro, pectore nigro albo maculato.* *Edw. av.* 180. t. 180.  
*Habitat in Africa.*



Corpus supra cinereum, griseo maculatum; subtus totum fuscum maculis albis rotundis. Alæ fuscæ. Remiges margine griseæ. Cauda nigra, forficata. Caput purpureum.

flavicans. 10. L. flava, dorso virescente, capite fulvo. Chin. Lagerstr. 17.

Habitat in Asia.

oryzivo- 11. L. fusca, temporibus albis, rostro rubro. Chin. Lagerstr. 16.

Loxia remigibus rectricibusque nigris. Mus. Ad. Fr. 1. p. 18.

Fringilla capite & gula nigra, temporibus albis. Osb. iter. 103.

Oryzivora. Edw. av. 41. t. 41, 42.

Passer indicus. Aldr. orn. l. 15. c. 24.

Habitat in Asia & Æthiopia inter Oryzam.

panici- 12. L. nigra, ala spuria alba, rostro incarnato.

vora. Fringilla nigra. Alb. av. 3. p. 65. t. 69.

Habitat in India.

An præcedentis Femina?

punctu- 13. L. ferruginea, abdomine nigro albo-maculato.

lata. Passer indicus fuscus, ventre ex albo & nigro punctato.

Edw. av. 40. t. 40.

Habitat in Asia.

hordea- 14. L. fulva, temporibus albis, cauda pectoreque atris.

cea. Mus. Ad. Fr. 2. p. . .

Habitat in Indiis.

Corpus magnitudine Motacillæ albæ. Grisea sunt Humeri, Femora, Ani regio, margines Rectricum. Nigra sunt Tempora ad rostrum usque, Alæ & Remiges, Cauda & Rectrices, Pectus. Fulva sunt Caput, Collum, Uropygium.

sanguini- 15. L. grisea, subtus alba, rostro pedibusque sanguineis.

rostris. Chin. Lagerstr. 15.

Habitat in Asia.

Astrild. 16. L. grisea fusco-undulata, rostro temporibus pectoreque coccineis.

Waxbill. Edw. av. 179. t. 179.

Habi-



*Habitat in Canariis, America, Africa.*

*Magnitudo Reguli; supra grisea fusco undulata; subtus pectore purpurea. Cauda rotundata, grisea lineolis transversis fuscis numerosis. Rostrum coccineum, gibbum. Fascia coccinea per oculos ducta.*

cyanea. 17. L. carulea, remigibus rectricibusque nigris. *Chineas.*  
*Lagerstr. 13.*  
*Coccythrales caruleus. Edw. av. 125. t. 125.*  
*Habitat in Angola.*

Lineola. 18. L. nigra, linea frontali temporibusque albis.  
*Habitat in Asia.*

*Corpus magnitudine Pari; supra nigrum, e caeruleo nitidum; subtus album. Rostrum nigrum, gibbum. Linea a fronte ad verticem ducta alba. Macula alba supra maxilla inferiore. Remiges nigrae: Primores basi anteriore alba, unde macula alarum alba. Cauda nigra, bifurcata.*

mexicana. 19. L. grisea, fronte gula uropygio superciliisque luteis.  
*Linnæa mexicana, capite flavo. Edw. av. 44. t. 44.*  
*Habitat in America. Mus. DeGeer.*  
*Magnitudo Fringilla. Fasciæ duæ cinerascensque in rectricibus alarum. Cauda integra.*

Chloris. 20. L. flavicanti-virens, remigibus primoribus antice luteis, rectricibus lateralibus quatuor basi luteis.  
*Fringilla eadem. Fn. sec. 202. Svenska.*  
*Chloris. Gess. av. 259. Will. orn. 129. Raj. av. 35. n. 4. Alb. av. 1. p. 56. t. 58. Frisch. av. 1. 8. f. 3. 4. Aldr. orn. 1. 18. c. 18.*  
*Habitat in Europa. in Japibq, ova sex maculis sanguineis. Media quasi inter Loxias & Emberizas, sed rostrum crassius quam in Emberizis.*

butyracea. 21. L. virefcens, fronte superciliis pectore abdomineque flavis, caudæ apice albo.  
*Habitat in India.*  
*Corpus magnitudine & figura Ligurini, viride, fusco maculatum; subtus totum flavum. Frontis & inde linea supra oculos flava. Tempora flava. Cauda nigricans, bifurca, apice alba.*



Collaria. 22. L. flavescens, pectore collarique flavis, temporibus nigris.

*Habitat in Indiis.*

Rostrum *nigrum*. Pedes *f. fci*. Frons *calva*. Genæ *nigræ*. Pectus & *ferme* Collare *nava*. Corpus *viride flavescens*, magnitudine *Pari minimi*.

benghalensis. 23. L. grisea, pileo flavo, temporibus albidis, abdomine albido fusco-maculato.

Passer benghalensis, capite flavo. *Edw. av. 189. t. 189.*

*Alb. av. 2. p. 48. t. 52.*

*Habitat in Benghala.*

malabarica. 24. L. cinerea, remigibus rectricibusque nigris, gula anoque albis.

*Habitat in Indiis.*

Corpus *magnitudine & facie Pari*. Rostrum *nigrum*. Gula *alba*. Remiges & Rectrices *nigræ*. Ani regio *albida*.

fusca. 25. L. fusca, subtus albida, remigibus a tertia ad nonam basi omnino albis. *Chin. Lagerstr. 19.*

*Habitat in Benghala.*

melanocephala. 26. L. lutea, capite atro.

Coccothraustes gambogia. *Alb. av. 3. p. 58. t. 62.*

*Habitat in Gvinea.*

cana. 27. L. cana, remigibus rectricibusque fuscis, pedibus rubris.

Linaria cinerea orientalis. *Edw. av. 179. t. 179. f. 1.*

*Habitat in Asia.*

*Margines rectricum & oris regio albida.*

nigra. 28. L. nigra, macula alba humeri remigumque duarum exteriorum.

Rubicilla minor nigra. *Catesb. car. p. 63. t. 68. Alb. av. 3. p. 65. t. 69.*

*Habitat in America australi.*

caerulea. 29. L. caerulea, alis fuscis fascia bascos purpurea.

Coccothraustes caerulea. *Catesb. car. 1. p. 39. t. 39.*

*Habitat in America.*



- violacea. 30. L. violacea, superciliis gula anoque rubris.  
 Coccothraustes purpurea. *Catesb. car.* 1. p. 40. t. 40.  
*Habitat in America.*
- minuta. 31. L. grisea, uropygio subtusque ferruginea, remigibus  
 4, 5, 6, basi utrinque albis, cauda integra. *Rolander.*  
*Habitat Surinami.*  
*Avicula vix Regulo major; Rostrum breve, crassum,*  
*subobtusum.*
- bicolor. 32. L. fusca, subtus rubra.  
 Rubicilla fusca minima. *Edw. av.* 83. t. 83. f. 1.  
*Habitat in India.*  
*Magnitudo L. minutæ.*

97. EMBERIZA. *Rostrum conicum.*

*Mandibulæ* basi deorsum a se invicem discedentes: inferiore lateribus inflexo-coarctata; superiore angustiore.

- nivalis. 1. E. remigibus albis: primoribus extrorsum nigris, rectricibus nigris: lateralibus tribus albis.  
 Alauda remigibus albis: primoribus extrorsum nigris, rectricibus nigris: lateralibus tribus albis. *Act. Stockh.* 1740. p. 368. t. 1. f. 9. *Fr. suec.* 194. t. 1. f. 194.  
 Pied-Chaffinch. *Alb. av.* 2. p. 50. t. 54. ♂ 3. p. 67. t. 71.  
*Avis ignota piperini. Gesn. av.* 798.  
 Fringilla albicans. *Aldr. orn.* 1. 8. c. 357. t. 15. f. 1.  
 Montifringilla calcaribus alaudæ. *Will. orn.* 187. t. 77.  
*Raj. av.* 88.  
 Miliaria nivis. *Frisch. av.* 2. t. 6. f. 1. 2.  
 Avis nivis. *Martens. spitsb.* 53. t. K. f. B. *Edw. av.* 126. t. 126. *Snoosparf.*  
*Habitat in alpibus Lapponiæ, Spitsbergæ ad sinum Hudsonis alibique, terræ insidens; intensiore hyeme ad nos migrans; avena nutritur, Sapidissima; hyeme alba; noctu vigil.*
- Calandra. 2. E. grisea nigro-maculata. *Fr. suec.* 206. *It. scan.* 292. t. 4.



Emberiza alba. Gesn. av. 570. Raj. av. 92. Will. orn. 195. t. 40. Alb. av. 2. p. 46. t. 50. Olin. av. 50.

Alvode congener. Frisch. av. . . .

Miliaria cana. Frisch. av. . . . t. 6. f. 4.

Habitat in Europa. Kornlämma.

Prædenti valde affinis.

Hortulana. 3. E. remigibus albis: primis tribus margine albidis, rectricibus nigris: lateralibus duabus extrorsum nigris. Fr. Suec. 208.

Hortulanus. Gesn. av. 570. Will. orn. 167. t. 20. Olin. av. 22. Alb. av. 2. t. 50.

Miliaria pingetensis. Frisch. av. 2. t. 3. f. 3. 4.

Habitat in Europa.

Oculorum orbita s. palpebrae unda flavæ, ut oculi annulo flavo circumdantur, et caput subius ad maxillam inferiorem flavum. Transmigrans menosc martii

Citrinella. 4. E. rectricibus nigricantibus: extremis duabus latere interiore macula alba acuta. Fr. Suec. 205.

Emberiza flava. Gesn. av. 653. Will. orn. 196. t. 40. Raj. av. 92. n. 2. Alb. av. 1. p. 63. t. 66.

Luteæ alterum genus. Aldr. orn.

Miliaria lutea. Frisch. av. 2. t. 3. f. 2.

Habitat in Europa, nidificat humi in pratis. Gohlspineck

Hæmæ domestica; æstate colligit larvas Brassicæ.

Orix. 5. E. grisea, fronte abdomineque nigris, collo uropygioque fulvis, rostro nigro.

Partes angolensis; capite nigro, collo & uropygio flavis.

Edw. av. 178. t. 178.

Habitat in Africa interiore.

Quelea. 6. E. dorso griseo, fronte nigra, rostro coccineo.

Habitat in India.

Rostrum coccineum, crassum Loxie, at non incurvum, maxillis emberina. Frons undique circum collum atra. Caput, humeri, Alæ nigro griseoque maculate ut Passeris domesticæ. Pectus & Abdomen albo subincarnatum. Remiges rectricibusque nigricantes margine undique cinereo. Pedes Unguesque incarnati.



- militaris. 7. *E. fusca*, pectore gula humerisque sanguineis.  
*Turdus ater*, pectore coccineo. *Mus. Ad. Fr.* 1. p. 18.  
*Chin. Lagerstr.* 12.  
*Rubicilla fusca major.* *Edw. av.* 82. t. 82.  
*Habitat in America, Asia.*  
*Magnitudo Sturni.* Color supra e scolopacino fuscus, subtus sanguineus. Rostrum basi subcalvum. Remiges fuscae: 1, 2 margine exteriori griseae. Rectrices aequales, fuscae: apice fasciis pallidioribus variae.
- atrata. 8. *E. atra nitens.*  
*Habitat in India.*  
*Tota, etiam rostro, aterrima, corpore supra parum e caeruleo virescente, nitido ut in Corvo; magnitudo Turdi.*
- familiaris. 9. *E. griseo-maculata*, apicibus rectricum albis, dorso postico flavo.  
*Motacilla capite & rostro nigro, uropygio luteo.* *Osborn.* 102.  
*Habitat in Asia.*  
*Corpus magnitudine Ligurini, supra cinereum maculis fuscis, subtus cinereum. Dorsum sub alis & versus caudam flavum. Rectrices caudae albae.*
- flaveola. 10. *E. grisea*, facie flava.  
*Habitat in calidis regionibus.*  
*Corpus magnitudine Ligurini. Frons & Gula flavae.*
- psittacea. 11. *E. cinereo-fusca*, alis fulvis, rectricibus duabus longissimis.  
*Fringilla brasiliensis.* *Seb. mus.* 1 p. 103. t. 66. f. 5.  
*Habitat in America australi.*
- paradisaea. 12. *E. fusca*, pectore rubro, rectricibus duabus longioribus acuminatis, intermediis duabus longissimis.  
*Passer indicus.* *Aldr. orn.* 1. 15. c. 23. *Will. orn.* 184. t. 45.  
*Passer psittacus indicus, cauda longa.* *Pet. gaz.* . . t. 55. f. 1.  
*Passer pectore rubro, cauda longissima.* *Edw. av.* 86. t. 86.  
*Habitat in Africa.*  
*Nigra est sed cervice & pectore coccineo. Deponit quotannis longas caudae pennas, uti Pavo.*



- Ciris. 13. E. capite cæruleo, abdomine fulvo, dorso viridi, pennis viridi-fuscis. *Act. Stockh.* 1750. p. 278. t. 7. f. 1.  
 Fringilla tricolor. *Catesb. car.* 1. p. 44. t. 44.  
 Fringilla tricolor mexicensis. *Edw. av.* 130. t. 130.  
 Fringilla chinensis. *Alb. av.* 3. p. 64. t. 68.  
 β. Linaria cærulea. *Catesb. car.* 1. p. 44. t. 44.  
*Habitat in America.*  
 Caput totum & Collum cæruleum. Dorsum, Alæ Caudaque supra viridia; tota subtus lutea, sed Pectus antice fulvum. ♀. Femina cærulea solo abdomine albo, hieme fere grisea evadit.
- Alario. 14. E. capite pectoreque atro, abdomine albo, alis rubris. *Passer capentis.* *Alb. av.* 3. p. 63. t. 67.  
*Habitat ad Cap. b. Spei.*

98. FRINGILLA. *Rostrum* conicum, rectum, acutum.

- oryzivo- 1. F. fusca, cervice fulva, macula alarum dorsoque postira. co albis.  
 Hortulanus carolinensis. *Catesb. car.* 1. p. 14. t. 14.  
 Emberiza carolinensis. *Klein. av.* 92.  
*Habitat in Cuba, ubi autumnno consumpta Oryza, feminae solæ descendunt in Carolinam.*  
*Femina grisea tota a mare colore differt.*
- cœlebs. 2. F. artubus nigris, remigibus utritique albis: tribus primis immaculatis, rectricibus duabus oblique albis. *Fn. svec.* 199. t. 2. f. 199.  
 Fringilla. *Gesn. av.* 387. *Aldr. orn.* l. 18. c. 6. *Will. orn.* 186. t. 45. f. 4. *Raj. av.* 88. *Alb. av.* 1. p. 60. t. 63. *Frisch. av.* . . t. 1. f. 1. 2. *Olin. av.* 31.  
*Habitat in Europa. Dosithe.*  
*Femina sola migrat per Belgium in Italiam. Mas capite pileato, vere mutato sono æstatem annunciat.*
- Montifringilla. 3. F. alarum basi subtus flavissima. *Fn. svec.* 198. t. 2. f. 198.  
 Montifringilla f. Fringilla montana. *Fonst. av.* 99. t. 38. *Will. orn.* 187. t. 45. f. 5. *Raj. av.* 88. *Alb. av.* 3. p. 60. t. 64. *Frisch. av.* . . t. 3. f. 2, 3. *Olin. av.* 32. *Aldr. orn.* l. 18. c. 7  
*Habitat in Europa. Norqvint.*



- Iulensis. 4. F. fusca, pectore humerisque rufis, alis nigris macula rufa. *Fn. suec.* 197.  
*Habitat in Svecia, ad Sulca West*
- Lapponi- 5. F. capite nigricante maculato: macula pone oculos al-  
ca. ba. *Fn. suec.* 196.  
Fringilla major. *Alb. av.* 3. p. 59. t. 63.  
*Habitat in Lapponia, ad Torneo*
- Sylvatica. 6. F. artibus remigibus rectricibusque nigris: duabus ut-  
trique extimis a medio extrorsum albis. *Fn. suec.*  
200.  
*Habitat in Svecia.*
- melan- 7. F. grisea nigro-punctata, area a rostro per latera col-  
cholica. li atra.  
Embriza fusca americana. *Edw. av.* 85. t. 85.  
*Habitat in America australi.*
- Crythroph- 8. F. nigra rubro relucens, abdomine rufescente, macula  
thalma. alarum alba.  
Passer niger, oculis rubris. *Catesb. car.* 1. p. 34. t. 34.  
*Habitat in America.*
- Cardue- 9. F. remigibus antrorsum luteis: extima immaculata, re-  
lis. cticibus duabus extimis medio reliquisque apice albis.  
*Fn. suec.* 195.  
Carduelis. *Gesn. av.* 242. *Aldr. orn.* 1. 28. c. 3. *Fonst.*  
*av.* 97. t. 37. *Will. orn.* 189. t. 46. *Raj. av.* 89.  
*n.* 1. *Merian. inf.* t. 173. *Alb. av.* 1. p. 61. t. 64.  
*Frisch. av.* . t. 1. f. 3. 4. *Olin. av.* 10.  
*Habitat in Europæ juniperetis; hyeme in capitatis*  
*plantis. Stiglesia.*
- Melba. 10. F. facie caudaque rubris, abdomine albo nigroque un-  
dato, dorso viridi.  
Cardueli affinis viridis. *Edw. av.* 128. t. 128.  
*Habitat in China.*
- Amanda- 11. F. rectricibus purpureis medietate postica atris.  
va. Amandava. *Alb. av.* 3. p. 72. t. 77.  
*Habitat in india orientali.*  
Mas cotis purpureus; Femina cinerea exceptis rostro &  
rectricibus.



- Gyrola. 12. F. viridis, capite rubro, collari flavo, pectore cæruleo.  
 Passer viridis, capite rubro. *Edw. av. 23. t. 23.*  
*Habitat in America.*
- rubra. 13. F. rubra tota.  
 Muscicapa rubra. *Catesb. car. 1. p. 56. t. 56.*  
*Habitat in America.*
- tristis. 14. F. flava, fronte nigra, alis fuscis.  
 Carduelis americana. *Catesb. car. 1. p. 43. t. 43.*  
*Habitat in America septentrionali.*
- Zena. 15. F. capite nigro, fascia alba alarum supra imaque oculos, pectore fulvo.  
 Fringilla bahamensis. *Catesb. car. 1. p. 42. t. 42.*  
*Habitat in America meridionali.*
- brasili- 16. F. cauda cuneiformi, corpore rufescente, temporibus  
 na. uropygio abdomineque violaceis, rostro rubro.  
 Fringilla coloribus rubro & cæruleo brasiliensis. *Edw. av. 191. t. 191.*  
*Habitat in Brasilia.*
- butyra- 17. F. viens, superciliis pectore abdomineque flavis, re-  
 cea. migibus primariis in parte anteriore albis.  
 Charis indicus. *Edw. av. 84.*  
*Habitat in Madera.*  
*Simus Loxia butyracea, sed rostrum minus.*
- Canaria. 18. F. rostro corporeque albicante, rectricibus remigibus-  
 que virentibus. *Fn. Juss. 207.*  
 Canaria. *G. n. av. 240 Aldr. orn. l. 18 c. 5.*  
 Passer canariensis. *Jonst. av. t. 26. Will. orn. 192. t. 46. Raj. av. 91. n. 6. Alb. av. 1. p. 62. t. 65. Frisch. av. 2. t. 12. f. 5. Olin. av. 7.*  
*Habitat in Canariis insulis. Canarienvogel.*  
*Semibus Phalaridis imprimis vicinans; hybrida parit, sed non ejus nepos.*
- Spinus. 19. F. remigibus medio luteis: primis quatuor immaculatis, rectricibus basi flavis apice nigris. *Fn. Juss. 203.*  
 Acanthus avicula. *Gesn. av. 1.*  
 Spinus f. Ligurinus. *Aldr. orn. l. 18. c. 4. Will. orn. 192. t. 46. Raj. av. 91. n. 1. Alb. av. 3. p. 71. t. 76. Frisch. av. 2. t. 11. f. 1, 2. Olin. av. 15.*  
*Habitat in Europæ juniores. Gronsva*



- flammea. 20. F. fusca, crista flammea. *Faun. svec.* 201.  
 Linaria f. Luteola nigra. *Klein. av.* 93.  
*Habitat in Europa. imprimis Norlandia*
- flaviro- 21. F. fusca, rostro flavicante. *Faun. svec.* 204.  
 stris. *Habitat in Europa. Sv: Riksa.*
- cannabi- 22. F. remigibus primoribus rectricibusque nigris utroque  
 na. margine albis. *Fn. svec.* 209.  
 Linaria rubra major. *Will. orn.* 191. t. 46. *Raj. av.*  
 90. n. 2. *Alb. av.* 3. p. 68. t. 72. 73. *Frisch. av.* 2.  
 t. 9. f. 1. 2.  
*Habitat in Europa. Kämping.*
- Linaria. 23. F. remigibus rectricibusque fuscis margine obsolete  
 pallido, litura alarum albida. *Fn. svec.* 210.  
 Linaria rubra. *Gesn. av.* 591. *Aldr. orn.* l. 18. c. 9.  
*Will. orn.* 191. *Raj. av.* 91. n. 3. *Alb. av.* 3. p. 70.  
 t. 75. *Frisch. av.* t. 19. f. 3. 4.  
*Habitat in Europa. Grus. Sv: a.*
- angolen- 24. F. dorso fusco, abdomine caudaque cæruleis.  
 nis. *Fringilla ventre cæruleo. Edw. av.* 131. t. 131.  
*Habitat in Angola & Africa.*
- violacea. 25. F. violacea, fronte subtusque flavissima. *Mus. Ad. Fr.*  
 2. p. . .  
*Habitat in Calidis regionibus.*  
*Nigro-cærulea sunt Dorsum, Collum, Remiges, Re-*  
*ctrices supra. Flavissima sunt Frons, Pectus, Ab-*  
*domen, Collum subtus. Rostrum brevissimum, tri-*  
*gonum, nigrum apice incurvo.*
- schoeni- 26. F. rectricibus fuscis: extimis duabus macula alba cu-  
 cius. neiformi, corpore griseo nigroque, capite nigro.  
*Fringilla capite nigro, maxillis rufis, torque albo, cor-*  
*pore rufo-nigricante. Fn. svec.* 211.  
*Passer aquaticus f. Schoeniclos. Gesn. av.* 652.  
*Juncus f. Passer arundinaceus. Aldr. orn.* 529.  
*Passer torquatus in arundinetis nidificans. Will. orn.* 196.  
*Raj. av.* 93. n. 3.  
*Cannevarola. Alb. av.* 2. p. 47. t. 51.  
*Habitat in Europa. Schw. Sparf.*  
*Similis F. domesticæ gula nigra, sed capite nigro, col-*  
*lari albo, cauda maxime forcipata.*



domesti- 27. F. remigibus rectricibusque fuscis, corpore griseo ni-  
ca. groque, fascia alarum alba solitaria.

Fringilla remigibus rectricibusque fuscis, gula nigra,  
temporibus ferrugineis. *Fn. suec.* 212.

Passer domesticus. *Gesn. av.* 643. *Aldr. orn. l.* 15. c. 10.  
*Will. orn.* 182. t. 44. *Raj. av.* 86. *Alb. av.* 1. p.  
5. 9. t. 62. *Frisch. av. . . t.* 8. f. 1. 2. *Olin.*  
*av.* 42.

*Habitat in Europa prope rura. Tætling. Gråspars.*  
*Salacissimus qui vigesies sæpe coit. Hortis pes-*  
*sima.*

montana. 28. F. remigibus rectricibusque fuscis, corpore griseo ni-  
groque, alarum fascia alba gemina.

Passer montanus. *Aldr. orn. t.* 15. c. 15. *Olin. av.*  
46. *Raj. av.* 87.

*Habitat in Europa.*

*Similima Fr. domesticæ sed minor & fascia duplex in*  
*alarum tegetibus alba s. tectrices alarum primi se-*  
*cundique ordinis albi, at in F. domestica tantum*  
*secundi.*

chinen- 29. F. ferruginea, capite atro, rostro cæruleo.

lis. Passer chinensis. *Alb. av.* 2. p. 49. t. 53. f. 1. *Edw.*  
*av.* 43. t. 43.

*Habitat in China.*

*Rostrum crassum fere Loxiæ.*

hyemalis. 30. F. nigra, ventre albo.

Passer nivalis. *Catesb. car.* 1. p. 36. t. 36.

*Habitat in America.*

Zena. 31. F. capite pectoreque nigris, dorso alis caudaque ob-  
scure virescentibus.

Passer bicolor bahamensis. *Catesb. car.* 1. p. 37.  
t. 37.

*Habitat in America.*



99. MOTACILLA, *Rostrum* subulatum, rectum :  
Mandibulis subæqualibus.  
Nares obovatae.  
Lingua lacero-emarginata.

Luscinia. 1. M. rufo-cinerea, genuum annulis cinereis. *Fn. svec.* 221.

Luscinia. *Gesn. av.* 592. *Aldr. orn.* l. 18. c. 2. *Will. orn.* 161. t. 41. *Raj. av.* 73. n. 2. *Alb. av.* 3. p. 49. t. 53. *Nachtergahl.*

*Habitat in Europæ francosâ, noctu vespereque cantillans : terra vicia, tam parvo in corpore, tam pertinax spiritus ; spiritum præcipiens quam cantu. Plin. X: 29. Miratrix avis, nutritur oris Formicarum.*

Calidris. 2. M. supra fusco-virescens, subtus fulva, linea oculari & buccularique nigra.

Luscinia americana. *Edw. av.* 121. t. 121. f. 2.

Icterus minor nidum suspendens. *Sloan, jam.* 2. p. 299.

*Raj. av.* 184, n. 27.

*Habitat in America.*

*Rectrices apice luteæ.*

modularis. 3. M. supra griseo-fusca, rectricibus alarum apice albis, pectore cærulescente-cinereo. *Fn. svec.* 223.

*Curruca cantu lusciniaë. Frisch. av. t.* 21. f. 3. *Klein. av.* 73. t. 1.

*Habitat in Europa. Jämsparf.*

Schoenobæus. 4. M. testaceo-fusca, subtus pallide testacea, capite maculato. *Fn. svec.* 222.

*Habitat in Europa. in scirpos Scanie.*

campestris. 5. M. grisea, capite cinereo, rectricibus concoloribus, abdomine albido.

*Curruca jamaicensis. Edw. av.* 122. t. 122. f. 2.

*Habitat in Jamaica.*

Curruca. 6. M. supra fusca, subtus albida, rectricibus fuscis : extrema margine tenuiore alba. *Fn. svec.* 233.

Cur-

Motacillæ plerumque colivora, nec granivora, hinc hyemem versus e borealibus ad meridionales terras migrant.



Curruca. Gesn. av. 370. Alar. orn. l. 17. c. 34. Will.  
orn. 157. Raj. av. 79. n. 6.  
Habitat in Europa. *Vnuka*.

Hippo- 7. M. virecente-cinerea, subtus flavescens, abdomine al-  
latis. bido, artubus fuscis. *Fn. svec.* 234.  
Ficedula repens. Alar. orn. l. 17. c. 37. Raj. av.  
79. n. 7.  
Habitat in Europa. *in arboribz.*

Salicaria. 8. M. cinerea, subtus alba, superciliis albis.  
Luscinia salicaria. *Klein. av.* 74.  
Salicaria cinerea. Will. orn. 158. Raj. av. 81. *Alb.*  
av. 3. p. 56. t. 60.  
Habitat in Europa.

Sylvia. 9. M. hypoleuca cinerea, subtus alba, rectrice prima longitudi-  
nata, secunda alba, tertia apice alba. *Fn. svec.*  
228.  
Habitat in Europa. *Skogsknerten, Mesar.*

Philome- 10. M. fusca cinerea, subtus cinerea, remigibus primoribus  
la. apice obsolete  
Luscinia cinerea. *Klein. av.* 73. t. 1.  
Habitat in Europa.

Ficedula. 11. M. subfusca, subtus alba, pectore cinereo maculato.  
*Fn. svec.* 231.  
Ficedula cananina. Will. orn. 163. Raj. av. 81. n.  
12. *Alb. av.* 3. p. 25. t. 26.  
Habitat in Europa. *in hortij.*

alba. 12. M. pectore nigro, rectricibus duabus lateralibus dimi-  
diato oblique albis.  
Motacilla pectore nigro. *Fn. svec.* 214.  
Motacilla. Gesn. av. 375. Alar. orn. l. 17. c. 23.  
*Bell. av.* 88. 6. *Will. orn.* 171. t. 42. *Raj. av.* 75.  
n. 1. *Alb. av.* 1. p. 49. t. 49. *Friick. av.* . t. 23.  
f. 4. *Olin. av.* 43.  
Habitat in Europa. *Sadesana*.

flava. 13. M. pectore abdomineque flavo, rectricibus duabus la-  
teralibus dimidiato oblique albis. *Fn. svec.* 215.



Motacilla flava. *Gesn. av.* 618. *Aldr. orn.* l. 17. c. 24. *Will. orn.* 172. t. 68. *Raj. av.* 75. n. 2. *Alb. av.* 2. p. 54. t. 58. *Frisch. av.* . t. 23. f. 3.  
*Habitat in Europa.*

Tiphia. 14. M. viridis, subtus flavescens, alis nigris: fasciis duabus albis.  
*Passer viridis indicus. Edw. av.* 79. t. 79.  
*Habitat in Benghala.*  
*Fasciæ alarum ex apicibus rectricum albis.*

Ruticilla. 15. M. nigra, pectore macula alarum basique remigum rectricumque fulvis.  
*Motacilla americana. Catesb. car.* 1. p. 67. t. 67.  
*Serino affinis avicula e croceo & nigro varia. Sloan. jam.* 2. p. 312. *Raj. av.* 188. n. 51.  
*Ruticilla minor americana. Edw. av.* 80. t. 80.  
*Habitat in America.*

hispanica. 16. M. ferruginea, area oculorum alis caudaque fuscis, rectricibus extimis latere albis.  
*Oenanthe fulva. Edw. av.* 31. t. 31.  
*Habitat in Hispania.*

Oenanthe. 17. M. dorso cano, fronte alba, oculorum fascia nigra.  
*Fn. suec.* 217.

*Oenanthe f. Vitiflora. Jonst. av.* 123. t. 45. f. 13.  
*Will. orn.* 168. t. 41. f. 4. *Raj. av.* 75. n. 1. *Alb. av.* 1. p. 53. t. 55. *Steussetta.*

β. Motacilla subtus pallida, rectricibus introrsum albis, dorso undulato. *Fn. suec.* 219.

*Oenanthes vitifloræ femina. Alb. av.* 3. p. 50. t. 54.  
*Habitat in Europæ apricis lapidosis.*  
*Sexu & atate varia; cessante nocturno frigore advenit.*

Rubetra. 18. M. nigricans, superciliis albis, macula alarum alba, gula pectoreque flavescente. *Fn. suec.* 218. & 230. t. 1. f. 3, 4.

*Muscicapa f. Oenanthe tertia. Aldr. orn.* 735. *Raj. av.* 76. n. 4. *Will. orn.* 169. t. 41. f. 5.

*Curruca major altera. Frisch. av.* . t. 22. f. 2.

*Rubetra. Alb. av.* 1. p. 50. t. 52.

*Ficedula f. Atricapilla alia. Jonst. av.* . t. 45. f. ult.

*Ficedula 3. aldrovandi. Edw. av.* 30. t. 30.

*Habitat in Europa.*



*Busfon anförer mycket om sin Gobe-Mouche  
Tom VIII pag. 304.*

*orn. 162. t. 41. Raj. av. 78. n. 8. Frisch. av. t.  
24. f. 1. Olin. av. 9. Gobe-Mouche Busfon  
Habitat in Europa. Storsam in Searna.*

Emeria. 20. M. grisea, subtus alba, temporibus uropygioque  
rubris.

Ruticilla bengalensis. *Edw. av. 190. t. 190. Alb. av.  
3. p. 52. t. 56.  
Habitat in Benghala.*

Phœni- 21. M. gula nigra, abdomine rufo, capite dorsoque cano.  
curus. *Fn. svec. 24.*

Ruticilla. *Will. orn. 159. Raj. av. 78. n. 5. Alb. av.  
1 p. 48. t. 50.*

Phœnicurus media, penna caudæ subnigra. *Frisch. av.  
t. 20. f. 3.*

*Habitat in Europa. Rödstiern.*

Eritha- 22. M. dorso remigibusque cinereis, abdomine rectricibus-  
cus. que rufis: extimis duabus cinereis. *Fn. svec. 225.*

*Habitat in Europa:*

Titys. 23. M. remigibus nigricantibus, rectricibus rufis: interme-  
dio pari nigro extrorsum rufescente. *Fn. svec. 227.*

*Habitat in Europa.*

svecica. 24. M. pectore ferrugineo fascia cærulea, rectricibus fu-  
scis versus basin ferrugineis.

Motacilla pectore cæruleo: macula flavescente albedine  
cineta. *Fn. svec. 220.*

Wegflecklin. *Gesn. av. 796. Aldr. orn. 749. Will.  
orn. 160. Raj. av. 78.*

Ruticilla gutture cæruleo. *Edw. av. 28. t. 28.*

Phœnicurus pectore cæruleo. *Frisch. av. 3. t. 19. f.  
3. 4.*

β. *Wydengyckerlin. Gesn. av. 796.*

*Habitat in Europæ alpinis.*

Sialis. 25. M. supra cærulea, subtus tota rubra.

Rubecula dorso cæruleo. *Catesb. car. I. p. 47. t. 47.*

*Edw. av. 24. t. 24.*

*Habitat in Bermudis & America calidiore.*



- Atricapilla. 19. *M. testacea*, subtus cinerea, pileo obscuro. *Fn. svec.* 229.  
*Atricapilla* f. *Ticedula*. *Aldr. orn.* l. 17. c. 36. *Will. orn.* 162. t. 41. *Raj. av.* 78. n. 8. *Frisch. av.* t. 21. f. 1. *Olin. av.* 9. *Gobe-Mouche Buffon*  
*Habitat in Europa. Stoseum in Scania.*
- Emeria. 20. *M. grisea*, subtus alba, temporibus uropygioque rubris.  
*Ruticilla bengalensis*. *Edw. av.* 190. t. 190. *Alb. av.* 3. p. 52. t. 56.  
*Habitat in Benghala.*
- Phœnicurus. 21. *M. gula nigra*, abdomine rufo, capite dorsoque cano.  
*Fn. svec.* 24.  
*Ruticilla*. *Will. orn.* 159. *Raj. av.* 78. n. 5. *Alb. av.* 1 p. 48. t. 50.  
*Phœnicurus media*, penna caudæ subnigra. *Frisch. av.* t. 20. f. 3.  
*Habitat in Europa. Rödstiern.*
- Erithacus. 22. *M. dorso remigibusque cinereis*, abdomine rectricibusque rufis: extimis duabus cinereis. *Fn. svec.* 225.  
*Habitat in Europa.*
- Tityus. 23. *M. remigibus nigricantibus*, rectricibus rufis: intermedio pari nigro extrorsum rufescente. *Fn. svec.* 227.  
*Habitat in Europa.*
- svecica. 24. *M. pectore ferrugineo fascia cærulea*, rectricibus fuscis versus basin ferrugineis.  
*Motacilla pectore cæruleo: macula flavescente albedine cincta*. *Fn. svec.* 220.  
*Wegflecklin*. *Gesn. av.* 796. *Aldr. orn.* 749. *Will. orn.* 160. *Raj. av.* 78.  
*Ruticilla gutture cæruleo*. *Edw. av.* 28. t. 28.  
*Phœnicurus pectore cæruleo*. *Frisch. av.* 3. t. 19. f. 3. 4.  
*β. Wydengyckerlin*. *Gesn. av.* 796.  
*Habitat in Europæ alpinis.*
- Sialis. 25. *M. supra cærulea*, subtus tota rubra.  
*Rubecula dorso cæruleo*. *Catesb. car.* 1. p. 47. t. 47.  
*Edw. av.* 24. t. 24.  
*Habitat in Bermudis & America calidiore.*



- Velia. 26 M. cærulea, ventre clunibusque rufescentibus.  
 Muscicapa cærulea, ventre rubro. *Edw. av. 22. t. 22.*  
*Habitat Surinami.*
- Spiza. 27. M. viridis, remigibus primoribus nigricantibus.  
 Muscicapa viridis, capite nigro. *Edw. av. 25. t. 25. f. 1.*  
 β. Muscicapa viridis, capite cæruleo. *Edw. av. 25. t. 25. f. 2.*  
*Habitat Surinami.*
- Rubecula. 28. M. grisea, gula pectoreque fulvis. *Fn. suec. 226.*  
 Rubecula. *Will. orn. 160. t. 38. Raj. av. 75. n. 3. Alb. av. 1. p. 49. t. 51. Frisch. av. 3. t. 19. f. 2. Olin av. 16.*  
*Habitat in Europa. Rotgel.*
- Troglodytes. 29. M. grisea, alis nigro cinereoque undulatis. *Fn. suec. 232.*  
 Passer troglodytes. *Gesn. av. 651. Aldr. orn. l. 17. c. 4. Will. orn. 164. t. 42. Raj. av. 80. Alb. av. 1. t. 53. f. 3.*  
 Trochilus remigibus tessellatis. *Frisch. av. . . t. 2. 4. f. 3.*  
*Habitat in Europa.*
- Regulus. 30. M. remigibus secundariis exteriori margine flavis, medio albis. *Fn. suec. 235.*  
 Regulus cristatus. *Will. orn. 163. t. 41. Raj. av. 79. n. 9. Alb. av. 1. p. 51. t. 53. Aldr. orn. l. 17. c. 1. Frisch. av. . . t. 24. f. 4. Catesb. car. 3. p. 13. t. 13.*  
*Habitat in Europa. renior apud nos. Kongsfogel.*
- Trochilus. 31. M. cinereo-virens, remigibus subtus flavescens, superciliis luteis. *Fn. suec. 236.*  
 Regulus non cristatus. *Aldr. orn. l. 17. c. 2. Will. orn. 164. t. 42. Raj. av. 80. n. 10. Alb. av. 2. p. 55. t. 59. f. A. Frisch. av. . . t. 24. f. 2.*  
*Habitat in Europa.*  
 Conj. Locustella. *Will. orn. 151. Alauda minima locustæ voce. Raj. av. 70; pro eadem habet. Mus. petron. 380.*



Acredu- 32. M. supra cinereo-virescens, remigibus fuscis: septimo  
la. octavo nono apice albis. *Fn. svec.* 237.

*Habitat in Europa. ad usquam*

Penduli- 33. M. capite ferrugineo, macula nigra oculari, remigibus  
nus. rectricibusque fuscis margine utroque ferrugineis.

*Lanius minimus. Edw. av. 55. t. 55.*

*Parus montanus. Alb. av. 3. p. 53. t. 59.*

*Parus minimus Remiz. Titius Lips. 1755. disserta-  
tio.*

*Parus lithuanicus nidum suspendens. Klein. av. 86.*

*Pendulinus. A. B. Bonn. 2. 2. p. 57. t. 7.*

*Remiz. Rhaczynsk. polon. 1. p. 294.*

*Habitat in Polonia, Lithuania, Hungaria, Italia, missa  
a DD. Montio.*

iniuta. 34. M. grisea, capite nigro punctis albis sparsis. *Mus. Ad.  
Fr. 2. p. . .*

*Habitat in India..*

*Corpus magnitudine Reguli. Dorsum Alaeque supra gri-  
sea. Pectus flavescens lineis transversis nigris. Cauda  
fusca, lateribus pallida. Caput nigrum, adpersum  
punctis rotundis albis, in singula penna singulis.*

*Mas antice in capite lineis carneis, postice punctis  
albis.*

100. PARUS. *Rostrum integerrimum.*

*Lingua truncata, setis terminata,*

cristatus. 1. P. capite cristato. *Fn. svec.* 239.

*Parus cristatus. Gesn. av. 642. f. med. Aldr. orn. l. 17. c.*

*20. Will. orn. 175. t. 43. Raj. av. 74. n. 6. Alb. av.*

*2. p. 53. t. 57. f. 2. Frisch. av. . . t. 14. f. 2.*

*Habitat in Europa. Sosnuyosa .*

major. 2. P. capite nigro, temporibus albis, nucha lutea. *Fn. svec.*  
238.

*Parus major. Gesn. av. 640. Bell. av. 95. a. Aldr.*

*orn. l. 17. c. 13. Will. orn. 174. Raj. av. 73. n.*

*3. Alb. av. 1. p. 44. t. 46. Frisch. av. 3. t. 13. f.*

*1. 2. Olin. av. 28.*

*Habitat in Europa. Salgoze .*



- americana- 3. P. cærulefcens, temporibus pectore dorfoque flavescen-  
 nus. tibus, hypochondriis purpurafcentibus.  
 Parus Fringillago. *Catesb. car.* 1. p. 64. t. 64.  
*Habitat in America feptentrionali; an fola varietas Paru  
 majoris.*
- cæruleus. 4. P. remigibus cærulefcentibus: primoribus margine ex-  
 teriore albis, fronte alba, vertice cæruleo. *Fn. fvec.*  
 240.  
 Parus cæruleus. *Bell. av.* 96. a. *Gefn. av.* 641. *Aldr.*  
*orn.* 1. 17. c. 17. *Will. orn.* 175. *Frifch. av.* 3. t.  
 14. f. 1.  
*Habitat in Europa. Blamees.*
- ater. 5. P. capite nigro, dorfo cinereo, occipite pectoreque albo.  
*Fn. fvec.* 241.  
 Parus ater. *Gefn. av.* 641. *Aldr. orn.* 1. 17. c. 19.  
*Will. orn.* 175. t. 43. *Raj. av.* 73. n. 2. *Frifch. av.*  
 3. t. 13. f. 3.  
*Habitat in Europa. in aluetis*
- paluftris. 6. P. capite nigro, temporibus albis, dorfo cinereo. *Faun.*  
*fvec.* 242.  
 Parus paluftris. *Gefn. av.* 642. *Aldr. orn.* 1. 17. c. 18.  
*Will. orn.* 175. t. 43. *Raj. av.* 73. n. 3. *Alb. av.* 3.  
 p. 54. t. 58. *Frifch. av.* 3. t. 13. f. 4.  
*Habitat in Europa. Putila.*
- caudatus. 7. P. vertice albo, cauda corpore longiore. *Fn. fvec.* 243.  
 t. 1. f. 243.  
 Parus caudatus. *Gefn. av.* 642. fig. infima. *Aldr. orn.*  
 1. 17. c. 25. *Will. orn.* 176. t. 43. *Raj. av.* 74. n. 3.  
*Alb. av.* 2. p. 53. t. 57. f. 1.  
*Habitat in Europa. Ahltita*
- biarmi- 8. P. vertice cano, cauda corpore longiore.  
 cus. Parus beardmanicus. *Alb. av.* 1. p. 46. t. 48.  
 Lanius minimus. *Edw. av.* 55. t. 55.  
*Habitat in Europa.*
- Pipra. 9. P. ater, capite fupra albo. *Muf. Ad. Fr.* 2. p.  
 Avicula toto corpore nigra, cum vitta alba. *Seb. muf.*  
 2. p. 102. t. 96. f. 5.  
*Habitat in Indiis.*



Statura *Motacilla*, similis sequenti, sed rostrum paulo  
 validius. Corpus totum nigrum. Caput totum album.  
 Vibrillæ ad os, validiores quam in congeneribus.

erythro- 10. P. niger, capite femoribusque fulvis.

cephalus. Parus auricapillus. *Klein. av.* 86.

Parus niger, capite fulvo. *Edw. av.* 21. p. 21.

*Habitat in America australi.*

Aureola. 11. P. niger, capite pectoreque coccineis, remigibus antror-  
 sum macula alba. *Mus. Ad. Fr.* 2. p.

Parus niger & fulvus. *Edw. av.* 83. t. 83. f. 2.

Avicula surinamensis nigra, capite e luteo coccineo.

*Pet. gaz.* 73. t. 46. f. 10.

Avicula mexicana de Chichil totolh altera. *Seb. mus.*

1. p. 96. t. 60. f. 8. 7.

*Habitat in America.*

Cela. 12. P. niger, rostro albo, macula alarum basique caudæ  
 flavis. *Mus. Ad. Fr.* 2. p. . .

*Habitat in Indiis.*

101. HIRUNDO. *Rostrum* minimum, incurvum, fu-  
 bulatum, basi depressum.

*Rictus* capite amplius.

rustica. 1. H. rectricibus, exceptis duabus intermediis, macula al-  
 ba notatis. *Fn. svec.* 244.

Hirundo domestica. *Gesn. av.* 548. *Aldr. orn.* 1. 17.

c. 6. *Jonst. av.* 115. t. 42. *Will. orn.* 155. t. 39.

*Raj. av.* 71. n. 1. *Alb. av.* 1. p. 43. t. 45. *Frisch.*

*av. t.* 18. f. 1.

*Habitat in Europæ domibus intra tectum. Laduscula  
 rustica & urbana autumno demergitur, vereque e-  
 mergit.*

esculen- 2. H. rectricibus omnibus macula alba notatis.

ta. Hirundo nidis edulibus. *Bont. jav.* 65. *Raj. av.* 72.

Capus marina. *Rumph. herb.* 6. p. 183. t. 75. f. 4.

*Olear. mus.* 25. t. 14. f. 2. 6.

*Habitat in China ad ripas, nidis gelatinosis esculentis.*

3. H.



- urbica. 3. *H. reductus* immaculatis, dorso nigro-cærulescente.  
*Fn. suec. 245. It. æl. 41.*  
*Hirundo agilis f. rufica Gesn. av. 564. Aldr. orn.*  
*l. 17. c. 7. Will. orn. 155. Raj. av. 71. n. 2. Alb.*  
*av. 2. p. 52. t. 56. f. A. Frisch. av. 3. t. 17.*  
*f. 2.*  
*Habitat in Europa, ad parietes sub tecto.*  
*Venit venit hirundo, palchra tempora adducens & pul-*  
*chros annos. Hesych. Husswala*
- riparia. 4. *H. cinerea*, gula abdomineque albis. *Fn. suec. 247.*  
*Hirundo riparia f. Diopis Gesn. av. 566. Aldr. orn.*  
*l. 17. c. 8. Will. orn. 156. t. 39. Raj. av. 71. n.*  
*3. Alb. av. 2. p. 52. t. 56. f. B. Frisch. av. t.*  
*18. f. 2.*  
*Habitat in Europæ collibus arenosis abruptis, foramine*  
*serpentino. Strandswala.*
- Apus. 5. *H. nigricans*, gula alba, digitis omnibus quatuor an-  
 ticiis.  
*Hirundo tota nigra, gula albicante. Fn. suec. 246.*  
*Hirundo Apus. Edw. av. 120. a. Gesn. av. 565. Aldr.*  
*orn. l. 17. c. 10. Jonst. av. 119. t. 42. Will. orn.*  
*156. t. 39. Raj. av. 72. n. 4. Alb. av. 2. p. 51.*  
*t. 55. Frisch. av. 3. t. 17. f. 1.*  
*Habitat in Europæ altis.*  
*In terram decidens non evolat; capitur hamo Cicadae*  
*inserto. Bell. 16. Ringswala.*
- Subis. 6. *H. nigro-cærulescens*, ore subtusque cinereo-ex-  
 albis.  
*Hirundo cærulea canadensis. Edw. av. 120. t. 120.*  
*Habitat ad sinum Hudsonis.*
- pelagica. 7. *H. restructus* æqualibus apice subulatis, nudis.  
*Hirundo, cauda aculeata, americana. Catesb. car. 3. p.*  
*8. t. 8.*  
*Habitat in America.*
- Melba. 8. *H. fusca*, gula abdomineque albis.  
*Hirundo riparia maxima. Edw. av. 27. t. 27. Klein.*  
*av. 83.*  
*Habitat ad fretum Herculeum.*



102. CAPRIMULGUS. *Rostrum* incurvum, minimum, subulatum, basi depressum.  
*Vibrissæ* ad os serie ciliari.  
*Rictus* amplissimus.

euro-  
pæus,

1. *C. narium* tubis obsoletis.

*Hirundo* cauda integra, ore fetis ciliato. *Fn. suec.* 248.

*Caprimulgus*. *Bell. av.* 28. *a. Gesn. av.* 242. *Forst. av.* 53. *t.* 20. *Will. orn.* 70. *t.* 14. *Raj. av.* 26. *n.* 1. *Alb. av.* 1. *p.* 10. *t.* 10. *Frisch. av.* . . . *t.* 101. *Catesb. car.* 1. *p.* 8. *t.* 8.

β. *Caprimulgus minor americanus*. *Catesb. car.* 3. *p.* 16. *t.* 16. *Edw. av.* 63. *t.* 63.

*Habitat in* Europa & America. *Natus in Asia.*

*Varietatem* β. *judico ex macula alba alarum & rectricum, ut in mare avis europeæ.*

*Vivitat Phalænis & insectis nocturnis. Nidus orbiculatus e luto inter rapas. nocte sola exit, proditur*  
*Suilo susurro continuis*

2. *C. narium* tubulis eminentibus

*Caprimulgus* f. *Noctua sylvatica jamaicensis*. *Sloan. jam.* 2. *p.* 298. *t.* 255. *f.* 1. *Raj. av.* 180

*Hirundo* major subfusca miscella, macula alba spherica in utraque ala. *Brown. jam.* 467.

*Habitat in* America calidiore.

N

CLAS-



## CLASSIS III.

## AMPHIBIA.

PESSIMA tetraque Animalia Corde uniloculari uniaurito, Pulmonibus arbitrariis, Pene duplici dignoscuntur.

AMPHIBIA pleraque horrent Corpore frigido, Colore lurido, Sceleto cartilagineo, Cute fœda, Facie torva, Obtutu meditabundo, Odore tetro, Sono rauco, Loco squalido, Veneno horrendo; non itaque in horum numerum sese jactavit eorum Auctor.

POLYMORPHA in his Amphibiis natura duplicem vitam plerisque concessit: Aliis *Metamorphosin* subire, aliis *Senectam* exuere; aliis *Ovo* nasci, aliis *nudos* fœtus parere; aliis in *sicco humidoque* promiscue vivere, aliis dimidio anno *hyemare*; aliis prædam visu astute assequi, aliis fascino quasi eandem in fauces revocare.

REPTILES pedati, auribus plano-denudatis absque auriculis, variam vitam ex structura agunt: *Testudines* muniuntur Testa; *Dracones* evolant Alis; *Lacertæ* fugiunt Pedibus; *Ranæ* absconduntur Loco; nec omnes Veneno prorsus carent, ut Bufo, Salamandra, Gecko.

SERPENTES apodes, absque *Auribus* surdos, a Piscibus separant Pulmones, Ovorum catena, Penisque duplex muricatus, affinitas denique cum Lacertis tanta, ac Lacertarum cum Ranis, vixque limites admittens. Hos nuda in terra reiectos, artuum ministerio expertes, omnium injuriæ expositos, armavit Natura conservatrix suis *armis*, horrentibus execrabili *Veneno*, in diversis diverso. Sunt  
autem



autem hæc *Tela* dentibus simillima, sed extra maxillam superiorem collocata, proque lubitu extirpanda & retrahenda, sacco ianici affixa, quam vulnere inflant in sanguinem, tum diri effectus causam, cæterum inertem; sicque *Catonia* hæc morfu virus habent & fatum dente minantur, pocula morte carent, prout solide *Reai*. Ne vero hi spoliati miserique armis, quæ ipsis sup. ressent, nimium sævirent, decimam quamque tantum speciem armavit (♂) imperans, sed versipelles eos voluit, ut dubii omnes metuerentur ab omnibus; at *Beneficus* Homini dedit *INDIS Ichneumonem* cum *Ophiorhiza*, *AMERICANIS Suem* cum *Senega*, *EUROPÆIS Ciconiam* cum *Olea*.

**DIAGNOSIN**, qui velit horum, eandem desumat a *Pedum* succedaneis *Scutis abdominalibus caudalibusque*; ne vero numerus alteri dentis alterique additus seducat, juvat etiam uterque connumeratus (*Act. Stockh. 1752. p. 226.*); ab ano utrinque *Longitudo* illustrat. & *Color* in nonnullis; cave vero ne renata sit mutilata cauda.

**NANTES** pinnatos aquaticos (*Chondroterugios* cartilagineosve dictos *Pisces*) *Amphibiorum* classem nunc subire jubent *Pulmones* (\*) *arbitrarii*, Latere licet, non vero *branchiis* liberis, sed *adnatis*, respirantes; *Maresque* bene duplici insidentes *Feminis*! ovis *concatenatis* foetis, foetibus *Cutis*, *Ossaque* cartilaginea, cætera. Neque hi omnes *Toxico* expertes, teste *Pastinaca*, *Torpedine*.

**AMPHIBIOLOGI** omnium paucissimi sunt, nullique veri.

*Seba* numero stupendo sibi ignota pulchre collegit & delineavit, sed multiplicavit, minimeque descripsit. *Catesbaus* nec paucos *Serpentes* pulchrius delineavit, quam notavit.

(\*) *Pulmones* horum pectinati ut *Piscium*, sed adnati vasi arcato cylindrico tabuloso, absque radio osseo, nec *piscium* juncit, nisi externa figura.



## CLASSIS III.

## AMPHIBIA.

PESSIMA tetraque Animalia *Corde uniloculari uniaurito, Pulmonibus arbitrariis, Pene duplici* dignoscuntur.

AMPHIBIA pleraque horrent Corpore frigido, Colore lurido, Sceleton cartilagineo, Cute foeda, Facie torva, Obtutu meditabundo, Odore tetro, Sono rauco, Loco squalido, Veneno horrendo; non itaque in horum numerum sese jactavit eorum Auctor.

POLYMORPHA in his Amphibiis natura duplicem vitam plerisque concessit: Aliis *Metamorphosin* subire, aliis *Senectam* exuere; aliis *Ovo* nasci, aliis *nudos* foetus parere; aliis in *sicco humidoque* promiscue vivere, aliis dimidio anno *hyemare*; aliis praedam nisu astute assequi, aliis fascino quasi eandem in fauces revocare.

REPTILES pedati, auribus plano-denudatis absque auriculis, variam vitam ex structura agunt: *Testudines* muniuntur Testa; *Dracones* evolant Alis; *Lacertae* fugiunt Pedibus; *Ranae* absconduntur Loco; nec omnes Veneno prorsus carent, ut Bufo, Salamandra, Gecko.

SERPENTES apodes, absque *Auribus* surdos, a Piscibus separant Pulmones, Ovorum catena, Penisque duplex muricatus, affinitas denique cum Lacertis tanta, ac Lacertarum cum Ranis, vixque limites admittens. Hos nuda in terra reiectos, artuum ministerio expertes, omnium injuriae expositos, armavit Natura conservatrix suis *armis*, horrentibus execrabili *Veneno*, in diversis diverso. Sunt autem



autem hæc *Tela* dentibus simillima, sed extra maxillam superiorem collocata, proque lubitu extirpanda & retrahenda, sacculo saniei affixa, quam vulnere inflant in sanguinem, tum diri effectus causam, cæterum inertem; sicque *Catonia* hæc morfu virus habent & fatum dente minantur, pocula morte carent, prout solide *Redi*. Ne vero hi spoliati miserique armis, quæ ipsis sup-ressent, nimium sævirent, decimam quamque tantum speciem armavit (♂) imperans, sed versipelles eos voluit, ut dubii omnes metuerentur ab omnibus; at Beneficus Homini dedit *INDIS Ichneumonem* cum *Ophiorhiza*, *AMERICANIS Suem* cum *Senega*, *EUROPÆIS Cicoriam* cum *Olea*.

**DIAGNOSIN**, qui velit horum, eandem desumat a *Pedum succedaneis Scutis abdominalibus caudalibusque*; ne vero numerus alteri demtus alterique additus seducat, juvat etiam uterque connumeratus (*Act. Stockh. 1752. p. 206.*); ab ano utrinque *Longitudo* illustrat. & *Color* in nonnullis; cave vero ne renata sit mutilata cauda.

**NANTES** pinnatos aquaticos (*Chondropterygios cartilagineosve dictos Pisces*) Amphibiorum classem nunc subire jubent *Pulmones* (\*) *arbitrarii*, Latere licet, non vero *branchiis liberis*, sed *adnatis*, respirantes; *Maresque Pene duplici insidentes Feminis!* ovis concatenatis roetis, rædæque *Cutis*, *Ossaque cartilaginea*, cætera. Neque hi omnes *Toxico expertes*, teste *Fastinaca*, *Torpedine*.

**AMPHIBIOLOGI** omnium paucissimi sunt, nullique veri.

*Seba* numero stupendo sibi ignota pulchre collegit & delineavit, sed multiplicavit, minimeque descripsit. *Catesbeus* nec paucos *Serpentes* pulchrius delineavit, quam notavit.

(\*) *Pulmones* *loram pectinati* ut *Piscium*, sed *adnati vasi arcato cylindrico tabuloso*, absque *radio oſſeo*, nec *piscium similit*, nec *externa figura*.



## GENERUM Characteres.

## I. REPTILES pedati, spirantes ore :

103. TESTUDO *Corpus Testa munitum.*104. DRACO *Corpus Alis volatile.*105. LACERTA *Corpus (Testa Alisve) nudum, caudatum.*106. RANA *Corpus similiter nudum, e caudatum.*

## II. SERPENTES apodes, spirantes ore :

107. CROTALUS *Scuta Abdominalia Caudaliaque cum Cre-  
pitaculo.*108. BOA *Scuta Abdominalia Caudaliaque absque Cre-  
pitaculo.*109. COLUBER *Scuta Abdominalia; Squamæ Caudales.*110. ANGUIS *Squamæ Abdominales Caudalesque.*111. AMPHISBÆNA *Annuli Abdominales Caudalesque.*112. COECILIA *Rugæ nudæ laterales.*

## III. NANTES pinnati, spirantes lateribus :

113. PETROMYZON *Spiracula 7.*114. RAJA *Spiracula 5 subtus. Corpus depressum.*115. SQUALUS *Spiracula 5 lateralia. Corpus teres.*116. CHIMÆRA *Spiracula 1. Dentes primores incisores 2.*117. LOPHIUS *Spiracula 1. Pinnae pectorales brachio in-  
sertæ.*118. ACIPENSER *Spiracula 1. Os retractile.*



## I. REPTILES.

*Os respirans.**Pedes quatuor.*

103. TESTUDO. *Corpus tetrapodum, caudatum, testa obtectum.*

Mydas. 1. T. pedibus pinniformibus, unguibus palmarum binis, plantarum solitariis, testa ovata.

*Amœn. acad. 1. p. 138. Testudo unguibus acuminatis: palmarum duobus, plantarum unico.*

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 50. Testudo atra.*

*Osborn. iter. 293.*

*Gesn. quadr. 78. Testudo marina.*

*Aldr. quadr. 712. t. 714.*

*Grew mus. 38. t. 3. f. 4.*

*Olear. mus. 27. t. 17. f. 1.*

*Bradl. natur. t. 4. f. 4.*

β. *Seb. mus. 1. t. 80. f. 9. Testudo marina americana Mydas dicta.*

*Amœn. acad. 1. p. 137. Testudo eadem.*

*Marcgr. bras. 241. Jurucuja brasiliensibus.*

*Raj. quadr. 256.*

γ. *Amœn. acad. 1. p. 287. n. 7. Testudo unguibus acuminatis, palmarum plantarumque solitariis.*

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 50. Testudo eadem.*

*Seb. mus. 1. t. 79. f. 4. 5. 6.*

*Habitat ad insulas Pelagi: insulam Adscensionis &c. ova membranacea noctu in Arena calcarea rotunda defodit.*

*Caro viridescens, esculenta; resupinata in mare dormiens natat; incedit tot hominibus, quot ei insistant; in terra resupinata non erigitur. Testa olim pro scutis, fornicibus.*

Caretta. 2. T. pedibus pinniformibus, unguibus palmarum plantarumque binis, testa ovata acute ferrata.

*Gron. mus. 2. p. 85. n. 69. Testudo pedibus natatoriis, unguibus acuminatis binis.*

*Brown. jam. 465. Testudo unguibus utrinque binis acutis, squamis dorsi quinque gibbis.*



*Catesb. car. 2. p. 39. t. 39. Testudo Caretta Rochef.*  
*Raj. quadr. 258. Testudo Caretta.*  
*Habitat ad insulas Americanas.*

orbicula- 3. T. pedibus palmatis, testa orbiculata planiuscula.  
 ris. *Raj. quadr. 254. Testudo aquarum dulcium?*  
*Habitat in meridionalibus Europæ.*

*Testa parva integerrima orbiculata, nec antice nec postice emarginata. Sternum postice bifidum. Pedum digiti membrana connexi in plantam orbiculatam.*

scabra. 4. T. testa planiuscula, scutellis omnibus intermediis dor-  
 satis. *Habitat in Indiis.*

*Corpus & testæ latera subtus albo nigroque varia: Sternum antice truncatum.*

lutaria. 5. T. pedibus subpalmatis, cauda corpore dimidio brevio-  
 re, testa subconvexa postice tribus scutellis carinata.  
*Amœn. acad. 1. p. 139. n. 23 Testudo unguibus acu-  
 minatis, palmarum plantarumque quaternis.\**  
*Habitat in Italia, Oriente.*

*Palmae magis palmatae, plantae minus. Sternum postice truncatum.*

gibba. 6. T. pedibus subdigitatis, testa gibba margine laterali ob-  
 tusissimo, scutellis planiusculis.

*Testudo tessellata minor atricana. Edw. av. 204. t.*

*204. Habitat in Africa.*  
*Corpus caudatum, palmis unguibus 5, plantis vero 4.*

carolina. 7. T. pedibus digitatis, testa gibba, cauda nulla.  
*Testudo tessellata minor caroliniana. Edw. av. 205.*

*205. Habitat in Carolina.*

*Palmae pentadactylae, Planta tetradactyla.*

carinata. 8. T. pedibus digitatis, testa gibbosa, scutellis dorsalibus  
 quatuor anterioribus carinatis, sterno integro.

*Habitat in Calidis regionibus.*

9. T.

*Testudines abscisso capite saepe 14 dies vivunt; hyeme in frigidioribus hybernant terre-  
 stres. Nullum animal Testudine tardius; copula coherent saepe per mensem.*



geome- 9. T. pedibus posticis palmatis, testæ scutellis elevatis  
trica. truncatis.

*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 50. Testudo unguibus acuminatis :  
palmarum 5, plantarum 4.

*Worm. mus.* 317. Testudo picta f. stellata.

*Amœn. acad.* 1. p. 139. n. 24.

*Grew. mus.* 36. t. 3. f. 1, 2. Testudo testa tessellata  
major.

*Seb. mus.* 1. t. 80. f. 8. Testudo minor amboinensis.

*Pis. bras.* t. 105. Testudo nigricantibus & flavescenti-  
bus figuris geometricis.

*Raj. quadr.* 259. Testudo tessellata minor.

*Habitat in Asia.*

*Testa nigra scutellis flavis radios flavos anastomosantes e-  
mittentibus.*

pufilla. 10. T. testa hemisphærica : scutellis convexis trapeziis  
margine striatis disco punctatis.

*Grew. mus.* 38. t. 3. f. 3. Testudo virginea.

*Worm. mus.* 313. Testudo terrestris pufilla ex India o-  
rientali.

*Raj. quadr.* 259. Testudo eadem.

*Habitat in India.*

serpenti- 11. T. pedibus digitatis, testa subconvexa postice obtusa  
na. acute quinque-dentata.

*Habitat in Calidis regionibus.*

104. DRACO. *Corpus* tetrapodum, caudatum, ala-  
tum.

volans. 1. DRACO. *Syst. nat.* 36. *Gron. mus.* 2. p. 73. n. 46.

*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 40. Draco.

*Amœn. acad.* 1. p. 126. Lacerta cauda tereti, pedibus  
pentadactylis, alis femore connexis, crista gulæ triplici.

*Bont. jav.* 57. t. 57. Lacertus volans f. Dracunculus.

*Seb. mus.* 2. t. 86. f. 3. Lacerta africana volans f.  
Draco volans.

*Testudinibus Pedum digiti antici 5, postici 4, totidem unguibus, exceptis marinis  
pinniformibus pedibus. Scuta testæ numero sæpius conveniunt, unde diagnosi  
Specierum difficillima.*

*Dracones omnes reliqui authorum fabulosi sunt, ut HYDRA, Seb. mus. 1. t. 102.  
f. 1. Hamburgi a nobis visa, non naturæ, sed artis opus eximium.*



*Bradl. natur. t. 9. f. 5. Lacerta volans.*  
*Habitat in India, Africa. Drake.*

105. LACERTA. Corpus tetrapodum, caudatum,  
 nudum.

\* *Cauda compressa.*

- Croc- 1. L. cauda compressa, pedibus triunguiculatis, palmis  
 dilus. pentadactylis, plantis tetradactylis palmatis.  
*Amœn. acad. 1. p. 121. Lacerta eadem.*  
*Mus. Ad. Fr. 1. p. 40. Lacerta eadem.*  
*Gron. mus. 2. p. 74. n. 47. Crocodilus.*  
*Bellon. aquat. 21. Crocodilus.*  
*Gesn. quadr. 9. Crocodilus.*  
*Aldr. aquat. 677. Crocodilus.*  
*Fonst. quadr. t. 79. f. 3. Crocodilus.*  
*Raj. quadr. 261. Lacertus maximus.*  
*Bont. jav. t. 55. Crocodylus Cayman.*  
*Marcgr. bras. 42. Jacare.*  
*Olear. mus. 8. t. 7. f. 3. Crocodylus.*  
*Bell. mus. 47. t. 13. Crocodilus niloticus.*  
*Sloan jam. 2. p. 332. Crocodilus.*  
*Seb. mus. 1. t. 103. 104. Crocodilus.*  
*Merian. sur. 49. f. 69. Crocodil.*  
*Vall. sn. nat. 1. t. 43.*  
*Catesb. car. 2. t. 63. Lacertus maximus.*  
*Habitat in Africa, Asia, America Aquis. Leviathan*  
*Anatome Crocodili. Hasselq. iter. 292.*  
*Ova cœmœna deponit, effodiuntur ab Ichneumone, avicu-*  
*la; exclusos pullos Mater in tergum provocat, ad*  
*aquas ducit, deciduos Mas Feminaque ingurgitant;*  
*sub aqua vorat; in catenam associati aquatilia exagi-*  
*tant. Leviathan Jobi, 40: 20; 41: 24.*  
*Fugientibus atrox; edocti dorso ipsius insiliunt, regunt.*
- Caudiver- 2. L. cauda depresso-plana pinnatifida, pedibus palmatis.  
 bera. *Fevill. peruv. 2. p. 319. t. 319.*  
*Seb. mus. 2. t. 62. f. 9.*  
*Habitat in Peru.*
- Superci- 3. L. cauda carinata, dorso superciliisque ciliatis.  
 liosa. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 40. Lacerta eadem.\**



*Seb. mus. 1. t. 109. f. 4.*  
*Habitat in Indiis.*

scutata. 4. L. cauda subcompressa mediocri, sutura dorsali denta-  
ta, occipite bimucronato.

*Seb. mus. 1. p. 173. t. 109. f. 3.* Salamandra prodigio-  
sa amboinensis scutata.

*Habitat in Asia.*

Monitor. 5. L. cauda carinata, corpore mutico.

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 41.* Lacerta cauda ancipiti integra,  
pedibus pentadactylis, digitis omnibus unguiculatis. \*

*Seb. mus. 2. t. 86. f. 2.*

*t. 105. f. 1.*

*1. t. 94. f. 1. 2.*

*Habitat in Indiis.*

Corpus maculis albis ocellatis verticillatum. Fasciæ  
abdominis albi lineares interruptæ.

principa- 6. L. cauda subcarinata, crista gulæ integerrima, dorso  
lis. lævi.

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 43.*

*Amœn. acad. 1. p. 286. t. 14. f. 2.*

*Habitat in Indiis.*

bicarina- 7. L. cauda compressa supra bicarinata mediocri, dorso  
ta. quadrifariam carinato-striato.

*Habitat in Indiis*

Parva, grisea. Dorsum striis duabus elevatis & latera  
dorsi singula ex squamis carinato-striata; Latera squa-  
mis convexo-tuberculatis. Abdomen 24 ordinibus trans-  
versalibus squamarum (in singulo 6.) tectum. Cauda  
corpore vix sesquilongior, compressa, subtus striata,  
lateribus lævis, supra duplici carina angulata. Cri-  
sta nulla.

palustris. 8. L. cauda ancipiti mediocri, pedibus muticis fissis; pal-  
mis tetradactylis. *Fn. suec. 256. Skröt Abbove.*

*Gron. mus. 2. p. 77. n. 51.* Salamandra alepidota ver-  
rucosa.

*Raj. quadr. 273.* Salamandra aquatica.

*Seb. mus. 1. t. 89. f. 4, 5.* Lacerta americana.

*Habitat in Europæ aquis dulcibus stagnantibus.*

*An distincta species a L. agili vel larva alius.*



\* \* *Cauda verticillata.*

- Cordylus.** 9. L. cauda verticillata brevi: squamis denticulatis, corpore lævigato.  
*Amœn. acad.* 1. p. 132. 292.  
*Cron. mus.* 2. p. 79. n. 55. Cordylus.  
*Seb. mus.* 1. t. 84. f. 3. 4. & 2. t. 62. f. 5.  
*Habitat in Africa, Asia.*  
*Corpus squamis truncatis verticillatum.*
- Stellio.** 10. L. cauda verticillata mediocri: squamis denticulatis, capite corporeque muricato.  
*Hasselt. iter 301.* Lacerta Stellio.  
*Tournesf. itin.* 1. p. 119. t. 120. Lacerta Coslordilos dicta.  
*Seb. mus.* 2. t. 8. f. 7.  
*Habitat in Oriente: Delos, Ægypto, Africa.*
- mauritania.** 11. cauda subverticillata brevi muricata apice lævi, corpore supra muricato, pedibus subtus squamatis.  
*Habitat in Mauritania. E. Brander.*  
*Corpus habitu & figura L. Gecko, sed luridum & ad latera capitis, supra collum, dorsum, femora, verrucosum mucronibus. Cauda corpore brevior, a basi ad medium spinis sexfariam muricata, inde ad apicem lævis. Digni pedum omnino ut in Gecko subtus lamelloso-squamati, unguibus minimis. Subtus totum corpus læve squamis minimis.*
- azurea.** 12. L. cauda verticillata brevi: squamis mucronatis.  
*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 42. Lacerta eadem.  
*Seb. mus.* 2. t. 62. f. 6.  
*Habitat in Africa.*
- turcica.** 13. L. cauda subverticillata mediocri, corpore griseo subverrucoso.  
*Edw. av.* 204. t. 204. Lacerta minor cinerea maculata asiatica.  
*Habitat in Oriente.*  
*Cauda vix corpore longior, obsolete verticillata. Corpus parvum, griseum, punctis fuscis irroratum, inæbuale & quasi verrucis obsoletis adpersum.*
- Ameiva.** 14. L. cauda verticillata longa, scutis abdominis triginta, collari subtus ruga duplici.  
*Amœn. acad.* 1. p. 127. 293. Lacerta cauda tereti corpore duplo longiore, pedibus pentadactylis, crista nulla, scutis abdominalibus 30.



*Mus Ad. Fr. 1 p. 45.* Lacerta eadem.

*Gron. mus. 2. p. 80 t. 56.* Lacerta cauda tereti corpore triplo longiore, squamis lævissimis, abdominalibus oblongo-quadratis.

*Cl. exot. 115.* Lacertus indicus.

*Edw. av. 202. t. 202, 203.* Lacertus major viridis.

*Worm. mus. 313. f. 313.*

*Raj. quadr. 270.* Lacertus indicus.

*Seb. mus. 1. t. 85. f. 2, 3.*

*t. 88. f. 1, 2.*

*Sloan. jam. 2. p. 333. t. 273. f. 3.* Lacertus major cinereus maculatus.

β. *Amœn. acad. 1. p. 130.* Lacerta cauda tereti corpore sesquialongiore, pedibus pentadactylis, dorso lineis longitudinalibus striato.\*

*Habitat in America.*

agilis. 15. L. cauda verticillata longiuscula squamis acutis, collari subtus squamis constructo.

*Faun. swec. 1352.* Lacerta cauda tereti verticillata longitudine corporis, pedibus pentadactylis unguiculatis.

*Syst. nat. 36. n. 6.* Lacerta cauda tereti longa verticillata squamis acutis, pedibus pentadactylis unguiculatis.

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 43.* Lacerta eadem.

*Gron. mus. 2. p. 80. n. 57.* Lacerta cauda corpore parum longiore, squamis lævissimis.

*Raj. quadr. 264.* Lacertus vulgaris, ventre nigro maculato.

*Seb. mus. 2. t. 79. f. 4.* Lacerta minor maculata indigena.

β. *Raj. quadr. 264.* Lacertus viridis.

*Aldr. quadr. 634.* Lacertus viridis.

*Seb. mus. 2. t. 4. f. 4. 5.* Lacerta viridis.

*Habitat in Europa, India.*

*Variat in australi Europa colore viridi; Indica pulchrius colorata. Femora postica subtus linea e punctis callosis notata, ut in L. Ameiva.*

algira. 16. L. cauda verticillata longiuscula, corpore lineis utrinque duabus flavis.

*Habitat in Mauritania. E. Brander.*

*Corpus vix digito longius, supra fuscum, subtus flavescens. Squamæ dorsales carinatae, acutiores. Linea utrinque flava dorsum includit & alia utrinque abdomen distinguit a lateribus.*

17. L.



Seps. 17. L. cauda verticillata longa, futura laterali reflexa, squamis quadratis.

*Amœn. acad. 1. p. 293. Lacerta cauda verticillata, pedibus subpentadactylis, squamis quadratis.\**

*Habitat in Meridionalibus.*

*Pedes breves, remotissimi, cursorii; Abdomen planum.*

angulata. 18. L. cauda hexagona longa, squamis carinatis mucronatis.

*Habitat in America. Rolander.*

*Parva dorso fusco. Squamæ omnes, exceptis abdominalibus, mucronatæ, valde carinatæ. Caput nudum, rugis variis elevatis; postice, ubi squamæ colli incipiunt, quasi truncatum & annexum; sub Gula squamæ 2, magnæ, rotundatæ. Cauda corpore sesquialongior, hexagona, valde angulata.*

\* \* \* *Cauda tereti imbricata, corpore longiore.*

Chamæleon. 19. L. cauda tereti brevi incurva, digitis duobus tribusque coadunatis.

*Amœn. acad. 1. p. 290, 501. Idem.*

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 45. Idem.*

*Gron. mus. 2. p. 76. n. 50. Chamæleon.*

*Olear. mus. 9. t. 8. f. 3. Chamæleon.*

*Bellon. itin. 1. 2. c. 60. Chamæleon.*

*Best. mus. t. 12. Chamæleon.*

*Valent. mus. 1. 3. c. 31. Chamæleon.*

*Kircher. mus. 275. t. 293. f. 44. Chamæleon.*

*Jonst. quadr. t. 79. Chamæleon.*

*Seb. mus. 1. t. 82. f. 3. 4. 5. & t. 83. f. 5.*

*Aldr. quadr. 670. Chamæleon.*

*Habitat in Africa, Asia.*

*Anatome Chamæleontis. Hasselq. iter. 297.*

*Variat vertice plano & carinato. Intumescit detumescitque lente corpus. Oculi tecti: pupilla nuda aurata fulgentissimi. Incessus tardus pedibus opposite anomalis caudaque scandente. Lingua lumbriciformis, longissima, muscicapa. Colores mutat in calidis; noctu vigil.*

Salaman- dra. 20. L. cauda tereti brevi, digitis muticis, corpore poroso nudo.

*Amœn. acad. 1. p. 131. Lacerta cauda tereti brevi, pedibus inermibus: palmis tetradactylis, plantis pentadactylis.*



Mus. Ad. Fr. 1. p. 45. Lacerta eadem.

Matth. diosc. 274. f. 274. Salamandra.

Gesn. quadr. 80. Salamandra.

Aldr. quadr. 641. Salamandra terrestris.

Fonst. quadr. t. 77. f. 10.

Olear. mus. t. 8. f. 4.

Seb. mus. 2. t. 12. f. 5.

Raj. quadr. 173. Salamandra terrestris.

Habitat in Europa.

Corpus nudum absque squamis, poris pertusum.

Ferebatur antiquitus in igne vivere, sed expertus Bartholinus; oleum e poris exsudans pro psilotro habetur.

Gecko. 21. L. cauda tereti mediocri, digitis subtus imbricatis, corpore verrucoso.

Amœn. acad. 1. p. 133. 292. Lacerta cauda tereti mediocri, pedibus pentadactylis: digitis cristatis imbricatis, corpore verrucoso.

Mus. Ad. Fr. 1. p. 46. idem.

Hasselqv. iter. 306. Lacerta Gecko cauda tereti mediocri, pedibus cristatis subtus longitudinaliter lamellofis.

Gron. mus. 2. p. 78. n. 53. Salamandra.

Seb. mus. 1. t. 168. f. 2-8.

Bont. jav. 57. Salamandra indica.

Habitat in Indiis, frequens etiam in domibus.

Pedibus exhalat venenum in esculentis (an urina?) Hasselqv. Mansueta; homo asylum.

Stincus. 22. L. cauda tereti mediocri apice compressa, digitis muticis marginatis.

Gron. mus. 2. p. 76. n. 49. Scincus.

Seb. mus. 2. p. 112. t. 105. f. 3.

Best. mus. 1. 12. f. 1.

Olear. mus. 9. t. 8. f. 1.

Raj. quadr. 271. Scincus.

Amœn. acad. 1. p. 294.

Hasselqv. act. ups. 1750. p. 30.

- - - itin. 309. n. 58.

Habitat in montosis Lybiæ, Ægypti, Arabiæ petreæ.

Corpus officinale pro aphrodisiaco.

hispidula. 23. L. cauda tereti mediocri, vertice trimuricato.

Mus. Ad. Fr. 1. p. 44. Lacerta eadem.



*Seb. mus. 1. t. 109. f. 6.*

*t. 83. f. 1. 2.*

*Habitat in America australi.*

orbicula-24. L. cauda tereti brevi, trunco subgloboso supra muricato.

*Seb. mus. 1. p. 134. t. 83. f. 1. 2. Lacertus orbicularis spinosus.*

*Hernand. mex. 327, 328. Lacertus orbicularis.*

*Raj. quadr. 263. Lacertus orbicularis.*

*Habitat in Mexico.*

vulgaris. 25. L. cauda tereti mediocri, palmis tetradactylis, pedibus muticis.

*Faun. svec. 254. Lacerta pedibus inermibus, manibus tetradactylis, plantis pentadactylis, corpore livido: linea dorsali fusca duplici.*

*Raj. quadr. 264. Lacerta vulgaris.*

*Habitat in Europa, Larva sub aquis.*

aquatica. 26. L. cauda teretiuscula mediocri, pedibus muticis fissis: palmis tetradactylis. *Fn. svec. 257. Syst. nat. 6. p. 36. n. 8.*

*Gron. mus. 2. p. 78. n. 52. Salamandra atepidota, cauda teretiuscula.*

*Gesn. ovip. 31. Lacertus aquaticus.*

*Seb. mus. 2. p. 15. t. 12. f. 7. Salamandra ceylanica, Habitat in Europæ aquis dulcibus, stagnantibus.*

*Utrum hæc distincta species vel larva prioris nondum rite perspectum habeo. Lacerta aquatica*

\* \* \* \* *Cauda tereti imbricata, corpore longiore.*

Basiliscus. 27. L. cauda tereti longa, pinna dorsali radiata, occipite cristato.

*Seb. mus. 1. t. 100. f. 1.*

*Habitat in America australi.*

Igvana. 28. L. cauda tereti longa, futura dorsali dentata, crista gulæ denticulata.

*Amæn. acad. 1. p. 123. 287. Lacerta cauda tereti, pedibus pentadactylis, crista dorii longitudinali, gulæ pendula antice dentata.*

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 43. Idem.*

*Gron. mus. 2. p. 82. n. 60. Igvana.*

*Marcgr. bras. 236. f. 236.*



*Fonst. quadr. t. 77. f. 5.*  
*Jacob. mus. t. 4.*  
*Olear. mus. t. 6. f. 1. Yvana.*  
*Bont. jav. 56. t. 56. Lacerta Leguan.*  
*Marcgr. bras. 236. Senembi f. Igvana.*  
*Nieremb. nat. 271. t. 271.*  
*Ovied. amer. l. 13. c. 3.*  
*Rhed. exper. 100. t. 101. Igvane.*  
*Worm. mus. 313.*  
*Sloan. jam. 2. p. 333.*  
*Raj. quadr. 265. Lacertus Senembi & Igvana.*  
*Seb. mus. 1. t. 95. f. 1. 2.*  
                                   96. f. 4.  
                                   97. f. 3.  
                                   98. f. 1.  
*Clus. exot. 116. Yvana.*  
*Catesb. car. 2. p. 64. t. 64?*  
*Habitat in Indiis.*  
*Capitur linea laqueari; Caro omnium sapidissima, Si-*  
*philiticis noxia.*

Calotes. 29. L. cauda tereti longa, dorso antice capiteque postice dentato.

*Amœn. acad. 1. p. 289.*

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 44.*

*Seb. mus. 1. t. 95. f. 3, 4.*

*t. 93. f. 2.*

*Habitat in Asia: Zeylona.*

*Corpus caeruleum squamis acutis, subtus striatum. Spi-*  
*ne dorsi lamellatae.*

Agama. 30. L. cauda tereti longa, collo supra capiteque postice aculeato.

*Amœn. acad. 1. p. 288.*

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 44.*

*Seb. mus. 1. t. 107. f. 1. 2. 3.*

*Habitat in America.*

*Color corporis pallidus. Abdomen minime striatum.*

Umbra. 31. L. cauda tereti longa, nucha subcristata, occipite calloso; dorso striato.

*Habitat in Meridionalibus.*

*Plica profunda sub gula. Color corporis nebulosus.*



- Plica. 32. L. cauda tereti longa, occipite calloso, palpebris supra excoriatis, collo lateribus verrucoso subtus plicato.  
*Habitat in Indiis.*  
 Corpus præter caudam vix digito majus, in meo specimine, tectum undique squamis conicis (velut Chagrin). Occiput callosum & Supercilia subcrenata, supra excoriata cicatrice membranacea transverse in 3 partes sulco distincta. Pone aures ad latera capitis & colli verrucæ 2, muricatae. Collum subtus duplici plica. Dorsi sutura majoribus squamis antice quasi crenata. Ruga elevata a collo supra brachia excurrit utrinque & in medio trunci deflectitur. Cauda teres, tecta squamis minutissimis; vix manifeste verticillata, corpore duplo longior. Digniti longi, subtus squamis acutioribus scabri; ungues compressi.
- marmorata. 33. L. cauda tereti longa, gula subcristata antice dentata, dorso lævi.  
*Amœn. acad. 1. p. 129. 288.*  
*Mus. Ad. Fr. 1. p. 43.*  
*Seb. mus. 2. t. 76. f. 4.*  
*Habitat in Hispania.*  
 Corpus compressum; Cauda striata.
- bullaris. 34. L. cauda tereti longa, vesica gulari.  
*Catesb. car. 2. t. 66. Lacerta viridis jamaicensis.*  
*Habitat in Jamaica.*  
 Parva, corpore viridi; sub gula globus ruber vesicularis retractilis.
- strumosa. 35. L. cauda tereti longa, pectore gibbo protenso.  
*Seb. mus. 2. t. 20. f. 4. Salamandra mexicana strumosa.*  
*Habitat in America australi.*  
 Pectus s. Sternum antice prominet in mucronem obtusum.
- Tegui-  
xin. 36. L. cauda tereti longa, sutura laterali plicata.  
*Amœn. acad. 1. p. 128. Lacerta cauda tereti longa,*  
*pedibus pentadactylis, crista nulla, hypochondriis plicatis.*  
*Mus. Ad. Fr. 1. p. 45.*  
*Seb. mus. 1. t. 96. f. 1.*  
*Habitat in Indiis.*  
 Collum subtus triplici plica.



- aurata. 37. L. cauda tereti longiuscula, squamis rotundatis glabris, lateribus subfuscis.  
*Amoën. acad. 1. p. 294. Lacerta cauda tereti, pedibus pentadactylis, squamis rotundatis lævissimis subgriseis: lateralibus subfuscis.*  
*Mus. Ad. Fr. 1. p. 46. Lacerta barbara.*  
*Gron. mus. 2. p. 75. n. 48. Scincus?*  
*Seb. mus. 1. t. 89. f. 3.*  
*Aldr. quadr. 660. Lacertus cyprius scincoides.*  
*Habitat in Jersea Anglorum, Cypro.*  
*Viva colore auri pulcherrime nitet.*  
*Corpus teres quasi pingue. Aures concavæ.*
- punctata. 38. L. cauda tereti longa, dorso lineis duabus flavis: punctis nigris interspersis.  
*Mus. Ad. Fr. p. 46. Lacerta eadem.*  
*Seb. mus. 2. t. 2. f. 9.*  
*Habitat in Asia.*  
*Lineæ 2. flavescentes includunt dorsum & a lateribus eundem distinguunt.*
- lemniscata. 39. L. cauda tereti longa, dorso lineis octo striatis.  
*Mus. Ad. Fr. 1. p. 47. Lacerta eadem.*  
*Seb. mus. 1. t. 92. f. 4.*  
*Habitat in Guinea.*  
*Multum affinis L. agili.*
- fasciata. 40. L. cauda tereti longiuscula, dorso brunneo lineis quinque flavescentibus.  
*Catesb. car. 2. t. 67. Lacerta cauda cærulea.*  
*Habitat in Carolina.*
- lineata. 41. L. cauda tereti longa, palmis tetradactylis, corpore lineis quatuor flavis.  
*Mus. Ad. Fr. 1. p. 46. Lacerta cauda tereti longa, pedibus subunguiculatis fissis, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis.*  
*Seb. mus. 2. t. 41. f. 6. Lacerta zeilonica minor lemniscata.*  
*Habitat in Zeilona.*
- Chalcides. 42. L. cauda tereti longa, pedibus tridactylis.  
*Syst. nat. 36. n. 7. Lacerta eadem.*



Column. ecphr. 1. p. 35. t. XXXVI. Seps, Lacerta  
Chalcidica f. Chalcides.

Aldr. quadr. 638. Lacerta chalcidica.

Habitat in Europa australi, Africa.

Media inter Lacertas & Angues, sed auribus instructa.

angvina. 43. L. cauda extremo rigidula, corpore striato, pedibus  
pinniformibus. †

Seb. mus. 2. t. 68. f. 7. 8. Vermis serpentiformis ex  
africa.

Habitat in Cap. B. Spei lutosis, mihi non visa.

## 106. RANA. Corpus tetrapodum, nudum, ecau- datum.

Pipa. 1. R. digitis anticis muticis quadridentatis, posticis ungui-  
culatis.

Mus. Ad. Fr. 1. p. 49. Rana eadem.

Gron. mus. 2. p. 84. n. 64.

Seb. mus. 1. p. 121. t. 77. f. 1-4. Bufo f. Pipa ame-  
ricana.

Vincent. pip. 1726. t. 62. Bufo aquaticus surinamensis.

Bradl. nat. t. 22. f. 1. Rana surinamensis.

Vallisn. nat. 1. t. 41. f. 6.

Habitat Surinami.

Pullos e dorso nidulantes excludit.

Bufo. 2. R. corpore ventricoso verrucoso lurido fuscoque.

Fr. svec. 253. Rana palmis tetradactylis fissis, plantis  
hexadactylis palmatis: pollice brevior.

It. cel. 142.

Gesn. pisc. 807. Rubeta f. Phrynum.

Fonst. quadr.

Bradl. nat. t. 21. f. 2.

Raj. quadr. 252. Bufo f. Rubeta.

Habitat in Europæ nemorosis ruderatis umbrosis, impri-  
mis Ucraina. Paddor.

Devoratur a Falcone Buteone. Gesn. pisc. 807.

Verrucæ lactescentes venenatæ infuso, tactu, halitu. De-  
lectatur Cotula, Actæa, Stachydæ foetidis. Vivipara,  
mare, ut fertur, obstetricante. Insecta in fauces fasci-  
no revocat; nocturna, foæiens.

3. R.

---

Palmae in perisque Ranæ speciebus fissæ tetradactylæ, Plantæque pentadactylæ pal-  
matae, rarius vero obscure hexadactylæ.



Rubeta. 3. R. corpore verrucoso, ano obtuso subtus punctato.  
*Syst. nat.* 37. n. 5. Rana palmis tetradactylis fissis,  
 plantis pentadactylis subpalmatis, ano subtus pun-  
 ctato.

*It. Wgot.* 261.

*Habitat in Europa.*

gibbosa. 4. R. corpore ovato-convexo: vitta longitudinali cinereo-  
 dentata, pedibus fissis.

*Amoen. acad.* 1. p. 286. Rana palmis tetradactylis fissis,  
 plantis hexadactylis fissis, pollice latiusculo brevissi-  
 mo.

*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 48. Rana eadem.

*Habitat in Exteris regionibus.*

variega- 5. R. corpore verrucoso, abdomine albo nigro-maculato,  
 ta. plica gulari.

*Habitat in Exteris regionibus.*

*Bufoni similis sed parva, nigra, supra undique punctis  
 exasperata, subtus albo nigroque varia. Pedes mutici:  
 Palmis tetradactylis fissis; plantis pentadactylis palma-  
 tis. Ruga transversa sub collo.*

ventrico- 6. R. ore semiovato, jugulo prominulo.

sa. *Mus. Ad. Fr.* 1. p. 48. Rana eadem.

*Habitat in Indiis.*

marina. 7. R. scapulis gibbosis, clunibus nodosis.

*Seb. mus.* 1. t. 76. f. 1. Rana marina maxima.

*Habitat in America.*

*Palmæ tetradactylæ fissæ; Plantæ pentadactylæ subfissæ.*

typhonia. 8. R. auricularibus lobis ovatis.

*Habitat in America, clamitans nocte sono cornicis tetro  
 lucente. Rolander.*

*Dorsum rugis quatuor longitudinalibus, punctis elevatis,  
 maculisque nigris. Pedes mutici. Palmæ tetradactylæ  
 fissæ; Plantæ pentadactylæ palmatæ: digitis angu-  
 stis: secundo longissimo, absque unguibus orbiculatis.*

ocellata. 9. R. auribus ocellatis, pedibus muticis.

*Brown. jam.* 466. t. 41. f. 4. Rana maxima compressa  
 miscella.



*Habitat in America.*

*Ad aures macula ocellaris utrinque. Palmæ tetradactylæ fissæ, Plantæ pentadactylæ, subpalmatæ.*

cornuta. 10. R. palpebris conicis.

*Mus. Ad. Fr. l. p. 48. Rana eadem.*

*Seb. mus. 1. t. 72. f. 1, 2. Buro cornutus s. spinosus virginianus.*

*Habitat in Virginia, adspectu horrenda.*

marginata. 11. R. lateribus marginatis, corpore lævi, plantis fissis.

*Mus. Ad. Fr. p. 47. Rana lateribus marginatis.\**

*Habitat in Indiis.*

paradoxa. 12. R. femoribus postice oblique striatis. *Mus. Ad. Fr.*

*2. p. . .*

*Syst. nat. 36. n. 2. Lacerta cauda ancipiti, palmis tetradactylis fissis, plantis pentadactylis palmatis, abdomine ventricoso.*

*Mus. Ad. Fr. l. p. 49. Rana piscis.*

*Seb. mus. 1. t. 78. f. omnes.*

*Merian. surin. 71. t. 71.*

*Habitat Surinami.*

temporaria. 13. R. dorso planiusculo subangulato.

*Faun. svec. 250. Rana palmis tetradactylis fissis, plantis pentadactylis palmatis: pollice longiore.*

*It. oel. 154. Rana temporaria.*

*Gesn. ovip. 46. Rana aquatica innoxia.*

*Aldr. ovip. 89. Rana.*

*Fonst. quadr. t. 75 f. 5, 6, 7, 8.*

*Raj. quadr. 247. Rana aquatica.*

*Bradl. natur. t. 21. f. 1.*

*Habitat in Europa. Groda*

*Vere aquatica, æstate terrestris, victitat Culicibus. Devoratur ab Anatibus, Ardeis. Corde licet exempto salit.*

esculenta. 14. R. corpore angulato, dorso transverse gibbo, abdomine marginato.

*Roes. ran. 51. t. 13. Rana viridis aquatica.*

*Habitat in Europæ fontibus.*

*Viridis lineis 3 flavis: intermedia ab ore ad anum ducta.*

*Dorsum transverse gibboso-diffractum. Pedes postici palmati. Mas auribus globoso-inflatis. Cantu vespertino frequentiore prædicit pluviam.*



Hyla. 15. R. dorso angulato transverse gibbo, abdomine fascia replicata inguinali intercepto.

*Gesn. pisc.* 809. Rana gibbosa 4, 5.

*Habitat in Europa*

*Sonus campanarum boatum e longinquo imitatur.*

arborea. 16. R. corpore lævi: subtus punctis contiguis tuberculato, pedibus fissis, unguibus orbiculato-dilatatis.

*Amæn. acad.* 1. p. 125 Rana pedibus fissis; unguibus subrotundis, corpore lævi: pollice angustato.

*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 47. Rana eadem.

*Gron. mus.* 2. p. 84 n. 63. Rana.

*Seb. mus.* 1. t. 73 f. 3. Rana brasiliensis gracilis.

*Seb. mus.* 2. t. 78. f. 5. Rana americana rubra.

*Gesn. pisc.* 808. Ranunculus viridis.

β *Amæn. acad.* 1. p. 285. Rana pedibus fissis, palmis pentadactylis, plantis pentadactylis: geniculis subtus mucronatis.

*Lin. t. 1. foliis arborum Europæ, Americæ, Muscas in fauces revocans.*

boans. 17. R. corpore lævi: subtus punctis contiguis, pedibus palmatis pentadactylis, palmis tetradactylis, unguibus orbiculato-dilatatis.

*Amæn. acad.* 1. p. 285. Rana palmis tetradactylis, plantis pentadactylis palmatis, digitorum apicibus subrotundis.

*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 47. Rana eadem.

*Seb. mus.* 1. t. 71 f. 3, 4. Rana surinamensis.

*Habitat in America.*

*Simillima R. arborea, sed pedes omnes palmati & cornus ac in magnum, mucosus etiam lacteis, modo hæc sufficiant pro specie distinguenda.*



## II. SERPENTES.

*Os respirans.**Pedes Pinnæve nullæ.*

107. CROTALUS. *Scuta abdominalia.*  
*Scuta Squamæque subcaudales.*  
*Crepitaculum terminale caudæ.*

*Scutis Scutellis.*

192. horridus. 167—23: 2. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 39.*

♂

*Bradl. natur. t. 9. f. 1.**Seb. mus. 2. t. 95. f. 1.**Habitat in America.**Venenatissimus; antidotum Senega; a Sue consumitur; Aves Sciurosque ex arboribus in fauces revocat.*

195. Dryinas. 165—30. *Amœn. acad. 1. p. 297.*

♂

*Habitat in America.**Exalbidus maculis flavescens paucis.*

196. Durissus. 172—21: 3. *Amœn. acad. 1. p. 500.*

♂

*Kalm. act. Stockb. 1752. p. 310. & 1753. p. 52, 185.**Gron. mus. 2. p. 70. n. 45. Crotalophorus 174—22: 3?**Habitat in America.**Albo flavoque varius, maculis rhombeis nigris disco albis.*

108. BOA. *Scuta abdominalia.*  
*Scuta subcaudalia (absque crepitaculo.)*

276. Scytale. 250—26. *Gron. mus. 2. p. 55. n. 10.*

*Scheuch. sacr. t. 737. f. 1.**Habitat in America. †**Color ex albo nigroque undulatus. Squamæ capitis majores.*



280. canina. 203—77. *Mus. Ad. Fr.* 1. p. 39. t. 3.  
*Seb. mus.* 2. t. 96. f. 2.  
 t. 81. f. 1.  
*Habitat in Americæ arboribus.*  
*Viridis, fasciis albis interruptis.*  
*Adoratur ab Americanis. Rolander.*
299. Hipnale. 179—120. *Seb. mus.* 2. t. 34. f. 2.  
*Habitat in Asia.*  
*Griseo-flavescente varius.*
300. Constri- 240—60. *Amoen. acad.* 1. p. 497. t. 17. f. 3.  
 etor. *Mus. Ad. Fr.* 1. p. 38.  
*Gron. mus.* 2. p. 69. n. 43. Cenchris 248—60  
*Seb. mus.* 2. t. 98. f. 1.  
 t. 99. f. 1, 2.  
 t. 100. f. 1.  
 t. 101. f. 1.  
 t. 104. f. 1.  
 1. t. 53. f. 1.  
 t. 36. f. 5.  
 t. 62. f. 2, 1.  
*Habitat in Indiis.*
319. murina. 254—65. *Gron. mus.* 2. p. 70. n. 44. Coluber 254—69.  
*Seb. mus.* 2. t. 29. f. 1.  
*Habitat in America.*  
*Rufus maculis supra rotundatis.*
322. Cenchria. 265—57.  
*Habitat Surinami.*  
*Flavescens ocellis albidis iride grisea.*
345. Orophias. 281—64. *Mus. De Geer.*  
*Habitat . . .*  
*Facie Constrictoris, sed fuscus.*
375. Enydris. 270—105. *Mus. De Geer.*  
*Habitat in America.*  
*Variiegatus colore griseo. Dentes inferiores longi.*
418. Hortula- 290—128. *Mus. Ad. Fr.* 1. p. 37.  
 na. *Seb. mus.* 2. t. 84. f. 1.  
 t. 74. f. 1.



*Habitat in America.*

*Palida maculis lividis cuneiformibus. Caput areolis luteis horti instar.*

109. COLUBER. *Scuta abdominalia.*  
*Squamæ subcaudales.*

140. Vipera. 118—22. *Hasselqv. AÆ Ups. 1750. p. 24.*  
♂ *itin. 314. n. 60.*

*Habitat in Ægypto.*

*Brevissima, capite gibbo, squamis minutis. Uvula hęc Vipera est ægyptiorum, nec Berus.*

153. Atropos. 131—22. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 22. t. 13. f. 1.*  
♂

*Habitat in America.*

*Canus, ocellis fuscis iride alba.*

160. Leberis. 110—50.  
♂

*Habitat in Canada. Kalm.*

*Fasciæ lineares nigrae.*

161. Lutrix. 134—27.

*Habitat in Indiis.*

*Dorsum & Abdomen flava; Latera carulescentia.*

162. Calamarius. 140—22. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 23. t. 6 f. 3.*

*Habitat in America.*

*Lividus fasciis punctisque linearibus fuscis; subtus fusco-tessellatus.*

170. Constrictor. 130—40.

*Habitat in Canada. Kalm.*

*Maxillæ apex sinus triqueter.*

*Adoritur homines circum pedes sese convolvens, sed innocuus.*

174. Ammodytes. 142—32. *Amœn. acad. 1. p. 506. n. 25.*  
♂

*Bellon. it. n. 203. Druinus.*

*Aldr. serp. 169. Ammodytes.*

*Habi-*

*Vipera cornuta Hasselqv. AÆ. Ups. 1750. p. 27. est fictitius Coluber astu Arabum, qui cognibus aviculæ percusserunt caput eidemque inseruerunt.*



*Habitat in Oriente.*

*Nasus terminatus verruca erecta.*

175. Ceraistes. 150—25. Hasselqv. Act. Ups. 1750. p. 27.  
*iter. 315. n. 61. Coluber cornutus.*

*Bellon. itin. 203.*

*Habitat in Oriente.*

*Squamæ capitis omnes parvæ rotundatæ.*

*Dens mollis exit e palpebra superiore.*

177. plicatilis. 131—46. *Amœn. acad. 1. p. 301. n. 26.*

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 23.*

*Seb. mus. 1. t. 57. f. 5.*

*Habitat in Ternatais.*

*Lividus lateribus fuscis; subtus punctis triphoi ordine fuscis.*

178. Domicella. 118—60. *Amœn. acad. 1. p. 117. n. 5.*

*Seb. mus. 2. t. 54. f. 1.*

*Habitat in Asia.*

*Alvus fasciis nigricantibus, subtus concurrentibus.*

179. Alidras. 121—58. *Mus. De Geer.*

*Habitat in Indiis.*

*Albus totus.*

180. buccatus. 107—72. *Mus. Ad. Fr. p. 29. t. 19. f. 3.*

*Habitat in Indiis.*

*Fuscus fasciis albis. Caput album: fuscis punctis 2 verticis & triangulo supra nares.*

181. angulatus. 120—60. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 23. t. 15. f. 1.*

*Amœn. acad. 1. p. 119. n. 7.*

*Seb. mus. 2. t. 12. f. 3.*

*Habitat in Asia.*

*Griseo-fuscus fasciis nigris.*

183. Berus. 146—39. *Faun. svec. 260.*

*Amœn. acad. 1. p. 113. n. 1.*

*Aidr. serp. 115, 116.*

*Habitat in Europa. Huggorn.*

*fasciis abdominalibus CXLIV. Squamis caudæ XXXIX.*



184. Chersea. 150—34. *Faun. Svec.* 261.  
 ♂ *L. Act. Stockh.* 1749. p. 246. t. 6.  
*Aldr. serp.* 197. *Aspis* colore ferrugineo.  
*Habitat in Sveciæ depressis; venenatissimus*  
*& morsu sæpius lethalis in Svecia; An*  
*satis diversus ab Aspide, licet apud nos*  
*minor? Asping.*
189. cæruleus. 165—24. *Amœn. acad.* 1. p. 303. n. 31.  
*Seb. mus.* 2. t. 13. f. 3.  
*Habitat in America.*  
*Cærulescens squamis altero latere albis; sub-*  
*tus albus.*
190. albus. 170—20. *Mus. Ad. Fr.* 1. p. 24. t. 14. f. 2.  
*Habitat in Indiis.*  
*Albus immaculatus.*
192. *Aspis.* 146—46. *Gallis Aspice.*  
 ♂ *Habitat in Gallia.*  
*Rufus maculis dorsalibus fuscis alternis con-*  
*fluentibus in vittam.*  
*Similis Cherseæ, sed major.*
193. Typhlus. 140—53. *Mus. De Geer.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Cærulescens.*
201. Lebeti- 155—46. *Hasselqvist.*  
 ♂ nus. *Habitat in Oriente.*  
*Subnebulatus, subtus punctis fuscis.*
202. melano- 140—62. *Mus. Ad. Fr.* 1. p. 24. t. 15. f. 2.  
 cephalus. *Habitat in America.*  
*Fuscus glaberrimus capite atro.*
204. Cobella. 150—54. *Amœn. acad.* 1. p. 117. n. 14.  
 p. 302. n. 28.  
 p. 496. n. 14.  
*Gron. mus.* 2. p. 65. n. 32.  
*Seb. mus.* 2. t. 2. f. 6.  
*Habitat in America frequentissimus.*

Cine-

---

Colubri Squamæ caudales numerantur longitudinales, s. per paria, quamvis alter-  
 næ, cum anæ sese habeant, ut unicum scutum sub abdomine.



*Cinereus adpersus lineolis obliquis albis. Macula obliqua plumbea pone singulos oculos.*

207. *Reginæ*. 137—70. *Mus. Ad. Fr. p. 24. t. 13. f. 3.*

*Habitat in Indiis.*

*Fuscus abdomine albo nigroque vario.*

212. *severus*. 170—42. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 25. t. 8. f. 1.*

♂ *Seb. mus. 2. t. 54. f. 4.*

*Habitat in Asia.*

*Cinereus fasciis albis. Fascia cinerea inter oculos & pone nares.*

216. *Aurora*. 179—37. *Mus. Ad. Fr. p. 25. t. 19. f. 1.*

*Seb. mus. 2. t. 78. f. 3.*

*Habitat in America.*

*Lividus dorso flavo.*

217. *Sipedon*. 144—73. *Kalm.*

*Habitat in America septentrionali.*

*Fuscus.*

218. *maurus*. 152—66.

*Habitat Algeriæ. E. Brander.*

*Corpus supra fuscum lineis dorsalibus duabus; subtus atrum; a lineis dorsalibus ad abdomen utrinque fasciæ plures nigrae.*

219. *stolatus*. 143—76. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 26. t. 22. f. 1.*

♂ *Seb. mus. 2. t. 9. f. 1.*

*Habitat in America.*

*Griseus vittis 2 albis.*

*Scuta utrinque puncto nigro.*

220. *vittatus*. 142—78. *Amœn. acad. 1. p. 30. n. 27.*

*Mus. Ad. Fr. p. 26. t. 18. f. 2.*

*Gron. mus. 2. p. 65. n. 31. Coluber 155—62.*

*Seb. mus. 2. t. 45. f. 5.*

*t. 60. f. 2, 3.*

*Habitat in America.*

*Scuta margine fusca.*

*Vitta alba dentata sub cauda.*



221. miliaris. 162—59. Mus. Ad. Fr. p. 27.  
*Habitat in Indiis.*  
*Fascus: squamis macula alba. Subtus albus.*
227. rhombea-  
tus. 157—70. Mus. Ad. Fr. p. 27. t. 24. f. 2.  
*Habitat in Indiis.*  
*Ceruleus maculis nigris medio ceruleis  
rhombeis.*
229. cyaneus. 149—110. *Amoen. acad. 1. p. 493. n. 10.*  
*Seb. mus. 2. t. 43. f. 2.*  
*Habitat in America.*  
*Saturate ceruleus, habitu Ahetulle; subtus  
virens.*
230. Natrix. 170—60. *Faun. suec. 259. Snok.*  
*It. gott. 146.*  
*Amoen. acad. 1. p. 116. n. 3.*  
*Gron. mus. 2. p. 63. n. 27.*  
*Habitat in Europa; in junctis pariens.*  
*Niger macula alba utrinque ad collum.*
233. Æscula-  
pii. 190—43. *Amoen. acad. 1. p. 497. n. 15.*  
*Mus. Ad. Fr. 1. p. 29. t. 11. f. 2.*  
*Gron. mus. 2. p. 59. n. 18.*  
*Seb. mus. 2. t. 18. f. 4.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Fascie albe nigræque, hæ linea annulove al-  
bo dimidiata.*
234. agilis. 184—50. *Amoen. acad. 1. p. 304. n. 33.*  
*Mus. Ad. Fr. 1. p. 27. t. 21. f. 2.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Fascie fusce albæque.*
235. lacteus. 203—32. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 28. t. 18. f. 1.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Albus maculis geminatis atris. Vertex ater  
linea longitudinali alba.*
244. aulicus. 184—60. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 29. t. 12. f. 2.*  
*Seb. mus. 1. t. 91. f. 5.*  
*Habitat in America.*

Gri-

Serpentes quædam, collo duplo crassiore, sæpe ingurgitant, ob maxillas dilatabiles,  
nec articulatas.



*Griseus fasciis albis latere bifurcatis. Vertex albus.*

246. monilis. 164—82. *Mus. De Geer.*  
*Habitat in America.*  
*Corpus annulatum; monile punctis 3 albis a tergo.*
251. pallidus. 156—96. *Amœn. acad. 1. p. 494. n. 11.*  
*Mus. Ad. Fr. 1. p. 31. t. 7. f. 2.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Pallidus maculis griseis vagis punctisque fuscis. Lineolæ binæ interruptæ laterales nigricantes.*
252. lineatus. 169—84. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 30. t. 12. f. 1.*  
*t. 20. f. 1.*  
*Seb. mus. 2. t. 12. f. 3.*  
*Habitat in Asia.*  
*Cærulescens vittis linearibus 4 fuscis.*
253. Naja. 193—60. *Mus. Ad. Fr. p. 30. t. 21. f. 1.*  
 ♂  
*Seb. mus. 2. t. 90. f. 1, 2.*  
*t. 85. f. 1.*  
*t. 89. f. 1, 2, 3, 4.*  
*t. 97. f. 1, 2, 3, 4.*  
*t. 94. f. 1.*  
*1. t. 44. f. 1.*  
*Kæmpb. amœn. 565. t. 567.*  
*Amœn. acad. 1. p. 305.*  
*Habitat in India orientali.*  
*Colli latera dilatata in membranam supra pictam perspicillis albis.*  
*Omnium venenatissimus; antidotum Ophiorhiza; ab Ichneumone occiditur.*
254. Padera. 198—56. *Mus. Ad. Fr. 2. p. . .*  
*Habitat in Indiis.*  
*Macularum fuscæ multæ paria secundum dorsum connexa lineola; totidemque simplices maculæ ad latera.*
258. canus. 188—70. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 31. t. 11. f. 1*  
*Habitat in Indiis.*

*Canus*

Telo venenato reflexili armatos, signo ♂ notatus, observa.



- Canus fasciis subfuscis, ad latera puncta  
2 nivea.*
260. sibilans. 160—100. *Amœn. acad. 1. p. 302. n. 30.*  
*Seb. mus. 2. t. 52. f. 4.*  
*t. 56. f. 4.*  
*t. 107. f. 4.*  
*Habitat in Asia.*  
*Cærulescens vittis nigris, subtus albus.*
261. laticaudatus. 220—42. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 31. t. 16. f. 1.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Cinereus fasciis fuscis.*  
*Cauda obtusa compresso-anceps.*
262. Sirtalis. 150—114. *Kalm.*  
*Habitat in Canada.*  
*Vittæ tres viridi-cærulescentes in corpore  
fusco tenui striato.*
263. atrox. 196—69. *Amœn. acad. 1. p. 305 n. 35.*  
♂ *Mus. Ad. Fr. 1. p. 33. t. 22. f. 2.*  
*Seb. mus. 1. t. 43. f. 5.*  
*Habitat in Asia.*  
*Canus squamis carinatis.*  
*Caput depressum, compressum, angulatum  
squamis minimis.*
264. Sibon. 180—85. *Amœn. acad. 1. p. 304. n. 32.*  
*Seb. mus. 1. t. 14. f. 4.*  
*Habitat in Africa.*  
*Fusco-ferrugineus albo adpersus; subtus albus  
maculis fuscis.*
265. nebulatus. 185—81. *Mus. Ad. Fr. p. 32. t. 24. f. 1.*  
*Catesb. car. 2. p. 42. t. 42?*  
*Habitat in America.*  
*Fusco cinereoque nebulatus; subtus albo fuscoque  
varius; adscendit tibias & stringit.*
266. fuscus. 149—117. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 32. t. 17. f. 1.*  
*Seb. mus. 2. t. 54. f. 2.*  
*t. 71. f. 1.*  
*t. 72. f. 1.*  
*t. 87. f. 1.*  
*s. 91. f. 1.*



*Habitat in Asia.*

*Cinereo-fuscus, habitu Ahatullæ. Pone oculos macula oblonga fusca.*

267. Saturninus. 147—120. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 32. t. 9. f. 1.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Lividus cinereo-nebulosus. Oculi magni.*
270. candidus. 220—50. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 33. t. 7. f. 1.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Albicans fasciis fuscis.*
271. niveus. 209—62. *Mus. De Geer.*  
 ♂ *Seb. mus. 2. t. 15. f. 1.*  
*Habitat in Africa.*  
*Albus immaculatus.*
272. scaber. 228—44. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 36. t. 10. f. 1.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Fusco nigroque nebulatus, squamis carinatis.*  
*Vertex macula nigra postice bifida.*
273. carinatus. 157—115. *Mus. Ad. Fr. p. 31.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Plumbeus squamis margine pallidis. Subtus albus. Dorsum carinatum.*
275. corallinus. 193—82. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 33.*  
 ♂ *Seb. mus. 2. t. 17. f. 1.*  
*Habitat in Asia.*  
*Glaucus vittis tribus fuscis, squamis distinctibus; subtus pallidus punctis canis.*
276. ovivorus. 203—73. *Kalm.*  
*Pis. bras. 279. Guinpuaguara.*  
*Habitat in America.*
279. exoletus. 147—132. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 34. t. 10. f. 2.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Cinereo-cærulescens, habitu Ahatullæ.*
281. Situla. 236—45.  
*Habitat in Ægypto. Hasselqvist.*  
*Griseus vittis duabus nigris.*



282. Trifcalis. 195—86.

*Habitat in Indiis.*

Corpus glaucum. Lineolæ longitudinales dorsales tres fuscae ad nucham conjunctæ, quarum media supra anum desinit; insuper in singulo latere linea fusca cum prioribus duabus excurrentes ad apicem caudæ.

Cauda  $\frac{1}{5}$ .285. lemniscatus. 250—37. *Amœn. acad.* 1. p. 118. n. 6.

p. 413 n. 9.

*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 24. t. 14. f. 1.*Seb. mus.* 1. t. 10. f. ult.

2. t. 76. f. 3.

*Habitat in Asia.*

Fasciæ albæ nigraque, hæ annulis duabus albis saepe interruptæ. Corpus glaberrimum.

286. annulatus. 190—96. *Amœn. acad.* 1. p. 120. n. 9.

p. 305. n. 34.

*Mus. Ad. Fr.* p. 24. t. 8. f. 2.*Seb. mus.* 2. t. 38. f. 2.*Habitat in America.*

Albus maculis alternis fuscis rotundis, passim confluentibus.

287. Dipsas. 152—135. *Amœn. acad.* 1. p. 302. n. 29.

♂

*Gron. mus.* 2. p. 64. n. 30.*Seb. mus.* 2. t. 24. f. 3.*Habitat in America.*

Cærulescens squamis margine albidis. Cauda subtus sutura cærulescente.

290. Pelias. 187—103. *Mus. De Geer.**Habitat in Indiis.*

Fuscus pone oculos & verticem, reliqua nigro duplicata. Abdomen viride, utrinque linea flava.

293. Tyria. 210—83.

*Habitat in Aegypto. Hasselqvist.*

Albidus triplici ordine longitudinali macularum rhombearum fuscærum.



297. jugularis. 195—102.  
*Habitat in Ægypto. Hasselqvist.*  
*Niger jugulo sanguinolento.*
299. Petola. 209—90. *Amœn. acad.* 1. p. 306. n. 36.  
 p. 119. n. 8.  
 p. 495. n. 13.  
*Gron. mus.* 2. p. 57. n. 13.  
*Seb. mus.* 1. t. 54. f. 4.  
*Habitat in Africa.*  
*Plumbens fasciis testaceis.*
307. Molurus. 248—59. *Mus. De Geer.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Simillimus Boæ, sed scuta & squamæ capitis*  
*majores, ut in Colubris.*
313. Ahætulla. 163—150. *Amœn. acad.* p. 115. n. 2.  
 p. 495. n. 12.  
*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 35. t. 22. f. 3.  
*Gron. mus.* 2. p. 61. n. 24.  
*Seb. mus.* 2. t. 82. f. 1.  
 2. t. 12. f. 3.  
*Bradl. natur.* t. 9. f. 2.  
*Habitat in Asia, America.*  
*Viridi-aureus squamis apice nigris; Fascia*  
*nigra trans oculos.*
314. petolaris. 212—102. *Mus. Ad. Fr.* 1. p. 35. t. 9. f. 2.  
*Habitat in Indiis.*  
*Fuscus fasciis albis; subtus pallidus.*
316. Haje. 207—109. *Hasselqv. iter.* 317. n. 62. Coluber scu-  
 tis abd. 206, squam. caudal. 60.  
*Habitat in Ægypto inferiore.*  
*Maximus, ater fasciis obliquis & squamis*  
*dimidiato albis.*
323. filiformis. 165—158. *Mus. Ad. Fr.* p. 36. t. 17. f. 2.  
*Habitat in Indiis.*  
*Niger, angustissimus, subtus albus. Caput*  
*corpore crassius.*
325. pullatus. 217—108. *Amœn. acad.* 1. p. 300. n. 25.  
*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 35. t. 20. f. 3.



- Gron. mus. 2. p. 56. n. 12. Coluber 215-104.*  
*Seb. mus. 2. t. 20. f. 1.*  
*Habitat in Asia.*  
*Fasciæ atræ punctis albis. Tempora nivea maculis atris.*
326. Hippo- 232-94. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 36. t. 16. f. 2.*  
 crepis. *Habitat in America.*  
*Lividus maculis fuscis. Fascia fusca inter oculos & arcuata occipitis.*
328. minervæ. 238-90. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 36.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Glaucus vitta dorsali fusca. Vittæ capitis 3 fuscæ.*
337. cinereus. 200-137. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 37.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Cinereus abdomine albo angulato. Caudæ squamæ margine ferrugineæ.*
339. viridissi- 217-122. *Mus. Ad. Fr. 2. p. . .*  
 mus. *Habitat Surinami.*  
*Viridissimus scutis abdominis medio dilatatis.*
340. mucosus. 200-140. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 37. t. 23. f. 1.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Caput cærulescens.*
344. Cenchoa. 220-124. *Amœn. acad. 1. p. 306. n. 37.*  
*Seb. mus. 2. t. 16. f. 2, 3.*  
*Habitat in America.*  
*Fuscus maculis pallidis fasciis niveis. Caput subglobosum.*
- 359 myæteri- 192-167. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 28. t. 5. f. 1.*  
 ♂ zans. *t. 19. f. 2.*  
*Gron. mus. 2. p. 59. n. 19.*  
*Seb. mus. 2. t. 23. f. 2.*  
*Catesb. carol. 2. p. 47. t. 47.*  
*Habitat in America.*  
*Rostrum productum tetragonum; latera vitæ lineari pallida.*



385. cærule- 215--170. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 37. t. 20. f. 2.*  
fcens. *Habitat in Indiis.*  
*Cærulescens.*

Arges. - - - *Seb. mus. 2. t. 103. f. 1.*  
*Habitat in Africa.*  
*Occiput bilobo-gibbum. Corpus ocellis trans-*  
*versis per annulos digestis. Mihi non vi-*  
*sus, nec scuta notata.*

110. ANGUIS. *Squamæ abdominales &*  
*Squamæ subcaudales.*

160. bipes. 100-60. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 21. t. 28. f. 3.*  
*Seb. mus. 1. t. 53. f. 8.*  
*t. 86. f. 3.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Pedes 2 brevissimi, didactyli, ad anum.*  
*Pallida puncto fusco in singula squama.*

197. Melea- 165--32.  
\*gris. *Seb. mus. 2. t. 21. f. 4.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Similis A. bipedi, glauca punctis nigris mul-*  
*tiplici ordine longitudinali.*

---

COLUBRI a me non visi, a Cl GRONOVIO in *musco 2.* descripti.

165	abd.	141	caud.	24.	Gron.	41.	Seb.	2	t.	98.	f.	1.
175	-	136	-	39.	Gron.	33.	<i>ferrugineo cæruleo alboque varius.</i>					
177	-	135	-	42.	Gron.	39.	<i>albus maculis albis nigrisque.</i>					
201	-	159	-	42.	Gron.	29.	Seb.	1.	t.	33.	f.	6.
202	-	142	-	60.	Gron.	36.	Seb.	2.	t.	35.	f.	4.
203	-	153	-	50.	Gron.	34.	<i>albus lineis maculisque nigris.</i>					
212	-	149	-	63.	Gron.	33.	<i>albus cinctus lineis nigris.</i>					
213	-	138	-	74.	Gron.	37.	Seb.	2.	t.	20.	f.	2.
220	-	160	-	60.	Gron.	28.	<i>cinctus lineis albis nigrisque.</i>					
230	-	165	-	74.	Gron.	20.	Seb.	2.	t.	21.	f.	3.
234	-	174	-	60.	Gron.	22.	Seb.	2.	t.	33.	f.	1.
240	-	163	-	77.	Gron.	26.	Seb.	2.	t.	1.	f.	9.
260	-	180	-	80.	Gron.	20.	<i>albo brunneoque varius.</i>					
266	-	191	-	75.	Gron.	15.	<i>brunneus punctis albis.</i>					
298	-	202	-	96.	Gron.	14.	<i>maculis brunneis.</i>					
311	-	189	-	122.	Gron.	17.	<i>purpurascens maculis atris.</i>					
314	-	172	-	142.	Gron.	23.	<i>cæruleus linea laterali atra.</i>					
315	-	190	-	325.	Gron.	28.	<i>cinctus lineis albis nigrisque.</i>					
342	-	272	-	70.	Gron.	11.	Seb.	2.	t.	199.	f.	2.



198. colubri- 180--18. *Hasselqv. iter. 320. n. 65. A3*  
na. *Habitat in Ægypto.*  
*Pallido fuscoque pulchre variegata.*
209. Jaculus. 186- 23. *Hasselqv. iter. 319. n. 64. n.*  
*Habitat in Ægypto.*  
*Squamæ abdominis paulo latiores.*
212. maculata. 200--12. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 21. t. 21. f. 3.*  
*Gron. mus. 2. p. 53. n. 5.*  
*Seb. mus. 2. t. 100. f. 2.*  
*1. t. 53. f. 7.*  
*Habitat in America.*  
*Supra flava, vitta dorsali fasciisque linea-*  
*ribus fuscis.*
214. reticulata. 177--37. *Gron. mus. 2. p. 54. n. 7.*  
*Scheuch. sacr. t. 747. f. 4.*  
*Habitat in America. †*  
*Color squamarum fuscus disco albo.*
215. Cerastes. 200--15. *Hasselqv. Act. Ups. 1750. p. 28.*  
*it. 320. n. 66.*  
*Habitat in Ægypto. †*
237. lumbrica- 230--7. *Gron. mus. 2. p. 52. n. 3.*  
lis. *Brown. jam. 460. t. 44. f. 1.*  
*Seb. mus. 1. p. 137. t. 86. f. 2.*  
*Habitat in America. †*  
*Color ex albido flavescens.*
250. laticauda. 200--50. *Mus. Ad. Fr. 2. p. . .*  
*Habitat Surinami.*  
*Cauda compressa, acuta, pallida fasciis fuscis.*
253. Scytale. 240--13. *Amœn. acad. 1. p. 296.*  
*Mus. Ad. Fr. 1. p. 21. t. 6 f. 2.*  
*Gron. mus. 2. n. 4. Anguis 227. 14.*  
*Seb. mus. 2. t. 2. f. 1, 2, 3, 4.*  
*t. 7. f. 4.*  
*t. 20. f. 3.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Albida squamarum marginibus passim fer-*  
*rugineis, fasciis fuscis.*



262. Eryx. Gron. mus. 2. p. 35. n. 9. (126—136.)  
*Habitat in America (non asi.)*  
*Cinerea lineis tribus nigris; subtus ceru-*  
*lescens.*
270. fragilis. 135—135. *Faus. (vec. 258. Ormista Kájupetormil*  
*Aldr. serp. 245. Cæcilia vulgaris.*  
*Habitat in Europa.*  
*Hujus maxima fragilitas lepide explicata a*  
*Lemery in dictionario.*

III. AMPHISBÆNA. *Annuli trunci caudæque.*

230. fuligino- 200—30. *Amœn. acad. 1. p. 295.*  
 1a. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 20.*  
*Gron. mus. 2 p. 1. Amphisbæna 209—25.*  
*Raj. quadr. 288.*  
*Seb. mus. 2. t. 1. f. 7.*  
                   *t. 18. f. 2.*  
                   *t. 22. f. 3.*  
                   *t. 73. f. 4.*  
                   *t. 100. f. 3.*  
                   *1. t. 88. f. 3.*  
*Habitat in America.*  
*Albo nigroque varia.*
239. alba. 223—16. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 26. t. 4. f. 2.*  
*Seb. mus. 2. t. 24. f. 1.*  
                   *t. 6. f. 4.*  
*Habitat in America.*  
*Alba tota.*

III. CÆCILIA. *Rugæ trunci caudæque.*  
*Labrum superius tentaculis 2.*

135. tentacula- 135—0. *Amœn. acad. 1. p. 489. t. 17. f. 2.*  
 ta. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 19. t. 5. f. 2.*  
*Gron mus. 2. n. 1. p. 52.*  
*Habitat in America.*
350. glutinosa. 340—10. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 19. t. 4. f. 1.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Fusca, linea laterali albida.*



## III. NANTES.

*Spiracula lateralia.*  
*Pinna natatoria.*

113. PETROMYZON. *Spiracula VII ad latera colli.*

*Fistula in vertice.*

*Pinnae pectorales aut ventrales nullae.*

marinus. 1. P. ore intus barbato, pinna dorsali posteriore a cauda distincta.

*Art. gen. 64. syn. 90. Petromyzon maculosus, ordinibus dentium circiter viginti.*

*Bell. pisc. 76. Mustela f. Lampetra.*

*Gesn. pisc. 590. Mustela f. Lampetra.*

*Rond. pisc. 398. Will. icht. 105. Raj. pisc. 35. Lampetra.*

*Habitat in Mari Europæo.*

fluviatilis. 2. P. pinna dorsali posteriori angulata. *Fn. suec. 273.*

*Art. gen. 64. syn. 89. spec. 99. Petromyzon unico ordine denticulorum minimorum in limbo oris, præter inferiores majores.*

*Gesn. pisc. 597. Lampredæ alterum genus.*

*Salv. pisc. 63. Pryck.*

*Fonst. pisc. t. 24. f. 6. Pricka.*

*Will. icht. 106. Raj. pisc. 35. Lampetræ medium genus.*

*Habitat in fluviis Europæ. Neinogor.*

*Adhæret cre, noctibus tenebrosis cono cavo piscatur.*

branchialis. 3. P. pinna dorsali posteriore lineari, labio oris superiore latere lobato. *Fn. suec. 274.*

*Rond. pisc. 202. Gesn. pisc. 598. Will. icht. 104. Raj. pisc. 35. Lampetra parva & fluviatilis.*

*Salv. pisc. 63. Lampetra minor.*

*Habitat in aquis dulcibus Europæ, branchiis piscium inhaerens. Lin. ahl.*

114. RA-



114. RAJA. *Spiracula* V subtus ad colium.  
*Corpus* depressum.  
*Os* sub capite.

\* *Dentibus acutis.*

- Torpe- 1. R. tota lævis. *Art. gen.* 73. *syn.* 102. *Amœn. acad.*  
do. 1. p. 307. *Mus. Ad. Fr. I. p. 52.*  
*Bell. pisc.* 89, 90. *Rond. pisc.* 358. *Salv. pisc.* 142.  
*Gesn. pisc.* 988. *Raj. pisc.* 28. Torpedo.  
*Kæmph. exot.* 509. t. 510. Torpedo.  
*Habitat in Sinu Persico, M. Mediterraneo.*  
*Iners, omnium injuriæ obnoxius se vindicat motu tre-*  
*mulo proprio. Act. haffn.* 5. obs. 97. *Rhed. exper.* 53.  
*Kæmph. amœn.* 514. *Reaun. act.* 1714. *Hall. boerb.*  
4. p. 13. *retardato spiritu præservatur.*
- Batis. 2. R. varia, dorso medio glabro, cauda unico aculeorum  
ordine. *Art. gen.* 73. *syn.* 102.  
*Rond. pisc.* 346. *Gesn. pisc.* 791. *Raj. pisc.* 25. Ra-  
ja undulata s. cinerea.  
*Fonst. pisc.* Raja undulata.  
*Habitat in Oceano Europæo.*  
*Corpus supra lituris nigris flexuosis.*
- Oxyrin- 3. R. varia, dorso medio tuberculis decem aculeatis. *Art.*  
chus. *gen.* 72. *syn.* 101.  
*Salv. pisc.* 149. Lævi-Raja.  
*Gesn. pisc.* 792. *Will. icht.* 77. *Rai. pisc.* 26. Raja  
oxyrinchos major.  
*Habitat in M. Mediterraneo & O. Europæo.*  
*Aculeus ante singulos oculos.*
- Mirale- 4. R. dorso ventreque glabris, aculeis ad oculos, terno-  
tus. que eorum ordine in cauda. *Art. gen.* 72. *syn.* 101.  
*Salv. pisc.* 150. Raja stellaris.  
*Fonst. pisc. . . t. 10. f. 4.* Raja oculata.  
*Will. icht.* 72. *Raj. pisc.* 27. Raja lævis oculata.  
*Habitat in mari Mediterraneo.*  
*Ocellus supra utramque alam.*
- Fulloni- 5. R. dorso toto aculeato, aculeorum ordine simplici ad  
ca. oculos, duplici in cauda. *Art. gen.* 72. *syn.* 101.  
*Rond. pisc.* 356. *Gesn. pisc.* 797. Raja fullonica.



*Will. icht.* 78. Raja fullonica; Raja aspera.

*Raj. pisc.* 26. Raja aspera.

*Habitat in M. Europæo.*

\* \* *Dentibus obtusis.*

Aquila. 6. R. corpore glabro, aculeo longo ferrato in cauda pin-  
nata. *Art. gen.* 72. *syn.* 100.

*Salv. pisc.* 146. *Rond. pisc.* 338. *Bellon. pisc.* 97. *Gesn.*  
*pisc.* 75. Aquila marina.

*Raj. pisc.* 23. Aquila.

*Will. icht.* 64. Aquila.

*Column. ecphr.* 1. p. 3. t. 2. Pastinaca marina lævis  
altera oxypterydes.

*Habitat in Mari Mediterraneo.*

Altavela. 7. R. corpore glabro, aculeis duobus postice ferratis in  
cauda apterygia. *Art. gen.* 71. *syn.* 109.

*Column. ecphr.* 1. p. 4. t. 2. *Will. icht.* 65. *Raj. pisc.*  
24. Pastinaca marina altera pteryplateja f. Altavela.

*Habitat in Mari Mediterraneo.*

*Cauda corpore brevior est.*

Pastina- 8. R. corpore glabro, aculeo longo anterieus ferrato in  
ca. cauda apterygia. *Art. gen.* 71. *syn.* 100.

*Bell. pisc.* 94. Pastinaca marina lævis.

*Rond. pisc.* 331. *Salv. pisc.* 144. Pastinaca.

*Gesn. pisc.* 679. Pastinaca marina.

*Will. icht.* 67. Pastinaca marina. 1.

*Raj. pisc.* 24. Pastinaca marina lævis.

*Habitat in Europa.*

*Caudæ aculeus venenatus veteribus & recentioribus.*

*Fato Ulyssis clarus.*

clavata. 9. R. aculeata, dentibus tuberculosis, cartilagine trans-  
versa ventrali. *Art. gen.* 71. *syn.* 99. *spec.* 103. *Fn.*  
*svéc.* 268. *It. Wgot.* 175.

*Rond. pisc.* 353. *Gesn. pisc.* 795. Raja clavata.

*Will. icht.* 74. *Raj. pisc.* 26. Raja clavata.

*Habitat in Oceano Europæo.*

Rhinoba- 10. R. oblonga, unico aculeorum ordine in medio  
tos. dorso. *Art. gen.* 70. *syn.* 99.



*Bell. pisc.* 78. *Gesn. pisc.* 903. Squato - Raja f. Rhinobatos.  
*Salv. pisc.* 153. *Will. icht.* 79. *Raj. pisc.* 28. Rhinobatos f. Squatino - Raja.  
*Habitat* Genuæ, Venetiis.

115. SQUALUS. *Spiracula* V ad latera colli.  
*Corpus* oblongum teretiufculum.  
*Os* in anteriore capitis parte.

\* *Dorso spinoso: pinna ani nulla.*

- Acanthias. 1. S. pinna ani nulla, dorso spinoso, corpore teretiufculo.  
*Art. gen* 66. *syn.* 94. *spec.* 102. *Fn. Svec.* 296.  
*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 53. *It. Wgot.* 174.  
*Rond. pisc.* 373. Galeus acanthias.  
*Gesn. pisc.* 607. Galeus acanthias.  
*Bellon. pisc.* 69. Mustelus spinax.  
*Salv. pisc.* 135 f. 136. Mustelus spinax.  
*Will. icht.* 56. Galeus acanthias f. spinax.  
*Raj. pisc.* 21. Galeus acanthias f. spinax.  
*Habitat in Oceano Europæo. Neij*
- Centrina. 2. S. pinna ani nulla, dorso spinoso, corpore sub triangulari *Art. gen* 67. n. 5. *syn.* 95.  
*Rond. pisc.* 334. Centrina  
*Salv. pisc.* 156-158. Centrina.  
*Gesn. pisc.* 609. Centrina.  
*Will. icht.* 58. Centrina.  
*Raj. pisc.* 21. Centrina.  
*Habitat in Mari Mediterraneo.*  
*Pinna dorsi anterior spina antrosum radios decussante, posterior retrorsum.*
- Spinax. 3. S. pinna ani nulla, dorso spinoso, naribus terminalibus.  
*Art. gen.* 67. *syn.* 95.  
*Will. icht.* 57. Galeus acanthias f. spinax fuscus.  
*Raj. pisc.* 21. Galeus acanthias f. spinax fuscus.  
*Habitat in Europa.*
- Squatina. 4. S. pinna ani nulla, ore terminali. *Art. gen* 67. n. 6.  
*syn.* 95.  
*Bellon. pisc.* 78. Squatina.  
*Rondel. pisc.* 367. Squatina.



*Gesn. pisc.* 899. Squatina.

*Will. icht.* 79. Squatina.

*Raj. pisc.* 26. Squatina.

*Habitat in Oceano Europæo.*

*Media inter Squalos & Rajas, ore in apice capitis, nec subtus.*

\* \* *Dorso mutico, dentibus acutis; cum pinna ani.*

Zygæna. 5. S. capite latissimo transverso malleiformi. *Art. gen.* 67.

*syn.* 96. *Mus. Ad. Fr.* 1. p. 52. \*

*Bell. pisc.* 60. Zygæna f. Libella.

*Rondel. pisc.* 280. Zygæna.

*Gesn. pisc.* 1050. Zygæna.

*Salv. pisc.* 128. Libella.

*Will. icht.* 55. Zygæna.

*Raj. pisc.* 20. Zygæna.

*Habitat in Europa, America.*

Tiburo. 6. S. capite latissimo cordato.

*Will. icht.* 55. Zygænae affinis, capite triangulo.

*Marcgr. bras.* 181. Tiburonis species minor.

*Habitat in America, præcedenti affinis.*

Galeus. 7. S. naribus ori vicinis, foraminibus ad oculos. *Art.*

*gen.* 68. n. 9. *syn.* 97.

*Rond. pisc.* 377. Galeus canis.

*Gesn. pisc.* 167. Galeus canis.

*Salv. pisc.* 130. Canis galeus.

*Will. icht.* 51. Canis galeus.

*Raj. pisc.* 20. Canis galeus.

*Habitat in Oceano Europæo.*

Canicu- 8. S. rufo-varius, pinna ani medio inter anum caudam-  
la. que pinnatam. *Art. gen.* 68. *syn.* 97.

*Osbeck. iter.* 70. Squalus conductus.

*Rond. pisc.* 380. Canicula aristotelis.

*Gesn. pisc.* 168. Canicula aristotelis.

*Salv. pisc.* . . . Catulus major.

*Will. icht.* 62. *Raj. pisc.* 22. Catulus major vul-  
garis.

*Habitat in Oceano Europæo.*

9. S.

Squali vivipari sunt, foramine in ore aperto, pone utrumque oculum, noctu splendent, resurpiti vocant, naves sequuntur in Indias ut cadaveribus satientur. Den-  
tes Glossopetræ.



Catulus. 9. S. dorso variegato mutico, pinnis ventralibus concretis, dorsalibus caudæ approximatis. *Art. gen. 69. syn.*

97.  
*Gron. mus. 2. n. 199. Squalus idem.*

*Salv. pisc. 137. Catulus minor.*

*Will. icht. 34. Catulus minor.*

*Raj. pisc. 22. Catulus minor vulgaris.*

*Habitat in Oceano Europæ.*

stellaris. 10. S. varius inermis, pinnis ventralibus discretis, dorsalibus caudæ approximatis. *Art. gen. 69. syn. 97.*

*Gron. mus. 2. n. 200*

*Will. icht. 63. Catulus maximus.*

*Raj. pisc. 22. Catulus maximus.*

*Habitat in Mari Europæo.*

glaucus. 11. S. fossula triangulari in extremo dorso, foraminibus natis ad oculos. *Art. gen. 69. n. 1, syn. 98.*

*Rond. pisc. 378. Gesn. pisc. 609. Will. icht. 49. Raj. pisc. 20. Galeus glaucus.*

*Habitat in Oceano Europæo.*

Carcharias. 12. S. dorso plano, dentibus ferratis. *Art. gen. 70. syn. 98.*

*Rond. pisc. 390. Lamia.*

*Gesn. pisc. 173. Will. icht. 47. Raj. pisc. 18. Canis Carcharias f. Lamia.*

*Habitat in Europa.*

*Jonam Prophetam, ut veteres Herculem trinoctem, in hujus ventriculo tridui spatii, habuisse verosimile est.*

\* \* \* *Dentibus granulatis.*

Mustelus. 13. S. dentibus obtusis. *Art. gen. 66. syn. 93.*

*Gesn. pisc. 608. Rond. pisc. 375. Galeus lævis.*

*Salv. pisc. 135, 137. Mustelus lævis.*

*Will. icht. 60. Raj. pisc. 22. Mustelus lævis primus.*

*Habitat in Europa.*

Pristis. 14. S. rostro ensiformi osseo plano utrinque dentato.

*Art. gen. 66. syn. 93. Faun. svec. 270. Mus. Ad. Fr.*

*1. p. 52. Squalus rostro longo cuspidato osseo plano utrinque dentato.*

*Bellon. pisc. 66. Serra marina.*

*Rond. pisc. 487. Pristis.*



*Clus. exot.* 136. *Pristis* f. *Serra piscis*.  
*Will. icht.* 61. *Raj. pisc.* 24. *Pristis* f. *Serra piscis*.  
*Habitat in Europa. Sagfirsk.*

116. CHIMÆRA. *Spiracula* solitaria sub collo.  
*Oris* labium superius bipartitum.  
*Dentes* primores incisores, bini  
 supra infraque.

monstro- 1. *C. rostro subtus plicis pertusis.*  
 sa. *Mus. Ad. Fr.* 1. p. 53. t. 25. *Chimæra*.  
*Clus. exot.* 136. t. 137. Genus *Galei*.  
*Will. icht.* 57. *Galeus acanthias clusii*.  
*Raj. pisc.* 23. *Galeus acanthias*.  
*Habitat in mari Atlantico.*

Callo- 2. *C. rostro subtus labro inflexo lævi.*  
 rynchus *Gron. mus.* 59. n. 130. t. 4. *Callorynchus*.  
*Fresier. itin.* 1. p. 211. t. 17. f. 4. *Pejegallo*.  
*Habitat in mari Æthiopico.*

117. LOPHIUS. *Spiracula* solitaria, pone brachia.  
*Pinnæ* pectorales brachiis insi-  
 dentes.

piscato- 1. *L. depressus, capite rotundato.*  
 rius. *Art. gen.* 63. *syn.* 87. *Lophius ore cirroso*.  
*It. Scan.* 327. *Lophius ore cirroso*.  
*Mus. Ad. Fr.* 55. *Lophius ore cirroso*.  
*Gron. mus.* 1. p. 57. *Lophius ore cirroso*.  
*Charl. oenom.* 199. t. 201. *Rana piscatrix*.  
*Olear. mus.* 37. t. 23. f. 4. *Rana piscatrix*.  
*Habitat in Oceano Europæo, sub lapidum fornicibus.*  
*Pinnæ D. 10. P. 24. V. 5. A. 9. C. 8.*  
*Caput corpore majus. Piscatur tentaculis binis capitis*  
*tamquam linea.*

Vesperti- 2. *L. depressus, capite rostrato.*  
 lio. *Art. syn.* 88. *Lophius fronte unicorni*.  
*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 55. *Lophius fronte unicorni*.



*Gron. mus.* 1. n. 129. Lophius fronte unicorni.  
*Seb. mus.* 1. p. 118. t. 74. f. 2. Rana piscatrix ame-  
 -ricana.  
*Marcgr. bras.* 143. Guacu-cuja.  
*Raj. pisc.* 30. Guacu-cuja.  
*Habitat in Oceano Americano.*  
*Pinne D.* 5. *P.* 10. *V.* 6. *A.* 0. *C.* 15.  
*Confer. Brown. jam.* 157. t. 48. f. 3.

histrion. 3. L. compressus.

*Chin. Lagerstr.* 21. Lophius pinnis dorsalibus tribus.  
*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 56. Balistes f. Guaperua chinensis.  
*It. W'goth.* 137. t. 3. f. 5. Balistes f. Guaperua.  
*Marcgr. bras.* 150. Guaperua.  
*Will. icht.* 50. t. E. 2. f. 2. Guaperua.  
*Os. iter.* 305. Lophius tumidus.  
*Habitat in Pelago inter lucum natantem.*  
*Pinne D.* 1, 1, 12. *P.* 10. *V.* 5. *A.* 7. *C.* 10.

118. ACIPENSER, *Spiracula* lateralia solitaria, li-  
 nearia.

Os sub capite, retractile, eden-  
 tulum. *Cirri* sub rostro, an-  
 te os.

Sturio. 1. A. cirris 4, squamis dorsalibus 11. *Mus. Ad. Fr.* 1.  
 p. 54. t. 18. f. 2.

*It. Scan.* 187. Acipenser.

*Art. gen.* 65. *syn.* 91. Acipenser corpore tuberculis spi-  
 -nolis aspero.

*Fr. suec.* 27. Acipenser idem.

*Gron. mus.* 2. p. 42. Acipenser idem.

*Habitat in mari Europæo.*

*Pinne D.* 31. *P.* 30. *V.* 19. *A.* 24. *C.* 24.

*Severi imp. ævo a coronatis ministris præeunte tibicine  
 ad epulas adsportabatur.*

ruthenus. 2. A. cirris 4, squamis dorsalibus 15. *Mus. Ad. Fr.* 1.  
 p. 54. t. 27. f. 2. & t. 28. f. 1.

*Fr. suec.* 272. Acipenser ordinibus 5 squamarum ossea-  
 -rum: intermedio osliculis 15.



*Habitat in Rutheno; introductus a Rege Friderico I in  
Mælerum Suecia. Herlett*  
*Ova hujus & Hujonis pro Garo Cavear dicto.*

Huso. 3. *A. cirris 4? corpore nudo.*  
*Art. gen. 65. syn. 92. Acipenser tuberculis catens.*  
*Habitat in Danubio, fluviusque Imperii Rna.*  
*Alii cirros 4, alii 8 trahunt in nobis non . . . 20-*  
*riam pro lineis curruum præstantissimum; in . . . b-*  
*thyocolla præparatur & ex ovis Garum conficitur.*

Plecosto-4. *A. cirris duobus. Mus. Ad. Fr. 1. p. 55. t. 23.*  
mus. *f. 4.*  
*Gron. mus. 1. n. 67. t. 3. f. 1, 2. Plecostomus dorso*  
*dipterygio, cirris duobus, cauda bifurca.*  
*Habitat Surinami.*  
*Pinne D. 8, I. P.  $\frac{1}{4}$ , V. 6. A. 5. C. 12.*  
*Acipenseris vivipari sunt, uti Petromyzon.*



## CLASSIS IV.

## PISCES.

AQUEI Elementi muti surdique Volucres compendiosissimi respirant *Branchiis* liberis, natant *Pinnis* radiatis, vestiuntur *Squamis* cartilagineis.

INSTRUUNTUR Capite, Thorace, Abdomine, Cauda, *Pinnis*; Cerebro Medullaque spinali, Corde uniloculari uniaurito, *Branchiis*, Diaphragmate, Hepate Vesiculaque fellea, Liene, Renibus Vesicaque urinaria, Vesiculis seminalibus Ovariisque, Intestinis cæcoque, Membrana nictitante.

DESTITUUNTUR Palpebris, Auribus Auriculisque, Collo, artuum *Brachiis* *Tibiisque*, Pene Vulvæ.

DIVIDITUR horum Corpus externum in *Caput*, *Truncum*, *Pinnas*.

CAPUT compressum (Cathetoplateum) s. depressum (Plagioplateum).

*Os* Labiis mobilibus, aut fixis clausile.

*Dentes* sæpe in *Maxillis*, *Lingua*, *Fauce*.

*Oculi* 2, nudi, membrana nictitante; *Pupilla* globosa.

*Nares* pertusæ, sæpe geminatæ, minus prominentes.

*Cirri* filiformes, molliusculi, labiis interdum inserti.

*Aperturæ* branchiarum per branchias in os hiantes.

*Opercula* branchias tegentia, aperturas claudentia.

*Branchiæ* extus spirantes comprimendæ, sæpius quatuor, radio arcuato osseo adnatæ, radiis liberis pectinatæ.

TRUNCUS squamosus, mucosus, oblongus, postice angustatus in Caudam: *Squamæ* pierisque cartilagineæ, rarius ciliatæ, nonnullis osseæ ut piscis loricatus evadat.



*Linea lateralis* utrinque distincta a linea interstitiali, sæpius ex glandulis *punctata*, rarius *loricata*, utraque *recta* aut *curvata*.

*Thorax* refertus Corde intra Pericardium suum.

*Abdomen* costatum Visceribus, Intestinis, Vesicula aërea.

*Anus* abdomen terminans, communis Intestinis, Vesicæ & Genitalibus.

*Cauda* postica Trunci, solida, musculosa.

**PINNÆ** membranaceæ expandendæ *Radiis* cartilagineis: qui

*Spinosi* duriores, ossei, simplices, pungentes. (\*)

*Molles* flexiles, tendinei, dichotomi, mutici.

*Branchiostegæ* sub operculis branchiarum plicatiles radiata membrana.

*Dorsalis* dorso longitudinalis imposita, sæpe 1, rarius 2, paucissimis 3.

*Adiposa*, dorsalis spuria, radiis destituta.

*Pectorales* ad latera thoracis positæ.

*Ventrales* abdomini subtus annexæ.

*Analisis* pone anum, sub cauda, longitudinalis.

*Caudalis* terminalis, perpendicularis: *rotunda*, *integra*, s. *bifurca*.

**PISCES** hi muti surdique ætheris sonum *non audiunt*, aëris licet tremorem sentiant, *Respirant* latere extrorsum aquam, *Movent* se Pinnis, dum *Caudali* propellantur, *Dorsali Analique* tamquam Gubernaculo reguntur, *Pectoralibus* tamquam Alis attolluntur, *Ventralibus* tamquam Pedibus insistent. *Fugiunt* natatu diversimodo; *Defenduntur* Spinis tamquam murice; *Visitant* Mucos, Insectis, Vermibus, Cadaveribus, Pisciculis, Plantis.

*Historia* horum ex Structura, Alimento, Solo, Moribus, Migrationibus & Ufu in Piscatura, Culina, Oeconomia, Mechanica, Medicina.

**LOCUS** omnium aquaticus est; forte etiam omnes marini; sed alii imprimis *lacustres* aquas dulces inhabitantes; varii etiam *fluviales*, sæpe e mari ascendentes; plurimi mere  
*mari-*

(\*) Recumbens spina nonnullis antrosum decumbit ante pinnam dorſi aut ani.



*marini*, qui aquas dulces non ferunt; horum plerique littora adeunt pro generandis (\*) & pariendis ovis, calidior aqua excludendis, nisi mere *pelagici* natantibus ovis, a littoribus semper alieni, sed omnium alii *diurni*, alii *nocturni*; illi plerique natant in aquis, hi vero sæpius in fundo paucuntur. Alii deinum subſolitarii vagantur, alii gregatim degunt.

VICTUS tenuis e piscibus nuper enectis, thoracicis, exercitatis; imprimis aſſati, veteribus in pretio, hodiernis in deliciis.

ICHTHYOLOGICI Practici *Bellonius, Rondeletius, Salvianus, Gesnerus, Aldrovandus, Willugbaeus, Rajus.*

Theoretici *Artedi! Nos, Gronovii, Hasselqvist*, radios pinnarum observarunt; At *Vaentinus* defectum artis exposuit; *Catesbaeus* pulchre quosdam depinxit americanos.

Synonyma ab *Artedio* petenda, ego itaque ea seposui.

DIVISIONEM Piscium, artis normam, a variis partibus tentarunt varii. Recentiorum immortalis *Artedi* Spinosos *Acanthopterygios* & Inermes *Malacopterygios* secundam Membranam *Branchiostegam* secutus, sed deseruit non semel in bivio constitutum; novam itaque tentabo viam a PEDIBUS *ante Alas, sub Alis, pone Alas* sitis.

Apertura instructa operculis pinnaque branchiali: dum

Pinnae *ventrales*: vel *nullae* omnino APODES. 1.

— — *ante* pinnas Pectorales JUGULARES. 2.

— — *sub* pinnis Pectoralibus THORACICI. 3.

— — *pone* pinnas Pectorales ABDOMINALES. 4.

— — Destituta operculis pinnisve branchialibus BRANCHIOSTEGI. 5.

(\*) Generatio Piscium etiamnum obscura est.



## CHARACTERES PISCIUM.

## I. APODES.

119. MURÆNA Aperturæ *branchiarum ad latera thoracis.*  
 120. GYMNOTUS Dorsum *apterygiūm.*  
 121. TRICHIURUS Cauda *aptera.*  
 122. ANARHICHAS Dentes *rotundati.*  
 123. AMMODYTES Caput *corpore angustius.*  
 124. STROMATEUS Corpus *ovatum.*  
 125. XIPHIAS Rostrum *ensiferum.*

## II. JUGULARES.

126. CALLIONYMUS Aperturæ *branch. ad nucham.*  
 127. URANOSCOPIUS Os *simum.*  
 128. TRACHINUS Anus *prope pectus.*  
 129. GADUS Pinne *Pectorales elongatæ in acumen.*  
 130. BLENNIUS Pinne *Ventrales didactyle muticæ.*  
 131. OPHIDIION Pinne *Ventrales e spina & cirrho.*

## III. THORACICI.

132. CYCLOPTERUS Pinne *Ventrales connatæ in orbiculum.*  
 133. ECHENEIS Capitis *dorsum planum transverse sulcatum.*  
 134. CORYPHÆNA Caput *antice truncato-obtusum.*  
 135. GOBIUS Pinne *Ventrales coadunatæ in pinnam ovatam.*  
 136. COTTUS Caput *corpore latius.*  
 137. SCORPÆNA Caput *cirris adpersum.*  
 138. ZEUS Labium *superius membrana transverse fornicatum.*  
 139. PLEURONECTES Oculi *ambo in latere altero capitis.*  
 140. CHÆTODON Dentes *setacei, confertissimi, flexiles.*  
 141. SPARUS Dentes *validi, incisores s. molares.*  
 142. LABRUS Pinna *Dorsalis ramento post spinas notata.*  
 143. SCIÆNA Pinna *Dorsalis in fossula recondenda.*  
 144. PERCA Opercula *branchiarum serrata.*  
 145. GASTEROSTEUS Cauda *lateribus carinata; Spinæ dorsales distinctæ.*



146. SCOMBER Cauda lateribus carinata; Pinnulæ spuria plures.  
 147. MUELLUS Squamæ, etiam capitis, laxæ.  
 148. TRIGLA Digni distincti juxta pinna pectorales.

## IV. ABDOMINALES.

149. COBITIS Corpus vix ad Caudam angustatum.  
 150. SILURUS Radius i pinnarum Dorsalium Pectoraliumque dentatus.  
 151. LORICARIA Corpus cataphractum.  
 152. SALMO Pinna Dorsalis postica adiposa.  
 153. FISTULARIA Rostrum cylindricum operculo clausile.  
 154. ESOK Mandibula inferior longior punctata.  
 155. ARGENTINA Anus caudæ vicinus.  
 156. ATHERINA Fascia lateralis longitudinalis argentea.  
 157. MUGIL Mandibula inferior intus carinata.  
 158. ENCOELTUS Pinnae Pectorales longitudine corporis.  
 159. POLYNEMUS Digni distincti juxta pinna pectorales.  
 160. CLUPEA Abdomen carinatum ferratum.  
 161. CYTRINUS Membrana Branchiostega triradiata.

## V. BRANCHIOSTEGI.

162. MORMYRUS Dentes emarginati. Squamæ imbricatæ.  
 163. BALISTES Dentes utrinque octo. Pinna Ventralis solitaria.  
 164. OSTRACION Dentes utrinque plures. Corpus testâ ossea.  
 165. TETRODON Dentes utrinque duo. Abdomen muricatum.  
 166. DIODON Dentes utrinque solitarii. Corpus echinatum.  
 167. CENTRISCUS Pinna Ventralis solitaria. Corpus loriceatum  
 spina.  
 168. SYNGNATHUS Pinnae Ventrals nullæ. Corpus articulatum.  
 169. PEGASUS Pinnae Ventrals binæ. Corpus articulatum.



## I. APODES.

119. MURÆNA, *Caput læve. Nares tubulosæ.*  
*Membrana branchiostega radiis X,*  
*ejusque Apertura ad pinnas*  
*pectorales.*  
*Corpus teretiufculum, lubricum.*  
*Pinna caudæ coadunata dor-*  
*fali anique.*

Helena. 1. *M. pinnis pectoralibus nullis.*

*Art. gen. 25. syn. 41. Gron,*  
*mus. 1. n. 16. Mus. Ad. Fr.*  
*1. p. 319. Muræna pinnis*  
*pectoralibus carens.*

*Seb. mus. 2. t. 69. f. 4, 5.*

*Catesb. car. 2. t. 20, 21. Mu-*  
*ræna maculata nigra, & vi-*  
*ridis.*

*Habitat in Europæ, Americæ Oceano.*

*Cænarum Helena, Romæ in piscinis: natat ad magi-*  
*strum delicata Muræna, Martial; Ved. Pollio damna-*  
*ta mancipia immergebat vivariis Murænarum, ut in*  
*visceribus suis aliquid de Servorum suorum corpore gu-*  
*staret. Plin. IX: 23. Morsu infesta.*

Ophis. 2. *M. cauda aptera cuspidata,*  
*corpore tereti.*

*Art. gen. 24. syn. 41. Muræ-*  
*na teres gracilis maculosa,*  
*cauda tereti cuspidata apte-*  
*rygia.*

*Habitat in Oceano Europæo.*

Serpens. 3. *M. cauda aptera acuta, cor-*  
*pore tereti.*

*Art. gen. 24. syn. 41. Muræ-*  
*na exacte teres, cauda acu-*  
*ta apterygia.*

*Habitat in Oceano Europæ australis.*

D.--P.16.V.--A.--C.--



Angvil- 4. *M.* maxilla inferiore lon-  
la. giore, corpore unicolore. D. 1000. P. 19. V. 0. A. 100. C.

*Art. spec. 66. gen. 24. syn.*  
39. *Fn. suec. 290.* Mu-  
ræna unicolor, maxilla  
inferiore longiore.

*Habitat in Europa; maxima in lacu Cornachio Ferrar-  
riensi; non fert Danubium.*

*Nocturna; latet in cœno duplici foramine; coërcetur trun-  
co albo Betulæ; cutis tenacissima; parit vivipara, sub  
canicula. Act. Holm. 1750. p. 194.*

Myrus. 5. *M.* pinna ambiente alba  
margine nigro.

*Art. gen. 24. syn. 40.* Mu-  
ræna rostro acuto lituris  
albis vario, margine pin-  
næ dorsalis nigro.

*Habitat in Mari Mediterraneo.*

Conger. 6. *M.* rostro tentaculis duo-  
bus linea laterali ex pun-  
ctis albida.

*Art. gen. 24. syn. 40.* Mu-  
ræna supremo margine  
pinnæ dorsalis nigro.

*Habitat in Oceano Europæo.*

cæca. 7. *M.* apterygia, rostro acutiusculo.

*Habitat in Mari Mediterraneo. E. Brander.*

*Corpus Angullæ absque omni pinna. Aperturæ bran-  
chiarum sub collo. Maxillæ acuminatæ dentibus ace-  
rosis. Nares tubulosæ sub rostro. Oculos nullos video;  
ad occiput puncta 7 perforata; itidem 7 supra caput  
in medio, & antè iterum quater duo. Anus pro-  
pior capiti quam caudæ.*



120. GYMNOTUS. *Caput operculis lateralibus. Tentacula duo ad labium superius. Membr. branch. radiis V. Corpus compressum, subtus pinna carinatum.*

Carapo. 1. G. nudus, dorso apterygio.

*Art. gen. 25 syn. 43. Amœn.*

*acad. 1. p. 318. t. 14. f. 6.*

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 76.*

Gymnotus.

B 5. D. 0. P. 13. V. 0. A. 200. C. 0.

*Habitat in America.*

*Abdomen carnosum - carinatum; Pinna ani in caudæ apicem excurrente.*

asiaticus. 2. G. squamosus, dorso pin-  
nato.

D. 46. P. 14. V. 0. A. 28. C. 16.

*Habitat in Asia.*

*Piscis plus quam spithameus, crassiusculus, tectus squamis lamellis, rotundatis, distinctis, etiam supra caput, cui puncta 5 excavata, uti etiam aliquot in maxillis inferioribus. Anus in medio corporis. Linea lateralis elevata, recta, sed descendens supra anum. Color obscurus fasciis fuscis. Puncta alba in pinna dorsali & postica parte corporis. Ob opercula lateraliter ampla aperienda & ob squamas nequit esse Muræna; pinna dorsalis incipit pone caput & extenditur jere ad caudam. Caput depressum, leviusculum. Tentacula 2 truncata, ante nares posita. Membr. branch. 5. Corpus subcylindricum, postice compressum. Pinna dorsi mox post nucham incipiens.*

121. TRICHIURUS. *Caput porrectum, operculis lateralibus. Dentes subulati: anteriores conferti. Membr. branch. radio I. Corpus compresso - ensiforme. Cauda subulata, aptera.*

Lepturus, 1. TRICHIURUS.



*Art. spec.* 111. Lepturus. B. 7. D. 100. P. 11. V. 0. A. 105. C. 0.  
*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 76. t. 26.

f. 2. Lepturus. B. 7. D. 124. P. 12. V. 0. A. 0. C. 0.  
*Gron. mus.* 1. n. 47. Gymna-  
 ster. B. 7. D. 135. P. 11. V. 0. A. 0. C. 0.

*Brown. jam.* 444. t. 45. f. 4.

Gymnogaster argenteus  
 compressus, cauda atte-  
 nuata impinna.

*Habitat in America, China.*

*Totus argenteus, exsiliens ex aquis saepe in Cymbam.*

122. ANARHICHAS. *Caput* obtusiusculum. *Dentes* confertissimi, rotundati: *antici* VI, conici.  
*Membr. branch. rad.* VI.  
*Corpus* teretiusculum. *Pinna* caudæ distincta.

Lupus. 1. ANARHICHAS. *Art. gen.*

23. *syn.* 38.

*Gron. mus.* 1. n. 44. Anar-  
 rhicas.

D. 73. P. 20. V. 0. A. 45. C. 18.

*Habitat in Oceano septentrionali Angliæ, &c.*

*Lapis Busonites ex hujus piscis dente.*

123. AMMODYTES. *Caput* compressum, corpore angustius. *Labium* superius duplicatum. *Mandibula* inferior angusta acuminata. *Dentes* acerofi.  
*Membr. branch. rad.* VII.  
*Corpus* teretiusculum squamis vix conspicuis. *Cauda* distincta.

*Tobias*

Tobianus. 1. AMMODYTES. *Art. gen.* 16.

*syn.* 29. *spec.* 55.

B. 7. D. 54. P. 12. V. 0. A. 28. C. 15.



*Fn. suec.* 303. Ammodytes. B. 7. D. 54. P. 13. V. 0. A. 28. C. 15.

*It. scan.* 141. Ammodytes. B. 5. D. 50. P. 12. V. 0. A. 26. C. 15.

*It. xl.* 87. Ammodytes. B. 7. D. 60. P. 15. V. 0. A. 32. C. 14.

*Mus. A. Fr.* 1. p. 75. Ammodytes. B. 7. D. 60. P. 14. V. 0. A. 30. C. 16.

*Habitat in Europæ Oceano arenoso, in gyrum contractus, e centro apice capitis arenam penetrat.*

124. STROMATEUS. *Caput compressum. Dentes in maxillis, palato.*

*Membr. branch. radiis . . .  
Corpus ovatum, lubricum;  
Cauda bifida.*

*Fiatola.* 1. *S. subfasciatus.*

*Art. gen.* 19. *syn.* 33. Stromateus. D. 46. P. 25. V. 0. A. 34. C. --

*Habitat in Mari Mediterraneo, & Mari Rubro.*

*Piscis pulchre variegatus; ventriculi duo.*

*Paru.* 2. *S. unicolor.*

*Sloan. jam.* 2. p. 281. t. 250.

f. 4. *Paru brasiliensi con-*  
*gener. Raj. pisc.* 51.

*Habitat in America.*

125. XIPHIAS. *Caput maxilla superiore terminatum rostro ensiformi; Os edentulum.*

*Membr. branch. radiis VIII.*

*Corpus teretiulculum.*

*Gladius.* 1. XIPHIAS. *Art. gen.* 30.

*syn.* 47.

D. 41. P. 17. V. 0. A. 15. C. --

*Habitat in Oceano Europæ.*

*Schelhameri Anatome Xiphii piscis.*



## II. JUGULARES.

126. CALLIONYMUS. *Caput* labio superiore duplicato; *Oculi* approximati.

*Membr. branch. radiis* V. (Gron.) *Aperturæ* laterales (sæpius clausæ, nucha foraminibus respirante).

*Corpus* nudum. *Pinnæ* ventrales remotissimæ.

*Lyra.* 1. C. dorsalis prioris radiis longitudine corporis.

*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 71. Uranoscopus.

D. 4, 10. P. 18. V. 6. A. 10. C. 10.

*Fr. suec.* 283. Trachinus maxilla superiore longiore, pinna dorsi priore altissima.

*Gron. mus.* 1. n. 64. Uranoscopus officulo primo pinnæ dorsalis longitudine corporis.

D. 4, 10. P. 19. V. 5. A. 10. C. 10.

*Gron. Act. Ups.* 1740. p. 121. t. 8. Cottus officulis pinnæ dorsalis longitudine corporis

D. 4, 10. P. 19. V. 5. A. 10. C. 10.

*Act. angl.* 293. p. 1749. Gurnardus luteus.

*Habitat in Mari Atlantico.*

*Dracunculus.* 2. C. dorsalis prioris radiis corpore brevioribus.

*Gron. mus.* 1. n. 63. Uranoscopus officulo primo pinnæ dorsalis primæ unciali.

D. 4, 9. P. 20. V. 5. A. 9. C. 10.



*Art. gen. 49. syn. 77. Cot-*  
tus pinna secunda dorsi  
alba.

D. 4, 10. P. 12. V. 6. A. 9. C. 12.

*Habitat* Genuæ, Romæ.

indicus, 3. C. capite lævi longitudi-  
naliter rugoso, operculis  
laterc aperiendis.

B. 7. D.  $\frac{1}{2}$ , 13. P. 20. V.  $\frac{1}{6}$ . A. 13. C. 11.

*Habitat in* Asia. *Mus. Ac. Holmens.*

Caput depressum, supra longitudinaliter rugosum. Ma-  
xilla inferior paulo longior. Os simum. Lingua  
tusa, emarginata. Aperturæ branchiarum magna, ve-  
terales. Opercula anteriora spina gemina; postica spi-  
na solitaria. Corpus valde depressum, lividum. Anus  
in medio. Radius primus P. dorsalis prioris brevissimus,  
remotus. P. ventrales valde distantes. Piscis medius  
quasi inter Callionymum, Uranoscopus & Trachinum.

127. URANOSCOPIUS. Caput depressum, scabrum,  
majus. Os simum; ma-  
xilla superiore brevior.

*Membr. branch. rad. V, pa-*  
piloso-dentata. *Opercula*  
membranaceo-ciliata.

*Corpus*; anus in medio.

scaber. 1 URANOSCOPIUS.

D. 4, 14. P. 16. V. 5. A. 13. C. 12.

*Art. gen. 42. syn. 71. Tra-*  
chinus cirris multis in  
maxilla inferiore.

D. 3, 14. P. 16. V. 5. A. 13. C. --

*Habitat in* Mari Mediterraneo.

Caput scabrum, depressum. Pinna dorsi prior nigra.

128. TRACHINUS. Caput minus læve, compressum.  
*Membr. branch. rad. VI; oper-*  
culorum lamina inferiore fer-  
rata.

*Corpus*; anus prope pectus.

Draco. 1. TRACHINUS. *It. scan. 325.*

• *Art.*



*Art. gen. 42. syn. 70. Fn.*

*svéc. 282. Trachinus ma-*  
xilla inferiore longiore,  
cirris destituta.

D.5,31. P.16.V.6. A.32.C.12.

*Gron. mus. 1. n. 97. Idem*  
nomen.

D.6,30. P.15.V.6. A.34.C.--

*Gron. Act. Ups. 1742. p. 95.*

Idem nomen.

D.6,30 P.16.V.6. A.30.C.12.

*Habitat in Oceano septentrionali.*

*Spinæ P. dorsus prioris pungant venenatissima. Barth.*  
*act. 3. obs. 54.*

## 129. GADUS. Caput læve.

*Membr. branch. rad. VII, teretibus.*

*Corpus oblongum squamis deciduis.*

*Pinnae omnes cute communi ve-*  
stitæ: duobus atque plures: ra-  
diis mucicis. *Pectorales* in acu-  
men attenuatæ.

\* *Pinnis dorsalibus tribus, ore cirroso.*

Æglefi-  
nus.

1. *G. tripterygius* albicans, cauda biloba, ma-  
xilla superiore longiore.

*Fn. svéc. 297.*

*Art. gen. 20. syn. 36. spec.*

64. *Gadus* dorso tripte-  
rygio, ore cirrato, cor-  
pore albicante, maxilla  
superiore longiore, cauda  
parum bifurca.

*Gron mus. 1. n. 59. Idem*  
nomen.

*It. scan. 325. Gadus Kolja.*

D.15,20,19.P.18.V.6. A.24,21.C.--

*It. Wgot. 178. Gadus dor-*  
so tripterygio, ore papil-  
loso.

D.16,18,20.P.17.V.6.A.22,21.C.23.

*Habitat in Oceano Europæo.*



- Callarias. 2.** *G. tripterygius cirratus* varius, cauda integra, maxilla superiore longiore. *Fn. svec.* 293. D.15,19,19.P.20.V.6.A.18,18.C.23.  
*Art. gen.* 16. *syn.* 35. *spec.* 62. *Gadus* dorso tripterygio, ore cirrato, colore vario, maxilla superiore longiore, cauda æquali. D.15,19,18.P.20.V.6.A.19,17.C.--  
*Gron. mus.* 1. n. 58. idem. D.15,19,18.P.10.V.6.A.16,16.C.--  
*It. æl.* 87. *Gadus balthicus* Torfk. D.14,19,17.P.17.V.6.A.20,16.C.--  
*It. scan.* 220. *Gadus Callarias balthicus.* D.15,19,17.P.18.V.6.A.17,16.C.24.  
*Habitat in Oceano Europæo & Balthico.*
- Morhua. 3.** *G. tripterygius cirratus*, cauda subæquali, radio primo anali spinoso. *Fn. svec.* 295.  
*Art. syn.* 35. *Gadus* dorso tripterygio, ore cirrato, cauda æquali fere cum radio primo spinoso.  
*It. Wgot.* 176. *Gadus Kabbeljä.* D.15,20,16.P.20.V.6.A.21,16.C.--  
*Habitat in Oceano Europæo.*  
*Ova quotannis 9344000 ponit. Leuwenh.*
- Iuscus. 4.** *G. tripterygius cirratus*, radio ventralium primo fetaceo. D.13,23,18.P.11.V.6.A.31,18,C.17.  
*Art. gen.* 21. *syn.* 35. *Gadus* dorso tripterygio, ore cirrato, officulo pinnarum ventralium primo in fetam longam producto.  
*Habitat in Oceano Europæo.*
- barbatus. 5.** *G. tripterygius cirratus*, maxilla inferiore punctis utrinque septem.



*Art. gen. 21. syn. 37. spec.*

65. Gadus dorso tripterygio, ore cirrato, longitudine ad latitudinem tripla, pinna ani prima

officulorum 30. D.13,24,21.P.19.V.6.A.30,21.C.--

*Art. syn. 111. Phycis (secundum D. Kæblerum).*

D.12,18,14.P.14.V.5.A.25,16.C.30.

*It. Wgot. 177. Gadus Torfk.*

D.12,20,20.P.18.V.6.A.19,19.C.40.

*It. Wgot. 178. Gadus lineata excavata pone caput.*

D.13,17,19.P.18.V.6.A.18,17.C.--

*Habitat in Oceano Europæo.*

*Fico Romanis hodie, cirro in mento, puncta maxilla inferioris utrinque 7; macula fusca ad pin. pectorales.*

*D. Kæbler.*

*minutus. 6. G. tripterygius cirratus, ano in medio corporis.*

*Art. gen. 21. syn. 36. Gadus dorso tripterygio, ore cirrato, corpore fescunciali, ano in medio corporis.*

D.12,19,17.P.13.V.6.A.27,17.C.--

*Habitat in M. Mediterraneo.*

\* \* *Pinnis dorsalibus tribus, ore imberbi.*

*virens. 7. G. tripterygius imberbis, dorso virescente. Fn. svec.*

296. D.13,20,19.P.17.V.6.A.24,20.C.--

*Gron. Aët. Ups. 1742. p. 90.*

*Idem. D.13,20,19.P.17.V.6.A.24,20.C.40.*

*Habitat in Oceano Europæo.*

*Merlan- 8. G. tripterygius imberbis albus, maxilla superiore longiore. Fn. svec. 294.*

*Art. gen. 19. syn. 34. spec.*

62. Gadus dorso tripterygio, ore imberbi, corpore albo, maxilla superiore longiore.

D.14,21,20.P.21.V.6.A.33,23.C.31.

*Gron...*



*Gron. mus. 1. n. 55. Idem.*

D. 14, 23, 18. P. 16. V. 4. A. 28, 19. C. --

*It. scan. 326. t. 2. f. 2. Ga-*

*lus Hvitling*

D. 14, 18, 10. P. 20. V. 6. A. 30, 20. C. --

*It. Wgot. 176. Gadus Hvit-*  
*ling.*

D. 14, 20, 20. P. 17. V. 6. A. 30, 22. C. --

*Habitat in Oceano Europæo.*

Carbona-9. *G. tripterygius imberbis,*  
*rius.* maxilla inferiore longio-  
re, linea laterali recta.

*Art. gen. 20. syn. 34. Gadus*

*dorso tripterygio imberbi,*

*maxilla inferiore longiore*

*linea laterali recta.*

D. 14, 20, 22. P. 18. V. 6. A. 22, 19. C. --

*Habitat in Oceano Europæo.*

Polla-10. *G. tripterygius imberbis,*  
*chius.* maxilla inferiore longio-  
re, linea laterali curva.

*Art. gen. 20. syn. 35. Ga-*

*lus dorso tripterygio im-*

*berbi, maxilla inferiore*

*longiore, linea laterali*

*curva.*

D. 11, 19, 16. P. 17. V. 6. A. 16, 18. C. --

*Gron. mus. 1. n. 57. Idem.*

D. 12, 17, 23. P. 17. V. 6. A. 24, 23. C. --

*It. Wgot. 177. Gadus Lyr-*

*bick f. Zaj.*

D. 13, 19, 18. P. 16. V. 6. A. 27, 18. C. --

*Habitat in Oceano Europæo.*

\* \* \* *Pinnis dorsalibus duabus.*

Merluc-11. *G. dipterygius cirratus,*  
*cius.* maxilla inferiore longio-  
re.

D. 10, 39. P. 12. V. 7. A. 38. C. 22.

*Art. gen. 22. syn. 36. Ga-*

*lus dorso dipterygio,*

*maxilla inferiore longio-*

*re.*

D. 9, 40. P. 12. V. 7. A. 39. C. --

*Habitat in Oceano.*

Molva. 12. *G. dipterygius cirratus,*  
maxilla superiore lon-  
giore.



*Art. gen. 22. syn. 36.* Gadus dorso dipterygio, ore cirrato, maxilla superiore longiore. D. 15, 65. P. 15. V. 6. A. 62. C. --

*It. Wgot. 177.* Gadus Longus. D. 15, 63. P. 20. V. 6. A. 60. C. --

*Habitat in Oceano Europæo.*

Lota. 13. G. dipterygius cirratus, maxillis æqualibus. *Fn. Svec. 292.*

*Art. gen. 22. syn. 38.* Gadus dorso dipterygio, ore cirrato, maxillis æqualibus. D. 13, 76. P. 21. V. 7. A. 55. C. --

*Art. spec. 107.* Silurus cirro in mento unico. D. 13, 76. P. 21. V. 7. A. 55. C. 30.

*Habitat in lacubus Europæis.*

Mustela. 14. G. dipterygius cirratus, cirris 5, pinna dorsali priore exoleta.

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 75.* Gadus dorso dipterygio, cirris maxillæ superioris 4, inferioris 1. D. 1, 42. P. 14. V. 7. A. 40. C. --

*Art. gen. 22. syn. 37.* G. dorso dipterygio, sulco ad pinnam dorsali primam, ore cirrato. D. 1, 56. P. -- V. 7. A. 47. C. --

*Gron. Act. Ups. 1742. p. 93. t. 3.* Idem. B. 7. D. 1, 48. P. 16. V. 7. A. 43. C. 25.

*Habitat in Oceano Europæo.*

\* \* \* \* *Pinna dorsali unica.*

mediter- 15. G. monopterygius cirra-  
raneus. tus, maxilla superiore cirris duobus, inferiore unico.

D. 54. P. 15. V. 2. A. 44. C. --

*Habitat in Oceano Europæo.*



130. BLENNIUS. *Caput declive, tectum.*

*Membr. branch. rad. VI.*

*Corpus lanceolatum. Pinnae ventrales didactylæ, muticæ. Pinna ani distincta.*

\* *Caput cristatum.*

Galerita. 1. B. crista capitis transversa cutacea. *Art. gen. 27. syn. 44.*

*Habitat in Oceano Europæo.*

cristatus. 2. B. crista setacea longitudinali inter oculos. *Gron. mus. 1. n. 75.*

*B. 5. D. 26. P. 14. V. 3. A. 16. C. 11.*

*Habitat in Indiis.*

cornutus. 3. B. radio simplici supra oculos, pinna dorsali solitaria. *Mus. Ad. Fr. 2. p. .*

*D. 33. P. 15. V. 2. A. 23. C. 12.*

*Amœn. acad. 1. p. 316. Blennius pinnis ocularibus subulatis, pinna ani officulorum XXVI.*

*D. 34. P. 15. V. 2. A. 25. C. 11.*

*Habitat in India.*

ocellaris. 4. B. radio simplici supra oculos, pinna dorsali anteriore ocello ornata. *Mus. Ad. Fr. 2. p.*

*D. 11, 15. P. 12. V. 2. A. 16. C. 11.*

*Art. gen. 26. syn. 44. Blennius sulco inter oculos, macula magna in pinna dorsali.*

*D. -- P. 12. V. 2. A. 17. C. 26.*

*Habitat in Europa.*

Gattorugine. 5. B. pinnulis superciliorum nuchæque palmatis. *D. 30. P. 13. V. 2. A. 21. C. 12.*

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 68. Blennius vertice superciliisque ciliato cristatis.*

*D.  $\frac{18}{3}$ . P. 14. V. 2. A. 20. C. 13.*



*Art. gen.* 26. *syn.* 44. Blennius pinnulis 2. ad oculos, pinna ani officulorum XXIII.

D.  $\frac{1}{3}\frac{2}{1}$ . P. 14. V. 2. A. 23. C. 12.

*Habitat in Europa.*

superciliofus. 6. B. pinnulis superciliarum palmatis, linea laterali curva.

*Amœn. acad.* 1. p. 317. Blennius pinnulis ocularibus brevissimis palmatis, linea laterali curva.

D. 15. P. 12. V. 2. A. 26. C. 12.

*Gron. mus.* 2. n. 172. t. 5. f. 5. Blennius officulis anterioribus pinnæ dorsalis majoribus.

D.  $\frac{3}{4}\frac{6}{4}$ . P. 15. V. 2. A. 28. C. 12.

*Habitat in India.*

\* \* *Caput absque cristis.*

Pholis. 7. B. capite lævi, linea laterali curva iubbifida.

D.  $\frac{1}{2}\frac{2}{8}$ . P. 14. V. 2. A. 19. C. 10.

*Art. gen.* 27. *syn.* 44. (Et *Pholis*) 116. Blennius capite, summo acuminato, maxilla superiore longiore.

D. 36. P. -- V. 2. A. 28. C. --

*Gron. mus.* 2. n. 175. idem. B. 6. D. 33. P. 13. V. 2. A. 19. C. 10.

*Habitat in Oceano & Mari Mediterraneo.*

Gunnel- 8. B. pinna dorsali ocellis X  
lus. nigris. *Mus. Ad. Fr.* 1. p. 69.

D. 77. P. 10. V. 2. A. 43. C. 16.

*Art. gen.* 27. *syn.* 45. Blennius maculis circiter X nigris, limbo albo, utrinque ad pinnam dorsalem.

D. 78. P. 11. V. 2. A.  $\frac{2}{4}\frac{2}{0}$ . C. --

*Habitat in Oceano Atlantico.*

mustelaris. 9. B. pinna dorsali anteriore triradiata. *Mus. Ad. Fr.* 1. p. 69.

D. 343. P. 17. V. 2. A. 29. C. 13.



9. B. pinna dorsi anteriore radiis 3, posteriore 40. *Mus.*  
*Ad. Fr. 1. p. 69.* D. 3, 40. P. 16. V. 2. A. 28. C. 12.  
*Habitat in India.*
- viviparus. 10. B. ore tentaculis duobus.  
*Art. syn. 45.* Blennius capite dorsoque fusco-flavescente lituris nigris, pinna ani flava.  
*Mus. Ad. Fr. 1. p. 69. idem.* D. 80. P. 19. V. 2. A. 66. C. --  
*Gron. mus. 1. p. 65. idem.* D. -- P. 19. V. 2. A. -- C. --  
*Gron. Act. Ups. 1742. p. 87. idem.* D. -- P. 19. V. 2. A. -- C. --  
*Act. Stockh. 1748. p. 32. t. 2. Tånglake.* D. 79. P. 20. V. 2. A. 70. --  
*Habitat in M. Europæo.*  
*Vivos parit foetus, quod singulare.*
- Lumpe- 11. B. corpore areolis dorsalibus fuscis.  
*Art. syn. 45.* Blennius cirris sub gula pinniformibus quasi bifidis, areolis dorsi transversis.  
*Habitat in Europa.*
- raninus. 12. B. pinnis ventralibus subsextidis, cirro gulari. D. 66. P. 22. V.  $\frac{2}{6}$ . A. 60. C. 30.  
*Habitat in Sveciæ lacubus.*  
*Cum radii pinnarum ventralium quidem 6, sed 2 primores in utraque setacei sint, & tamquam veri habendi, poterit forte piscis ad hoc genus referrî ob habitum cum duobus præcedentibus.*



131. OPHIDION. *Caput nudiusculum.*  
*Membr. branch. patula radiis V.*  
*Corpus ensiforme. Pinna dor-*  
*talıs anique unita caudæ Pin-*  
*næ ventrales radiis duobus:*  
*exteriore spinolo.*

barba- 1. O. maxilla superiore cir-  
 tum. ris quatuor. *Art. gen. 25.*

*syn. 42.*

*Habitat in Europa australi.*

imberbe. 2. O. maxillis imberbibus,  
 cauda obtusiuscula.

*Art. gen. 25. syn. 42. O-*  
*phidion cirris carens.*

*Fn. suec. 289. Idem no-*  
 men.

*D. 79. P. 11. V. 2. A. 41. C. 18.*

*Habitat in Europa.*

macroph- 3. O. maxillis imberbibus,  
 thaimum. pinna caudæ acuminata.

*D. 69. P. 15. V. 6. A. 62. C. 12.*

*Habitat in M. Mediterraneo. L. Brander.*



## III. THORACICI.

132. CYCLOPTERUS. *Caput* obtusum. *Maxillæ* denticulatæ.  
*Membr. branch.* radiis IV.  
*Corpus* squamis osseis distantibus angulatum. *Pinnæ* ventrales connatæ in rotatam.

Lumpus. 1. C. corpore squamis osseis angulato. *Mus. Ad. Fr.* 1. p. 57.  
*Fn. svec.* 275. *It. scan.* 188. Cyclopterus. D. 21. P. 20. V. 6. A. 10. C. 9.  
*Art. gen.* 62. *syn.* 87. Cyclopterus.  
*Gron. mus. n.* 127. Cyclopterus. D. 21. P. 20. V. 15. A. 10. C. 12.  
*Habitat in Oceano* Balthico & Septentrionali.  
*Affinitas summa cum cartilaginoso Acipensere.*

nudus. 2. C. corpore nudo. *Mus. Ad.* *Fr.* 1. p. 57. t. 27. f. 1. B. 1. D. 6. P. 21. V. 4. A. -- C. 10.  
*Habitat in* India.

133. ECHENEIS. *Caput* pingue, nudum, depressum: supra planum, marginatum, transverse sulcato-fer-ratum.  
*Membr. branch.* radiis X.  
*Corpus* nudum.

Remora. 1. E. cauda bifurca, striis capitis 18.  
*Amœn. acad.* 1. p. 320. Echeneis. D. 22. P. 28. V. 5. A. 22. C. 16.  
*Art. gen.* 15. *syn.* 28. Echeneis.



*Gron. mus.* 1. n. 33. Eche-  
neis. D. 22. P. 25. V. 6. A. 22. C. 17.

*Catesb. carol.* 2. t. 26. Re-  
mora.

*Habitat in Pelago Indico.*  
*Capitis clypeo adheret aliis.*

Neucra- 2. E. cauda integra, striis  
tes, capitis 24. D. 37. P. 21. V. 5. A. 37. C. 16.

*Vallisn. nat.* 1. t. 44.

*Hasselqv. itin.* 324. n. 68.

Echeneis Naucrates.

*Habitat in Pelago Indico.*

*Differt a precedenti cauda longiore, corpore majore, pin-  
nis acutioribus.*

134. CORYPHÆNA. Caput maxime truncato-de-  
clive.

*Membr. branch. radiis V.*

*Corpus: Pinna dorsalis longi-  
tudine Dorsi.*

Hippu- 1. C. cauda bifida, radiis dor-  
rus, salibus LX. *Læfl. epist.* D. 60. P. 21. V. 6. A. 26. C. 18.

*Osbeck itin.* 307. B. 10. D. 60. P. 19. V. 6. A. 27. C. 20.

*Art. gen.* 15. *syn.* 29. Co-  
ryphæna cauda bifida. D. - - P. 20. V. 6. A. - - C. 18.

*Habitat in Pelago; Nautis Dorado dictus a colore splen-  
didissimo.*

Equise- 2. C. cauda bifurca, radiis  
lis, dorsalibus LIII.

*Osbeck itin.* 308. Dorado. B. 6. D. 53. P. 19. V. 6. A. 23. C. 20.

*Marcgr. bras.* 160. Guara-  
capema.

*Habitat in alto Pelago.*

*Pulcherrimus, a priori parum distinctus.*

pentada- 3. C. maculis nigris quinis  
ctyla, versus caput longitudi-  
nalibus.

*Act. Stockh.* 1740. p. 460.

t. 3. f. 2. Blennius ma-



culis 5 utrinque versus  
caput in 3. B. 4. D.  $\frac{2}{1}$ . P. 11. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{3}{4}$ . C. 13.

*Valent. amb. 5. p. 435. t.*

292. *Rievier Dofyn.*

*Will. icht. app. 7. t. 8. f. 2.*

*Habitat in India.*

Novacu-4. C. capite pinnisque can-  
cellatis lineis cæruiescen-  
tibus.

*Art. gen. 15 syn. 29. Co-  
ryphæna palmatis pulchre  
varia, dorso acuto.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

Pompi-  
lus.

5. C. dorso supra lineam la-  
teralem e tyam fa. ciolis  
flavescentibus picto. B. 5. D.  $\frac{8}{3}$ . P. 14. V. 6. A.  $\frac{2}{4}$ . C. 16.

*Art. gen. 16 syn. 29. Co-  
ryphæna cauda æquali, li-  
nea laterali curva.*

*Habitat in Pelago.*

*Corpus pingue, postice attenuatum. Linea lateralis cur-  
va, flavescens. Caput obtusum. Maxilla inferior as-  
cendens. Operculæ cœniscens, maxillis latere cohæren-  
tibus, intus scabrum. Capitis latera cavernosa dentata.  
Pinna dorsalis prior unita posteriori. Pinnae pectora-  
les admodum acuminatae.*

135. GOBIUS. Caput poris 2 inter oculos approxi-  
matis : altero anteriore.

*Membr. branch. radiis IV.*

*Pinnae ventrales unitæ in ovatam  
12 - radiatam.*

niger.

1. G. pinna dorsi secunda ra-  
diis quatuordecim.

D. 6, 14. P. 18. V. 10. A. 11. C. 14.

*Art. gen. 28 syn. 46. Go-  
bius e nigricante varius,  
pinna d. ii secunda ossi-  
culo. um. 14.*

D. 6, 14. P. 17. -- A. 14. C. --

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 74. idem.*



*Osbeck. iter.* 131. Apocryptes cantonensis. D.6,14.P.10.V.12.A.13.C.18.  
*Habitat in Europa, Asia.*

Paganel- 2. G. pinna caudæ dorsali-  
lus. que secunda basi purpura-  
scente, priori linea lutea  
terminali.

*Art. gen.* 29. *syn.* 46. Go-  
bius linea lutea transversa,  
in summo pinnæ dorsalis  
primæ.

*Hasselqv. itin.* 326. Gobius  
Paganelus. D.6,17.P.17.V.12.A.16.C.20.  
*Habitat in Mari Mediterraneo.*

Eleotris. 3. G. pinnae radiis novem.  
*Chin. Lagerstr.* 28. B.5. D.6,11.P.20.V.10.A.9.C.10.

*Osbeck. iter.* 260. Gobius  
chinensis B.5. D.6,11.P.18.V.8.A.8.C.12.

*Amœn. acad.* 1. p. 311. Tra-  
chinus capite inermi nu-  
do, pinnis pectoralibus  
coadunatis. D.6,10.P.16.V.12.A.10.C.14.

*Gron. mus.* 2. n. 169. Eleo-  
tris pinnis ventralibus con-  
cretis? D.6,12.P.--V.10.A.9.C.--

*Habitat in China.*

Aphya. 4. G. fasciis etiam pinnarum  
fuscis. D.6,16.P.18.V.12.A.14.C.13.

*Art. gen.* 29. *syn.* 49. Go-  
bius uncialis pinna dorfi  
secunda officulorum 17. D.6,17.P.17.V.6.A.11.C.--

*Habitat in Nilo.*

Jozo. 5. G. radiis dorsalibus emi-  
nentibus setaceis. D.6,13.P.16.V.12.A.13.C.14.

*Art. Gen.* 29. *syn.* 47. Go-  
bius pinna ventrali cæru-  
lea, officulis pinnæ dor-  
salis supra membranam  
assurgentibus.

*Habitat in Europa australi.*



p Etini- 6. *G.* dentibus maxillæ infe-  
gultis, rioris horizontalibus.  
*Chin. Lagerstr* 29. f. 3. D. 5, 26. P. 19. V. 12. A. 25. C. 15.  
*Osbeck, iter.* 130. Apocry-  
ptes chinensis. B. 5. D. 5, 26. P. 18. V. 10. A. 26. C. --  
*Habitat in China.*

anguilla- 7. *G.* pinna dorsali unica.. D. 52 P. 12. V. 10. A. 43. C. 12.  
ris. *Habitat in China.*  
*Corpus lubricum Anguillæ pingue, subdiaphana cute ut ve-  
næ transpareant. Pinnae omnes rubrae: Dorsalis & Ani  
in caudam excurrentes. Os sinum dentibus exsertum.  
Pinnae pectorales valde parvae, rotundatae.*

136. COTTUS. Caput corpore latius spinosum,  
Membr. branch. radiis VI.  
Corpus . . .

cataphra- 1. *C.* loricatus; rostro ver-  
ctus. rucis 2 bifidis, capite sub-  
tus cirroso.  
*Art. gen.* 49. *syn.* 77. *spec.*  
87. Cottus cirris pluri-  
mis, corpore octagono. D.  $\frac{5}{7}$ . P. 15. V.  $\frac{1}{3}$ . A. 6. C. 11.  
*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 70. idem. D. 5, 7. P. 16. V. 2. A. 7. C. 11.  
*Habitat in M. Europæo.*

quadri- 2. *C.* verrucis capitis 4 os-  
cornis. seis. *En. svec.* 278. *Syst.*  
*nat.* 6. p. 47. t. 4. f. 3.  
*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 70. t.  
32. f. 4.  
*Art. gen.* 48. *spec.* 84. Cot-  
tus scaber, tuberculis 4  
corniformibus in medio  
capite. D. 9, 14. P. 17. V. 4. A. 14. C. 12.  
*Habitat in M. Balthico.*

grun- 3. *C.* gula tamentis villosa,  
niens. corpore nudo. *Mus. Ad.*  
*Fr.* 2. p.  
Varietas alia. D. 2, 26. P. 18. V.  $\frac{1}{3}$ . A. 22. C. 12.  
D. 2, 21. P. 22. V.  $\frac{1}{3}$ . A. 16. C. 12.



*Gron. mus.* 1. n. 106. Cottus  
alepidotus varius, maxilla  
inferiore longiore multum  
cirrata.

D.  $\frac{3}{25}$ . P. 23. V. 3. A. 19. C. 15.

*Marcgr. bras.* 178. Nigvi.  
*Will. icht. app. t.* 4. f. 1.  
Gallus grunniens.

*Habitat in America.*

scaber. 4. C. capite striis corporisque  
squamis ferratis, linea la-  
terali elevata.

B. 7. D. 9, 11. P. 2. V.  $\frac{1}{6}$ . A. 11. C. 12.

*Habitat . .*

Scorpius. 5. C. capite spinis pluribus,  
maxilla superiore paulo  
longiore.

*It. scin.* 325. Ulka. D. 9, 16. P. 16. V. 3. A. 12. C. 12.

*Art. gen.* 49. *syn.* 77. *spec.*  
86. *Fn. suec.* 280 Cottus  
alepidotus, capite po-  
lyacantho, maxilla supe-  
riore paulo longiore.

D. 7, 17. P. 14. V. 4. A. 13. C. 8.

*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 70. Cot-  
tus idem.

D. 10. 14.

*Gron. mus.* 1. n. 104. idem. D. 10, 14. P. 16. V. 4. A. 10. C. 12.

*Habitat in Oceano Europæo.*

Gobio. 6. C. lævis, capite spinis dua-  
bus.

*Art. gen.* 48. *syn.* 76. *spec.*  
82. Cottus alepidotus gla-  
ber, capite diacantho.

D. 7, 17. P. 14. V. 4. A. 13. C. 8.

*Fn. suec.* 279. idem.

D. 7, 18. P. 14. V. 4. A. 13. C. 10.

*Gron. mus.* 2. n. 166. Ura-  
noscopus capite utrinque  
monacanthio.

D. 7, 18. P. 14. V. 4. A. 12. C. 13.

*Habitat in Europæ fluviiis.*

*Nidum in fundo format, ovis incubat.*



137. SCORPÆNA. *Caput* magnum, aculeatum:  
*Oculi* vicini. *Dentes* ma-  
 xillis, palato faucibusque.  
*Membr. branch.* radiis VII.  
*Corpus* . . .

Porcus. 1. S. cirri ad oculos nares-  
 que. D.  $\frac{1}{2}$  $\frac{2}{2}$ . P. 18. V. 7. A.  $\frac{3}{8}$ . C. 15.  
*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 68. Zeus  
 cirris supra oculos &  
 nares. D.  $\frac{1}{2}$  $\frac{2}{1}$ . P. 18. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{3}{8}$ . C. 12.  
*Art. gen.* 47. *syn.* 75. Scor-  
 pæna pinnulis ad oculos  
 & nares. D.  $\frac{1}{2}$  $\frac{2}{7}$ . P. 15. V.  $\frac{1}{7}$ . A.  $\frac{3}{8}$ . C. --  
*Hajjelqv. itin.* 330. idem. D.  $\frac{1}{2}$  $\frac{2}{7}$ . P. 16. V. 6. A.  $\frac{3}{8}$ . C. 13.  
*Habitat in* M. Mediterraneo, Oceano.

Scrofa. 2. S. cirris ad labium inferius.  
*Art. gen.* 47. *syn.* 76. Scor-  
 pæna tota rubens, cirris  
 plurimis ad os. D. -- P. 19. V. -- A. -- C. --  
*Gron. mus.* 1. n. 203. Scor-  
 pæna capite cavernoso,  
 cirris geminis in maxilla  
 inferiore? D.  $\frac{1}{2}$  $\frac{2}{2}$ . P. 15. V. -- A. 6. C. 13.  
*Habitat in* M. Mediterraneo.

138. ZEUS. *Caput* compressum, declive: *Lab. su-*  
*perius* membrana transversa forni-  
 cata. *Lingua* subulata.  
*Membr. branch.* radiis VII perpendi-  
 cularibus: infimo transverso.  
*Corpus* compressum.

Vomer. 1. Z. cauda bifurca, spina  
 ante pinnam ani decum-  
 bente.  
*Brown. jam.* 454. Rhom-  
 boida alepidota argentea,  
 pinnis omnibus brevibus.



*Mus. Ad Fr. 1. p. 66. t. 31. f. 9. Zeus cauda bifurca.*

D. 8.  $\frac{1}{2}$ . P. 18. V. 4. A.  $\frac{1}{9}$ . C. 20.

*Habitat in America.*

*Color argenteus. Piana de si interior radiis 4: posterioribus distinctis brevissimis; pennis 2. pennis anam.*

*Linea lateralis valde curva.*

Gallus. 2. Z. radio dorsali decimo anatique secundo corpore longioribus.

*Arted. gen. 35. syn. 78. Zeus cauda bifurca.*

*Gron. mus. 1. n. 105. idem. D.  $\frac{9}{31}$ . P. 20. V. 6. A.  $\frac{1}{20}$ . C. 17.*

*Brown. jam. 455. Rhomboida inajor alepidota, radiis anterioribus pinnæ dorsalis & ani longissimis.*

*Marcgr. bras. 161. Abucatuia*

*Habitat in America.*

Faber. 3. Z. cauda rotundata, lateribus mediis oculo fusco. D. 10, 23. P. 13. V.  $\frac{1}{5}$ . A.  $4, \frac{4}{27}$ . C. 13.

*Art. gen. 50. syn. 78. Zeus ventre aculeato, cauda in extremo circinata. D. 10, 24. P. 14. V.  $\frac{2}{7}$ . A.  $\frac{4}{26}$ . C. --*

*Mus. Ad Fr. 1 p. 67. t. 31. f. 2. Zeus ventre aculeato, cauda rotundata. D. 10, 23. P. 13. V.  $\frac{1}{5}$ . A. 21. C. 15.*

*Gron. mus. 1. n. 107. idem. D. 10, 21. P. 13. V. 7. A. 4, 22. C. 14.*

*Habitat in Pelago.*

Aper. 4. Z. cauda æquali, corpore rubente

*Art. gen. 50. syn. 78. Zeus cauda æquali totus rubens, rostro reflexo. D. 9, 25. P. 14. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{3}{26}$ . C. --*

*Habitat Romæ, Genuæ.*



139. PLEURONECTES. (\*) *Caput: Oculi ambo in eodem latere capitis. Membr. branch. radiis IV - VII. Corpus compressum, latere altero dorsum, altero abdomen referente.*

\* *Oculis a latere dextro.*

- Achirus*. 1. P. oculis dextris, corpore glabro, pinnis pectoralibus nullis. *Gron. mus.*  
I. n. 42. D. 60. P. 0. V. 4. A. 48. C. 16.

*Habitat Surinami.*

*Corpus brunneum lineis nigris transversis raris. Latus sinistrum capitis cirrosum.*

- trichoda-* 2. P. oculis dextris, corpore  
*ctylus.* aspero, pinnis pectoralibus filiformibus. D. 53. P. 4. V. 5. A. 43. C. 16.

*Art. gen. 18. syn. 33. spec. 60. Pleuronectes asper canescens, pinnis lateralibus vix conspicuis.*

*Habitat in Amboina.*

*Corpus fuscum, maculis obscuris varium.*

- lineatus*. 3. P. oculis dextris, lineis lateralibus septem transversis.

*Pleuronectes fuscus subrotundus glaber, lineis septem nigris transversalibus inter pinnam pectoralem & caudam. Brown. jam. 445.*

Passer

(\*) *Pleuronectes inter omnia animalia singularis oculis ambo ab eodem latere capitis & corpore latere altero superiore colorato, altero inferiore pallido, natatu obliquo.*



Passer lineis transversis notatus. *Sloan. jam* 2. p. 277. t. 246. f. 2. *Raj. pisc.* 157.

*Habitat in America.*

ocellatus. 4. P. oculis dextris, corpore ocellis 4 atris iridibus albis. D. 66. P. 3. V. 6. A. 55. C. 14.

*Habitat Surinami.*

*Pinna dorsalis plicata. Pinna caudæ fascia nigra.*

lunatus. 5. P. oculis dextris, punctis ocellisque dimidiatis cæruleis sparsis.

*Catesb. car.* 2. p. 27. t. 27.

*Solea lunata & punctata.*

*Habitat in America Septentrionali.*

Hippoglossus. 6. P. oculis dextris, corpore toto glabro. *Fn. svec.* 302.

*Art. gen.* 17. *syn.* 31. Pleuronectes oculis a dextra totus glaber.

D. 105. P. 15. V. 6. A. 79. C. --

*Gron. mus.* 2. n. 158. idem. D. 102. P. 16. V. 6. A. 78. C. 19.

*Habitat in Oceano Europæo.*

Cynoglossus. 7. P. oculis dextris, corpore oblongo glabro, dentibus obtusis, cauda subrotunda.

*Gron. mus.* 1. n. 39. D. 112. P. 11. V. 6. A. 102. C. 24.

*Habitat in Oceano Belgium ailuente.*

Plateffa. 8. P. oculis dextris, corpore glabro, tuberculis 6 capitis. *Fn. svec.* 301.

*Art. gen.* 17. *syn.* 30. Pleuronectes oculis & tuberculis 6 in dextra capitis, lateribus glabris, spina ad anum.

D. 77. P. 12. V. 6. A. 55. C. --

*It. Wgot.* 179. nomen *Fn. svec.*

D. 74. P. 11. V. 6. A. 54. C. 20.

*It. scan.* 326. Pleuronectes *Slátvar.*

D. 76. P. 12. V. 6. A. 54. C. 17.



- Gron mus.* 1. n. 36. nom.  
Aited. D. 72. P. 12. V. 6. A. 51. C. 20.  
*Habitat in M. Europæo.*
- Flesus. 9. P. oculis dextris, linea laterali aspera, spinulis ad pinnas. *Fn. sv.* 300. D. 55. P. 11. V. 6. A. 40. C. 14.  
*Art. gen.* 17. *syn.* 33. Pleuronectes oculis a dextris, linea laterali aspera, spinulis superne ad radices pinnarum, dentibus obtulis  
*Art. spec.* 59. Pleuronectes linea laterali aspera, spinulis ad radices pinnarum in latere oculato. D. 61. P. 12. V. 6. A. 42. C. 19.  
*Gron. mus.* 1. n. 40. idem. D. 62. P. 12. V. 6. A. 43. C. 14.  
*It. scan.* 326 idem. D. 64. P. 11:10. V. 6. A. 41. C. 17.  
*Habitat in M. Europæo.*
- Limanda. 10. P. oculis dextris, squamis asperis, spina ad anum, dentibus obtulis.  
*Art. gen.* 17. *syn.* 33. D. 79. P. 12. V. 6. A. 60. C. --  
*Habitat in M. Europæo.*
- Solea. 11. P. oculis dextris, corpore aspero oblongo, maxilla superiore longiore.  
*Art. gen.* 18. *syn.* 32. *spec.* 60. Pleuronectes maxilla superiore longiore, corpore oblongo, squamis utrinque asperis. D. 91. P. 9. V. 5. A. 74. C. 14.  
*Fn. suec.* 299. idem.  
*It. Wgot.* 178. Pleuronectes Tunga. D. 71. P. 8:7. V. 5. A. 40. C. 40.  
*Habitat in M. Europæo.*
- Lingua- 12. P. oculis dextris, ano sinistra.  
*Art. gen.* 17. *syn.* 31. Pleuronectes oculis a dextra,



ano ad-latus finistrum,  
dentibus acutis.

D. 65. P. 9. V. -- A. 45. C. --  
*Gron. mus.* 1. n. 41. idem. D. 68. P. 10. V. 6. A. 55. C. 19.  
*Habitat in M. Europæo.*

\* \* *Oculis a latere sinistro.*

Rhom-  
bus.

13. P. oculis sinistris, cor-  
pore glabro. *Art. gen.*  
18. *syn.* 31.

D. 76. P. 10. V. 6. A. 57. C. --

*It. Wgot.* 178. Pleuronectes  
Pigghvarf.

D. 71. P. 12. V. 6. A. 61. C. 18.

*Gron. mus.* 1. n. 43. nom.  
Arted.

D. 78. P. 10. V. 6. A. 56. C. 16.

*Habitat in Oceano Europæo.*

*Maximus Domitiani tempore captus, unde Senatus consult.*  
*Ex hoc tempore, jam Caesar siguli tua castra sequantur.*

maximus. 14. P. oculis sinistris, corpo-  
re aspero. *Art. gen.* 18.  
*syn.* 32.

D. 70. P. 11. V. 6. A. 50. C. 17.

*Fn. swec.* 298. idem.

D. 64. P. 11. V. 6. A. 48. C. 16.

*It. Gottl.* 178. idem.

D. 59. P. 12. V. 6. A. 39. C. 16.

*Gron. mus.* 2. n. 159. idem. D. 65. P. 13. V. 6. A. 50. C. 16.

*Habitat in Oceano Europæo.*

Passer. 15. P. oculis sinistris, linea  
lateralis sinistra aculeata.

*Art. gen.* 18. *syn.* 32.

Pleuronectes oculis a si-  
nistra, linea laterali a-  
culeata.

D. 66. P. 9. V. 6. A. 50. C. --

*Habitat in Oceano Europæo.*

papillo-  
sus.

16. P. oculis sinistris, linea la-  
terali curva, corpore pa-  
pilloso.

D. 58. P. 12. V. 5: 6. A. 42. C. 16.

*Marcgr. bras.* 181. Aramaca.

*Habitat in America.*



140. CHÆTODON. (\*) *Caput: Dentis setacei, flexiles, confertissimi, numerosissimi*

*Membr. branch. radiis VI.*

*Corpus pictum. Pinna dorsali analique carnosae squamosae.*

cane-  
scens.

1. C. spinis dorsalibus 2, radio tertio longissimo filiformi, aculeo utrinque ad os, cauda bifida.

*Art. spec. 93. Chætodon canescens, aculeo utrinque ad os, officulo tertio pinnæ dorsalis setiformi longissimo.*

D.  $\frac{2}{4}$ . P. 17. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{3}{3}$ . C. 16.

*Habitat in Indiis.*

argen-  
teus.

2. C. spinis dorsalibus 3, cauda bifida, pinnis ventralibus ex spinis duabus.

*Chin. Lagerstr. 26.*

D.  $\frac{3}{3}$ . P. 26. V.  $\frac{2}{6}$ . A.  $\frac{3}{3}$ . C. 17.

*Habitat in Indiis.*

acumina-  
tus.

3. C. spinis dorsalibus 3: radio tertio longissimo.

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 63. t. 33.*

*f. 3. Chætodon fasciis 3 fuscis, pinna dorsali setiformi.*

D.  $\frac{3}{2}$ . P. 16. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{3}{3}$ . C. 17.

*Habitat in Indiis.*

pinnatus.

4. C. spinis dorsalibus 4, pinna dorsali analique longissima.

*Mus. Ad. Fr. p. 64. t. 33.*

*f. 6. Chætodon griseus, fascia frontali apiceque caudæ albis.*

D.  $\frac{4}{4}$ . P. 18. V.  $\frac{1}{6}$ . A. 28. C. 18.

*Chin.*

(\*) Chætodon *Caudæ pinna bifida, 1, 2, 5, 10, 11, 14, 18.*

*Rostrum cylindrico elongato, 8, 12, 16.*

*Radio pinnæ dorsalis 3 s. 4 longissimo, 1, 3, 5, 13.*



*Chin. Lagerstr.* 25. idem. D. 30. P. 18. V.  $\frac{1}{6}$ . A. 28. C. 18.  
*Habitat in Indiis.*

cornutus. 5. C. spinis pinnæ dorsalis 7,  
 cauda bifida, radio dor-  
 sali tertio longissimo.

*Art. syn.* 92. Chætodon a-  
 culeis 2 brevibus supra  
 oculos, officulo tertio  
 pinnæ dorsalis longissimo. D.  $\frac{7}{6}$ . P. 18. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{2}{3}$ . C. 16.

*Habitat in Indiis.*

puncta- 6. C. spinis pinnæ dorsalis 8,  
 tus. pinnis pectoralibus fal-  
 catis.

B. 4. D.  $\frac{8}{3}$ . P. 17. V.  $\frac{6}{6}$ . A.  $\frac{3}{20}$ . C. 17.

*Habitat in Asia. Mus. Ac. Holmense.*

Corpus albidum s. argenteum punctis fuscis, pone anum di-  
 latatum, figura Cyprini. Oculi magni, rubri. Linea  
 lateralis sursum curva. Radii 3 primi p. ani distantes.

arcuatus. 7. C. spinis pinnæ dorsalis 8,  
 arcibus 4 albis.

*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 61. t. 33.  
 f. 5. Chætodon fuscus, ar-  
 cubus 5 nigris.

D.  $\frac{8}{3}$ . P. 20. V.  $\frac{1}{5}$ . A.  $\frac{3}{27}$ . C. 19.

*Art. syn.* 79. *Spec.* 91. Chæ-  
 todon niger, capite dia-  
 cantho, lineis utrinque 4  
 transversis curvis.

D.  $\frac{9}{41}$ . P.  $\frac{2}{28}$ . V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{3}{23}$ . C. 17.

*Habitat in Indiis.*

rostratus. 8. C. spinis pinnæ dorsalis 9,  
 maculaque ocellari, ro-  
 stro cylindrico.

*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 61. t.  
 31. f. 2. Chætodon ro-  
 stratus, pinna dorsali po-  
 stice macula fusca.

D.  $\frac{9}{40}$ . P. 14. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{3}{23}$ . C. 14.

*Gron. mus.* 1. n. 109. Chæ-  
 todon macrolepidotus al-  
 bo-flavescens, rostro lon-

S

giss<sup>a</sup>



giffimo osseo, macula nigra ad pinnam dorsalem.  $D. \frac{9}{39}$ . P. 15. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{3}{24}$ . C. --  
*Habitat in Indiis.*

nigricans. 9. C. spinis pinnæ dorsalis 9, spina laterali utrinque caudæ integræ.

*Art. spec. 90.* Chætodon nigrescens, cauda albescente æquali utrinque aculeata.

$D. \frac{9}{38}$ . P. 16. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{3}{29}$ . C. 16.

*Hasselqv. itin. 332.* Chætodon aculeis in utroque latere ad caudam duobus.

$D. \frac{6}{33}$ . P. 17. V. 6. A.  $\frac{2}{26}$ . C. 26.

*Habitat in Mari rubro.*

trioste- 10. C. spinis pinnæ dorsalis 9, membranæ branchio-  
 gus. stegæ 3, fasciis 5 nigris, cauda subbifida.

$D. \frac{9}{32}$ . P.  $\frac{1}{3}$ . V.  $\frac{1}{3}$ . A.  $\frac{2}{22}$ . C. 16.

*Habitat in Indiis.*

lineatus. 11. C. spinis pinnæ dorsalis 9, spina laterali utrinque caudæ bifidæ.

*Art. spec. 89.* Chætodon lineis longitudinalibus variis, cauda bifurca utrinque aculeata.

$D. \frac{9}{36}$ . P. 16. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{3}{29}$ . C. 16.

*Habitat in Indiis.*

macrole- 12. C. spinis pinnæ dorsalis  
 pidotus. 11, radio dorsali quarto filiformi longissimo.

*Art. spec. 94.* Chætodon lineis utrinque 2 nigris, radio quarto dorsali longissimo setiformi.

$D. \frac{11}{37}$ . P.  $\frac{2}{18}$ . V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{3}{23}$ . C. 17.

*Gron. mus. 2. n. 194.* Ch. officulis dorsalibus 3 aculeatis, quarto setiformi, 7 subsequentibus iterum aculeatis.

$D. \frac{11}{37}$ . P. 19. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{2}{21}$ . C. 16.

*Habitat in Indiis.*



- striatus.** 13. C. spinis pinnæ dorsalis 12, corpore striato, rostro prominente, cauda integra.  
*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 62. t. 33. f. 7. Chætodon flavescens, fasciis 5 fuscis. D.  $\frac{10}{3}$ . P. 15. V.  $\frac{1}{8}$ . A.  $\frac{3}{21}$ . C. 18.  
*Art. spec.* 95. Chætodon macrolepidotus, lineis utrinque tribus nigris latis, linea quarta in cauda. D.  $\frac{12}{33}$ . P. 16. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{3}{21}$ . C. 17.  
*Amœn. acad.* 1. p. 313. Labrus rostro reflexo, fasciis lateralibus 3 fuscis. D.  $\frac{12}{33}$ . P. 14. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{3}{20}$ . C. 17.  
*Gron. mus.* 1. n. 110. Chætodon rostro longo osseo macrolepidotus albo flavescens lineis transversalibus 4 brunneis. D.  $\frac{11}{32}$ . P. 15. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{3}{27}$ . C. --  
*Habitat in Indiis.*
- aruanus.** 14. C. spinis pinnæ dorsalis 12, cauda bifida, fasciis 3 fuscis.  
*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 63. t. 33. f. 8. Chætodon cauda bifurca, fasciis 3 fuscis. D.  $\frac{12}{32}$ . P. 18. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{2}{13}$ . C. 16.  
*Habitat in Indiis.*  
*Frons alba est.*
- capistratus.** 15. C. spinis pinnæ dorsalis 12, corpore striato, ocello subcaudali.  
*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 63. t. 33. f. 4. Chætodon pallidus, fascia capitis ocelloque subcaudali fuscis. D.  $\frac{12}{32}$ . P. 14. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{3}{21}$ . C. 18.  
*Gron. mus.* 2. n. 195. Chæt. macrolepidotus, linea nigra ad oculos, macula rotunda ad pinnam dorsalem. D.  $\frac{12}{30}$ . P. --. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{2}{18}$ . C. --  
*Amœn. acad.* 1. p. 314. Labrus rostro reflexo, ocello



- purpureo iride alba juxta  
caudam. D.  $\frac{1}{3}\frac{3}{1}$ . P. 14. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{3}{17}$ . C. --  
*Habitat in Indiis.*
- vagabun-16. C. spinis pinnæ dorsalis  
13, corpore striato, ro-  
stro cylindrico. D.  $\frac{1}{4}\frac{3}{0}$ . P. 15. V.  $\frac{1}{6}$ . A. 24. C. 18.  
*Mus. Ad. Fr. 2. p. -- Chætodon rostratus, fascia nigra trans oculos, triplicique ad caudam.*  
*Habitat in Indiis.*
- ciliaris. 17. C. spinis pinnæ dorsalis  
14, operculis spinosis,  
squamis ciliatis.  
*Gron. mus. 2. n. 192. Ch. macrolepidotus, aculeis utrinque 2 in operculis, postico longissimo.* D.  $\frac{1}{3}\frac{4}{3}$ . P. 26. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{3}{26}$ . C. 17.  
*Mus. Ad. Fr. 1. p. 62. t. 33. f. 1. Chætodon griseus fasciis 4 fuscis.* D.  $\frac{1}{3}\frac{4}{4}$ . P. 20. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{3}{23}$ . C. 18.  
*Osborn. iter. 273. Sparus saxatilis.* D.  $\frac{1}{3}\frac{3}{9}$ . P. 16. V. 6. A.  $\frac{3}{23}$ . C. 20.  
*Habitat in Indiis.*
- saxatilis. 18. C. spinis pinnæ dorsalis  
14, pinnis ventralibus acuminatis, cauda bifida,  
dentibus emarginatis.  
*Mus. Ad. Fr. 1. p. 64. Chætodon cauda bifurca, fasciis 5 albis.* D.  $\frac{1}{2}\frac{4}{6}$ . P. 15. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{2}{15}$ . C. 15.  
*Amœn. acad. 1. p. 312. Sparus fasciis 5 transversis fuscis.* D.  $\frac{1}{2}\frac{3}{5}$ . P. 18. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{2}{14}$ . C. 15.  
*Gron. mus. 1. n. 89. Idem.* D.  $\frac{1}{2}\frac{3}{6}$ . P. 17. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{2}{14}$ . C. 18.  
*Habitat in India.*  
*Habitu toto Percæ a congeneribus recedit.*



rotundus. 19. C. spinis pinnæ dorsalis  
23, fasciis quinque pal-  
lidis.

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 64. Chæ-*  
*todon rotundatus cinere-*  
*us, fasciis 5.*

D.  $\frac{23}{2}$ . P. 10. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{2}{4}$ . C. --

*Habitat in Indiis.*

lanceola-  
tus. 20. C. fasciis tribus: ocula-  
ri pectorali longitudina-  
lique, cauda integra.

*Edw. av. 210. t. 210. Gva-*  
*pena.*

*Habitat in India.*

*Corpus oblongum, lanceolatum: fasciæ nigre margine*  
*griseæ 3; prima transversa per oculos; secunda trans-*  
*versa per thoracem; tertia a pinna dorsali anteriori*  
*ad pinnam caudæ.*

141. SPARUS. *Caput: Dentes incisores vel lania-*  
*rii robusti; molares obtusiusculi,*  
*conferti.*

*Membr. branch. radiis V. Oper-*  
*cula squamosa.*

*Corpus compressum.*

\* *Macula nigra notati.*

Aurata. 1. S. lunula aurea inter oculos. D.  $\frac{11}{24}$ . P. 15. V. 6. A.  $\frac{3}{5}$ . C. 17.

*Art. gen. 25. syn. 63. Sparus*  
*dorso acutissimo, linea*

*arcuata aurea inter oculos. D. 24. P. 17. V. 6. A. 14. C. --*

*Gron. mus. 1. n. 90. idem. D.  $\frac{12}{3}$ . P. 16. V. 6. A.  $\frac{3}{2}$ . C. 20.*

*Læfl. epist. idem. D.  $\frac{12}{2}$ . P. 15. V. 6. A. 11. C. 17.*

*Hasselqv. itin. 337. idem. D.  $\frac{11}{24}$ . P. 16. V. 6. A.  $\frac{3}{4}$ . C. 22.*

*Habitat in Mari Mediterraneo & Oceano inter Euro-*  
*pam Americamque.*

*In meo exemplari macula nigra ad caudam.*

*Romanis olim pretiosissimus Sergi auctoritate; Veneri*  
*sacer.*



- annularis. 2. S. ocello nigro subcaudali, corpore flavescente.  
*Art. gen. 37. syn. 57.* Sparus unicolor flavescens, macula nigra annulari ad caudam.  
*Habitat in M. Adriatico, infero.*
- Sargus. 3. S. ocello subcaudali, corpore fasciis nigris. *D.  $\frac{1}{2}$   $\frac{2}{6}$ . P. 16. V. 6. A.  $\frac{3}{16}$ . C. 17.*  
*Art. gen. 37. syn. 58.* Sparus lineis transversis variis, macula nigra insigni ad caudam. *D. 26. P. 14. V. 6. A. 17. C. --*  
*Habitat in M. infero.*
- Melanurus. 4. S. ocello nigro caudæ, corpore lineis longitudinalibus.  
*Art. gen. 37. syn. 58.* Sparus lineis longitudinalibus variis, macula utrinque ad caudam.  
*Habitat in M. infero.*
- Smaris. 5. S. ocello nigro laterali, pinnis pectoralibus caudæque rubris.  
*Art. gen. 36. syn. 62.* Sparus macula nigra in utroque latere medio, pinnis pectoralibus caudaque rubris.  
*Habitat in Europa australi.*
- Mæna. 6. S. ocello fusco laterali, corpore variegato.  
*Art. gen. 36. syn. 61.* Sparus varius, macula nigricante in medio latere, dentibus 4 majoribus.  
*Habitat in M. mediterraneo.*
- saxatilis. 7. S. ocello subcaudali, corpore candicante.



*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 65. Sciaena ocello ad basin pinnæ caudæ.

D.  $\frac{1}{3}\frac{9}{3}$ . P. 16. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{3}{1}\frac{2}{2}$ . C. 16.

*Gron. mus.* 2. n. 185. t. 6. f. 3. Sparus rostro plagio-plateo, rufescens, macula nigra iride alba ad caudam subrotundam.

D.  $\frac{1}{3}\frac{7}{1}$ . P. 17. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{3}{1}\frac{1}{1}$ . C. 17.

*Habitat* Surinami.

Orphus. 8. S. ocello subcaudali, capite rufescente, cauda integra. †

*Art. gen.* 37. *syn.* 63. Sparus varius macula nigra ad caudam in extremo æqualem.

D. 10.

*Habitat* . . .

\* \* *Rubri.*

Hurta. 9. S. cauda bifida, corpore faciis transversis rubris,

dentibus lanianis exsertis. D.  $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ . P. 16. V. 6. A.  $\frac{3}{9}$ . C. 17.

*Habitat in* M. Mediterraneo.

*An Dentex* 17?

Erythrinus. 10. S. cauda subintegra, corpore rubro. *Mus. Ad. Fr.*

2. p. . .

D.  $\frac{1}{2}\frac{2}{2}$ . P. 16. V. 6. A.  $\frac{7}{1}\frac{3}{3}$ . C. 18.

*Læst. epist. msc.*

D.  $\frac{1}{2}\frac{1}{4}$ . P. 17. V. 6. A.  $\frac{3}{1}\frac{2}{2}$ . C. 17.

*Art. gen.* 36. *syn.* 59. Sparus totus rubens, iride argentea.

*Habitat in* M. Mediterraneo, Americano.

Pagrus. 11. S. rubescens, cute ad radicem pinnarum dorsi & ani in sinum producta.

*Art. gen.* 36. *syn.* 64.

*Habitat in* Europa australi.



\* \* \* *Lineati.*

- Boops.** 12. S. lineis longitudinalibus obscuris: inferioribus quatuor aureis argenteisque.  
*Art. gen. 36. syn. 61.* Sparus lineis utrinque 4 aureis ac argenteis longitudinalibus parallelis. **D. 30. P. -- V. -- A. 19. C. --**  
*Habitat in M. infero.*
- Cantharus.** 13. S. cauda immaculata, corpore lineis longitudinalibus luteis.  
*Art. gen. 36. syn. 58.* Sparus lineis utrinque luteis longitudinalibus parallelis, iride argentea.  
*Habitat in M. infero.*
- Chromis.** 14. S. cauda bifida, radio ventralium secundo setaceo.  
*Art. gen. 37. syn. 62.* Sparus officulo secundo pinnarum ventralium in longam setam quasi producto. **D. 23. P. 17. V. 6. A. 12. C. --**  
*Habitat in Europa australi.*
- Salpa.** 15. S. cauda bifida, lineis fulvis longitudinalibus utrinque undecim. **D.  $\frac{11}{28}$ . P. 16. V. 6. A.  $\frac{3}{17}$ . C. 17.**  
*Art. gen. 38. syn. 60.* Sparus lineis utrinque undecim aureis parallelis longitudinalibus.  
*Habitat in M. Mediterraneo.*
- Synagris.** 16. S. cauda bifida rubra, corpore purpurascente lineis utrinque 7 aureis.  
*Catesb. car. 2. p. 17. t. 17.*  
 Salpa purpurascens variegata.  
*Habitat in America septentrionali.*



\* \* \* \* *Varii.*

- Dentex. 17. S. cauda bifida, corpore variegato, dentibus quatuor majoribus.  
*Art. gen. 36. syn. 60. Sparus varius, dorso acuto, dentibus 4 majoribus. D. 90. P. -- V. -- A. 10. C. --*  
*Habitat in M. infero & supero.*
- Spinus. 18. S. cauda bifida, spina dorsali recumbente. *D.  $\frac{1}{2}\frac{3}{3}$ . P. 16. V.  $\frac{1}{5}$ . A.  $\frac{7}{8}$ . C. 16.*  
*Læst. epist. msc. an idem? D.  $\frac{1}{2}\frac{2}{4}$ . P. 17. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{3}{4}$ . C. 17.*  
*Osborn. iter. 273. Sparus javanensis. D.  $\frac{1}{2}\frac{3}{4}$ . P. 15. V.  $\frac{2}{5}$ . A.  $\frac{7}{8}$ . C. 18.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Corpus lituris cæruleis repandis variis pictum.*
- virginicus. 19. S. cauda bifida, fasciis duabus nigris transversis, lineisque cæruleis plurimis. *D.  $\frac{1}{2}\frac{1}{7}$ . P. 18. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{1}{3}$ . C. 18.*  
*Habitat in America Septentrionali. Mus. De Geer.*  
*Opercula subserrata. Fascia prior ab humeris per oculos ad maxillam inferiorem, altera ab humeris per latera thoracis ad pinnas pectorales. Lineæ cæruleæ plures, longitudinales, parallelæ. Caudæ pinna biloba, obtusa.*
- Mormyrus. 20. S. cauda bifida, fasciis argenteis nigrisque plurimis.  
*Art. gen. 37. syn. 62. Sparus maxilla superiore longiore, lineis utrinque duabus nigris transversis parallelis. D. 23. P. 14. V. 6. A. 13. C. --*  
*Hasselqv. itin. 335. Sparus Mormyrus. D.  $\frac{1}{2}\frac{1}{4}$ . P. 15. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{3}{8}$ . C. 18.*  
*Habitat in M. infero.*
- capistratus. 21. S. cauda integra, corpore albo-reticulato. *D.  $\frac{9}{20}$ . P. 12. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{1}{8}$ . C. 14.*  
*Habitat in America. Mus. De Geer.*  
*Corpus oblongum, figura Pl. Hippoglossi. Squamæ laxæ ante marginem fascia albâ ad angulum rectum inflexa, unde*



*unde piscis reticulatus. Dentes primores magni 2 superiores, 4 inferiores. Pinna dorsalis longitudine jere dorsi.*

galilæus. 22. S. cauda integra, corpore supra virescente, subtus albo. †

*Hasselqv. itin. 343. n. 76.*

Sparus galilæus. B. 5. D.  $\frac{17}{5}$ . P. 11. V. 7. A.  $\frac{3}{1}$ . C. 20.

*Habitat in Lacu Genezareth Galilææ. Piscatura prodigiosa Lucæ V. ex hoc pisce.*

142. LABRUS. *Caput: Dentes acuti. Membr. branch. radiis VI. Opercula squamosa. Corpus: Pinnæ dorsalis radii postice ramento filiformi aucti.*

\* *Cauda bifurca.*

Scarus. 1. L. appendicibus transversis ad caudæ latera. †

*Art. syn. 54. Scarus auctorum.*

*Habitat in Græciæ littoribus, Siciliam tenus.*

*Sub Tiberio Claudio in deliciis, ruminans; jecinora in Vitellii patina s. clypeo minervæ. Piscis hodie obscurus.*

cretensis. 2. L. dentibus 4 virescens, cauda bifurca. *Art. gen.*

*34. syn. 57. †*

*Habitat in Creta & adjacentibus.*

Anthias. 3. L. totus rubescens, cauda bifurca. *Art. syn. 54. D.  $\frac{10}{9}$ .*

*Catesb. car. 2. p. 25. t. 25.*

*Anthea IV. Rondel.*

*Habitat in Europa Meridionali & America.*

Hepatus. 4. L. maxilla inferiore longiore, cauda bifurca, lineis utrinque transversis

nigris.



nigris. *Art. gen.* 35.

*syn.* 53.

D.  $\frac{10}{21}$ . P. 13. V. 6. A. 9. C. --

*Habitat in Mari Mediterraneo.*

Pinna dorsalis post radius spinosus, parte superiore, notatur macula nigra. *Raj.*

griseus. 5. L. cauda subbifida, corpore subgriseo. †

*Catesb. car.* 2. p. 9. t. 9.

Turdus pinnis branchialibus carens. \*

*Habitat in America.*

*Catesbeus absque pinnis pectoralibus pinxit; an rite?*

lunaris. 6. L. pinna caudæ medio truncata, dorsali anique linea purpurea, labiis plicatis.

D.  $\frac{9}{23}$ . P. 15. V.  $\frac{9}{8}$ . A.  $\frac{2}{15}$ . C. 16.

*Gron. mus.* 2. n. 180. t. 6.

f. 2. Labrus oblongus, cauda bifurca, capite purpurascente.

D.  $\frac{12}{22}$ . P. 17. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{3}{17}$ . C. 14.

*Habitat in Indiis.*

opercularis. 7. L. cauda bifida, corpore fasciis 10, maculaque operculorum fuscis. *Chin.*

*Lagerstr.* 24.

D.  $\frac{13}{20}$ . P. 16. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{15}{28}$ . C. 16.

*Habitat in Asia.*

Pavo. 8. L. viridi cæruleo sanguineo canoque varius, cauda bifida.

*Art. gen.* 34. *syn.* 55. Labrus pulchre varius, pinnis pectoralibus rotundatis.

*Hasselqv. iter.* 344. n. 77.

Labrus Pavo.

B. 6. D. 31. P. 14. V. 6. A.  $\frac{3}{4}$ . C. 16.

*Habitat in M. Mediterraneo ad Syriam.*

auritus. 9. L. cauda bifida, operculis branchiarum pinniformibus.

D.  $\frac{10}{21}$ . P. 15. V. 6. A. 13. C. 17.

*Habitat in Philadelphia. Mus. De Geer.*

10. L.



- falcatus. 10. L. pinna dorsali analique radiis quinque primis inermibus falcata.  $D. \frac{7}{27}$ . P. 17. V. 5. A.  $\frac{3}{20}$ . C. 20.  
*Habitat in America. Mus. De Geer.*  
*Corpus latitudinis Bramæ, argenteum. Radii 5 primi e mollibus dorsalis analisque elongati, sequentibus æqualibus, unde hæ pinne falcatae. Dentes acuti sunt. Pinne ventrales parvæ.*
- rufus. 11. L. cauda lunata, corpore toto fulvo. *Læfl.*  $D. 23$ . P. 17. V. 6. A. 12. C. 16.  
*Catesb. car. 2. p. 11. t. 11.*  
*Turdus flavus.*  
*Habitat in America.*  
 \* \* *Cauda integra (secundum spinas dorsales).*
- marginalis. 12. L. subfuscus, margine pinnarum dorsi pectoraliumque fulvo. *Læfl. epist.*  $D. \frac{2}{22}$ . P. 17. V. 6. A.  $\frac{3}{12}$ . C. 17.  
*Habitat in Pelago.*
- ferrugineus. 13. L. ferrugineus immaculatus, cauda integra.  $D. \frac{2}{28}$ . P. 16. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{3}{17}$ . C. 17.  
*Habitat in India.*
- Julis. 14. L. lateribus cærulescentibus: \* vitta longitudinali fulva utrinque dentata.  $D. \frac{9}{21}$ . P. 13. V.  $\frac{1}{6}$ . A. 13. C. 12.  
*Art. gen. 34. syn. 53. Labrus palmaris varius, dentibus 2 majoribus maxillæ superioris.*  $D. 21$ . P. 14. V. 6. A. 14. C. --  
*Gron. mus. 2. n. 184. L. oblongus nigricans, lateribus linea alba utrinque sinuata varius, cauda indivisa.*  $D. \frac{9}{21}$ . P. 13. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{3}{15}$ . C. 16.  
*Habitat Genuæ.*  
*Formosissimus piscis Europæorum ob colores varios.*
- paroticus. 15. L. cauda integra, linea laterali curva, pinnis rufis, operculis coccineis. *Mus.*  
*Ad. Fr. 2. p. . . .*  $D. \frac{9}{21}$ . P. 12. V. 6. A. 14. C. 14.  
*Habitat in India.*



- fuillus. 16. L. pinna dorsi ramentacea, macula nigra supra caudam, spinis dorsalibus 9.  
*It. Wgot.* 179. Sparus Berginyltra. D.  $\frac{9}{17}$ . P. 13. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{3}{10}$ . C. 14.  
*Habitat in O. Europæo.*
- striatus. 17. L. pinna dorsi ramentacea lineis albis fuscisque.  
*Mus. Ad. Fr.* 2. p. D.  $\frac{10}{21}$ . P. 17. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{3}{11}$ . C. 12.  
*Habitat in America.*
- Gvaza. 18. L. fuscus, cauda rotundata, radiis membranam superantibus. *Læfl. epist.* D.  $\frac{11}{27}$ . P. 16. V. 6. A. 13. C. 15.  
*Habitat in Pelago.*
- ocellaris. 19. L. pinna dorsi ramentacea, ocello in medio ad basin caudæ. *Mus. Ad. Fr.* 2. p. . . D.  $\frac{14}{24}$ . P. 15. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{1}{13}$ . C. 13.  
*Habitat . . .*
- Tinca. 20. L. rostro sursum reflexo, cauda in extremo circulari. *Art. gen.* 33. *Syn.* 56. D.  $\frac{15}{26}$ . P. 14. V. 6. A.  $\frac{3}{13}$ . C. --  
*Habitat in M. Britannico.*
- bimaculatus. 21. L. pinna dorsi ramentacea, macula fusca in latere medio & ad caudam. *Mus. Ad. Fr.* 1. p. 66. Scienza macula fusca in medio corporis & supra basin caudæ. D.  $\frac{15}{26}$ . P. 15. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{4}{12}$ . C. --  
*Habitat in M. Mediterraneo.*
- punctatus. 22. L. pinna dorsi ramentacea, lineis parallelis fusco-punctatis.



*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 66. Sciæna lineis longitudinalibus plurimis fusco punctatis.  $D. \frac{16}{24}$ . P. 14. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{3}{15}$ . C. 16.

*Gron. mus.* 1. n. 87. Labrus brunneus, officulo secundo p. ventralium setiformi.  $D. \frac{15}{25}$ . P. 15. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{4}{12}$ . C. 18.

*Habitat* Surinami.

Melops. 23. L. pinna dorsi ramentacea anique variegata, lunula fusca pone oculos.

*Mus. Ad. Fr.* 2. p. . .  $D. \frac{16}{25}$ . P. 13. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{3}{13}$ . C. 12.

*Habitat in* Europa australi.

niloticus. 24. L. cauda integra, pinnis dorsi ani caudæque nebulatis. *Mus. Ad. Fr.*

2. p. . .  $D. \frac{17}{30}$ . P. 14. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{3}{12}$ . C. 17.

*Hasselqv. iter.* 346. n. 78.

Labrus niloticus.  $D. \frac{17}{30}$ . P. 15. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{3}{12}$ . C. 20.

*Habitat in* Ægypto.

offifagus. 25. L. labiis plicatis, pinna dorsali radiis 30.

$D. \frac{17}{31}$ . P. 15. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{3}{15}$ . C. 13.

*Habitat in* Europa.

rupestris. 26. L. pinna dorsi ramentacea antice macula fusca.

*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 65. Sciæna margine superiore caudæ macula fusca notato.  $D. \frac{17}{26}$ . P. 14. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{3}{10}$ . C. 13.

*Habitat* . .

Onitis. 27. L. pinna dorsi ramentacea, abdomine cinereo fuscoque maculato. *Mus.*

*Ad. Fr.* 2. p. . .  $D. \frac{17}{27}$ . P. 15. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{3}{11}$ . C. 14.

*Habitat* . .

viridis. 28. L. viridis: linea utrinque cærulea. *Art. gen.* 34.  $D. \frac{18}{30}$ .

*Habitat in* M. Mediterraneo.



- luscus. 29. L. cauda integra pinnis omnibus flavis, palpebra superiore nigra. *Mus. Ad. Fr. 2. p. . .* D.  $\frac{18}{31}$ . P. 14. V. 6. A.  $\frac{3}{14}$ . C. 14.  
*Habitat . .*
- livens. 30. L. pinna dorsi ramentacea, corpore fusco-livido. *Mus. Ad. Fr. 2. p.* D.  $\frac{18}{35}$ . P. 14. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{3}{12}$ . C. 11.  
*Habitat . .*
- Turdus. 31. L. oblongus viridis, iride aurea. *Art. gen. 34. syn. 57.* D.  $\frac{19}{32}$ .  
*Habitat in M. Europæo.*
- exoletus. 32. L. pinna dorsi ramentacea, corpore lineis cæruleis, pinna ani spinis 5. D.  $\frac{19}{25}$ . P. 13. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{5}{13}$ . C. 13.  
*Habitat in Oceano Atlantico.*
- chinensis. 33. L. pinna dorsi ramentacea, corpore livido, vertice retuso. D.  $\frac{19}{24}$ . P. 13. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{5}{12}$ . C. 12.  
*Habitat in Asia.*
- linearis. 34. L. oblongus, pinnæ dorsalis radio ultimo inermi. *Amœn. acad. 1. p. 315.* D.  $\frac{20}{21}$ . P. 12. V.  $\frac{0}{6}$ . A. 15. C. 12.  
*Habitat in Indiis.*  
\* \* \* *Cauda integra (spinis dorsalibus adhuc ignotis).*
- mixtus. 35. L. e flavo cæruleoque varius, dentibus anterioribus majoribus. *Art. gen. 34. syn. 57.*  
*Habitat Liburni.*
- fulvus. 36. L. cauda integra, corpore fulvo.  
*Catesb. car. 2. p. 10. f. 2.*  
Turdus cauda convexa.  
*Habitat in America.*



radiatus. 37. L. cauda integra, oculis radiatis, corpore cæruleo maculato, fascia pectorali caudæque fulva.

*Catesb. car. 2. p. 12. t. 12. f. 1. Turdus oculo radiato.*

*Habitat in America.*

varius. 38. L. e purpureo viridi cæruleo nigroque varius. *Art.*

*gen. 35. syn. 55.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

Merula. 39. L. cæruleo - nigricans.

*Art syn. 55.*

*Habitat in Europa.*

Cynæ-  
dus. 40. L. luteus, dorso purpureo, pinna a capite ad caudam continua. *Art.*

*syn. 56.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

### 143. SCIÆNA. *Caput . .*

*Membr. branch. radiis VI. Oper-  
cula squamosa & totum caput.*

*Corpus: Fossula dorsi pro pinna dor-  
fali recondenda.*

Cappa. 1. S. capitis lateribus squama-  
rum ordine duplici.

*D.  $\frac{11}{3}$ . P. 16. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{3}{13}$ . C. 17.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

Lepisma. 2. S. pinna dorsali intra 2  
folia squamea reconden-  
da.

*D.  $\frac{10}{9}$ . P. 11. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{3}{11}$ . C. 13.*

*Habitat . .*

3. S.

---

*Sciænæ genus medium est inter Labros & Percas, vix sufficienter distinctum.*



- unimaculata. 3. *S. macula fusca in medio utriusque lateris.* D.  $\frac{11}{2}$ . P. 15. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{3}{12}$ . C. 17.  
*Habitat . .*
- Umbra. 4. *S. nigro varia, pinnis ventralibus integerrimis.* *Art. gen. 39. syn. 65.* D. 11-24. P. 17. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{2}{9}$ . C. --  
*Hasselq. iter. 352. n. 80.*  
*Sciæna umbra.* D. 10-26. P. 18. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{2}{9}$ . C. 18.  
*Habitat in M. Mediterraneo.*
- cirrosa. 5. *S. maxilla superiore longiore, inferiore cirro unico.* *Art. gen. 38.* D.  $\frac{9}{4}$ . P. 15. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{1}{8}$ . C. --  
*Gron. mus. 1. n. 92?*  
*Habitat in M. Mediterraneo & infero.*

144. PERCA. *Caput: Opercula squamosa ferrata.*  
*Membr. branch. radiis VII.*  
*Corpus pinnis spinosis.*

\* *Pinnis dorsalibus 2 distinctis.*

- fluviatilis. 1. *P. pinnis dorsalibus distinctis: secunda radiis 16.*  
*Fn. suec. 285.*  
*Art. gen. 39. syn. 66. spec. 74.* *Perca lineis utrinque sex nigris, pinnis ventralibus rubris.* D. 14, 16. P. 14. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{2}{12}$ . C. 17.  
*Gron. mus. 1. n. 96. idem nomen.* D. 14, 14. P. 13. V. 6. A. 11. C. 17.  
*Habitat in Europæ Lacubus imprimis.*  
*Ovarium unicum. Piscatur in determinato profundo; cibo salutaris cum Petroselino laudatur.*
- Lucio-perca. 2. *P. pinnis dorsalibus distinctis: secunda radiis 23.*  
*Fn. suec. 285.*

T

Art.

*Perca genus difficile distinguitur a tribus precedentibus, quoniam differt solis operculis dentato-ferratis.*



- Art. gen. 39. syn. 62. spec.*  
76. Perca pallide macu-  
losa, duobus dentibus ma-  
xillaribus utrinque majo-  
ribus. D. 14,  $\frac{2}{3}$ . P. 16. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{2}{4}$ . C. 17.  
*Habitat in Europæ Lacubus.*
- Asper. 3. P. pinnis dorsalibus distin-  
ctis, secundæ radiis 13.  
*Art. gen. 40. syn. 67. Perca*  
lineis utrinque 8. s. 9.  
transversis nigris. D. 8, 13. P. 14. V. 5. A. 12. C. --  
*Habitat in Europa australiore.*
- Labrax. 4. P. pinnis dorsalibus distin-  
ctis, secundæ radiis 14.  
*Gron. Act. Ups. 1750. p.*  
39. t. 4. D. 9,  $\frac{1}{4}$ . P. 19. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{3}{4}$ . C. 18.  
*Art. gen. 41. syn. 69. Per-*  
ca radiis pinnæ dorsalis  
secundæ 13, ani 14. D. 9, 13. P. 15. V. 6. A.  $\frac{3}{4}$ . C. --  
*Habitat in Europa australiore.*  
*Hic, Muræna Helena, Myxo in Tripatino; Romæ*  
*optimus inter duos pontes.*
- nilotica. 5. P. pinnis dorsalibus subdi-  
stinctis, caudæ integra.  
*Mus. Ad. Fr. 2. p.* D. 8,  $\frac{1}{9}$ . P. 14. V. 6. A.  $\frac{3}{3}$ . C. 15.  
*Hasselqv. iter. 359. n. 83.*  
Perca nilotica. D. 8,  $\frac{1}{3}$ . P. 16. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{3}{2}$ . C. 20.  
*Habitat in Nilo. Hasselqvist.*
- \* \* *Dorso monopterygio, cauda indivisa.*
- marina. 6. P. pinnis dorsalibus unitis;  
radiis XV spinosis, XIV  
muticis, corpore lituris  
variegato. D.  $\frac{15}{29}$ . P. 19. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{3}{11}$ . C. 14.  
*Art. gen. 40. syn. 68. Per-*  
ca lineis utrinque 7 trans-  
versis nigris, ductibus mi-  
niaceis cæruleisque in ca-  
pite & antica ventris. D.  $\frac{10}{25}$ . P. --. V. --. A.  $\frac{3}{10}$ . C. --  
*Habitat in Norvegia, Italia.*



- nobilis. 7. P. pinnis dorsalibus unitis,  
cauda integra, corpore  
argenteo fasciis octo fu-  
scis.  $D. \frac{12}{5}$ . P. 15. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{3}{10}$ . C. 17.  
*Habitat in America septentrionali. Mus. De Geer.*  
*Radii spinosi dorsales lateribus argentei sunt.*
- polym- 8. P. pinnis dorsalibus unitis,  
na. corpore nigro: fasciis 3  
albis. *Mus. acad.*  $D. \frac{11}{6}$ . P. 18. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{1}{10}$ . C. 16.  
*Habitat in Indiis.*  
*Coniungit hæc Percas, Labros, Sparos, Chaetodontes,*  
*sed opercula spinosa ad Percam refert.*
- cottoides. 9. P. pinnis dorsalibus unitis,  
cauda indivisa, pinnis om-  
nibus lineis duabus pun-  
ctatis.  $D. \frac{14}{5}$ . P. 14. V.  $\frac{1}{5}$ . A.  $\frac{3}{10}$ . C. 12.  
*Habitat . .*
- philadel- 10. P. pinnis dorsalibus con-  
phica. natis: radiis XI spinosis,  
IX muticis.  $D. \frac{11}{5}$ . P. 16. V. 6. A.  $\frac{3}{8}$ . C. 11.  
*Habitat in America.*
- mediter- 11. P. pinnis dorsalibus uni-  
rana. tis, reliquis fulvis, ma-  
cula nigra ad pectorales.  
*Mus. Ad. Fr. 2. p. . .*  $D. \frac{16}{5}$ . P. 13. V.  $\frac{1}{8}$ . A.  $\frac{3}{13}$ . C. 13.  
*Habitat . .*
- vittata. 12. P. pinnis dorsalibus uni-  
tis, fasciis 5 longitudi-  
nalibus albis fuscisque.  
*Mus. Ad. Fr. 2. p.*  $D. \frac{12}{8}$ . P. 18. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{3}{12}$ . C. 17.  
*Habitat . .*
- punctata. 13. P. pinnis dorsalibus uni-  
tis, cauda integra, cor-  
pore cæruleo punctato.  
*Caresb. car. 2. p. 7. t. 7. f. 1.*  
*Perca marina punctata.*  
*Habitat in America.*



- guttata. 14. P. pinnis dorsalibus unitis, cauda integra, corpore punctis sanguineis adperso.  
*Marcgr. bras.* 169. Cugupugvacu.  
*Sloan. jam.* 2. p. 280. t. 247. f. 2.  
*Will. icht.* 303. t. 1.  
*Raj. pisc.* 127.  
*Catesb. car.* 2. p. 14. t. 14.  
*Habitat in America.*
- Scriba. 15. P. pinnis dorsalibus unitis, cauda integra, pinnis caudæ pectoralibusque flavis, capite scripto. *Mus. Ad.*  
*Fr.* 2. p. . . . . *D.*  $\frac{10}{25}$ . *P.* 13. *V.*  $\frac{1}{8}$ . *A.*  $\frac{3}{10}$ . *C.* 15.  
*Habitat . . .*  
 \* \* \* *Dorso monopterygio, cauda bifida.*
- venenosa. 16. P. pinnis dorsalibus unitis, pectoralibus apice flavis, cauda lunata, corpore punctis sanguineis.  
*Catesb. car.* 2. p. 5. t. 5.  
 Perca marina venenosa punctata.  
*Habitat in America.*
- melanura. 17. P. pinnis dorsalibus unitis, cauda bifida nigra margine albo, corpore lineis luteis.  
*Catesb. car.* 2. p. 7. t. 7. f. 2. Perca marina cauda nigra.  
*Habitat in America.*
- gibbosa. 18. P. pinnis dorsalibus unitis, cauda bifida, abdomine luteo, operculis striatis apice nigro fulvoque.



*Catesb. car. 2. p. 8. t. 8.*  
*f. 3. Perca fluviatilis gib-*  
*bosa, ventre luteo.*  
*Habitat in America.*

saltatrix. 19. P. pinnis dorsalibus uni-  
 tis, cauda bifurca posti-  
 ce rubra, abdomine luteo  
 griseo-lineato.

*Catesb. car. 2. p. 8. t. 8. f. 2.*  
*Perca marina saltatrix.*  
*Habitat in America.*

stigma. 20. P. pinna dorsali ramenta-  
 cea, operculis inustis. *Mus.*  
*Acad.*

*D.  $\frac{18}{27}$ . P. 13. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{9}{19}$ . C. 17.*

*Habitat in India.*

diagram- 21. P. pinnis dorsalibus uni-  
 ma. tis, corpore lineis luteis.

*Gron. mus. 1. n. 88. Sparus*  
*lineis longitudinalibus lu-*  
*teis variis, aculeis XI. in*  
*pinna dorsi.*

*D.  $\frac{11}{26}$ . P. 13. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{3}{11}$ . C. 18.*

*Habitat . .*

striata. 22. P. pinnis dorsalibus uni-  
 tis, cauda bifida, corpo-  
 re striato.

*D.  $\frac{13}{24}$ . P. 15. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{3}{11}$ . C. 17.*

*Habitat in America Septentrionali. Mus. De Geer.*  
*Opercula subserrata. Radius secundus analis validissimus.*  
*Cauda nigra non est, qua differt a P. Melanura.*

lineata. 23. P. pinna dorsali ramenta-  
 cea, corpore lineis 5 al-  
 bis fuscisque.

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 66. Sci-*  
*æna fasciis 5 longitudina-*  
*libus albis fuscisque al-*  
*ternis.*

*D.  $\frac{17}{33}$ . P. 15. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{3}{8}$ . C. 16.*

*Habitat . .*

rhomboi- 24. P. lineis 7 luteis, pinnis  
 dalis. flavis, cauda bifurca.



*Catesb. car. 2. p. 4. t. 4.* Perca marina rhomboidalis fasciata.

*Brown. jam. 146.* Sparus striis longitudinalibus variis, dentibus anterioribus latioribus compressis æqualibus acutis.

*Habitat in America.*

Cernua. 25. P. pinnis dorsalibus unitis radiis 27, spinis 15, cauda bifida. *Fn. svec. 286.*

*Art. gen. 40. syn. 68. spec. 77.* Perca dorso mono-

pterygio, capite cavernoso.  $D. \frac{1}{2} \frac{5}{8}$ . P. 15. V.  $\frac{1}{5}$ . A.  $\frac{2}{5}$ . C. --

*Gron. mus. 1. n. 94. idem.*  $D. \frac{1}{2} \frac{5}{8}$ . P. -- V. 6. A.  $\frac{2}{7}$ . C. 16.

*Habitat in Europæ Lacubus.*

Schræter. 26. P. pinnis dorsalibus unitis, lineis corporis nigris.

*Art. gen. 40. syn. 68.* Perca dorso monoptyerygio, lineis utrinque longitudinalibus nigris.

$D. \frac{1}{3} \frac{8}{10}$ . P. 16. V. 6. A.  $\frac{2}{8}$ . C. --

*Habitat in Europa australi.*

argentea. 27. P. pinnis dorsalibus unitis, cauda bifida, naribus tubulosis. *N. M. ad. fr. 2. p. ...*

$D. \frac{1}{2} \frac{2}{2}$ . P. 12. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{3}{11}$ . C. 17.

*Habitat . . .*

Cabrilla. 28. P. pinnis dorsalibus unitis, cauda bifida, fasciis longitudinalibus 4 sanguineis. *Mus. Ad. Fr. 2. p. ...*

$D. \frac{1}{2} \frac{10}{4}$ . P. 16. V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{3}{10}$ . C. 17.

*B. Mus. Ad. Fr. 2. p. ...* Perca lituris flavis violaceisque variegata.

$D. \frac{1}{2} \frac{10}{4}$ . P. 14. V. 6. A.  $\frac{3}{10}$ . C. 16.

*Habitat . . .*

Radula. 29. P. pinnis dorsalibus unitis, cauda bifida, corpore punctis albis lineato.



*Amen. acad.* 1. p. 315. Labrus immaculatus, pinnae dorsalis radiis 10 spinosis.

D.  $\frac{11}{20}$ . P. 12. V. 6. A.  $\frac{3}{13}$ . C. 17.

*Habitat in India.*  
*Squamæ crenulatæ.*

145. GASTEROSTEUS. *Caput . .*

*Membr. branch. radiis III.*

*Arted.*

*Corpus ad caudam utrinque carinatum. Aculei distincti ante pinnam dorsii.*

aculeatus. 1. G. spinis dorsalibus tribus.

*Art. gen.* 52. *syn.* 80. *spec.* 26. *Fn. suec.* 276.

D. 3. 12. P. 10. V.  $\frac{1}{2}$ . A.  $\frac{1}{5}$ . C. 12.

*Habitat in Europa.*

Ductor. 2. G. spinis dorsalibus quatuor.

B. 7. D. 4, 27. P. 18. V. 6. A. 16. C. 19.

*Hasselqv. iter.* 366. Scomber Ductor.

D.  $\frac{4}{8}$ . P. 20. V. 5. A. 16. C. 16.

*Osbeck. iter.* 73. Scomber Ductor.

D.  $\frac{3}{30}$ . P. 19. V. 5. A. 16. C. 26.

-- *Act. Stockh.* 1755. p. 71. idem.

*Habitat in Pelago, Satelles Squali.*

*Medius quasi inter Gasterosteus & Scombras; at convenit cum illis spinis ante pinnam dorsalem distinctis & cum G. Pungitio eandem lateribus carinatis, quamvis differat a Gasterosteis Membrana branchiostega.*

occidentalis. 3. G. spinis dorsalibus septem, spinisque duabus ante pinnam analem.

D. 7, 11. P. 7. V. 6. A.  $2\frac{1}{7}$ . C. 16.

*Habitat in America. Mus. De Geer.*



- ovatus. 4. G. spinis dorsalibus septem:  
prima recumbente, corpore ovato. B. 6. D. 7, 20. P. 16. V. 6. A. 2,  $\frac{1}{7}$ . C. 20.

*Habitat in Asia.*

Pisciculus ovato oblongus, compressus, figura Chatodontis. Maxillæ & labiorum dentes scabri. Spinæ in dorso 7 ante pinnam dorsalem, sed distinctæ & alternatim ad latera directæ; harum prima minima, 2<sup>da</sup> paulo longior. Spinæ 2 validæ ante pinnam ani. Differt a Gasterosteis reliquis membr. branch. radiis 6, nec 3; caret scutello thoracis osseo, an itaque Labris annumerandus vel Gasterosteis. Spina prima dorso antrosum decumbens fixa, uti in Scombris quibusdam.

- Pungitius. 5. G. spinis dorsalibus decem.  
Art. gen. 52. syn. 80. spec. 97. *Fn. suec.* 277. D. 10, 11. P. -- V. 1. A. 11. C. --  
*Habitat in Europa.*

- volitans. 6. G. spinis dorsalibus tredecim, cirris senis, pinnis pectoralibus corpore longioribus.  
*Gron. mus.* 2. n. 191. Perca dorso monopterygio, capite cavernoso, maxilla superiore cirris 4, cauda subrotunda utrinque aculeata, B. 7. D. 13-12. P. 14. V. 6. A.  $\frac{1}{9}$ . C. 13.

*Will. icht. app.* 1. t. 2. n. 3.  
Perca amboinensis Niehoffii.

*Ruysch. thes.* 1. p. 39. t. 2. f. 3.  
*Valent. amb.* t. 210. n. 210. & t. 212. n. 213.

*Habitat in Amboina.*

Radii dorsales 13 priores basi tantum membrana connexi sunt, & spinosi. P. pectorales corpore longiores volantes. Cauda supra & infra aculeis 3 minimis.

- Spinachia. 7. G. spinis dorsalibus quindecim. *Art. gen.* 52. syn. 81. *Mus. Ad. Fr.* 2. p. . . D. 15, 6. P. 10. V. 0. A. 7. C. 12.  
*Habitat in Europa australiore.*



Spinarel-8. G. capitis postico spinis  
la. quaternis ferrulatis longi-  
tudine abdominis.

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 74. t. 32.*

*f. 5. Pungitius.*

*Habitat in India.*

D.16. P.20. V.4. A.8. C.--

146. SCOMBER. *Caput compressum, læve.*  
*Membr. branch. radiis VII.*  
*Corpus læve, linea laterali posti-*  
*ce carinatum. Pinnæ spuria læ-*  
*pius versus caudam.*

\* *Pinnulis spuris distinctis.*

Scom-  
brus.

1. S. pinnulis V.

*Fn. suec. 287. Scomber*  
*radiis pinnarum pectora-*  
*lium 20, dorsalium 12.*

*Art. gen. 30. syn. 48. spec.*  
*68. Scomber pinnulis 5*  
*in extremo dorso, spina*  
*brevi ad anum.*

D.12,12. P.20. V.6. A.13. C.--

*Gron. mus. 1. n. 81. idem. D.11,11. P.18. V.6. A.12. C.--*

*Habitat in Oceano Atlantico victitans Medusis, ut con-*  
*generes.*

*Lucet in tenebris.*

Pelamis. 2. S. pinnulis inferioribus VII,  
corpore lineis utrinque

quatuor nigris. *Læst. epist. D.15,11. P.27. V.6. A.14. C.--*

*Osbeck. iter. 67. Scomber*  
*pulcher f. Bonet.*

D.15,10. P.28. V.7. A.14. C.26.

*Habitat in Pelago inter Tropicos.*

Thyn-  
nus.

3. S. pinnulis utrinque VIII.

*Osbeck. iter. 69. Scomber*  
*albicans f. Albeor.*

D.14,12. P.32. V.6. A.13. C.30.

*Art. gen. 31 syn. 49. Scom-*  
*ber pinnulis 8. f. 9. in*  
*extremo dorso, fulco ad*  
*pinnas ventrales.*

D.14,14. P.34. V.6. A.13. C.--



*Læst. epist.* Scomber pinnulis 9, pinna dorsi priori plicata, dentibus planis lanceolatis, maxilla superiore acuta.

D.14,13. P.22. V.6. A.16. C.--

*Brown. jam.* 451. Thynnus pinnulis superioribus 9, inferioribus 8.

*Habitat inter Tropicos, in Pelago.*

*Sociorum Garum pretiosa piscium Sanies ex intestinis piscium salitis.*

Cordyla. 4. S. pinnulis X, linea laterali loricata.

*Gron. Act. Ups.* 1750. p. 36.

Scomber linea laterali curva tabellis offeis loricata, corpore lato & tenui.

D.7,9. P.15. V.6. A.2,14. C.20.

*Marcgr. bras.* 172. Guara tereba.

*Raj. pisc.* 93. Trachurus brasiliensis.

*Habitat in America.*

\* \* *Pinnulis spuris connatis.*

Glaucus. 5. S. pinnulis nullis, spina dorsali recumbente.

*Osbeck. iter.* 296. Scomber adscensionis.

D.7,25. P.20. V.5. A.25. C.20.

*Art. gen.* 32. *syn.* 51. Scomber dorso dipterygio, officulo secundo pinnæ dorsalis altissimo.

D.7,26. P.18. V.5. A. $\frac{2}{27}$ . C.--

*Habitat ad inf. adscensionis.*

Trachurus. 6. S. pinnulis unitis, spina dorsali recumbente, linea laterali loricata.

*Art. gen.* 31. *syn.* 50. Scomber linea laterali aculeata; pinna ani officulorum 30.

D.8,34. P.20. V.6. A. $\frac{2}{30}$ . C.--



*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 72. idem. D. 8, 31. P. 20. V. 6. A. 27. C. 22.

*Chin. Lagerstr.* 27. Scomber linea laterali squamis latis pinnata.

D. 8, 34. P. 18. V. 6. A.  $\frac{2}{30}$ . C. 17.

*Hasselqv. iter.* 363. Scomber Trachurus.

D. 8, 32. P. 20. V. 6. A. 30. C. 20.

*Habitat in Mediterraneo.*

Amia. 7. S. pinnulis unitis, radio ultimo dorsalis posterioris longiore.

*Art. gen.* 31. *syn.* 51. Scomber dorso dipterygio, officulo ultimo pinnæ dorsalis secundæ prælongo.

D. 5, 34. P. 20. V. 6. A. 24. C. --

*Habitat . .*

pelagicus. 8. S. pinnulis pinnaque dorsali coadunatis in unum.

*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 72. Scomber pinna dorsali unica.

D. 40. P. 19. V. 5. A. 22. C. 20.

*Habitat . .*

147. MULLUS. Caput compressum, declive, squamis tectum.

*Membr. branch.* radiis III.

*Corpus* squamis magnis, facile deciduis.

barbatus. 1. M. cirris geminis, corpore rubro.

D. 7, 9. P. 15. V. 6. A. 7. C. 16.

*Art. gen.* 43. *syn.* 71. Trigla capite glabro, cirris geminis in maxilla inferiore.

D. 7, 9. P. 16. V. 6. A. 7. C. 17.

*Gron. mus.* 1. n. 99. idem. D. 7, 9. P. 17. V.  $\frac{1}{7}$ . A.  $\frac{1}{2}$ . C. --

*Habitat in M. Mediterraneo, & Oceano septentrionali.*

*Desquamatus ruber est; nihil eo expirante firmius, nihil Mullo sapidius, Romanorum itaque in eo summa gula insania & Asetorum prodigalitas, teste Plinio,*

*Sene-*



*Seneca, Horatio, Juvenali, Martiali; emebatur olim argenti puri pondere, ideoque non edit Mullum, qui eum capit; maxime friabilis.*

Surmu- 2. *M. cirris geminis, lineis*  
letus. *luteis longitudinalibus.*  
*Art. gen. 43. syn. 71. Trigla*  
*capite glabro, lineis utrin-*  
*que 4 luteis longitudi-*  
*nalibus.*  
*Habitat in M. Mediterraneo & ad Cornubiam.*

imberbis. 3. *M. imberbis.*  
*Art. gen. 43. syn. 71. Trigla*  
*capite glabro, tota ru-*  
*bens, cirris carens. D. 6,  $\frac{1}{8}$ . P. 12. V. 6. A.  $\frac{2}{10}$ . C. 20.*  
*Habitat in Melita.*

148. TRIGLA. *Caput loricatum lineis scabris.*  
*Membr. branch. radiis VII.*  
*Corpus: Digiti liberi ad pinnas*  
*pectorales.*

eataphra- 1. *T. digitis geminis, rostro*  
ta. *furcato elongato, corpo-*  
*re loricato. B. 7. D. 27. P. 11. V. 6. A. 20. C. 10.*  
*Art. gen. 46. syn. 75. Trigla*  
*cirris plurimis, corpore*  
*octagono. D. 26. P. 12. V. 6. A. 19. C. --*  
*Gron. mus. 1. n. 98. idem. B. 5.*  
*Habitat in M. Mediterraneo: supero inferoque.*  
*Pinnae ventrales adnexae pectoralibus. Cirri plures ad*  
*labium inferius. Os edentulum.*

Lyra. 2. *T. digitis ternis, naribus*  
*tubulosis.*  
*Art. gen. 46. syn. 74. Trigla*  
*rostro longo diacantho,*  
*naribus tubulosis. D. 10, 18. P. 12. V.  $\frac{1}{6}$ . A. -- C. --*  
*Habitat in Mari Britannico.*



Gurnardus. 3. T. digitis ternis, dorso maculis nigris rubrisque D. 9, 18. P. 10. V. 6. A. 19. C. 15.

*Art. gen. 46. syn. 74.* Trigla varia rostro diacantho, aculeis geminis ad utrumque oculum.

*Gron. mus. i. n. 101.* idem. D. 8, 18. P. 10. V. 6. A. 17. C. 15.  
*Habitat in Oceano Britannico.*

Cuculus. 4. T. digitis ternis, linea laterali mutica. D. 9, 16. P. 10. V.  $\frac{1}{6}$ . A. 16. C. 13.

*Art. gen. 45. syn. 74.* Trigla tota rubens, rostro parum bicorni, operculis branchiarum striatis.

D. 9, 17. P. 11. V. 6. A. 15. C. 13.

*Habitat in Mari Mediterraneo, Pelago.*

Lucerna. 5. T. digitis ternis, rostro subbifido, linea laterali ad caudam bifida.

*Art. gen. 45. syn. 73.* Trigla rostro parum bifido, linea laterali ad caudam bifurca.

D. 10, 17. P. 10. V. 6. A. 15. C. --

*Gron. mus. i. n. 100.* idem. D. 8, 16. P. 10. V. 6. A. 15. C. --

*Habitat in Oceano septentrionali.*

Hirundo. 6. T. digitis ternis, linea laterali aculeata.

*Art. gen. 44. syn. 73.* Trigla capite aculeato, appendicibus utrinque tribus ad pinnas pectorales.

D. 9, 18. P. 10. V.  $\frac{1}{6}$ . A. 19. C. 12.

*Fn. svec. 281. It. Wgot. p. 176.* idem.

D. 7, 19. P. 9. V. 6. A. 18. C. 11.

*Habitat in Oceano Atlantico.*

*Pinnæ pectorales nigrae.*

asiatica. 7. T. digitis quaternis. B. 7. D.  $\frac{1}{7}$ , 16. P. 18. V. 6. A. 17. C. 18.

*Habitat in Oceano asiatico.*



Corpus leve, teretiusculum, argenteum. Nasus s. rostrum  
 prominens, leve. Os intus scabrum. Opercula ante-  
 riora serrata. Pinnæ pectorales falcatae.

volitans. 8. T. digitis vicenis palmatis.

*Art. gen.* 44. *syn.* 73. Tri-  
 gla capite parum aculeato,  
 pinnula singulari ad pinnas  
 pectorales.

D. 5, 8. P. 28. V. 5. A. 6. C. ->

*Gron. mus.* 1. n. 102. idem. D. 6, 8. P. 6. V. 5. A. 6. C. 18.

*Habitat in* Mari Mediterraneo, Oceano, Pelago *inter*  
*tropicos*, in Asia, imprimis ad Cap. b. spei, saepe  
*agitata evolans ex aqua.*



## IV. ABDOMINALES.

149. COBITIS. *Caput* : *Oculi* in suprema capitis parte.

*Membr. branch.* radiis IV-VI. *O-*  
*percula* inferne clausa.

*Corpus* fere æquale s. *Cauda* versus  
*pinnam* minus angustata.

Ana-  
bleps.

1. *C. capite* inermi depresso,  
oculis prominulis.

*Art. gen.* 25. *Anableps.*

*Gron. mus.* 1. n. 32. t. 1.

f. 1; 2, 3. *Anableps.* B. 6. D. 7. P. 22. V. 7. A. 9. C. --

*Habitat in* India.

Barbatu-  
la.

2. *C. cirris* oris 6, capite in-  
ermi compresso.

*Art. gen.* 2. *syn.* 2. *Cobitis*  
tota glabra maculosa, cor-  
pore subtereti.

D. 8. P. 12. V. 7. A. 6. C. --

*Faun. suec.* 332. idem.

*Habitat in* Europæ, Asiæ aquis dulcibus.

Tænia.

3. *C. cirris* oris 6, spina sub-  
oculari.

D. 7. P. 8. V. 7. A. 7. C. 16.

*Art. gen.* 2. *syn.* 3. *spec.* 4.

*Cobitis aculeo* bifurco in-  
fra utrumque oculum.

D. 9. P. 7. V. 7. A. 8. C. 18.

*Fz. suec.* 333. idem.

*Gron. mus.* 1. n. 5. idem. D. 7. P. -- V. 7. A. 6. C. 16.

*Habitat in* Europæ aquis dulcibus.

fossilis.

4. *C. cirris* oris 8, spina su-  
pra-oculari.

*Gron. Act. Ups.* 1742. p. 79.

t. 3. *Cobitis aculeo* bi-  
furco supra utrumque o-  
culum.

B. 3. D. 7. P. 9. V. 6. A. 7. C. 16.

*Art. gen.* 2. *syn.* 3. *Co-*  
*bitis cæruleicens*, lineis

utrinq-



utrinque 5 longitudinalibus.

D. 7. P. 11. V. 5. A. 5. C. 16.

*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 76. idem. D. 6. P. 11. V. 6. A. 6. C. 15.

*Habitat in Europa.*

150. SILURUS. *Caput nudum. Os cirris aliquot filiformibus tentaculatum.*

*Membr. branch. radiis IV - XIV.*

*Corpus: Radius pinnarum pectoralium aut dorsalis primus spinosus, retrodentatus.*

**Asotus.** 1. S. pinna dorsali unica, cirris 4.

B. 16. D. 0. P.  $\frac{1}{4}$ . V. 13. A. 82. C. 16.

*Habitat in Asia. M. Ac. Holmenfis.*

*Cirri duo supra os; duo infra. Dentes numerosi. Spina nulla rigida in pinna dorsi, at serrata in Pectoralibus, ut in congeneribus. P. ani longa, caudæ annexa.*

**Glanis.** 2. S. pinna dorsali unica, cirris 6.

*It. scan.* 61. Mal. B. 14. D. 4. P.  $\frac{1}{8}$ . V. 12. A. 88. C. 17.

*Act. Stockb.* 1756. p. 34.

t. 3. Silurus. B. 16. D. 4. P.  $\frac{1}{7}$ . V. 13. A. 88. C. 17.

*Art. gen.* 82. *syn.* 110.

Silurus cirris 4 in mento.

D. 4. P.  $\frac{1}{8}$ . V. 11. A. 20. C. 17.

*Gron. mus.* 1. n. 25. Silurus cirris 2, ad maxillam superiorem, 4 in mento.

B. 14. D.  $\frac{1}{3}$ . P.  $\frac{1}{5}$ . V. 11. A. 90. C. 15.

*Habitat in Oriente, minus frequens in Europæ lacubus. Maximus dulcium; judæis vetitus.*

**Aspredo.** 3. S. pinna dorsali unica: radiis 5, cirris 8.

*Amœn. acad.* 1. p. 311. t.

14. f. 5. Aspredo. B. 4. D. 5. P.  $\frac{1}{8}$ . V. 6. A. 55. C. 11.



*Gron. mus.* 1. n. 26. Aspre-  
do. B 4. D. 5. P.  $\frac{1}{8}$ . V. 6. A. 55. C. 9.

*Klein. miss.* 5. p. 86. t. 4.  
f. 8. *Batrachus.*

*Habitat in Americæ fluviiis,*

*Mytus.* 4. S. pinna dorsali unica, ra-  
diis 6, cirris 8. *Mus. Ad.*  
*Fr.* 2. p. . . B. - - D.  $\frac{1}{5}$ . P.  $\frac{1}{9}$ . V. 6. A. 57. C. 19.

*Hasselqv. iter.* 376. *Silurus*  
*Schilbe niloticus.* B. 10. D.  $\frac{1}{7}$ . P.  $\frac{1}{12}$ . V. 6. A. 62. C. 20.

*Habitat in Nilo.*

*anguilla-* 5. S. pinna dorsali unica ra-  
*ris.* diis 70, cirris 8. *Mus. Ad.*  
*Fr.* 2. p. . . B. - - D. 70. P.  $\frac{1}{7}$ . V. 6. A. 55. C. 17.

*Hasselqv. iter.* 371. *Silurus*  
*Charmuth niloticus.* B. 10. D. 72. P.  $\frac{1}{15}$ . V. 6. A. 59. C. 21.

*Habitat in Nilo.*

*Batra-* 6. S. pinna dorsali unica ra-  
*chus.* diis 60, cirris 8. *Mus.*  
*Ad. Fr.* 2. p. . . B. 5. D. 60. P.  $\frac{1}{5}$ . V. 6. A. 48. C. 14.

*Habitat in Asia, Africa.*

*undeci-* 7. S. pinna dorsali unica ra-  
*malis.* diis 11, cirris 8. *Mus.*  
*Ad. Fr.* 2. p. . . B. - - D.  $\frac{1}{11}$ . P.  $\frac{1}{11}$ . V. 6. A. 11. C. 17.

*Habitat . . .*

*militaris.* 8. S. pinna dorsali postica a-  
diposa, cirris 2 rigidis. B. - - D. 50. P.  $\frac{1}{11}$ . V. 7. A. 20. C. 18.  
*Habitat in Asia. M. Ac. Holmens.*

Oculi ad latera capitis. Cirri 2 ad os, compressi, rigi-  
di, ossei. Linea lateralis recta. Dorsum ad pinnam  
dorsi assurgens.

*Catus.* 9. S. pinna dorsali postica a-  
diposa, ani radiis 20, cir-  
ris 8. B. 5. D.  $\frac{1}{8}$ . P.  $\frac{1}{11}$ . V. 8. A. 20. C. 17.

*Catesb. car.* 2. p. 23. t. 23.

Bagre 2 *Marcgr.* affinis.



*Marcgr. bras* 173. Bagre  
species 2.

*Habitat in America, Asia.*

*Ex Asia vidi pinnis ventr. radiis 6.*

Clarias. 10. S. pinna dorsali postica adi-  
pofa, ani radiis 11, cirris 6.

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 73.* A-  
spredo pinna dorsali po-  
stica adiposa.

B. 9. D.  $\frac{1}{7}$ , 0. P.  $\frac{1}{10}$ . V. 7. A. 11. C. 17.

*It. scan.* 82. Aspredo cir-  
ris longitudine corporis,  
pinnis dorsalibus dua-  
bus.

B. -- D. 7, 0. P.  $\frac{1}{9}$ . V. 5. A. 10. C. 16.

*Gron. mus. 1. n. 83.* Mystus  
cirris 6 longissimis, pin-  
na dorsi secunda longis-  
sima a priori ad caudam  
extensa.

B. 4. D.  $\frac{1}{7}$ , 0. P.  $\frac{1}{10}$ . V.  $\frac{1}{6}$ . A. 11. C. 19.

*Hasselqv. iter.* 369. Silu-  
rus Scheilan niloticus.

B. 6. D.  $\frac{1}{7}$ , 0. P.  $\frac{1}{9}$ . V. 7. A. 12. C. 16.

*Habitat in Americæ, Africæ fluviis.*

*In Nilo venenatus radio dentato pectoralium.*

Afcita. 11. S. pinna dorsali postica  
adiposa, ani radiis 18,  
cirris 6.

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 79. t.*

30, f. 2. Afcita.

B. -- D.  $\frac{1}{8}$ , 0. P.  $\frac{1}{12}$ . V. 6. A. 18. C. 18.

*Habitat in India.*

*Ovis maturis, intumescente abdomine, longitudinaliter de-  
biscit.*

costatus. 12. S. pinna dorsali postica  
adiposa, squamis serie  
simplici, cirris 6, cauda  
bifida.

*Gron. mus. 2. n. 177. t. 5. f.*

1. 2. Mystus cirris 6 lon-  
gissimis, unico squama-  
rum aculeatarum ordine  
utrinque in lateribus.

D.  $\frac{1}{7}$ , 0. P.  $\frac{1}{9}$ . V. 7. A. 12. C. 17.

*Habitat in Indiis.*



- Callich- 13. S. pinna dorsali postica  
thys. uniradiata, squamis ordi-  
ne duplici, cirris 4.  
*Amoen. acad.* 1. p. 317. t.  
14 f. 1. Callichthys. B. 3. D.  $\frac{1}{8}, \frac{1}{1}$ . P.  $\frac{1}{7}$ . V. 6. A.  $\frac{1}{7}$ . C. 14.  
*Gron. mus.* 1. n. 70. Cal-  
lichthys cirris 4, lateri-  
bus duplici squamarum  
ordine. B. 3. D.  $\frac{2}{8}, 1$ . P.  $\frac{1}{7}$ . V. 7. A. 7. C. 14.  
*Barrer. equin.* 175. Mul-  
lus palustris minor lori-  
catus.  
*Habitat in Americæ rivulis.*  
*Rivulis exsiccatis exit per terram aquas quæsiturus.*  
*Marcgr. bras.* 151.

- cata- 14. S. pinna dorsali postica u-  
phractus. uniradiata, squamis ordine  
simplici, cirris 6, cauda  
integra.  
*Gron. mus.* 1. n. 71. t. 3.  
f. 4. 5. Callichthys cir-  
ris 6, lateribus uno squa-  
marum ordine. B. 6. D.  $\frac{1}{5}, \frac{1}{1}$ . P. -- V. 6. A. 9. C. 19.  
*Catesb. car.* 3. p. 19. t. 19.  
Cataphractus americanus.  
*Habitat in America.*

151. LORICARIA. Caput læve, depreſum. Os  
edentulum, retractile.  
Membr. branch. radiis VI.  
Corpus cataphractum.

- cataphra- 1. LORICARIA. *Mus. Ad. Fr.*  
cta. 1. p. 79. t. 29. f. 1. D.  $\frac{1}{8}$ . P.  $\frac{1}{7}$ . V.  $\frac{1}{6}$ . A.  $\frac{1}{6}$ . C. 12.  
*Gron. mus.* 1. n. 68. t. 2.  
f. 1. 2. Plecostomus dor-  
so monopterygio, officu-  
lo superiori caudæ bifur-  
cæ setiformi. D.  $\frac{1}{8}$ . P.  $\frac{1}{7}$ . V.  $\frac{1}{6}$ . A. 6. C. 12.



β. *Gron. mus.* 1. n. 69. Ple-  
costomus ore edentulo,  
officulo superiori caudæ  
bifurcæ longitudine cor-  
poris.

*Habitat in America meridionali.*

*Lobus superior caudæ filo longissimo terminatur.*

152. SALMO. Caput læve, Dentes in maxillis,  
lingua.

*Membr. branch. radiis IV - X.*

*Corpus: Pinna dorsalis postica adi-  
posa; Pinnæ ventrales multi-  
radiatæ.*

\* TRUTTÆ corpore variegato.

Salar.

1. S. rostro ultra inferio-  
rem maxillam prominen-  
te. *Art. gen.* 11. *syn.* 22.  
*spec.* 48. *Fn. suec.* 306.

B. 12. D. 15. P. 14. V. 10. A. 13. C. 19.

*Habitat in Oceano Europæ, parit in fluviis.*

*Mas maxilla superiore adunca; fortiter fluvios adscen-  
dit; allicitur albo.*

Eriox.

2. S. maculis cinereis, cau-  
dæ extremo æquali. *Art.*  
*gen.* 12. *syn.* 23. *spec.* 50.  
*Fn. suec.* 307.

B. 12. D. 14. P. 14. V. 10. A. 12. C. --

*Habitat cum præcedente.*

Trutta.

3. S. ocellis nigris iridibus  
brunneis, pinna pectora-  
li punctis 6. *Fn. suec.*  
308.

B. -- D. 12 P. 13. V. 10. A. 9. C. 20.

*Art. gen.* 12. *syn.* 14. Sal-  
mo latus, maculis rubris  
nigrisque, cauda æquali.

*Gron. mus.* 2. n. 164. Sal-  
mo latus, cauda subrecta



maxillis æqualibus, maculis nigris annulo albido. D. 14. P. 12. V. 12. A. 10. C. --  
*Habitat in fluviis Europæ.*

Fatio. 4. S. maculis rubris, maxilla inferiore sublongiore. *Art. gen. 12. syn. 23. spec. 51.* B. -- D. 13. P. 10. V. 10. A. 10. C. 18.  
*Fn. Svec. 309. idem. B. 10. D. 14. P. 14. V. 9. A. 11. C. 20.*  
*Habitat in Sveciæ, Helvetiæ fluviis.*

Hucho. 5. S. oblongus, dentium lineis duabus palati, maculis tantummodo nigris.  
*Art. gen. 12. syn. 25.*  
*Habitat . . .*

Iacustris. 6. S. cauda bifurca, maculis solum nigris, sulco longitudinali ventris. *Art. gen. 12. syn. 25.*  
*Habitat in Helvetia.*

Carpio. 7. S. pede minor, dentium ordinibus quinque palati.  
*Art. gen. 13. syn. 27.*  
*Habitat in Angliæ, Vallesiæ fluviis.*

alpinus. 8. S. dorso nigro, lateribus cæruleis, ventre fulvo.  
*Fn. Svec. 310.*  
*It. Wgot. 257. Rœding. B. 10. D. 13. P. 14. V. 10. A. 12. C. 19.*  
*Art. gen. 13. syn. 25. spec. 52.* Salmo vix pedalis, pinnis ventris rubris, maxilla inferiore paulo longiore.  
*Habitat in Lapponiæ, Angliæ alpibus, solus.*  
*Caro rubra.*

Salvelinus. 9. S. pedalis, maxilla superiore longiore. *Art. gen. 13. syn. 26.*  
*Habitat in Austria ad Lintz.*



Salmari- 10. S. dorso fulvo : maculis  
nus. luteis, cauda bifurcata.

*Art. syn. 24.*

*Habitat Tridenti in fluvio frigidis saxosis.*

Umbla. 11. S. lineis lateralibus sursum  
recurvis, cauda bifurca.

*Art. gen. 13. syn. 25.*

*Habitat in Helvetiæ, Italiæ lacubus.*

\* \* OSMERI pinna dorsali anique oppositis.

Eperla- 12. S. capite diaphano, ra-  
nus. diis pinnæ ani 17.

*Art. gen. 10. syn. 21. spec.  
45.*

D. 11. P. 11. V. 8. A. 7. C. 19.

*Fn. svec. 311. Osmerus ra-  
diis pinnæ ani 17.*

*Habitat in Europa, fluvios primo vere adscendens.*

*Noster foetidus prurit cum Salice rubra & Viola edo-  
rata.*

Saurus. 13. S. radiis pinnæ ani 10.

*Art. gen. 10. syn. 22. O-  
smerus radiis pinnæ ani  
10.*

B. -- D. 12. P. 13. V. 8. A. 10. C. --

*Habitat in Europa.*

\* \* \* COREGONI Dentibus vix conspicuis.

Lavare- 14. S. maxilla superiore lon-  
tus. giore, radiis pinnæ dor-  
si 14.

*Art. gen. 10. syn. 19. spec.*

*37. Coregonus maxilla  
superiore longiore pinna  
dorsi officulorum 14. Fn.*

*svec. 312.*

B. 9. D. 14. P. 16. V. 12. A. 17. C. 18.

*Act. Stockh. 1753. p. 195.*

*Habitat in Europa.*

Albula. 15. S. maxillis edentulis : in-  
feriore longiore.

*Art. gen. 9. syn. 13. spec.*

*40. Coregonus edentu-*



lus, maxilla inferiore longiore. *Fn. svec.* 313. B. 7. D. 14. P. 16. V. 12. A. 15. C. --  
*Habitat in Europa.*  
*Prurit ante Brumam.*

Thymalus. 16. S. maxilla superiore longiore, pinna dorsi radiis 23.  
*Art. gen.* 10. *syn.* 20. *spec.* 41. Coregonus maxilla superiore longiore, pinna dorsi officulorum 23.  
*Fn. svec.* 314. *idem.* B. 10. D. 23. P. 16. V. 12. A. 14. C. 19.  
*Gron. mus.* 2. n. 165. *idem.* B. -- D. 21. P. 15. V. 10. A. 15. C. --  
*Habitat in Europæ fluviis maritimis.*

Oxyrinchus. 17. S. maxilla superiore longiore conica.  
*Art. gen.* 10. *syn.* 21. Coregonus maxilla superiore longiore conica. B. -- D. 13. P. 17. V. 12. A. 14. C. --  
*Gron. mus.* 1. n. 48. *idem.* B. -- D. 14. P. 12. V. 10. A. 15. C. --  
*Habitat in Oceano Atlantico.*

Vimba. 18. S. pinna adiposa subserata.  
*It. Wgot. p.* 231. *Wimba.* B. -- D. 12. P. 16. V. 10. A. 14. C. --  
*Habitat in Wenero Sveciæ.*

\* \* \* \* CHARACINI Membr. branch. radiis tantum IV.

gibbosus. 19. S. dorso gibboso compresso, pinna ani radiis 50.  
*Gron. mus.* 1. n. 53. t. 1. f. 4. Charax dorso admodum prominulo, pinna ani radiis 55. D. 10. P. 11. V. 8. A. 55. C. 19.  
*Habitat Surinami.*

bimaculatus. 20. S. corpore compresso bimaculato, pinna ani radiis 30.



- Gron. mus. 1. n. 54. t. 1. f. 5.* Charax dorso leviter convexo, pinna ani radiis 31. D. 10. P. 13. V. 8. A. 31. C. 19.
- Mus. Ad Fr. 1. p. 78. t. 32. f. 2.* Albula pinna ani radiis 32. B. 4. D. 10. P. 13. V. 8. A. 32. C. 19.
- Art. spec. 14.* Coregonoides amboinensis. D. 12. P. 13. V. 10. A. 34. C. --
- Habitat in America meridionali.*
- immaculatus. 21. S. corpore immaculato, pinna ani radiis 12.
- Mus. Ad Fr. 1. p. 78.* Albula pinna ani radiis 12. D. 11. P. 14. V. 11. A. 12. C. 20.
- Habitat in America.*
- niloticus. 22. S. pinnis omnibus flavescens, corpore toto albo.
- D. 9. P. 13. V. 9. A. 26. C. 19.
- Habitat in Nilo.*
- pulverulentus. 23. S. pinnis subpulverulentis, linea laterali descendente. D. 11. P. 16. V. 8. A. 26. C. 18.
- Habitat in America.*
- ano stomus. 24. S. ore sursum spectante.
- Gron. mus. 2. n. 165. t. 7. f. 2.* Anostomus. B. 4. D. 11. P. 13. V. 7. A. 10. C. 25.
- Habitat in Indiis.*

153. FISTULARIA. *Caput* : Rostrum cylindricum apice maxillosum.

*Membr. branch.* radiis VII.

*Corpus* . . .

tabacaria. I. FISTULARIA. *Mus. Ad Fr. 1. p. 80. t. 26. f. 1.* D. 14. P. 14. V. 6. A. 4. C. 13.

*Gron. mus. 1. n. 31.* Solenostomos cauda bifurca in setam balneaceam abeunte. D. 8. P. 15. V. 6. A. 12. C. 12.



*Catesb. car. 3. t. 17. f. 2.*

*Petimbuaba. Marcgr. bras.*

148.

*Will. icht. app. 22. Petem-  
buaba.*

*Habitat in America.*

*Filum e divisura pinnae caudae.*

154. **ESOX.** *Caput supra planiusculum: Mandibula  
superiore plana brevior: inferiore punctata. Dentes in maxillis,  
lingua.*

*Membr. branch. radiis VIII-XIII.*

*Corpus elongatum.*

Sphyræ- 1. E. dorso dipterygio: anti-  
na. ca spinosa.

D. 5, 10. P. 12. V. 6. A. 10. C. 17.

*Art. gen. 84. syn. 112. Sphy-  
ræna.*

D. 5, 10. P. 13. V. 6. A. 10. C. --

*Habitat in Mari Mediterraneo.*

osseus. 2. E. pinnae duplici, squa-  
mis osseis.

D. 6. P. 11. V. 6. A. 5. C. 12.

*Art. gen. 14. syn. 27. E-  
sox maxilla superiore lon-  
giore, cauda quadrata.*

*Gron. mus. 1. n. 29. idem.*

*Catesb. car. 2. t. 30. Acus  
maxima squamosa viridis.*

*Habitat in America septentrionali, Asia.*

Vulpes. 3. E. pinna in medio dorfi,  
membrana branchiostega  
triradiata.

D. 14. P. 14. V. 8. A. 10. C. 17.

*Catesb. car. 2. t. 1. f. 2.*

*Vulpes bahamensis.*

*Habitat in America.*

Synodus. 4. E. pinna in medio dorfi,  
membrana branchiostega  
5-radiata.

*Gron. mus. 2. n. 151. t. 7.*

*f. 1. Synodus.*

B. 5. D. 11. P. 12. V. 8. A. 6. C. 8.

U 5

*Habi-*



*Habitat in America.*

*Similitudo summa cum E. Vulpe.*

Lucius. 5. E. rostro depresso subæquali.

*Art. gen. 10. syn. 26. spec.*

53. *Fn. svec. 304. Efox*

rostro plagioplateo.

D. 21. P. 15. V. 11. A. 18. C. 19.

*Gron. mus. 1. n. 28. idem. D. 18. P. 11. V. 9. A. 15. C. --*

*Habitat in Europa.*

*Voracissimus exhaurit piscinas; ab Anatibus feritur.*

Hepsetus. 6. E. linea laterali argentea.

*Amoen. acad. 1. p. 321. Ar-*

gentina pinna dorsali pinnae ani opposita.

D. 14. P. 12. V. 6. A. 15. C. 14.

*Marcgr. bras. 159. Piquitinga.*

*Brown. jam. 441. t. 45. f.*

3. Menidia corpore subpellucido, linea laterali latiori argentea.

*Habitat in America.*

*Diversus ab Hepseto Atherinae pinna dorsi unica, & maxilla superiore &c.*

Bellone. 7. E. rostro utraque maxilla subulato.

*Art. gen. 10. syn. 27. Efox*  
rostro cuspidato gracili subtereti spithamali.

*Fn. svec. 305. idem.*

D. 16. P. 13. V. 7. A. 20. C. --

*Gron. mus. 1. n. 30. idem.*

B. 14. D. 16. P. 13. V. 7. A. 21. C. 23.

*Habitat in Oceano Europæo.*

*Ossa noctu lucent viridia.*

brasiliensis. 8. E. maxilla inferiore longissima, corpore serpentino.

D. 12. P. 10. V. 6. A. 17. C. 16.

*Marcgr. bras. 168. Timucu.*

*Brown. jam. 443. t. 45. f. 2.*

Efox maxilla inferiore producta.

*Habitat in America australi.*



gymno- 9. E. maxillis æqualibus, o-  
cephalus. perculis obtusissimis, ca-  
pite denudato. D. 13. P. 10. V. 7. A. 26. C. 19.  
*Habitat in India.*  
*Magnitudine Ammodytis qui nobis visus.*

155. ARGENTINA. *Caput* : *Dentes* in maxillis,  
lingua.  
*Membr. branch.* radiis VIII.  
*Corpus* ano caudæ vicino. *Pin-*  
*næ ventrales* multiradiatæ.

Sphyræ- 1. ARGENTINA. *Art. gen.* 8.  
na. *syn.* 17. D. 10. P. 14. V. 11. A. 9. C. --  
*Gron. mus.* 1. n. 29. Argen-  
tina. D. 10. P. -- V. -- A. 10. C. --  
*Habitat in Mari infero.*  
*Vesicula aërea utrinque conica velut argento foliato resplen-*  
*dens, unde margaritæ artificiales. Raj. pisc.* 108.

156. ATHERINA. *Caput* maxilla superiore planiu-  
scula. Mandibulæ edentulæ.  
*Membr. branch.* radiis VI.  
*Corpus* fascia laterali argentea.

Hepsetus. 1. ATHERINA. D. 8, 12. P. 13. V.  $\frac{1}{2}$ . A. 16. C. 17.  
*Arted. syn.* 117. Atherina.  
*Gron. mus.* 1. n. 66. Athe-  
rina. D. 6, 12. P. 13. V. 6. A. 10. C. --  
*Hasselqv. iter.* 382. Athe-  
rina Hepsetus. D. 8, 9. P. 12. V. 6. A.  $\frac{1}{2}$ . C. 20.  
*Habitat in Mari Mediterraneo.*



157. MUGIL. *Caput*: Labia membranacea: inferius introrsum carinatum. *Dentes* nulli. Denticulus inflexus supra sinus oris.  
*Membr. branch.* radiis VII curvis;  
*Opercula* lævia rotundata.  
*Corpus* albicans.

Cephalus.	1. MUGIL.	D. 4, $\frac{1}{9}$ . P. 16. V. $\frac{1}{6}$ . A. $\frac{3}{12}$ . C. 12.
	<i>Art. gen.</i> 32. <i>syn.</i> 52. <i>spec.</i>	
	71. Mugil.	D. 5, $\frac{1}{11}$ . P. 18. V. $\frac{1}{6}$ . A. $\frac{3}{13}$ . C. --
	<i>Hasselqv. iter.</i> 385. Mugil	
	Cephalus.	D. 5, 11. P. 13. V. 6. A. 10. C. --
	<i>Habitat in Oceano Europæo, fluvios subiens.</i>	
	<i>Botargo italarum ex hujus ovis.</i>	

158. EXOCOETUS. *Caput* squamosum. *Os* edentulum: maxillis utroque latere connexis.  
*Membr. branch.* radiis X.  
*Corpus* albicans. *Abdomen* angulatum. *Pinnæ* pectorales maximæ, volatiles radiis antice carinatis.

volitans.	1. EXOCOETUS. <i>Amæn. acad.</i>	
	1. p. 321.	D. 14. P. 15. V. 6. A. 13. C. 15.
	<i>Art. gen.</i> 8. <i>syn.</i> 18. <i>spec.</i> 35.	
	Exocoetus.	D. 13. P. 17. V. 6. A. 11. C. 15.
	<i>Gron. mus.</i> 1. n. 27. Exocoetus.	D. 13. P. 17. V. 7. A. -- C. --
	<i>Habitat in alto Pelago, Europæo &amp; Americano, a Coryphænis exagitatus ad scopeti jactum ex aquis evolans gregarius, præda fit Aquilæ Phaëtontis; an Selæ Israelitarum, jubente Auctore coryphænas pellere hos ad littus, uti statuit Rudbeck. fil.?</i>	



159. POLYNEMUS. *Caput* compressum, undique squamosum: rostro obtusissimo, prominente.  
*Membr. branch. radiis VII. f. V.*  
*Corpus* Digitis liberis ad pinnas pectorales.

quinquarius. 1. P. digitis quinque corpore longioribus.

*Gron. mus. 1. n. 74.* Polynemus officulis filiformibus utriusque 5 ad pinnas pectorales.

B. 5. D. 7, 16. P. 16. V.  $\frac{1}{8}$ . A.  $\frac{2}{5}$ . C. 17.

*Habitat in America.*

virginicus. 2. P. digitis septem, cauda integra.

B. 7. D. 7,  $\frac{1}{3}$ . P. 15. V.  $\frac{1}{8}$ . A.  $\frac{2}{10}$ . C. 15.

*Habitat in America.*

*Opercula serrata. Radius primus dorsalis prioris brevissimus. Pinna caudæ lata, acuta.*

paradiseus. 3. P. digitis septem, cauda bifida.

*Edw. av. 208. t. 208.* Paradisea piscis.

*Habitat in India.*

*Genus a Trigla distinctum pinnis ventralibus, non in pectore, sed abdomine sitis; nec digiti articulati, ut in Triglis.*

160. CLUPEA. *Caput* maxillarum superiorum mystacibus ferratis.

*Membr. branch. radiis VIII: Branchiæ interne fetacæ.*

*Corpus: Abdominis carina serrata. Pinnae ventrales sæpe novem-radiatæ.*

Harengus. 1. C. immaculata, maxilla inferiore longiore.

D. 18. P. 18. V. 9. A. 17. C. 13.



- Art. gen. 7. syn. 14. spec. 37.*  
Clupea maxilla inferiore longiore, maculis nigris carens. D. 18. P. 18. V. 9. A. 17. C. 18.  
*Fn. svec. 315. idem.*  
*Gron. mus. 1. n. 21. idem.* D. 19. P. 15. V. 8. A. 16. C. ---  
*Habitat in M. Europæis.*  
*Europæis borealibus copiosissimus piscis.*
- Sprattus. 2. C. pinna dorsali radiis XIII. D. 17. P. 16. V. 6. A. 19. C. ---  
*Art. gen. 7. syn. 17. spec. 33.* Clupea quadruncialis, maxilla inferiore longiore, ventre acutissimo.  
*Fn. svec. 316.* D. 17. P. 17. V. 7. A. 19. C. ---  
*Habitat in Oceano Europæo.*
- Alofa. 3. C. lateribus nigro maculatis, rostro bifido. D. 19. P. 15. V. 9. A. 21. C. 19.  
*Art. gen. 7. syn. 15. spec. 34.* Clupea apice maxillæ superioris bifido, maculis nigris utrinque. D. 19. P. 15. V. 9. A. 22. C. 19.  
*Gron. mus. 1. n. 23. idem.* D. 18. P. --- V. 8. A. 20. C. ---  
*Hasselqv. itin. 388. idem.* D. 19. P. 15. V. --- A. 18. C. 26.  
*Habitat in Oceano Europæo.*
- Encrasi- 4. C. maxilla superiore longiore.  
colus. *Art. gen. 7. syn. 17.* Clupea maxilla superiore longiore.  
*Habitat in Oceano Europæo.*  
*E' culina expulit Garum veterum.*
- Thrissa. 5. C. pinna ani radiis 28, dorsalis radio postremo setaceo longo.  
*Brown. jam. 443.* Clupea minor, radio ultimo pinnae dorsalis longissimo.  
*Chin. Lagerstr. 30.* Mystus corpore ovato. B. 5. D. 14. P. 13. V. 8. A. 28. C. 21.



*Osbeck. itin.* 257. Clupea  
 Thrissa. B. 7. D. 16. P. 14. V. 7. A. 24. C. 24.  
*Habitat in Mari Indico.*  
*Pinnæ ventrales sunt parvæ.*

Sima. 6. C. pinnis flavis: ventralibus minutissimis. B. 6. D. 17. P.  $\frac{1}{7}$ . V.  $\frac{1}{6}$ . A. 53. C. 18.  
*Habitat in Asia. Mus. Acad. Holmens.*  
*Os sinum: maxilla superiore brevissima, apice truncata.*  
*Corpus argenteum. Abdomen carinato-serratum. Lacuna inter oculos. Pinnæ flavæ: ventrales aëo parvæ, ut vix conspicuæ.*

Sterni- 7. C. pinnis ventralibus nul-  
 cla. lis. B. 2. D. 11. P. 9. V. 0. A. 34. C. 18.  
*Gron. mus. 2. n. 155. t. 7.*  
*f. 5. Gasteropelecus. D. 12. P. 9. V. 0. A. 33. C. 22.*  
*Habitat Surinami.*  
*Corpus latissimum, abdomine gibboso carinatum.*

Mystus. 8. C. corpore ensiformi, pinna ani caudæ coadunata. D. 12. P. 18. V. 6. A. 84. C. 11.  
*Osbeck. itin.* 256. Clupea  
 Mystus. B. 10. D. 13. P. 17. V. 7. A. 86. C. 13.  
*Chin. Lagerstr. 31. t. 1. f.*  
 12. Mystus corpore ensiformi. D. 12. P. 17. V. 6. A. 84. C. 11.  
*Habitat in Mari Indico.*  
*Pinna ani excurrit in pinnam caudæ integram; forte genere sub diverso comprehendi posset?*

tropica. 9. C. cauda cuneiformi. *Osbeck. itin.* 300. B. 7. D. 26. P. 6. V. 6. A. 26. C. 20.  
*Habitat ad insulam Ascensionis.*  
*Corpus album, compressum, latum, serratum. Linea lateralis recta, dorso propior. Oculi prope rictum. Opercula squamosa. Caput declive. Maxilla inferior longior. Rictus magnus. Dentes unius ordinis. Cauda cuneiformis. P. dorsi a medio dorsi ad caudam. P. Ani longitudine dorsalis.*

sinensis. 10. C. radio extimo membranæ branchiostegæ postice truncato. D. 16. P. 16. V. 8. A. 16. C. --  
*Habitat in China.*



*Similis Clup. Harengo, sed latior. Os edentulum. Opercula infima membr. branchiof. tegentia valde truncata s. potius radium extimum membr. branchioflegæ constituentia.*

161. CYPRINUS. Caput ore edentulo; Os nasale bifidum.

*Membr. branch. radiis III.*

*Corpus læve, albens. Pinnae ventrales sæpe novemradiatæ.*

\* *Barbati s. ad os cirrosi.*

Barbus. 1. C. pinna ani radiis 7, cirris 4, pinnæ dorsi radio secundo utrinque serrato. D.  $\frac{2}{1\frac{1}{2}}$ . P. 16. V. 9. A. 7. C. 16.

*Art. gen. 4. syn. 8. Cyprinus maxilla superiore longiore, cirris 4, pinna ani officulorum 7.*

*Gron. mus. 1. n. 20. idem. D.  $\frac{3}{1\frac{1}{2}}$ . P. 16. V. 9. A. 7. C. 16.*

*mus. 2. p. 3. idem. D. 10. P. 17. V. 9. A. 8. C. 17.*

*Habitat in Europa australi.*

*Ova choleram causantur. Tim. cas. 104.*

Carpio. 2. C. pinna ani radiis 9, cirris 4, pinnæ dorsalis radio secundo postice serrato. D.  $\frac{2}{2\frac{1}{4}}$ . P. 16. V. 9. A. 9. C. 19.

*Art. gen. 4. syn. 3. spec.*

*25. Cyprinus cirris 4, officulo tertio pinnarum dorsi anique uncinulis armato.*

*D. 24. P. 16. V. 9. A. 9. C. 19.*

*Fn. svec. 317. idem.*

*Gron. mus. 1. n. 19. idem. D. 23. P. 17. V. 8. A. 8. C. --*

*Habitat in Europa.*

*Nobilis piscis sæpius in piscinis educatus, circa a. 1600 primum in Angliam introductus.*

Gobio. 3. C. pinna ani radiis 11, cirris 2. D. 10. P. 16. V. 9. A. 11. C. 19.



*Art. gen. 4. syn. 11. spec.*

13. Cyprinus quincun-  
cialis maculosus, maxilla  
superiore longiore; cirris  
duobus ad os.

D. 12. P. 17. V. 11. A. 11. C. 19.

*Gron. mus. 2. n. 149. i-  
dem?*

D. 8. P. 14. V. 6. A. 7. C. --

*Habitat in Anglia & adjacentibus.*

america- 4. C. pinna ani radiis . . , cir-  
nus. ris plurimis.

*Catesb. car. 2. p. 12. t. 12.*

Alburnus americanus.

*Habitat in America.*

\* \* *Pinna caudæ indivisa.*

Caras- 5. C. pinna ani radiis 10,  
fius. caudæ integra, linea la-  
terali recta.

D. 20. P. 15. V. 8. A. 9. C. 21.

*Art. gen. 4. syn. 5. spec. 29.*

Cyprinus pinna dorsi os-  
siculis 20, linea laterali  
recta.

D. 20. P. 15. V. 9. A. 10. C. --

*Fn. svec. 322. idem.*

*Gron. mus. 1. n. 11. idem.* D. 20. P. 11. V. 9. A. 10. C. 23.

*Act. Ups. 1741. p. 75. n.*

55. Cyprinus Hamburger. D. 20. P. 14. V. 9. A. 9. C. 22.

*Habitat in Europæ stagnis.*

*Facillime in piscinis educatur.*

Tinca. 6. C. pinna ani radiis 25,  
caudæ integra, corpore  
mucoso.

D. 10. P. 16. V. 9. A. 25. C. 24.

*Art. gen. 4. syn. 5. spec.*

27. Cyprinus mucosus  
totus nigrescens, extre-  
mitate caudæ æquali.

D. 12. P. 17. V. 11. A. 11. C. 19.

*Fn. svec. 321. Cyprinus pin-  
na ani ossiculorum 11,  
cauda æquali.*

*Habitat in Europæ stagnis, Lacubus.*

*Carassios repurgat; Icteri magnes.*



Cephalus.

7. C. pinna ani radiis 11, caudæ integræ, corpore subcylindrico.

*Mus. Ad. Fr. p. 77. t. 30.*

Cyprinus pinna ani radiis 11, cauda rotundata.

D. 11. P. 16. V. 9. A. 11. C. 17.

*Art. gen. 5. syn. 7. Cyprinus oblongus macrolepidotus, pinna ani officulis 11.*

D. -- P. -- V. -- A. 11. C. --

*Gron. mus. 1. n. 12. idem. mus. 2. p. 3. idem.*

D. 11. P. -- V. 9. A. 11. C. --

*Habitat in Europa meridionali.*\* \* \* *Pinna caudæ trifida.*

auratus.

8. C. pinna ani gemina, caudæ transversa trifurca.

*Fn. svec. p. 125. t. 2.**Act. Stockb. 1740. p. 403.**t. 1. f. 1-8. idem.*D.  $\frac{2}{8}$ . P. 16. V. 9. A. 8, 8. C. 37.*Gron. mus. 1. n. 15. idem.*

D. 8. P. 11. V. 7. A. -- C. 20.

*mus. 2. n. 150. C. pinna ani simplici, cauda trifurca.*

D. 18. P. 11. V. 8. A. 8. C. 44.

*Edw. av. t. 209.**Pet. gaz. t. 78. f. 7.**Habitat in Chinæ, Japoniæ fluviis.**Piscis colitur in vasis murrhinis ob aureum fulgorem, tum multum pinnis varians. Radius secundus ani postice ferratus.*\* \* \* \* *Pinna caudæ bifida.*

niloticus. 9. C. pinna ani radiis 7, dorsali 18.

D. 18. P. 17. V. 9. A. 7. C. 19.

*Hasselqv. iter. 393. n. 94.*

Cyprinus rufescens.

D. 18. P.  $\frac{1}{7}$ . V. 9. A. 7. C. 24.*Habitat in Nilo.*

Phoxinus. 10. C. pinna ani radiis 8, macula fusca ad caudam, corpore pellucido.

D. 8. P. 16. V. 8. A. 8. C. 19.



*Art. syn.* 12. Cyprinus tri-  
dactylus varius oblongus  
teretiufculus, pinna ani  
officulorum 8.

*Habitat in Europa.*

Aphya. 11. C. pinna ani radiis 9, i-  
ridibus rubris, corpore  
pellucido. *Fn. svec.* 331. D. 10. P. 12. V. 7. A. 9. C. 19.

*It. W'got.* 232. Cyprinus  
minimus. D. 11. P. 8. V. 8. A. 9. C. 19.

*Art. gen.* 4 *syn.* 13. *spec.*  
30. Cyprinus biuncialis,  
iridibus rubris, pinna ani  
officulorum 9.

D. -- P. -- V. -- A. 9. C. --

*Habitat in Europæ rivulis.*

Leucifcus. 12. C. pinna ani radiis 16,  
dorsali 9.

D. 9. P. -- V. -- A. 10. C. 19.

*Art. syn.* 9. Cyprinus no-  
vem digitorum, rutilo  
longior & angustior, pin-  
na ani radiorum decem.

*Habitat in Europa media.*

Dobula. 13. C. pinna ani dorsali que  
radiis 10.

D. 10. P. 15. V. 9. A. 10. C. 19.

*Art. syn.* 10. Cyprinus peda-  
lis gracilis oblongus cras-  
sufculus, dorso crasso,  
pinna ani officulorum 9.

*Habitat in Europa media.*

Grillagi-  
-ne. 14. C. pinna ani radiis 11, pin-  
nis albensibus. *Fn. svec.* 325.

*Art. gen.* 5. Cyprinus ob-  
longus, iride argentea,  
pinnis albensibus.

*Gron. mus.* 2. n. 148. Cy-  
prinus idem.

D. 11. P. 11. V. 9. A. 11. C. --

*Art. syn.* 5. *spec.* 12. Cy-  
prinus oblongus, figura  
rutili, pinna ani officulo-  
rum 10.

D. 10. P. 16. V. 9. A. 11. C. 19.

*Habitat in Europæ lacubus.*



- Idbarus. 15. C. pinna ani radiis 12, pinnis ventralibus sanguineis. D. 10. P. -- V. -- A. 12. C. 19.  
*Habitat in Sveciæ lacubus.*
- Rutilus. 16. C. pinna ani radiis 12 rubicunda. *Fn. svec.* 329.  
*Art. gen.* 3. *syn.* 10. *spec.* 10. Cyprinus iride pinnis ventris ac ani plerumque rubentibus. D. 13. P. 15. V. 9. A. 12. C. 17.  
*Gron. mus.* 1. n. 8. idem. D. 12. P. -- V. 9. A. 13. C. --  
*Act. Ups.* 1741. p. 74. n. 51. idem. D. 10. P. 11. V. 10. A. 15. C. --  
*Act. Ups.* 1741. n. 52. Rex van Ruy. D. 10. P. 12. V. 9. A. 15. C. 22.  
*Habitat in Europæ lacubus.*
- Idus. 17. C. pinna ani radiis 13 rubra. *Fn. svec.* 320. D. 10. P. 18. V. 10. A. 13. C. 19.  
*Art. gen.* 5. *syn.* 14. *spec.* 6. Cyprinus iride subluttea, pinnis ventralibus anique rubris. D. 11. P. -- V. 10. A. 13. C. 19.  
*Gron. mus.* 1. p. 3. n. 13. idem. D. 10. P. 20. V. 9. A. 13. C. 24.  
*Habitat in Europæ aquis dulcibus.*
- Orfus. 18. C. pinna ani radiis 13. *Art. syn.* 6. Cyprinus Orfus dictus.  
*Raj. pisc.* 118. Rutilus latior s. Rubellio fluvialilis. D. 10. P. 19. V. 9. A. 13. C. --  
*Meyer. thier.* 2. t. 94. Orf. *Habitat in Rheno, Angliæ fluviiis, lacubus.*
- Erythrophthalmus. 19. C. pinna ani radiis 14, pinnis rubris. *Fn. svec.* 324.  
*Art. gen.* 3. *syn.* 4. *spec.* 9. Cyprinus iride pinnis omnibus caudaque rubris. D. 11. P. 16. V. 10. A. 14. C. 19.  
*Habitat in Europa septentrionali.*



- Jeses. 20. C. pinna ani radiis 14, rostro rotundato. D. -- P. -- V. -- A. -- C. --  
*Art. syn. 7. Cyprinus cubitalis, pinna ani officulorum 14.*  
*Habitat in Germania.*
- Nafus. 21. C. pinna ani radiis 14, rostro prominente. *Art. gen. 5. syn. 6.*  
*Gron. mus. 2. n. 147. idem. D. 11. P. 7. V. 9. A. 12. C. 25.*  
*Habitat in Rheno fluvio.*
- Aspius. 22. C. pinna ani radiis 16, maxilla inferiore longiore incurva. *Fn. svec. 319.*  
*Art. gen. 6. syn. 14. spec. 14. Cyprinus maxilla inferiore longiore cum apice elevato, pinna ani officulorum 15.* D. 11. P. 18. V. 10. A. 16. C. 19.  
*Habitat in Sveciæ lacubus.*
- Alburnus. 23. C. pinna ani radiis 20. *Fn. svec. 330.*  
*Art. gen. 6. syn. 10. spec. 17. Cyprinus quincuncialis, pinna ani officulorum 20.* D. 10. P. 14. V. 9. A. 21. C. --  
*Gron. mus. 1. n. 10. idem D. 9. P. -- V. 9. A. 22. C. --*  
*Act. Ups. 1741. p. 75. n. 58. Koning van asterling. D. 8. P. 14. V. 8. A. 18. C. 20.*  
*Habitat in Europæ aquis dulcibus.*
- Vimba. 24. C. pinna ani radiis 24, rostro nasiformi. *Fn. sv. 326.*  
*Art. gen. 6. syn. 14. spec. 18. Cyprinus rostro nasiformi, dorso acuminato, pinna ani officulorum 24.* D. 11. P. 16. V. 10. A. 24. C. 19.  
*Habitat in Sveciæ lacubus.*
- Dentex. 25. C. pinna ani radiis 26, ore dentibus undique molaribus. D. 10. P. 14. V. 9. A. 26. C. 19.



- Hasselqv. itin.* 395. *Salmo dentex.* D.10. P.15. V.10. A.24. C.25.  
*Habitat in Nilo.*  
*Ob dentes singularis, Sparis similis, sed facies & membr. branchiostega omnino Cyprini; pinnam adiposam non vidi.*
- Brama.* 26. C. pinna ani radiis 27, pinnis fuscis. *Fn. suec.* 318. *Art. gen.* 6. *syn.* 4. *spec.* 22. Cyprinus pinnis omnibus nigrescentibus, pinna ani officulorum 27. D.12. P.17. V.9. A.27. C.19.  
*Gron. mus.* 1. n. 14. idem. D.11. P. -- V.10. A.27. C. --  
*Habitat in Europæ lacubus.*
- cultratus.* 27. C. pinna ani radiis 30, linea laterali declinata, ventre acutissimo. *It. scan.* 82. t. 2. D.8. P.16. V.8. A.30. C.19.  
*Habitat in M. Baltico.*
- Bjoerkna.* 28. C. pinna ani radiis 35. *Fn. suec.* 328. D.11. P.15. V.9. A.35. C.19.  
*Art. gen.* 3. *syn.* 13. *spec.* 20. Cyprinus quincuncialis, pinna ani officulorum 25. D.11. P.15. V.9. A.25. C.19.  
*Habitat in Sveciæ lacubus.*
- Fareus.* 29. C. pinna ani radiis 37, iride flavâ. *Art. spec.* 23. *Fn. sv.* 327. D.11. P.18. V.10. A.37. C.19.  
*Habitat in Sveciæ Lacu Mælero.*
- Ballerus.* 30. C. pinna ani radiis 40. *Fn. suec.* 323. *Art. gen.* 3. *syn.* 12. *spec.* 23. Cyprinus admodum latus & tenuis, pinna ani officulorum 40. D.11. P.16. V.10. A.40. C.19.  
*Habitat in Europæ lacubus.*



## V. BRANCHIOSTEGI.

162. MORMYRUS. *Caput: Dentes* plures, emarginati.

*Apertura* linearis, pone capitis latera.

*Corpus* squamis imbricatis.

*Pinnæ* ventrales sunt abdominales.

cyprinoi-1. M. cauda bifida acuta.

des. *Mus. Ad. Fr. 2. p. . .* D.27. P.9. V.6. A.32. C.19.  
*Habitat in Nilo.*

anguilloi-2. M. cauda bifida obtusa.

des. *Mus. Ad. Fr. 2. p. . .* D.26. P.10. V.6. A.41. C.19.

*Hasselqv. iter 398. Mormyrus* Caschive.

D.20. P.10. V.6. A.19. C.24.

*Habitat in Nilo.*

163. BALISTES. *Caput* compressum. *Dentes* incisores utrobi 8 paralleli.

*Apertura* supra pinnas pectorales.

*Corpus* compressum squamis corio coadunatis. *Abdomen* carinatum.

Monoce-1. B. pinna capitis uniradiata.

ros. *Mus. Ad. Fr. 2. p. . .* D.1,46. P.14. V.0. A.50. C.12.

*Osborn. iter. 110. Balistes* Monoceros.

D.1,47. P.13. V.0. A.51. C.12.

*Catesb. car. 2. t. 19. Unicornu* piscis bahamensis.



*Habitat in Asia, America.*

*Carina abdominis intra cutem.*

- tomen- 2. B. pinna capitis biradiata,  
tosus. corpore posterius subvil-  
loso.  
*Gron. mus. 1. n. 114. Ba-*  
*listes aculeis dorfi 2, la-*  
*teribus versus caudam hir-*  
*sutis.* D.  $\frac{1}{2}$ , 29. P. 10. V. 0. A. 27. C. --
- Clus. exot. 143. Raj. pisc.*  
*47. Monoceros piscis.*  
*Marcgr. bras. 154. Pira-aca.*  
*Habitat in America.*
- papillo- 3. B. pinna dorsali anteriore  
ius. biradiata, corpore papil-  
loso. *Mus. Ad. Fr. 2.*  
*p. . .* D.  $\frac{1}{2}$ , 29. P. 13. V. 0. A. 21. C. 12.  
*Habitat . . .*
- verruco- 4. B. pinna dorsali anteriore  
sus. triradiata, cauda ordine  
triplici verrucarum. *Mus.*  
*Ad. Fr. 1. p. 57. t. 27.*  
*f. 4.* D. 3, 24. P. 13. V. 0. A. 21. C. 12.  
*Habitat in India.*
- aculea- 5. B. pinna dorsali anteriore  
tus. triradiata, caudæ lateribus  
spinis recumbentibus.  
*It. Wgoth. 138. Ostracion*  
*compressus, fasciis ni-*  
*gris, cauda lateribus mu-*  
*ricata.* D. 3, 24. P. 13. V. 0. A. 21. C. 12.  
*Habitat in India.*
- Simillimus priori statura & radiis; differt colore, sed*  
*imprimis nota illa singulari, quod ad latera caudæ u-*  
*trinque notetur quadruplici circiter ordine spinarum re-*  
*cumbentium; cum præcedens eodem loco verrucas ro-*  
*tundas scabras gerat.*



Vetula. 6. B. pinna dorsali anteriore  
triradiata, ventrali lon-  
gitudinali, caudali bifi-  
da. D.3,30.P.16.V.16.A.28.C.12.

*Catesb. car. 2. p. 22. t.*  
22.. Turdus oculo ra-  
diato.

*Art gen. 53. syn. 8.* Bali-  
stes aculeis dorsi tribus,  
cauda bifurca. D.3,30.P.15.V.17.A.27.C.12.

*Osbeck. iter. 294.* Balistes  
Vetula. D.3,30.P.14.V.12.A.28.C.12.

*Brown. jam. 456.* Balistes  
major fasciata, dorso tri-  
acantho, cauda bifurca:  
radiis exterioribus longis-  
simis.

*Habitat ad insulam Ascensionis.*

ringens. 7. B. pinna dorsali anteriore  
triradiata, lateribus capi-  
tis triplicatis, cauda bifida.  
*Mus. Ad. Fr. 1. p. 58.* D.3,29.P.15.V.0.A.26.C.12.

*It. Wgot. 139.* Ostracion  
compressus rufescens, pin-  
næ dorsalis radio longo  
retrosum dentato. D.3,30.P.10.V.0.A.26.C.10.

*Osbeck. iter. 295.* Balistes  
nigra. D.2,34.P.16.V.0.A.31.C.13.

*Habitat ad inf. Ascensionis.*

Scolo- 8. B. pinna dorsali anteriore  
pax. quinque-radiata, rostro  
longissimo maxilla infe-  
riore operculato.

*Art. gen. 54. syn. 82.* Ba-  
listes aculeis binis loco  
pinnarum ventralium, fo-  
litaro infra anum. D.5,12.P.14.V.--A.18.C.--

*Habitat in Mari Mediterraneo.*



164. OSTRACION. *Caput: Dentes utrobi 10 porrecti, teretes obtusiusculi.*

*Apertura . . .*

*Corpus osse integro obtectum.*

*Pinnae ventrales nullae.*

triqueter. 1. *O. trigonus muticus.*

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 60. Ostracion polyodon inermis triqueter.*

D. 10. P. 12. V. 0. A. 10. C. 10.

*Art. gen. 57. syn. 85. Ostracion triangulus, tuberculis exiguis innumeris, aculeis carens.*

D. 10. P. 12. V. 0. A. 10. C. 10.

*Habitat in India,*

*Dorsum quasi rhombis transverse dissectis tectum, margine repandum.*

trigonus. 2. *O. trigonus spinis subcaudalibus 2, pinna dorsali radiis XIV.*

*Art. gen. 56. syn. 85. Ostracion triangulus, limbis figurarum hexagonarum eminentibus, aculeis 2 in imo ventre.*

*It. scan. 160. Ostracion polyodon tetragonus, abdomine pone bicorni.*

D. 14. P. 10. V. 0. A. 9. C. 7.

*Habitat in India.*

bicaudalis. 3. *O. trigonus, spinis subcaudalibus 2, pinna dorsali radiis decem.*

*Art. gen. 57. syn. 85. Ostracion triangulatus, tuberculis hexagonis radiatis, aculeis 2 in imo ventre.*

D. 10. P. 12. V. 0. A. 10. C. 10.

*B. Art. gen. 57. syn. 85. Ostracion triangulatus totus maculosus ac tuber-*



culosus, aculeis 2 in imo ventre.

D. 10. P. 11. V. 0. A. 10. C. 10.

*Habitat in India.*

tricornis. 4. O. trigonus, spinis frontilibus duabus, dorsali unica.

*Art. gen. 56. syn. 85.* Ostracion triangulatus, aculeis 2 in capite & unico longiore superne ad caudam.

*Habitat in India.*

quadricornis. 5. O. trigonus, spinis frontilibus subcaudalibusque binis.

*Art. gen. 56. syn. 85.* Ostracion triangulatus, 2 aculeis in fronte & totidem in imo ventre.

D. 10. P. 11. V. 0. A. 10. C. 10.

*Habitat in India.*

cornutus. 6. O. tetragonus, spinis frontilibus subcaudalibusque binis.

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 59.* Ostracion polyodon tetragonus, antice postice dorsoque spinosus.

D. 9. P. 10. V. 0. A. 9. C. 10.

*Gron. mus. 1. n. 118.* Ostracion quadrangularis, aculeis 2 in fronte & totidem in imo ventre.

D. 11. P. 9. V. 0. A. -- C. 5.

*Will. icht. t. 7. f. 13. f. 1.* Piscis cornutus. *Bont. jav. 79.*

*Habitat in India.*

tuberculatus. 7. O. tetragonus muticus, tuberculis dorsalibus 4.

*Art. gen. 55. syn. 84.* Ostracion quadrangulus, tuberculis 4 majoribus in dorso.

*Habitat in India.*



gibbosus. 8. *O. tetragonus muticus gibbosus.*

*Art. gen. 55. syn. 83. Ostracion quadrangulus gibbosus.*

*Habitat in India.*

cubicus. 9. *O. tetragonus muticus, lateribus planiusculis.*

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 59. Ostracion polyodon tetragonus inermis.*

D. 9. P. 10. V. 0. A. 10. C. 10.

*It. Wgot. p. 138. nomen Artedii.*

D. 10. P. 8. V. 0. A. 9. C. 10.

*Art. gen. 56. syn. 85. Ostracion quadrangulus maculis variis plurimis.*

D. 9. P. 10. V. 0. A. 8. C. 10.

*Habitat in India.*

165. TETRAODON. *Caput: Maxillæ ossæ, porrectæ, apice bipartitæ.*

*Apertura linearis.*

*Corpus subtus ventricosum muricatum.*

*Pinnæ ventrales nullæ.*

testudineus. 1. *T. abdomine plano læviore, dorso futuris curvis albis picto.*

*Art. gen. 60. syn. 86. Ostracion oblongus glaber, corpore figuris variis ornato.*

D. - - P. 14. V. 0. A. 6. C. 9.

*Amœn. acad. 1. p. 309, t. 14. f. 3. idem.*

D. 6. P. 14. V. 0. A. 6. C. 9.

*Habitat in India.*

*Corpus supra scabriusculum, subtus punctis pertusum, intra quæ aculei latent.*

lagocephalus. 2. *T. abdomine aculeato, corpore lævi, humeris prominentibus.*



*Mus. Ad. Fr. 1. p. 59.* Ostracion tetraodon ventricosus, abdomine muricato. D. 10. P. 18. V. 0. A. 8. C. 10.

*Art. gen. 58. syn. 86.* Ostracion cathetoplateo-oblongus, ventre tantum aculeato & subrotundo.

*Amœn. acad. 1. p. 310. t. 14. f. 4. idem.* D. 9. P. 17. V. 0. A. 9. C. 7.

*Gron. mus. 1. n. 126.* Ostracion cathetoplateus tetraodon compressus maculosus scaber.

D. 9. P. 16. V. 0. A. -- C. --

*Habitat in India.*

lineatus. 3. T. fasciis longitudinalibus fuscis pallidisque. *Mus.*

*Ad. Fr. 2. p. . . .* D. 11. P. 18. V. 0. A. 9. C. 11.

*Hasselqv. itin. 400.* Tetraodon Fahaca.

D. 12. P. 21. V. 0. A. 9. C. 11.

*Habitat in Nilo.*

*Aculei abdominis venenati pungunt, quasi urticatione.*

ocellatus. 4. T. fascia humerali ocellata. *Mus. Ad. Fr. 2. p. . . .*

D. 14. P. 18. V. 0. A. 12. C. 7.

*Osbeck. itin. 226.* Diodon ocellatus.

D. 15. P. 18. V. 0. A. 11. C. 8.

*It. sean. 260.* Ostracion maculosus, abdomine muricato.

D. 12. P. 20. V. 0. A. 12. C. --

*Art. gen. 58. syn. 85.* Ostracion maculosus, aculeis undique densis exiguis.

*Habitat in Asiæ & Ægypti aquis dulcibus.*

*Venenatus piscis, uti precedens.*

hispidus. 5. T. totus hispidus papillis setaceis.

*Chin. Lagerstr. 23.* Ostracion tetraodon ventricosus, corpore toto muricato.

D. 9. P. 17. V. 0. A. 10. C. 10.



*Art. gen. 58. syn. 83. Ostracion tetraodon sphaericus, aculeis undique exiguis.*

*Habitat in India.*

Mola. 6. T. laevis compressus, cauda truncata: pinna brevissima dorsali analique annexa.

*Art. gen. 61. syn. 83. Ostracion cathetoplateus subrotundus inermis asper, pinnis pectoralibus horizontalibus, foraminibus 4 in capite.*

D.-- P. 14. V.-- A.-- C.--

*Act. bonon. 2. pp. 2. p. 297. t. 17. Mola.*

B. *Gron. mus. 1. n. 125. Ostracion cathetoplateus subcompressus, pinna dorsali & ani cum cauda continuatis.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

166. DIODON. *Caput: Maxillae osseae, porrectae, indivisae.*

*Apertura linearis.*

*Corpus spinis acutis mobilibus undique adpersum.*

*Pinnae ventrales nullae.*

Atranga. 1. D. sphaericus, aculeis triquetris.

*Art. gen. 59. syn. 86. Ostracion bidens sphaericus, aculeis undique densis triquetris.*

*Habitat in India.*

reticulatus. 2. D. subrotundus, aculeis triquetris.



*Art. gen. 59. syn. 86.* Ostracion subrotundus, aculeis undique brevibus triquetris raris.

*Habitat in India.*

echinatus. 3. D. subrotundus, aculeis basi triquetris.

*Art. gen. 60. syn. 86.* Ostracion subrotundus, aculeis undique densis basi triquetris.

*Habitat in India.*

spinofus. 4. D. subrotundus, aculeis planis, abdomine lævi.

*Art. gen. 59. syn. 86.* Ostracion subrotundus, aculeis undique brevibus planis, ventre glabro.

*Habitat in India.*

Hystrix. 5. D. oblongus, aculeis teretibus.

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 58.* Ostracion diodon, corpore spinis undique armato.

D. 14. P. 22. V. o. A. 14. C. 9.

*Art. gen. 60. syn. 86.* Ostracion conico-oblongus, aculeis undique longis teretiformibus imprimis in lateribus.

*Amœn. acad. 1. p. 310.* idem.

*It. scan. 285.* idem.

D. 14. P. 22. V. o. A. 14. C. 9.

*Habitat in India.*

holocanthus. 6. D. aculeis capitis collique longioribus.

*Art. gen. 60. syn. 86.* Ostracion oblongus holocanthus, aculeis longissimis teretiformibus in capite imprimis & in collo.

*Habitat in India.*



raninus. 7. D. pinna dorsi longissima.  
*Art. gen.* 59. *syn.* 86. O-  
 stracion rotundo-oblon-  
 gus, tuberculis utriusque,  
 pinna dorsi longissima.  
*Habitat in India.*

167. CENTRISCUS. *Caput* productum in Rostrum  
 angustissimum.  
*Apertura* repanda.  
*Corpus* dorso loricatum Osse po-  
 stice mucronato recto longi-  
 tudine corporis. *Abdomen*  
 carinatum.  
*Pinna ventralis* unica.

scutatus. 1. CENTRISCUS †. *Gron. mus.*  
 2. p. 171. t. 7. f. 3. D. 3, 9. P. 10. V. 6. A. 11. C. 9.  
*Valentyn. amb.* 4. p. 420.  
 n. 243. f. 243, 254. I-  
 kan Pisau.  
*Habitat in India orientali.*  
*Singularis piscis loricatus testa ossea longitudinali postice*  
*in spinam terminata, sub qua cauda; sed, inter spi-*  
*nam & caudam, pinnae dorsi sunt.*

168. SYNGNATHUS. *Caput*: Rostrum subcylin-  
 dricum, ore operculato  
 maxilla inferiore.  
*Apertura* branchiarum oper-  
 culis clausis; nucha fora-  
 mine spirans.  
*Corpus* articulatum.  
*Pinnae ventrales* nullae.

Typhle. 1. S. pinnis caudae anti pecto-  
 ralibusque radiatis, cor-  
 pore sexangulato.



*Art. gen. 1. syn. 1. spec.*

3. Syngnathus corpore medio hexagono, cauda pinnata. *Fn. suec. 336. D. 36. P. 14. V. o. A. 3. C. 10. Gron. mus. 1. n. 4. idem. D. 7. P. 9. V. o. A. o. C. 12. Habitat in Europa.*

*Laminae corporis trunci 18, caudæ 36.*

Acus. 2. S. pinnis caudæ ani pectoralibusque radiatis, corpore septem-angulato.

*Art. gen. 1. syn. 2. spec. 2.*

Syngnathus corpore medio heptagono, cauda pinnata. *Fn. suec. 335. D. 38. P. 12. V. o. A. 5. C. 10. Gron. mus. 1. n. 3. idem. D. 37. P. - - V. o. A. o. C. 10. Habitat in Europa.*

*Laminae corporis trunci 20, caudæ 43.*

pelagicus. 3. S. pinnis pectoralibus caudæque radiatis, ani nulla, corpore septemangulato.

*Osbeck itin. 305. Syngnathus pelagicus.*

*D. 31. P. 14. V. o. A. o. C. 10.*

*Habitat in Fuco natante.*

*Laminae corporis heptagoni 18, Caudæ tetragonæ 32.*

æquoreus. 4. S. pinna caudæ radiata, pectoralibus anique nullis, corpore angulato.

*D. 30. P. o. V. o. A. o. C. 5.*

*Habitat in Pelago.*

Ophidion. 5. S. pinnis caudæ ani pectoralibusque nullis, corpore tereti.

*Art. gen. 1. syn. 2. spec. 1.*

Syngnathus teres, pinnis pectoralibus caudæque carens. *Fn. suec. 334. D. 34. P. o. V. o. A. o. C. o.*

*Gron. mus. 1. n. 2. idem. D. 42. P. o. V. o. A. o. C. o.*

*Habitat in Europa.*

barbarus. 6. S. pinnis caudæ anique nullis, corpore sexangulato.

*D. 43. P. 22. V. o. A. o. C. o.*

*Habitat in Pelago.*



Hippo-  
campus.

7. S. pinna caudæ nulla, corpore septemangulato tuberculato, cauda quadrangulata.

D. 20. P. 18. V. 0. A. 4. C. 0.

*Art. gen. 1. syn. 1. Syngnathus corpore quadrangulo, pinna caudæ carens.*

D. 35. P. - - V. 0. A. 0. C. 0.

*Olear. mus. 53. t. 26. f. 4.*

Hippocampus.

*Bradl. natur. t. 4. f. 3.*

Equis marinus.

*Habitat in Pelago.**Lamine corporis trunci 17, caudæ 45.*

169. PEGASUS. *Caput*: Os proboscide retractili; maxilla superiore denticulata, sub Rostro ensiformi, lineari, utrinque ferrato.

*Apertura* branchiarum ante pinnas pectorales.

*Corpus* articulatum osseis incisuris, cataphractum.

*Pinne* ventrales abdominales.

volitans. 1. PEGASUS. *Mus. Ad. Fr.*

2. p. . .

D. 5. P. 10. V. 2. A. 5. C. 7.

*Gron. mus. 1. n. 146. Pisciculus amboinensis volitans osseo tuberculatus, proboscide ferrata.*

D. 4. P. 10. V. 1. A. 5. C. - -

*Ruyseb. thes. t. 7. f. 2. D.**Habitat in Amboina.*


---

Quis, nisi vidisset, pisces habitare sub unda, crederet?

---



## CLASSIS V.

## INSECTA.

ANIMALCULA polypoda, poris lateralibus respirantia, *Cute* ossea cataphracta; *Antennis* mobilibus sensoriis capitibus instruuntur.

CORPUS horum dividitur in *Caput*, *Truncum*, *Abdomen*, *Artus*:

CAPUT plerisque distinctum, *instruitur* Oculis, Antennis, sæpiusque Ore; *deslituitur* Cerebro, Naribus, Auribus.

*Oculi* plerisque bini, absque palpebris, simplices aut compositi; quibus vident colores.

*Antennæ* articulatae, sensu nobis ignoto, sunt *setaceæ*, *filiformes*, *moniliformes*, *clavate*, *capitatae*, *fissiles*, *pectinatae*, *barbatae*.

*Palpi* articulati, ori affixi, plerisque sex.

*Os* plerisque sub capite, quibusdam in pectore; *Rostro*, *Maxillis* transversis, *Dentibus*, *Lingua*, *Palato*.

TRUNCUS, inter Caput & Abdomen, pedatus, supra *Thorace*, subtus *Pectore*, postice *Scutello* constans.

ABDOMEN Ventriculo, Intestinis, Visceribusque foetum, annulatum, *Spiraculis* lateralibus pertusum.

ARTUS sunt *Cauda*, *Pedes*, plurimisque *Alæ*:

*Cauda* abdomen terminans, est vel solitaria s. *bicornis*; simplex s. armata *Forcipe*, *Furca*, *Seta*, *Chela* s. *Aculeo* simplici s. composito, *lævi* s. *ferrato*.

*Pedes* Femoribus, *Tibiis*, *Tarso*, *Digito*, *Unguibus*; *Manus* (*Chela*) nonnullis, simplex *Pollice* mobili; *Posteriores* pro usu *cursorii*, *saltatorii*, *natatorii*.

*Alæ* duæ s. quatuor, sunt vel *planæ*, *plicatiles*, *erectæ*, *patentes*, *incumbentes*, *deflexæ* s. *reversæ*.



*Elytra* (alæ superiores) crustacea bina, mobilia, *levia* s. *scabra*, *striata* s. *fulcata* s. *punctata*, tegentia alas inferiores. *Hemelytra* media quasi alas inter & elytra. *Halteres* sub alis dipterorum ex petiolo capitati.

SEXUS *Mas* & *Femina* generant Perfecta.

*Neutra* nonnullis societate foederatis.

METAMORPHOSIS plurimis triplex, mutanda structura exutis ovi tunicis una post alteram.

*Ovum* sub minima mole vesicaria excluditur.

*Larva* (Eruca) succosa, mollior, major, aptera, sterilis, tardior, apoda sæpe, sæpeque polypoda, vorax alimento proprio.

*Pupa* (Nympha) siccior, coarctata, durior, *nuda* s. *folliculata*, sæpe absque ore.

Hæc vel Pedata 1. 2. 3. vel Apoda 4. 5.

1. *Completa* omnibus partibus agilis. (*Aranea*, *Acarus*, *Oniscus*.)

2. *Semicompleta* solis alarum rudimentis (*Gryllus*, *Cicada*, *Cimex*, *Libellula*, *Ephemera*.)

3. *Incompleta* alis pedibusque immobilis. (*Apis*, *Formica*, *Tipula*.)

4. *Obtecta* thorace abdomineque distincto corticata. (*Lepidoptera*) eaque vel *nuda*, vel *folliculata*.

5. *Coarctata* intra globum. (*Musca*, *Oestrus*.)

*Perfectum* generans, agile, antennis instructum.

Triplex itaque structura & cognitio ejusdem animalis.

HÆC *Mata*, nisi alio proprio instrumento sonora; *Surda*, stuidorem ætheris licet percipiant; *Plura* ubique plantarum speciebus, sed ob patientiorem sibi regionem in orbe pauciora: *Tropica*, *Arctica* s. hodie ignota *Antarctica*; singula demum *Minima*, exceptis aquaticis, sed universa maximæ molis animalia, effectuque pariter maxima, sed magis occulto magisque disperso, ideoque minus coercendo; totidem etenim sunt Naturæ annui ministri, propriis negotiis peragendis præfixi, quot muniis sufficiant, proportionem inter plantas servando, superflua, mortua, putrida consumendo, aliis demum, imprimis avibus, in alimentum cedendo.



ENTOMOLOGO pręstantiores figuris, proprietatibus, attributis inclaruere:

Metamorphosii *Gędart, Meriana, Albinus, Frisch, Wilkes, Ręsel!*

Philosophi *Swammerdam, Reaumur! De Geer.*

Descriptores *Rajus, Fauna suecica.*

Monographi *Lister, Schęffer, Clerk.*

ORDINES ab Alis defumfi.

Alę 4	Superiores	}	crustaceę totę	-	-	<i>Coleoptera</i>	-	1.
			femicrustaceę	-	-	<i>Hęmiptera</i>	-	2.
	Omnes	}	imbricatę squamis	-		<i>Lepidoptera</i>	-	3.
			membranaceę					
				ano	{	mutico	<i>Neuroptera</i>	4.
					{	aculeato	<i>Hymenoptera</i>	5.
Alę 2,	Halteres	loco	posticarum	-	-	<i>Diptera</i>	-	6.
Alę 0 s.	absque	Alis &	Elytris	-	-	<i>Aptera</i>	-	7.

---

*Quęso ne hęc legentes,  
quoniam in his spernunt multa,  
etiam relata fastidio damnent,  
cum in contemplatione nature  
nil possit videri supervacaneum.*

*Plin.*

---



## I. COLEOPTERA.

## \* Antennis clavatis.

170. SCARABÆUS *Antennæ* clava fissili. *Tibiæ* antice dentatæ.  
 171. DERMESTES *Antennæ* clava perfoliata. *Caput* inflexum sub  
 thorace vix marginato.  
 172. HISTER *Antennæ* clava solida, *Caput* retractile intra thoracem.  
 178. ATTELABUS *Caput* postice attenuatum.  
 177. CURCULIO *Antennæ* insidentes *Rostro* corneo.  
 173. SILPHA *Thorax* Elytraque marginata.  
 175. COCCINELLA *Antennæ* clava truncata. *Palpi* . .

## \* \* Antennis filiformibus.

174. CASSIDA *Corpus* ovatum. *Elytra* marginata. *Caput* tectum  
 clypeo.  
 176. CHRYSOMELA *Corpus* ovatum, immarginatum.  
 188. MELOE *Thorax* subrotundus. *Caput* gibbum, inflexum.  
 187. TENEBRIO *Thorax* marginatus. *Caput* exsertum: *Corpus*  
 oblongum.  
 189. MORDELLA *Lamina* ad basin abdominis. *Caput* inflexum.  
 191. STAPHYLINUS *Elytra* dimidiata alas regentia. *Vesiculæ* 2 su-  
 pra caudam exserendæ.

## \* \* \* Antennis setaceis.

179. CERAMBYX *Thorax* lateribus mucronato-callosus.  
 180. LEPTURA *Elytra* apice attenuata. *Thorax* teretiusculus.  
 181. CANTHARIS *Elytra* flexilia. *Abdomen* lateribus plicato-pa-  
 pillosum.  
 182. ELATER *Pectoris* mucro e poro abdominis resiliens.  
 183. CICINDELA *Maxillæ* exsertæ dentatæ. *Oculi* prominuli.  
 184. BUPRESTIS *Caput* intra thoracem retractum.  
 185. DYTISCUS *Pedes* postici ciliati natatorii.  
 186. CARABUS *Thorax* obcordatus postice truncatus.  
 190. NECYDALIS *Elytra* dimidiata: alis nudis.  
 192. FORFICULA *Elytra* dimidiata: alis tectis. *Cauda* forcipata.  
 193. BLATTA *Elytra* alæque coriacea plana. *Cauda* supra bi-  
 cornis.  
 194. GRYLLUS *Elytra* alæque membranacea deflexa. *Pedes* sal-  
 tatorii.



## II. HEMIPTERA.

195. CICADA *Rostrum* inflexum. *Pedes* postici saltatorii.  
 196. NOTONECTA *Rostrum* inflexum. *Pedes* postici natatorii  
 (ciliati.)  
 197. NEPA *Rostrum* inflexum. *Pedes* antici capitis cheliferi.  
 198. CIMEX *Rostrum* inflexum. *Pedes* cursorii.  
 199. APHIS *Rostrum* inflexum. *Abdomen* bicornè.  
 200. CHERMES *Rostrum* pectorale. *Pedes* postici saltatorii.  
 201. COCCUS *Rostrum* pectorale. *Abdomen* postice setosum ma-  
 ribus.  
 202. THRIPS *Rostrum* obsoletum. *Alæ* incumbentes abdomini re-  
 flexili.

## III. LEPIDOPTERA.

203. PAPILIO *Antennæ* extrorsum crassiores. *Alæ* erectæ.  
 204. SPHINX *Antennæ* medio crassiores.  
 205. PHALÆNA *Antennæ* introrsum crassiores.

## IV. NEUROPTERA.

206. LIBELLA *Cauda* forcipata. *Os* maxillosum. *Alæ* extensæ.  
 207. EPHEMERA *Cauda* setis 2 s. 3. *Os* edentulum. *Alæ* erectæ.  
 208. PHRYGANEÆ *Cauda* simplex. *Os* edentulum. *Alæ* deflexæ.  
 209. HEMEROBIUS *Cauda* simplex. *Os* bidentatum. *Alæ* deflexæ.  
 210. PANORPA *Cauda* chelata. *Os* rostratum. *Alæ* incumbentes.  
 211. RAPHDIA *Cauda* filo 1. *Os* bidentatum. *Alæ* deflexæ.

## V. HYMENOPTERA.

212. CYNIPS *Aculeus* spiralis!  
 213. TENTHREDO *Aculeus* ferratus! bivalvis.  
 214. ICHNEUMON *Aculeus* exsertus! triplex.  
 215. SPHEX *Aculeus* punctorius. *Alæ* planæ. *Os* elingue.  
 216. VESPA *Aculeus* punctorius. *Alæ* superiores plicatæ!  
 217. APIS *Aculeus* punctorius. *Lingua* inflexa!  
 218. FORMICA *Aculeus* obsoletus. *Alæ* neutris nullæ!  
 219. MUTELLA *Aculeus* punctorius. *Alæ* omnibus nullæ!



## VI. DIPTERA.

220. OESTRUS *Os* clausum s. nullum.  
 221. TIPULA *Os* labiis lateralibus.  
 222. MUSCA *Os* proboscide edentulum.  
 223. TABANUS *Os* proboscide dentatum.  
 224. CULEX *Os* rostro nutante univalvi.  
 225. EMPIS *Os* rostro inflexo.  
 226. CONOPS *Os* rostro porrecto geniculato.  
 227. ASILUS *Os* rostro porrecto subulato.  
 228. BOMBYLIUS *Os* rostro porrecto setaceo.  
 229. HIPPOBOSCA *Os* rostro subnutante brevissimo.

## VII. APTERA.

\* Pedibus sex; Capite a Thorace discreto.

230. LEPISMA *Cauda* setis exsertis.  
 231. PODURA *Cauda* bifurca inflexa saltatrix.  
 232. TERMES *Os* maxillis duabus.  
 233. PEDICULUS *Os* aculeo exserendo.  
 234. PULEX *Os* rostro inflexo.

† Mutella *vide* 219.

\* \* Pedibus pluribus (octo & ultra); Capite cum Thorace unito.

235. ACARUS *Oculi* 2, remoti. *Pedes* 8.  
 236. PHALANGIUM *Oculi* 2, approximati. *Pedes* 8.  
 237. ARANEA *Oculi* 8. *Pedes* 8.  
 238. SCORPIO *Oculi* 8. *Pedes* 10. *Cauda* armata.  
 239. CANCER *Oculi* 2. *Pedes* 10. *Cauda* inermis.  
 240. MONOCULUS *Oculi* 2. *Pedes* branchiales.

\* \* \* Pedibus pluribus. Capite a Thorace discreto.

241. ONISCUS *Corpus* ovatum.  
 242. SCOLOPENDRA *Corpus* lineare.  
 243. JULUS *Corpus* subcylindraceum.



## I. COLEOPTERA.

*Elytra alas tegentia.*

170. SCARABÆUS. *Antennæ* clavatæ capitulo  
fiffili.

*Tibiæ* anticæ sæpius dentatæ.

\* *Thorace* cornuto.

Hercules. 1. S. thoracis cornu incurvo maximo subtus barbato, ca-  
pitis cornu recurvato: supra dentato.

*Marcgr. bras.* 247. f. 3. *Jonst. inf. t.* 16. f. 1.

*Olear. mus. t.* 16. f. 1. *Pet. gaz. t.* 70. f. 1.

*Grew. mus.* 162. *Swamm. bibl. t.* 30. f. 2.

*Rœf. scarab. 1. t. A. f.* 1. *inf. 4. p.* 45. *t. 5. f.* 3.

*Habitat in* America.

Aëtæon. 2. S. thorace bicorni, capitis cornu tridentato: apice bi-  
fido. *Mus. L. U.*

*Marcgr. bras.* 246. *Enena. Olear. mus. t.* 16. f. 2.

*Mer. sur. t.* 72. *Rœf. scar. 1. t. A. f.* 2.

*Hoffm. pict. 1. t. 1. in medio. Swamm. bibl. t.* 30. f. 4.

*Habitat in* America.

Simfon. 3. S. thorace bicorni, capitis cornu apice tantum bifurcato.

*Sloan. jam. 2. p.* 205. *t.* 237. f. 4. 5.

*Brown. jam.* 428. *t.* 43. f. 6. Scarabæus 4.

*Habitat in* America.

Atlas. 4. S. thorace tricorni: antico brevissimo, capitis cornu re-  
curvato. *M. L. U.*

*Marcgr. bras.* 247. f. 1. *Olear. mus. t.* 16. f. 3.

*Pet. gaz. t.* 49. f. 8. *an t.* 14. f. 12.

*Merian. surin. in titulo F. G. Swamm. bibl. t.* 30. f. 3.

*Habitat in* America.

Aloëus. 5. S. thorace tricorni: intermedio longiore, capite muti-  
co, elytris unistriatis. *M. L. U.*

*Rœf. inf. 2. scar. 1. t. A. f.* 6. *Pet. gaz. 2. 24. f.* 10.



*Habitat in America septentrionali.*

*Simillimus S. nasicorni, sed triplo major, tibiis anticis quinquedentatis.*

Py-  
phœus.

6. S. thorace tricorni: intermedio minore, capite mutico. *M. L. U.*

*Pet. gaz. t. 23. f. 3.*

*Habitat in Anglia, Hispania. Osbeck.*

*Magnitudo S. stercorarii; elytra laevia, non vero nitida.*

nasicornis.

7. S. thorace tuberculo triplici, capitis cornu recurvato. *Fn. suec. 340.* Scarabæus capite unicorni recurvo, thorace gibbo, abdomine hirsuto.

*Olear. mus. 27. t. 16. f. 4. Frisch. inf. 3. t. 3. f. 1.*

*Swamm. bibl. t. 27. f. 1, 2. Jacob. mus. 1. S. 5.*

*Fonst. inf. t. 15. f. 2. Rœs. inf. 2. scar. 1. t. 7. f. 8, 10.*

*Hoffm. pict. t. 13. f. antepen.*

*Habitat in Europæ Vaporarius.*

*Femina thorace rotundato, vix retuso, minime cornuto.*

lunaris.

8. S. thorace tricorni: intermedio obtuso bifido, capitis cornu erecto.

*Fn. suec. 341.* Scarabæus thorace submutico, capite lunato, corniculo emarginato.

*Pet. gaz. t. 8 f. 4.*

*Frisch. inf. 4. t. 3. f. 7.*

*Rœs. inf. 2. scar. 1. t. B. f. 2.*

*Habitat in Europa.*

*Sexus varietas thorace retuso laevi absque corniculis thoracinis, quare difficiliter primum dignoscitur.*

cylindri-  
cus.

9. S. thorace antice truncato quinquedentato, capite antice cornu erecto, corpore cylindrico.

*Habitat in Europa.*

Carnifex.

10. S. thorace retuso dentato, capitis cornu erecto subulato curvo, labio integro, elytris sulcatis.

*Rœs. scar. 1. t. B. f. 8.*

*Brown. jam. 428. t. 43. f. 5.* Scarabæus cornu incurvo.

*Habitat in Jamaica.*

\* \* *Thorace inermi, capite cornuto.*

Rhinoce-  
ros.

11. S. thorace inermi, capite cornu simplici, labio bifido, elytris punctatis. *M. L. U.*

*Pet. gaz. t. 44. f. 9. & t. 100. f. 3.*

*Rœs. scarab. 1. t. A. f. 7.*

*Habi-*



*Habitat in Asia.*

Similis *S. nasicorni*, sed duplo major, cornu capitis basi non compresso sed depresso, Labio bifido.

Molos- 12. *S. thorace inermi retuso, capite lunato unicorni mar-*  
fus. gine integro, clytris lævibus. *M. L. U.*

*Habitat in India. Osbeck.*

*Postice crassior, valde gibbus & ovali-rotundatus.*

Mimas. 13. *S. thorace inermi retuso angulato, capite obsolete bi-*  
corni, clytris inauratis striatis. *M. L. U.*

*Marcgr. bras. 147. f. 2? sed minor.*

*Rœs. scarab. 1. p. 20. t. 13. f. 1.*

*Habitat in America meridionali.*

*Fortissimus laterem ponderosum movet & attollit.*

*Marcgr.*

facer. 14. *S. thorace inermi, capite obsolete bicorni antice trilo-*  
bo: intermedio quadridentato, thoracis marginibus  
subcrenulatis.

*Habitat in Ægypto, Mauritania.*

*Cornuum rudimenta in mare desunt. Thoracis latera  
margine obsolete crenulata & ciliata. Femora postica  
dente obtuso notata.*

*Hic in columnis antiquis Romæ exsculptus ab Ægyptiis.*

didymus. 15. *S. thorace inermi fossula exarato, capite tricuspidi, e-*  
lytris striatis.

*Habitat in America.*

*Sexus alter mucronem parvum habet in antica thoracis.*

valgus. 16. *S. thorace mutico, capite cornuto, femoribus secundi*  
paris remotis. *M. L. U.*

*Pet. gaz. t. 27. f. 8.*

*Habitat in America.*

*Elytra brevia. Digniti magis hirsuti, quam in reliquis.*

*Scutellum nullum.*

nuchi- 17. *S. thorace inermi, occipite spina erecta armato.*

cornis. *Fn. svec. 354. It. gotl. 41. Scarabæus capite thorace-*  
que atro opaco, clytris cinereis nigro nebulosis.

*Rœs. inf. scar. t. A. f. 4.*

*Habitat in Europa.*

*Femina tantum a tergo cornuta.*



- subterra- 18. S. thorace inermi glabro triplici tuberculo, elytris striis  
neus. crenatis.  
*Gadd satag.* 76. Scarabæus niger, capitis clypeo lunato tribus tuberculis notato.  
*Habitat in Europa.*
- erraticus. 19. S. thorace inermi lævi, capite tuberculo unico, elytris testaceis.  
*Habitat in Europa, forte & in India.*
- maurus. 20. S. thorace inermi, capite mucronibus tribus, corpore cyaneo, abdomine flavescente.  
*Habitat in Mauritania. Cl. Alstrómer.*  
• *Oblongus, viridi cæruleus. Abdomen sordide lutescens villosum. Thorax convexus; mucrones 3 transversi in antica capitis.*
- Fossor. 21. S. thorace inermi subretuso, capite tuberculo triplici: medio subcornuto.  
*Fn. suec.* 352. Scarabæus ovatus ater glaber.  
*Habitat in Europæ collibus.*
- fimeta- 22. S. thorace inermi, capite tuberculato, elytris rubris, rorius. corpore nigro.  
*Fn. suec.* 355. Scarabæus capite thoraceque nigro, antennis elytrisque rubris.  
*Frisch. inf.* 4. t. 19. f. 3. *Ræs. inf.* 2. scarab. t. A. f. 3.  
β. Scarabæus capite thoraceque nigro glabro, elytris griseis, pedibus pallidis. *It. æl.* 41. *Fn. suec.* 353.  
*Uddm. diff.* n. 2.  
*Habitat in Europæ stercoratis.*
- hæmor- 23. S. thorace inermi, capite tuberculato, elytris apice rhoidalis. rubris.  
*Fn. suec.* 358. Scarabæus ater, elytris pone ferrugineis, pedibus rufis.  
*Habitat in Europæ fungis & putridis.*
- conspur- 24. S. thorace inermi, capite tuberculato, elytris lividis catus. maculatis. *M. L. U.*  
*Habitat in Europæ stercoratis primo vere.*
- \* \* \* Mutici capite & thorace inermi.
- Gigas. 25. S. thorace inermi retuso, capite inermi supra margineque angulato. *M. L. U.*



*Habitat in Ægypto.*  
*Magnitudinis primæ, ater.*

- scaber. 26. *S. muticus*, thorace elytrisque antice scabris. *M. L. U.*  
*Habitat in India.*  
*Magnitudo dupla S. nasicornis. Caput angulatum, retu-*  
*sum puncto, in medio prominulo.*
- longima- 27. *S. muticus*, pedibus anticis arcuatis longissimis. *M. L. U.*  
 nus. *Habitat in India.*  
*Thoracis margo crenulatus. Tibiæ antice longitudine cor-*  
*poris. Femora antica in medio dente valido. Ungues*  
*quasi duplicati.*
- pilula- 28. *S. muticus*, thorace postice rotundato, scutello nullo.  
 rius. *M. L. U.*  
*Arist. lib. 5. c. 18. Plin. nat. 11: 34. Pilularius.*  
*Raj. ins. 105. n. 1. Catesb. car. 3. t. 11.*  
*Habitat in America.*  
*Sisyphi instar volvit globum e stercore imprimis humano*  
*confectum.*
- Schæffe- 29. *S. muticus*, thorace postice rotundato, scutello nullo,  
 ri. clypeo emarginato, elytris triangulis.  
*Habitat in Germania. I. C. Schæfferus.*  
*Statura S. nuchicornis, sed major, ater; elytris apice*  
*angustioribus ♂ versus apicem magis gibbis.*
- stercora- 30. *S. muticus ater glaber*, elytris fulcatis, capite rhom-  
 rius. bæo: vertice prominulo. *Fn. svec. 359.*  
*Mouff. ins. 151. Scarabæus stercorarius.*  
*List. mut. 17. f. 4. Raj. ins. 90. n. 7. ♂ 74. n. 1.*  
*Frisch. ins. 4. t. 13. f. 6.*  
*Habitat in Europa, America. Kalm.*  
*Perforat terram aridam sub stercore, Acaris obnoxius.*
- vernalis. 31. *S. muticus*, elytris glabris lævissimis, capitis clypeo  
 rhombeo: vertice prominulo. *Fn. svec. 350.*  
*Habitat in Europa.*  
*Trahit stercore ovium ad foramina, uti S. pilularius.*
- calcara- 32. *S. muticus*, capite clypeato emarginato, femoribus po-  
 tus. sticis dentatis.  
*Habitat in Ægypto.*



- sabulo- 33. *S. muticus niger opacus rugosus.*  
 sus. *Habitat in Europæ terra sabulosa.*
- Chrysis. 34. *S. muticus, pectore antice cornuto, scutello elytris di-*  
 midio brevior. *M. L. U.*  
*Habitat in India.*  
*Corpus magnitudine & colore S. aurati; sed Pectus sub-*  
*tus antrosum cornutum.*
- nitidus. 35. *S. muticus, thorace pollice lobato, capite inermi, pe-*  
 ctore antice cornuto. *M. L. U.*  
*Habitat in India.*  
*Scutellum minimum; color viridis. Tibiæ non dentatæ.*
- lanige- 36. *S. muticus subtus lanatus, capite thoraceque auratis,*  
 rus. *elytris flavis. M. L. U.*  
*Habitat in India.*  
*Labium sutura distinctum a capite. Elytra sulphurea.*
- festivus. 37. *S. muticus, scutello nullo, thorace nigro maculato e-*  
*lytrisque rubro-æneis.*  
*Habitat in America. Rolander.*  
*Magnitudo S. Melolonthæ, ut brevior, niger. Caput nigrum,*  
*lunatum, integrum. Thorax lævis, convexus, rubro-*  
*æneus, postice rotundatus absque Scutello: Macula lo-*  
*bata nigra in disco; unica nigra utrinque ab angulo*  
*lateralis thoracis exiens; unica utrinque nigra parva*  
*intra angulum thoracis ad punctum impressum. Ely-*  
*tra rubro-ænea, striata, longitudine thoracis.*
- lineola. 38. *S. muticus niger, lineola flava a capite ad scutellum*  
*ducta.*  
*Habitat in America. Rolander.*  
*Minor S. stercorario, niger. Lineola flava longitudinalis*  
*thoracis. Maris Elytra immaculata. Feminis macu-*  
*lae 3 flavæ, sparsæ in singulis elytris & postica abdo-*  
*minis, quæ pone elytra luteo maculata. Femora u-*  
*trisque flavescencia.*
- puncta- 39. *S. muticus niger, thorace elytrisque testaceis: punctis*  
 tus. *octo nigris. M. L. U.*  
*Habitat in India.*  
*Thorax puncto utrinque nigro laterali notatus.*



Sepicola. 40. *S. muticus ferrugineus*, thorace elytrisque pilosis.  
*M. L. U.*

*Habitat in India.*

*Habitus S. Horticolæ, sed triplo major.*

fyriacus. 41. *S. muticus*, capite thoraceque piloso viridibus, elytris pilosis ciliatis. *M. L. U.*

*Habitat in India.*

*Statura S. Horticolæ.*

Hortico- 42. *S. muticus*, capite thoraceque cæruleo piloso, elytris  
la. griseis, pedibus nigris. *Fn. suec. 351.*

*It. scan. 116, 321. Scarabæus frisius.*

*Habitat in Europæ hortis, Pomonam devastat, intumescit  
Pyro communi.*

Melo- 43. *S. muticus testaceus*, thorace villoso, cauda inflexa,  
lontha. incisuris abdominis albis. *Fn. suec. 345.*

*Aldr. inf. 454. t. super. f. 2. Mouff. lat. 160. f. 2.*

*Hoffn. inf. t. 1. f. 11. Merian. europ. 1. p. 2. f. 4.*

*Gæd. inf. 1. t. 78. Frisch. inf. 4. t. 14.*

*Alb. inf. 60. Raj. inf. 109. n. 1.*

*Rœs. inf. 2. Scarab. 1. t. 1. Pet. gaz. t. 9. f. 2.*

*Leuwenb. epist. 1. p. 18.*

*Habitat in Europa. Semm. Mäykefuer*

*Exedunt radices segetis Larvæ; Scarabæi folia arborum, Fagi, aliarumque.*

solstitia- 44. *S. muticus testaceus*, thorace villoso, elytris luteo  
lis. pallidis: lineis tribus albis parallelis. *Fn. suec. 346.*

*Mouff. inf. 160. f. 3. List. mut. 18. f. 17.*

*Pet. gaz. t. 22 f. 9. Frisch inf. 9. t. 15. f. 3.*

*Habitat in Europa. Volitat vesperi imprimis.*

hemipte- 45. *S. muticus*, thorace tomentoso rugis duabus longitu-  
rus. dinalibus marginato, elytris abbreviatis.

*Habitat in Germania. P. Forskål.*

*Clypeus apice emarginato. Antennæ piceæ. Corpus nigrum. Thorax marginatus, planiusculus, rugis duabus longitudinalibus elevatis. Elytra abdomine dimidio breviora. Abdomen post elytra sæpe cinereus. Plantæ piceæ. Aculeus ani femine serratus.*

46. S.



- Fullo. 46. *S. muticus*, antennarum lamellis septenis æqualibus, corpore nigro albedine irrorato. *Fn. suec.* 343.  
*Mouff. inf.* 160. f. 4. *Hoffm. pict.* t. 7.  
*Frisch. inf.* 11. t. 1. f. 1. *Raj. inf.* 93. n. 9.  
*Habitat in Europæ duris, arenosis.*
- fasciatus. 47. *S. muticus*, niger tomentoso-flavus, elytris fasciis duabus luteis coadunatis. *Fn. suec.* 348.  
*Mouff. inf.* 161. f. 6,  
*Habitat in Europæ floribus Syringæ, Filipendule.*
- indus. 48. *S. muticus*, thorace hirsuto: elytris lividis fusco punctatis. *M. L. U.*  
*Habitat in India.*  
*Statura S. fasciati. Thorax postice emarginatus. Scutellum nudum.*
- brunnus. 49. *S. muticus testaceus*, elytris striatis, thorace utrinque puncto notato. *M. L. U.*  
*Habitat in Europa.*
- capensis. 50. *S. muticus ruber* adpersus punctis albis. †  
*Pet. gaz.* t. 8. f. 6. *Rœs. inf.* 2. scar t. t. B. f. 6.  
*Habitat ad Cap. b. Spei.*
- Lanius. 51. *S. muticus ruber* adpersus punctis nigris.  
*Sloan. jam.* 2. t. 237. f. 7, 8. *Rœs. inf.* 2. scar. 1. t. B. f. 3.  
*Habitat in America.*
- auratus. 52. *S. muticus auratus*, segmento abdominis secundo latere unidentato.  
*Fn. suec.* 344. *Scarabæus muticus glaber æneus.*  
*Hoffm. pict.* t. 6. f. prior. *Frisch. inf.* 12. t. 3. f. 1.  
*Raj. inf.* 76. n. 7. *Rœs. inf.* 2. t. 2. f. 9, 8.  
*Habitat in Europæ acervis formicarum, plantarum, delectatur floribus.*  
*Pectoris latera postice in dentem exeunt.*
- variabilis. 53. *S. muticus lævis opacus ater*, elytris punctatis.  
*M. L. U.*  
*Rœs. inf.* 2. scarab. 1. t. 3.  
*Habitat in Europæ Quercubus varius.*  
*Mas femina quintuplo minor est; variat colore aureo & rubro.*



- nobilis. 54. *S. muticus lævis opacus*, abdomine postice albo punctato.  
*Rœs. inf. 2. scar. 1. t. 3. f. 3, 4, 5.*  
*Udam. diff. 1. Scarabæus viridi æneus*, thorace fulcato, elytris rugosis.  
*Habitat in Europæ Floribus.*
- rufipes. 55. *S. muticus ater*, antennis pallidis, elytris lævibus. *Fn. svec. 356.*  
*Habitat in Europæ stercoretis.*  
*Simillimus S. subterraneo*, sed elytra striis minime crenatis & thorax minus gibbus.
- aquat-  
cus. 56. *S. muticus piceus*, elytris striatis, antennis flavescensibus filiformibus. *Fn. svec. 357.*  
*Habitat in aqua Europæ cum Dytiscis.*
- Cerato-  
niæ. 57. *S. muticus*, thorace scabro lateribus tridentato, elytris griseis. †  
*Hasselqv. iter. 409. n. 99. Scarabæus ceratonix.*  
*Habitat in Ceratonia Cairi.*
- \* \* *Os maxillis forcipatis.*
- Cervus. 58. *S. maxillofus* : maxillis exsertis apice bifurcatis.  
*Fn. svec. 377. Scarabæus cornibus duobus mobilibus æqualibus apice bifurcatis* : introrsum ramis denticulisque instructis.  
*Morff. inf. 148. Cervus volans.*  
*Aldr. inf. 151. f. 1. Jonst. inf. t. 14. f. 1. 2*  
*Haffn. inf. t. 6. Mer. eur. t. 168.*  
*Worm. mus. 242. Raj. inf. 74.*  
*Olear. mus. t. 16. f. 5. Taurus volans.*  
*Rœs. scar. 1. t. 4. 5. f. 7. 9.*  
 β. *Scarabæus maxillis lunatis prominentibus dentatis*, thorace inermi. *Fn. svec. 338. (fœmina).*  
*Rœs. inf. 2. t. 5. f. 8.*  
 γ. *Merian. Europ. 168. optime.*  
*Habitat in Europæ ligno quercino putrido*, in America triplo minor &c.  
*Cornua officinalia sunt. Maxilla, in hac specie majores, speciosa.*



interru-  
ptus.59. *S. maxillofus*, antennis arcuatis, corpore oblongo de-  
presso, vertice subcornuto, thorace abdomineque re-  
motis. *M. L. U.**Merian. sur. t. 50.**Pet. gaz. t. 27. f. 7.**Brown. jam. 429. t. 44. f. 7. Dermestes.**Habitat in America.**Facies Sc. valgi, & summa affinitas.*

carinatus.

60. *S. maxillofus depressus*, thorace mutico capite brevio-  
re: angulis posticis excavatis. *M. L. U.**Habitat in India.**Abdomen brevissimum, non longius thorace cum capite.**Pectus postice terminatum angulo acuto.*tridenta-  
tus.61. *S. maxillofus*, thorace utrinque tridentato. *Fn. svec.*339. *It. æl. 152.**Habitat in Europa.*paralleli-  
pedus.62. *S. maxillofus depressus niger*, maxillis dente laterali  
elevato.*Habitat in Germania.**Ita similis facie, structura, antennis & omnibus S. Cer-  
vo fœminæ, ut nisi S:ies minor esset, eundem dicerem;  
sed color ater, non purpurascens-niger, & corpus ma-  
gis depressum.*Caraboi-  
des.63. *S. maxillofus*, maxillis lunulatis, thorace marginato.*Uddm. diss. n. 40. Carabus cœrulefcens.**Habitat in Europa.***171. DERMESTES.** *Antennæ clavatæ: capitulo per-  
foliato articulis tribus cras-  
sioribus.**Thorax convexus, vix margi-  
natus.**Caput sub thorace inflexum  
condens.*

lardarius.

1. *D. niger*, elytris antice cinereis. *Fn. svec. 360.**Goed. inf. 2. t. 41.**Mer. inf. 2. t. 33.**Blank. inf. t. 11. f. K. L. M. Frisch. inf. 5. t. 9.**Raj. inf. 107. n. 4.**Habitat in Europæ animalibus, lardo, carnibus.*



- undatus. 2. *D. niger*, fascia lineari alba duplici undulata. *Fn. suec.* 361.  
*Habitat in Europæ putridis.*
- pellio. 3. *D. niger*, coleoptris punctis albis binis. *Fn. suec.* 362.  
*Frisch. inf.* 5. t. 8.  
*Habitat in Europæ cibariis, pellibus.*
- pectini- 4. *D. fuscus*, antennis luteis pennatis.  
cornis. *Habitat in Europa.*
- clavico- 5. *D. niger*, antennis clavatis pilosis.  
nis. *Habitat in Europa.*
- pertinax. 6. *D. fuscus*, antennis filiformibus.  
*Fn. suec.* 384. *Cassida nigra*, antennis setaceis, corpore  
teretiufculo.  
*Habitat in Europæ domibus, quisquiliis, vestimentis.*  
*Potius occiditur, quam captus se movet.*
- mollis. 7. *D. testaceus*, oculis fuscis, antennis filiformibus.  
*Habitat in Europa.*  
*Affinis Chrysomelis, sed statura D. pertinacis.*
- Capuci- 8. *D. niger*, elytris abdomineque rubris, thorace emargi  
nus. nato retuso.  
*Habitat in Europæ truncis, parietibus ligneis.*
- typogra- 9. *D. testaceus pilosus*, elytris striatis retusis præmorfo  
phus. dentatis. *Fn. suec.* 366. *It. æl.* 26. 195.  
*Raj. inf.* 100. n. 10. *Scarabæus.*  
*Habitat in Europa intra cortices truncorum; in Ame-  
rica. Kalm.*
- micro- 10. *D. testaceus glaber*, elytris apice villosis obtusis. *Fn.*  
graphus. *suec.* 367.  
*Habitat in Europa intra cortices arborum emortuarum.*
- poligra- 11. *D. testaceus pilosus*, elytris glaucis obtufiusculis.  
phus. *Habitat in Europa sub arborum corticibus: labyrinthis  
pinnatis.*
- piniper- 12. *D. niger subvillosus*, elytris piceis integris, plantis  
da. rufis.



*Habitat in Europæ ramulis inferioribus Pini, quos perforat, exsiccat.*

- viola- 13. *D. nigro-carulescens*, thorace villoso.  
ceus. *Fn. suec. 373. Dermestes nigro-caruleus.*  
*Habitat in Europa.*
- fenestra- 14. *D. castaneus*, capite nigricante, thorace fusco.  
lis. *Fn. suec. 443. Chrysomela fusca*, capite nigricante.  
*Habitat in Europa.*
- domesti- 15. *D. niger*, elytris griseis margine nigris, thorace villoso.  
cus. *Fn. suec. 368.*  
*Habitat in Europa.*  
*Thorax valde gibbus & fere hemisphericus.*
- melano- 16. *D. niger ovatus glaber*, elytris griseis. *Fn. suec. 369.*  
cephalus. *Habitat in Europa.*
- murinus. 17. *D. tomentosus oblongus*, fusco cinereoque nebulosus,  
scutello luteo. *Fn. suec. 365.*  
*Frisch. inf. 4. t. 18.*  
*Habitat in Europæ cadaveribus.*  
*Subtus ex nigredine albus.*
- pilula. 18. *D. tomentosus ovatus fusco-nebulosus.*  
*Fn. suec. 536. Mordella subrotunda*, colore murino.  
*Habitat in Europa sub lapidibus.*
- Scarabæ- 19. *D. ovatus ater glaber*, elytris maculis duabus obsole-  
oides. te ferrugineis.  
*Habitat in Europa.*
- Scrophu- 20. *D. tomentosus maculatus.*  
lariæ. *Fn. suec. 411. Coccinella villosa*, coleoptorum margi-  
ne inflexo, thoracis macula baseos utrinque alba.  
C. *Coccinella villosa*, coleoptorum margine inflexo, su-  
turis rubris. *Fn. suec. 412.*  
*Habitat in Europæ Scrophulariis.*
- Pisorum. 21. *D. tomentosus griseus*, antennis filiformibus, elytris  
abbreviatis, podice albo: maculis duabus nigris.  
*Kalm. it. 2. p. 294. Bruchus americanæ septentrionalis.*  
*Amoen. acad. 3. p. 347. Curculio pisorum.*  
*Habitat in Americæ septentrionalis seminibus Pisi.*



*Pisa per Americam septentrionalem misere destruit.*  
*Statura Curculionis sed absque rostro; Antennæ filiformes, nec capitata.*

paniceus. 22. *D. ferrugineus, oculis rufis.*

*Habitat in Europæ pane, quod exedit.*

*Magnitudo Milii, obtusus, totus castaneus, etiam antennis, vix villosus. Oculi magis rubent.*

eustatius. 23. *D. ater glaber obtusissimus, pedibus ferrugineis.*

*Habitat in insula Eustatii Iungis. Rolander.*

*Magnitudo Pediculi, ater, glaberrimus, postice valde obtusus, elytris tamen tectus.*

sterco- 24. *D. oblongus glaber testaceus, oculis nigris. Faun.*  
 reus. *svec. 375.*

*Habitat in Europæ viis, imprimis in fimo Equino.*

pedicula- 25. *D. oblongus testaceus, elytris abbreviatis.*

rius. *Fn. svec. 441. Chrysomela dilute testacea hemiptera.*

*Habitat in Europa.*

pulica- 26. *D. oblongus niger, elytris abbreviatis, abdomine acu-*  
 rius. *to. Fn. svec. 370.*

*Raj. inf. 108.*

*Habitat in Floribus cursitans.*

psyllius. 27. *D. ovatus niger, abdomine obtuso, thorace elytrisque*  
*marginatis.*

*Habitat in Floribus.*

scanicus. 28. *D. fuscus, thorace testaceo. Fn. svec. 376.*

*Habitat in Europa.*

Colon. 29. *D. thoracis lateribus flavis, elytris griseis puncto nigro.*

*Habitat in Europa.*

*Corpus ovatum. Caput nigrum. Thorax fuscus lateribus flavis. Elytra obscure testacea s. grisea, cum puncto nigro in medio versus marginem inferiorem.*

surina- 30. *D. testaceus, elytris striatis, thorace striis tribus ele-*  
 mensis. *vatis marginibusque denticulato.*

*Habitat Surinami. Rolander.*

*Oblongus, magnitudine Pediculi.*



hemipte- 31. *D. elytris abbreviatis basi exteriori apiceque testaceis.*  
rus.

*Habitat Surinami. Rolander.*

*Magnitudo Pediculi. Antennæ capitatae. Pedes ferruginei. Elytra abdomine  $\frac{1}{2}$ . breviora, singulis macula glauca cuneiformis in apice, & punctum glaucum ad basim anteriorem elytri,*

172. **HISTER.** *Antennæ capitatae capitulo solidiusculo; infimo articulo compresso, decurvato.*

*Caput intra corpus retractile. Os forcipatum.*

*Elytra corpore breviora.*

unicolor, 1. *H. totus ater, elytris substriatis.*

*Fn. svec. 410. Coccinella atra glabra, elytris abdomine brevioribus margine inflexis.*

*Habitat in Europæ, Indiæ arena, terra, stercore*

*In Indiis decuplo major.*

pyg-  
mæus.

2. *H. totus ater, elytris lævissimis.*

*Habitat in Svecia.*

*Simillimus primo, sed quadruplo minor, & elytra minime striata, si non unica tantum stria arcuata.*

bimacu- 3. *H. ater, elytris postice rubris.*

latus.

*Udam. diff. 20. Coccinella atra glabra, elytris abdomine brevioribus, maculis duabus rubris.*

*Habitat in Europa.*

4-macu-  
latus.

4. *H. ater, elytris bimaculatis.*

*Gadd. satag. 76. Scarabæus ovatus niger glaber, maculis duabus rubris in singulo elytro.*

*Habitat in Europa.*

*Major reliquis: in antica parte elytri macula rubra inæqualis, in postica vero macula rubra lunata.*



173. SILPHA. *Antennæ* extrorsum crassiores.  
*Elytra* marginata. *Caput* pro-  
minens.

*Thorax* planiusculus, marginatus.

germani- 1. *S. oblonga* atra, clypeo obrotundo inæquali marginato,  
ca. elytris obtusissimis margine laterali ferrugineis.

*Habitat in Germania. P. Forskåhl.*

*Reliquis major. Tota atra, glabra. Clypeus figura se-  
quentis, sed latior quam longus. Elytra obtusissima &  
fere truncata. Margo lateralis elytrorum inflexus &  
occultatus ferrugineus est.*

Vespillo. 2. *S. oblonga*, clypeo orbiculato inæquali, elytris fascia du-  
plici ferruginea.

*Fn. svec. 347. Scarabæus* clypeo marginato, elytris ni-  
gris, fasciis duabus transversis rubris.

*Gleditsch. Act. Berol. 1752. p. 53. Vespillo.*

*Mouff. inf. 147. lin. 7. f. 3. & app. tab. ult.*

*Imp. alt. 692. t. 2. f. 2.*

*Blank. inf. 168. t. 14. f. 1.*

*Frisch. inf. 12. p. 28. t. 2. f. 2.*

*Rœs. inf. 4. p. 3. t. 1. f. 1, 2, 3.*

*Raj. inf. 106. Scarabæus* foetidus i aldrovandî.

*Habitat in Europæ, Americæ Cadaveribus.*

*In America Septentrionali decuplo major.*

*Sepelit cadavera minora sub terra eandem effodiendo.*

*Gleditsch. act. berol.*

bipuncta- 3. *S. oblonga* nigra, elytris singulis puncto unico rubro.

ta. *Fn. svec. 363. Dermestes* niger, coleoptris punctis ru-  
bris binis.

*Habitat in Europæ Carnibus, Lardo.*

4-puncta- 4. *S. oblonga* nigra, elytris punctis duobus ferrugineis.

ta. *Fn. svec. 364. Dermestes* niger, coleoptris punctis ru-  
bris quaternis.

*Frisch. inf. 9. p. 36. t. 19. Scarabæus* parvus luteo-  
maculatus, erucæ lanigeræ.

*Habitat in Europæ arboribus putridis, fenestris.*



- indica. 5. *S. nigra*, elytris fasciis duabus ferrugineis, thorace antice bidentato. *M. L. U.*  
*Habitat in India.*
- americana- 6. *S. ovata fusca*, clypeo flavo: centro nigro intra annu-  
nā. lum fulvum.  
*Catesb. car. 3. p. 30. t. 10. f. 5. Blatta americana.*  
*Habitat in America.*  
*Magnitudo S. vejpilionis.*
- feminu- 7. *S. ovata atra nitida immaculata.*  
lum. *Habitat in Europæ ligno putrido Abietis. Rolander.*  
*Componit testam, uti Dasytus, & similis semini terre-  
jacta caput & pectus abdomini applicat, ut exacte  
granum, glabrum, lucidum referat, facile inventorem  
seducens, quiete jaciendo. Abdomen rubrum est.*
- agaricina. 8. *S. ovata atra glaberrima hemiptera.*  
*Habitat in Agaricis.*
- maura. 9. *S. oblongiuscula atra*, thoracis marginibus elevatis, e-  
lytris sulcatis.  
*Habitat in Mauritania. E. Brander.*  
*Thorax lateribus margine dilatato postice utrinque acu-  
minato. Elytra sulcis profundis postice connexis.*
- ruffica. 10. *S. oblonga rufa*, antennis elytris pectoreque nigris.  
*Uddm. diss. 7. Dermestes elytris nigris, capite clypeo  
& abdomine rubro.*  
*Habitat in Europa.*
- littoralis. 11. *S. atra*, elytris lævibus: lineis elevatis tribus, clypeo  
orbiculato nitido.  
*Fn. svec. 380. Cassida atra, elytris lineis tribus eleva-  
tis, antennis antice testaceis.*  
*Frijsh. inf. 6. p. 12. t. 8. Scarabæus campestris.*  
*Habitat in Europa, sub Fucis putridis.*
- atrata. 12. *S. atra*, elytris subpunctatis: lineis elevatis tribus  
lævibus, clypeo antice integro. *Fn. svec. 385.*  
*Habitat in Europa.*
- thoraci- 13. *S. nigra*, elytris obscuris: linea elevata unica, clypeo  
ca. retuso testaceo.  
*Fn. svec. 386. Cassida nigra, clypeo ferrugineo, elytris  
linea elevata.*



*Raj. inf. 90.* Scarabæus primo similis parum canaliculatus, scapulis croceis.

*Gadd. diff. 25.* Cassida nigra, clypeo latissimo pallide rufo, macula lata nigra nitida.

*Habitat in Europa.*

opaca. 14. *S. fusca*; elytris concoloribus: lineis elevatis subternis, thorace antice truncato.

*Habitat in Europa.*

rugosa. 15. *S. nigricans*, elytris rugosis: lineis elevatis tribus, thorace emarginato.

*Fn. svec. 379.* Cassida atra, elytris striis quinque punctisque elevatis.

*Raj. inf. 90.* Scarabæus niger inter cadavera frequens, depressus, parum canaliculatus, undique niger.

*Habitat in casis Lapponum, & alibi per Europam.*

fabulosa. 16. *S. fusca*, elytris lineis elevatis tribus utrinque dentatis, thorace subemarginato.

*Fn. svec. 382.* Cassida nigra, elytris striis quinque utrinque dentatis, clypeo emarginato.

*Uddm. diff. 5.* Dermestes niger, inter elytrorum lineas, quatuor elevatis scrobiculis exaratus.

*Habitat in Arena Europæ.*

*Similis Scarabæo sabuloso.*

obscura. 17. *S. nigra*, elytris punctatis: lineis elevatis tribus, clypeo truncato.

*Uddm. diff. 8.* Cassida ovata nigra, elytris lineis tribus elevatis: media longissima.

*Habitat in Europa.*

*Differt a S. atrata, quod Color non lucidus, & aliter punctata.*

ferruginea. 18. *S. testacea*, elytris lineis elevatis senis, thorace emarginato. *Fn. svec. 387.*

*Habitat in Europa.*

grossa. 19. *S. nigra*, elytris confertim punctatis: lineis elevatis tribus, thorace emarginato.

*Habitat in Europa.*

*Differt a sequenti, quod ovata nec oblonga; puncta conferta confusa, nec serie longitudinali digesta.*



oblonga. 20. *S. nigra*, elytris striis punctatis: lineis elevatis senis, thorace emarginato.

*Faun. svec.* 381. *Cassida atra*, elytris striis 10 elevatis, punctis excavatis striatis.

*Habitat in Europa.*

*Differt a precedenti, quod magis oblonga, minusque emarginata.*

aquatica. 21. *S. cinerea*, elytris substriatis, thorace emarginato longitudinaliter rugoso virescente.

*Habitat in Europæ aquis, Buprestis similis, sed parva.*

colon. 22. *S. nigra*, elytris ferrugineo variis, thorace emarginato: tergo duplici puncto impresso.

*Habitat in Europa.*

depressa. 23. *S. ferruginea*, elytris lævibus, thorace emarginato.

*Habitat in Europa.*

grisea. 24. *S. grisea*, elytris lævibus, thorace emarginato.

*Habitat in Europa.*

æstiva. 25. *S. testacea subtomentosa*, oculis nigris.

*Habitat in Europæ floribus.*

pedicula- 26. *S. nigra*, elytris lævibus, thorace marginato.

ris. *Habitat in Europa.*

*Magnitudo Pediculi, sed obtusa, pallidius nigra.*

174. CASSIDA. *Antennæ* subfiliformes, extrorsum crassiores.

*Elytra* marginata.

*Caput* sub thoracis clypeo plano reconditum.

viridis. 1. *C. viridis.*

*Fn. svec.* 377.

*Raj. inf.* 107. n. 5.

*Gæd. inf.* 1. p. 94. t. 43.

*Frisch. inf.* 13. p. 35. t. 29.

*Blank. inf.* 89. t. 11. f. F.

*Reaum. inf.* 3. t. 18.

*Merian. europ.* t. 115.

*Rœs. inf.* 2. scar. 3. p. 13. t. 6.

*Volk. hesp.* 1. p. 166. f. 4.

*Habitat in Plantis verticillatis Europæ.*



- nebulosa. 2. *C. pallido-nebulosa*.  
*Fn. svec.* 378. *Gæd. inf.* 1. p. 96. t. 44.  
*Raj. inf.* 88. *Scarabæus minor sordide fulvus.*  
*Habitat in Carduis.*
- nobilis. 3. *C. grisea*, elytris linea cærulea nitidissima.  
*Habitat in Europa.*  
*Linea cærulea elytrorum perit cum vita.*
- cruciata. 4. *C. pallida*, elytris disco fusco-cruciato.  
*Habitat in America. Rolander.*  
*Elytra pallida, supra dorsum insecti fusca, inde brachium fuscum pictum excurrit utrinque ad angulos thoracis & tertium brachium per utrumque elytron ad anum.*
- bifasciata. 5. *C. pallida*, corpore fasciis duabus fuscis.  
*Habitat in America meridionali. Rolander.*
- flava. 6. *C. flava immaculata*, corpore testaceo.  
*Habitat in America. Rolander.*
- purpurea. 7. *C. flava supra corpus purpurea.*  
*Habitat in America. Rolander.*  
*Parva, testa omni flava, sed supra corpus insecta purpurea lata macula.*
- marginata. 8. *C. testacea*, margine thoracis elytrorumque flavo.  
*Habitat in America. Rolander.*
- reticulata. 9. *C. flava nigro-punctato reticulata.*  
*Habitat in America. Rolander.*
- variegata. 10. *C. rufa*, elytris nigro variegatis: lateribus fasciatis.  
*Habitat in America. Rolander.*  
*Maxima. Fasciæ duæ nigræ in margine lato laterali.*
- grossa. 11. *C. sanguinea*, elytris disco punctis nigris sparsis, margine lineis ramosis nigris.  
*Habitat in India. De Geer.*  
*Hæc omnium maxima. Thorax immaculatus.*
- clatrata. 12. *C. ferruginea*, elytris margine omni, linea longitudinali, semique transversali nigris.

*Habi-*

*Cassidæ Larvæ folia plantarum subtus exedunt, & proprio stercore sese sæpius obtegunt.*



*Habitat in India. De Geer.*

Thorax immaculatus. Elytra latissima, margine undique etiam sutura longitudinalis nigra. Linea longitudinalis nigra per medium singuli elytri. Linea inter præcedentes longitudinales nigra utrasque combinat. Femina habet lineas dimidiatas transversales tres.

- jamaicensis. 13. *C. luteo-ænea*, elytris immaculatis excavato-punctatis. *Sloan. jam. 2. p. 208. t. 233. f. 27. 28.*  
*Habitat in America.*
- cyanea. 14. *C. cyaneo-ænea*, elytris immaculatis excavato-punctatis. *Pet. gaz. t. 57. f. 6.*  
*Habitat in Brasilia.*
- inæqualis. 15. *C. ferrugineo-ænea*, elytris macula flava subovata disci: *Mus. petrop. 650. n. 130.*  
*Habitat in America. Rolander.*  
*Elytrorum superficies inæqualis est.*
- lateralis. 16. *C. fusco-ænea*, elytris macula flava laterali. *Habitat in America. Rolander.*
- discoides. 17. *C. viridi-ænea*, elytris maculis duabus flavis disci. *Habitat in America. Rolander.*
- petiveriana. 18. *C. nigra*, elytris maculis quatuor flavescentibus. *Pet. gaz. 7. t. 71. f. 1. Act. angl. 271. p. 861.*  
*Habitat in Asia.*

175. COCCINELLA. *Antennæ subclavatæ, truncatæ.*  
*Palpi clava femicordata.*  
*Corpus hemisphæricum, thorace elytrisque marginatis.*  
*Abdomine plano.*

• *Coleoptris rubris flavisque; Punctis nigris maculatis.*

- unipunctata. 1. *C. coleoptris* flavescentibus: puncto communi nigro. *Habitat in Europa.*
- 2-punctata. 2. *C. coleoptris* rubris: punctis nigris duobus. *Fn. succ. 388.*



*Pet. gaz.* 34. t. 21. f. 4.

*Merian. inf.* 69. t. 136.

*Raj. inf.* 86. n. 2.

*Frisch. inf.* 9. p. 33. t. 16. f. 4.

*Habitat in Europæ Alnetis.*

*Puncta duo in medio coleoptrorum.*

*List. loqu.* 383. n. 8.

*Bradl. natur.* t. 27. f. 4.

*Reaum. inf.* 3. t. 31. f. 1.

3-puncta-3. C. coleoptris rubris: punctis nigris tribus.

ta. *Habitat in Europa*

*Puncta duo ad apicem coleoptrorum.*

hebræa. 4. C. coleoptris luteis: maculis nigris sex longitudinalibus difformibus.

*Habitat in Europa.*

5-puncta-5. C. coleoptris sanguineis: punctis nigris quinque. *Fn.*

ta. *svec.* 392.

*Habitat in Pruno spinosa.*

*Elytra sanguinea sunt.*

trifascia-6. C. coleoptris rubris: fasciis nigris tribus. *Faun. svec.*

ta. 390.

*Habitat in Lapponia.*

hieroglyphica-7. C. coleoptris luteis: maculis duabus nigris longitudinalibus sinuatis.

*Habitat in Svecia.*

7-puncta-8. C. coleoptris rubris: punctis nigris septem. *Fn. svec.*

ta. 391.

*Frisch. inf.* 4. p. 1. t. 1. f. 4. *Raj. inf.* 86. n. 1.

*Pet. gaz.* 33. t. 21. f. 3. *Merian. eur.* 24. f.

*Gæd. inf.* 2. p. 58. t. 18. *Alb. inf.* 61. f. C.

*Rœs. inf.* 2. scar. 3. p. 7. t. 2.

*Reaum. inf.* 3. t. 31. f. 18. *Bradl. nat.* t. 27. f. 4

*Habitat in Europæ agris & plantis.*

9-puncta-9. C. coleoptris rubris: punctis nigris novem.

ta. *Uddm. diff.* 14. Coccinella nigra, elytris rubris, punctis novem nigris.

*Habitat in Europæ Juniperetis.*

10-puncta-10. C. coleoptris fulvis: punctis nigris decem.

Etata. *Habitat in Europa.*

II. C.



- 11-pun- 11. *C. coleoptris rubris* : punctis nigris undecim. *Faun.*  
 ctata. *svec.* 394.  
*Merian. europ.* 168.  
*Habitat in Europa.*
- 13-pun- 12. *C. coleoptris luteis* : punctis nigris tredecim. *Fn. svec.*  
 ctata. 395.  
*Habitat in Europæ Armoracia.*
- 14-pun- 13. *C. coleoptris flavis* : punctis nigris quatuordecim : qui-  
 ctata. busdam contiguis. *Fn. svec.* 396.  
*Habitat in Europa.*
- ocellata. 14. *C. coleoptris luteis* : punctis nigris quindecim. *Faun.*  
*svec.* 398.  
*Gadd sat.* 26. *Coccinella elytris flavo-luteis*, punctis  
 15 nigris oculo flavo cinctis.  
*Merian. inf.* 48. f. 5.  
*Habitat in Europa.*  
*Hæc reliquis major.*
- 19-pun- 15. *C. coleoptris flavis* : punctis nigris novendecim.  
 ctata. *Habitat in Europa.*
- 22-pun- 16. *C. coleoptris flavis* : punctis nigris viginti duobus.  
 ctata. *Fn. svec.* 401.  
*Habitat in Europa.*  
*Thorax punctatus est.*
- 24-pun- 17. *C. coleoptris rubris* : punctis nigris viginti quatuor.  
 ctata. *Fn. svec.* 402.  
*Habitat in Europa.*
- 25-pun- 18. *C. coleoptris rubris* : punctis nigris viginti quinque.  
 ctata. *Habitat in Europa.*
- conglom- 19. *C. coleoptris rubris* : punctis nigris plurimis subcon-  
 data. tiguis. *Fn. svec.* 403.  
*Frisch. inf.* 9. p. 34. t. 17. f. 6.  
*Habitat in Europa.*
- conglom- 20. *C. coleoptris flavescens* : punctis nigris plurimis  
 merata. contiguis. *Fn. svec.* 404.  
*Raj. inf.* 87. n. 15. *List. loqu.* 383. n. 9.  
*Frisch. inf.* 9. t. 17. f. 4. 5.  
*Habitat in Europa.*



\* \* *Coleoptris rubris flavisve: albo maculatis.*

guttato- 21. *C. coleoptris rubris: punctis albis quatuordecim, ni-*  
punctata. *gris tribus.*  
*Habitat in Europa.*

14-gut- 22. *C. coleoptris rubris: punctis quatuordecim albis. Fn.*  
tata. *svec. 397.*  
*List. loqu. 383. n. 10.*  
*Habitat in Europæ Salicibus.*

16-gut- 23. *C. coleoptris rubris: punctis albis sedecim. Fn. svec.*  
tata. *399.*  
*Habitat in Europa.*

18-gut- 24. *C. coleoptris rubris: punctis albis sedecim: duobus*  
tata. *primis lunatis.*  
*Habitat in Svecia.*

20-gut- 25. *C. coleoptris rubris: punctis albis viginti. Fn. svec. 400.*  
tata. *Habitat in Europa.*

oblongo- 26. *C. coleoptris rubris, lineis punctisque albis. Fn. svec.*  
guttata. *389.*  
*Habitat in Europa.*

oblitera- 27. *C. coleoptris flavis: punctis quatuor rufis: anticis ob-*  
ta. *soletis.*  
*Habitat in Europa.*

\* \* \* *Coleoptris nigris: rubro maculatis.*

2-pustu- 28. *C. coleoptris nigris: punctis rubris duobus, abdomine*  
lata. *sanguineo. Fn. svec. 409.*  
*Frisch. inf. 9. p. 34. t. 16. f. 6.*  
*Ræs. inf. 2. scar. 3. p. 10. t. 3.*  
*Habitat in Europæ Sorbis; in America septentrionali.*  
*Kalm.*  
*Singulum punctum e tribus componitur.*

4-pustu- 29. *C. coleoptris nigris: punctis rubris quatuor: interiori-*  
lata. *bus longioribus. Fn. svec. 408.*  
*Habitat in Europæ Urticis, Rubis.*

6-pustu- 30. *C. coleoptris nigris, punctis rubris sex. Fn. svec. 407.*  
lata. *Raj. inf. 87. n. 4.*  
*Habitat in Europa.*



10-pustu-31. *C. coleoptris* nigris: punctis fulvis decem. *Fn. svec.* 404.  
lata. *Frisch. inf.* 9. t. 17. f. 4. 5. *List. loq.* 383. n. 9.  
*Raj. inf.* 87. n. 15.  
*Habitat in Europa.*

14-pustu-32. *C. coleoptris* nigris: punctis rubris quatuordecim. *Fn.*  
lata. *svec.* 406.  
*Uddm. diff.* 15. *Coccinella coleoptris* nigris, maculis  
decem pallide flavis.  
*Habitat in Europa.*  
*Maculae aliis flavæ, aliis fulvæ, aliis rubræ.*

16-pustu-33. *C. coleoptris* nigris, punctis fulvis sedecim.  
lata. *Habitat in Europa.*

gigantea. 34. *C. coleoptris* nigris: punctis fulvis numerosissimis.  
*Habitat in India. De Geer.*  
*Gigas in hac gente, & Scarabæo stercorario par. media*  
*inter Coccinellas & Chrysomelas. Corpus nigrum o-*  
*vatum. Thorax marginatus & emarginatus. An-*  
*tennæ clavatæ. Elytra valde convexa marginata,*  
*punctis, in maculas sæpe confluentibus, numerosissi-*  
*mis, rufo-fulvis adpersa.*

\* \* \* \* *Colcoptris nigris albo flavove maculatis.*

pantheri-35. *C. coleoptris* nigris: punctis flavis octo.  
na. *Habitat in Europa.*

tigrina. 36. *C. coleoptris* nigris: punctis albidis viginti. *Fn. svec.*  
405.  
*Uddm. diff.* 11. *Coccinella coleoptris* nigris, punctis  
viginti albis.  
*Habitat in Europa.*

176. CHRYSOMELA. *Antennæ* moniliformes, ex-  
trorsum crassiores.

*Thorax*, nec elytra, margi-  
natus.

\* *Corpore ovato.*

göttin- 1. *C. ovata* atra, pedibus violaceis.  
gensis. *Ræf. inf.* 2. *scar.* 3. t. 5.  
*Habitat in Germania. P. Forskåhl,*

2. *C.*



- Tanacet- 2. *C. ovata atra punctata*, antennis pedibusque nigris.  
ti. *Fn. suec.* 413. *Chrysomela atra*, punctis excavatis con-  
tiguis.  
*It. goth.* 270.  
*Habitat in Tanaceto vulgari.*
- hæmor- 3. *C. ovata nigra nitida*, antennis basi flavescens, ano-  
rhoidalis. supra rubro.  
*Fn. suec.* 419. *Chrysomela nigra glabra*, antennarum  
basi subflava.  
*Habitat in Betula Alno.*
- Graminis. 4. *C. ovata viridis nitida*, antennis pedibusque concolo-  
ribus.  
*Fn. suec.* 419. *Chrysomela viridi-cærulea.*  
*Habitat in Gramine pratorum.*
- ænea. 5. *C. ovata viridis nitida*, abdomine postice ferrugineo.  
*Fn. suec.* 420. *Chrysomela viridis nitida*, thorace anti-  
ce excavato.  
*Habitat in Betula Alno.*
- Alni. 6. *C. ovata violacea*, elytris punctis excavatis sparsis. *Fn.*  
*suec.* 416.  
*Habitat in Betula Alno.*
- Betulæ. 7. *C. ovata violacea*, elytris punctis excavatis striatis. *Fn.*  
*suec.* 415.  
*Habitat in Betula alba.*
- hæmo- 8. *C. ovata violacea*, alis rubris.  
ptera. *Habitat in Europa.*
- occiden- 9. *C. ovata viridi-ænea*, pedibus antennisque flavis.  
talis. *Habitat in America. Rolander.*  
*Similis C. vitellinæ.*
- Padi. 10. *C. ovata nigra*, elytris apice lividis.  
*Habitat in Pruno Pado.*  
*Pælice major, tota nigra, elytris apice lividis.*
- Armora- 11. *C. ovata cæruleo-viridis*, subtus nigra.  
ciæ. *Habitat in Cochlearia Armoracia.*



- Hypo- 12. *C. ovata aurata*, antennis nigris, elytris abbreviatis.  
chæridis. *It. scan.* 210.  
*Habitat in Hypochæridis maculatæ floribus.*
- vulgatis- 13. *C. oblongo-ovata cærulea*, antennis basi ferrugineis.  
fima. *Habitat in Europa.*  
*Differt a sequenti quod major, non ænea, sed cærulea*  
*& magis oblonga.*
- vitellinæ. 14. *C. ovata ænea.*  
*Chrysomela ænei coloris. Fn. svec.* 426.  
*Ræs. inf.* 2. *scar.* 3. *p.* 5. *t.* 1.  
*Habitat in Salicibus glabris Populoque, folia subtus con-*  
*sumens.*  
*Dum pascuntur larvæ disponuntur per lineas parallelas.*
- Polygo- 15. *C. ovata cærulea*, thorace femoribus anoque rufis.  
ni. *Fn. svec.* 440.  
*Reaum. inf.* 3. *t.* 17. *f.* 15.  
*Habitat in Polygono aviculari, terrestris.*
- pallida. 16. *C. ovata flavescens tota*, oculis nigris.  
*Fn. svec.* 423. *Chrysomela pallido-grisea.*  
*Habitat in Salicibus.*
- staphy- 17. *C. ovata obscure testacea tota. Fn. svec.* 422.  
læa. *Habitat in Europa.*
- polita. 18. *C. ovata*, thorace aurato, elytris rufis.  
*Fn. svec.* 427. *Chrysomela viridi-ænea*, elytris rubi-  
cundis.  
*Habitat in Salice, Populo.*
- clavico- 19. *C. ovata nigra*, elytris abdomineque rubris; antennis  
nis. clavatis.  
*Habitat in America. Rolander.*  
*Facies C. populi. Antennarum caput articulis tribus*  
*nigris.*
- Populi. 20. *C. ovata*, thorace cærulescente, elytris rubris apice ni-  
gris.  
*Fn. svec.* 428. *It. æl.* 38. *Chrysomela nigro cærulea*,  
elytris rubris apice nigris.  
*Merian. inf.* 14. *t.* 27. *Alb. inf.* 63. *f.* C.  
*Habitat in Populo tremula.*



INSECTA COLEOPTERA. Chrysomela.

- vimina- 21. *C. ovata* nigra, thorace bimaculato, elytris testaceis.  
lis. *Fn. Svec. 429.* Chrysomela thorace elytrisque rubris.  
*Habitat in Salicibus.*
- 10-pun- 22. *C. ovata*, thorace rubro postice nigro, elytris rufis:  
ctata. punctis subquinis nigris.  
*Fn. Svec. 436.* Chrysomela supra rufa, thoracis punctis  
nigris duobus, elytrorum pluribus.  
*Frisch. inf. 13. t. 28.*  
β. Chrysomela rubra, elytro singulo maculis quinque ni-  
gris. *Fn. Svec. 1354.*  
*Habitat in Populo tremula, Asparago.*
- lapponi- 23. *C. ovata*, thorace viridi, elytris rubris: fascia inter  
ca. punctum maculamque lunatam cærulea.  
*Fn. Svec. 431.* Chrysomela thorace viridi, coleoptris  
rubris cruce cærulea.  
*Habitat in Europa.*
- Boleti. 24. *C. ovata* nigra, elytris fasciis tribus flavis repandis.  
*Uddm. diss. 4. t. 1. f. 3.* Dermestes ater nitens, elytris  
nigris, fasciis duabus flavis undulatis.  
*Habitat in Europa.*
- collaris. 25. *C. ovata* violacea, thorace marginibus luteo: puncto  
nigro. *Fn. Svec. 417.*  
*Habitat in Salicibus.*
- sanguino- 26. *C. ovata* nigra, elytris margine sanguineis.  
lenta. *Habitat in Europa.*
- margina- 27. *C. ovata* nigro-ænea, elytris margine luteis. *Fn. Svec.*  
ta. 437.  
*Habitat in Europa.*
- margi- 28. *C. oblongo ovata* nigro-cærulea, thorace elytrisque  
nella. margine luteis.  
*Habitat in Europa.*
- æstuans. 29. *C. oblongo-ovata* rufo-testacea, elytris maculis 4 fla-  
vescentibus alternis.  
*Habitat in America. Rolander.*
- coccinea. 30. *C. ovata*, thorace emarginato sanguineo macula ni-  
gra, elytris sanguineis: maculis duabus nigris.



- Uddm. diff.* 13. *Coccinella coleoptris rubris, maculis 4 nigris.*  
*Habitat in Europa.*
- philadel- 31. *C. ovata viridis, elytris flavis: punctis virescentibus*  
phica. *oblongiusculis, antennis pedibusque ferrugineis.*  
*Habitat in Pennsylvania. C. De Geer.*
- america- 32. *C. ovata viridi-cærulescens, elytris lineis tribus rubris,*  
na. *alis sanguineis.*  
*Habitat in America, lecta inter Coccus officinarum.*  
*Corpus totum nitidum, cæruleo-virescens, ovale; subtus totum piceo-fuscum. Caput Thorax & Elytra nigro viridi-cærulescentia. Elytron singulum pictum lineis 3 longitudinalibus, a basi ad apicem elytri exaratis; harum interior recta a basi ad apicem excurrit; extrema marginalis duplicata.*
- saera. 33. *C. ovata supra rufa, thoracis linea punctis duobus e-*  
*lytrorumque futura nigris.*  
*Habitat in Palæstina. Hasselqvist.*  
*Linea extrema basi coiens cum intima; intermedia parum flexuosa ante apicem desinit; ramulus ruber in medio lineæ marginalis antrorsum spectans. Alæ sanguineæ.*
- minuta. 34. *C. ovata nigra, elytris pedibus thoracisque lateribus*  
*griseis.*  
*Habitat in Europæ aquosis.*  
*Gerit faciem simillimam Dytiscis, sed pedes unguiculati.*
- \* \* *Saltatoriæ femoribus posticis crassissimis.*
- oleracea. 35. *C. saltatoria, corpore virescenti-cæruleo.*  
*Fn. svec. 539. Mordella subrotunda atro-cærulea.*  
*Habitat in Europæ cotyledonibus plantarum.*
- chryso- 36. *C. saltatoria, corpore atro-cæruleo, capite pedibusque*  
cephala. *quatuor anterioribus luteis.*  
*Habitat in Svecia.*
- Hyoscy- 37. *C. saltatoria, corpore virescenti-cæruleo, pedibus te-*  
ami. *staceis, femoribus posticis violaceis.*  
*Fn. svec. 540. Mordella ovata cærulea nitida, tibiis ferrugineis.*  
*Habitat in Hyoscyamo nigro.*



- erythro- 38. *C. saltatoria*, corpore atro-cæruleo, capite geniculisque  
cephala. pedum rufis.  
*Habitat in Svecia.*
- Helxines. 39. *C. saltatoria*, corpore viridi-æneo, antennis pedibusque  
omnibus testaceis.  
*Fn. svec. 539. Mordella atro-ænea subrotunda.*  
*Habitat in Polygono Fagopyro.*
- exfoleta. 40. *C. saltatoria*, corpore flavescente, pedibus testaceis.  
*Fn. svec. 533. Mordella flava.*  
*Habitat in Europa.*
- nitidula. 41. *C. saltatoria*, elytris cæruleis, capite thoraceque aureo,  
pedibus ferrugineis.  
*Habitat in Europa.*
- nemo- 42. *C. saltatoria*, corpore atro, elytris linea flava, pedibus  
rum. pallidis.  
*Fn. svec. 542. Mordella oblonga atra, elytris longitu-  
dinaliter in medio flavescens.*  
*Habitat in Pulmonariis, Dentariis.*
- rufipes. 43. *C. saltatoria cærulea obovata*, thorace pedibus capite  
antennisque rufis.  
*Habitat in Europa.*
- holfati- 44. *C. saltatoria nigra nitida*, elytris apice puncto rubro.  
ca. *Fn. svec. 544. Mordella nigra, elytris apice rubris.*  
*Habitat in Europa.*
- hemi- 45. *C. saltatoria*, corpore nigro hemisphærico, tibiis piceis.  
sphærica. *Habitat in Germania. P. Forstkâbl.*
- furina- 46. *C. saltatoria flavescens*, elytris margine fasciaque san-  
menfis. guineis.  
*Habitat Surinami. Rolander.*  
*Antecedentibus major. Antennæ pedesque pallidi.*
- S. litera. 47. *C. saltatoria pallida*, elytris nigris: linea longitudinali  
flexuosa alba.  
*Habitat Surinami. Rolander.*  
*Linea alba in singulo elytro refert S literam, neque hac  
parva est.*



æquino- 48. *C. saltatoria*, thorace rubro, elytris violaceis: maculis  
ctialis. 4 albis alternis.

*Habitat in America. Rolander.*

*Magnitudo Coccinelle bifurcatae. Antennæ & Pedes nigri; maculae Elytrorum subrotundæ.*

\* \* \* *Corpore cylindrico.*

tridenta- 49. *C. cylindrica*, thorace cæruleo, elytris testaceis.  
ta. *Habitat in Lonicera Xylosteo.*

4-puncta- 50. *C. cylindrica*, thorace nigro, elytris rubris: punctis  
ta. duobus nigris, antennis brevibus.

*Fn. svec. 432. Chrysomela oblonga nigra, coleoptris rubris: maculis quatuor nigris.*

*Habitat in Europa.*

2-puncta- 51. *C. cylindrica*, thorace nigro nitido, elytris rubris:  
ta. punctis duobus nigris, antennis longis.

*Uddm. diff. 22. Chrysomela atra, elytris rubris, punctis 4 nigris.*

*β. Uddm. diff. 21. Chrysomela nigra, elytris rubris macula nigra longitudinali.*

*Gadd. diff. 25. Calinda nigra, elytris flavis nitidis, maculis quatuor nigris, quarum duæ posteriores majores & quasi ex duabus aliis connatæ.*

*Habitat in Europa.*

*Calinda nigra, thorace nigro, elytris nigris: maculis duabus rubris marginalibus.*

*Gadd. diff. 28. Calinda nigra nitida, clypeo caput fere æquante, macula ad apicem & basin elytrorum lutea.*

*Habitat in Europa.*

52. *C. cylindrica*, thorace cæruleo nitido, elytris cæruleis, pedibus testaceis.

*Habitat in Europa.*

54. *C. cylindrica*, thorace cæruleo, elytris pedibusque cæruleis.

*Fn. svec. 418. Chrysomela viridis nitida, thorace æquali, elytris punctis excavatis contignis.*

*Habitat in Salicibus.*



Coryli. 55. *C. cylindrica*, thorace elytrisque testaceis, pedibus nigris.

*Habitat in Europa.*

Pini. 56. *C. cylindrica* testacea, elytris pallidioribus, pedibus concoloribus, antennis fuscis.

*Habitat in Pino,*

bothnica. 57. *C. cylindrica* atra, thorace linea longitudinali rubra.

*Habitat in Westerbotnia. D. C. Solander.*

*Statura C. cordigerae, sed atra. Thorax margine antico & linea longitudinali ruber. Caput in fronte macula quadrata rubra.*

cordigera. 58. *C. cylindrica*, thorace variegato, elytris rubris: punctis duobus nigris.

*Uddm. diff. 23. Chryfomela nigra, elytris subflavis punctis quatuor nigris.*

*Habitat in Europa.*

*Macula media postica thoracis antrosum bifida est.*

6-puncta. 59. *C. cylindrica*, thorace variegato, elytris rubris: maculis tribus nigris.

*Habitat in Europa.*

*Genicula tibiaram puncto albo notata.*

10 ma- 60. *C. cylindrica*, thorace variegato, elytris flavis punctis culata. quinque nigris.

*Habitat in Europa.*

obscura. 61. *C. subcylindrica*, thorace nigro, elytris pedibusque nigris.

*Habitat in Europa.*

*Elytrorum anguli exteriores versus pectus gibbosiores sunt, ut in Curculionibus.*

\* \* \* \* *Corpore oblongo Thorace angustiore.*

merdige- 62. *C. oblonga* rubra, thorace utrinque impresso. *Faun. ra. suec. 425.*

*Blank. inf. 91. t. 11. f. 7. Val'isa. nat. 1. p. 265. t. 32.*

*Merian. inf. 71.*

*Reaum. inf. 3. t. 17. f. 1. 2.*

*Habitat in Lilio, Convallaria.*



- Nym-  
phææ. 63. *C. oblonga* fusca, elytris margine prominulo flavescen-  
tibus. *Fn. suec. 444.*  
*Habitat in Nymphæis.*
- Caprea. 64. *C. oblonga*, thorace elytrisque griseis, antennis nigris  
longis.  
*In suec. 424.* Chrysomela nigra, thorace elytrisque griseis.  
*Habitat in Salicibus.*
- 4-macu-  
lata. 65. *C. oblonga*, thorace flavo, elytris flavis: maculis dua-  
bus nigris remanentibus.  
*Gaed. sat. 77.* Chrysomela fusco latea, elytrorum pun-  
ctis quatuor nigris.  
*Habitat in Europa.*
- cyanella. 66. *C. oblonga* cærulea, thorace cylindrico lateribus gibbis.  
*Habitat in Europa.*
- 12-pun-  
ctata. 67. *C. oblonga* rufa, elytris punctis sex, pectore pedum-  
que geniculis nigris.  
*Habitat in Europa.*
- melano-  
pus. 68. *C. oblonga* cærulea, thorace pedibusque rufis.  
*Habitat in Europa.*
- Phellan-  
drii. 69. *C. oblonga* nigra, thorace elytrisque lineis duabus in-  
teis. *Fn. suec. 438.*  
*Habitat in Phellandrio aquatico.*
- Aspara-  
gi. 70. *C. oblonga*, thorace rubro, punctis duobus nigris, e-  
lytris flavis: cruce punctisque quatuor nigris. *Faun.*  
*suec. 430.*  
*Frisch. inf. 1. p. 27. t. 6. Ræf. inf. 2. scar. 3. p. 11. t. 4.*  
*Habitat in Asparago officinali.*  
*Conf. Cancarellum Asparagi Vallisn. oper. 1. t. 7.*
- Cerasi. 71. *C. oblongiuscula* grisea: oculis nigris. †  
*Fn. suec. 435.* Chrysomela livida, oculis nigris.  
*Habitat in Europæ Pruno Pado.*
- fulphu-  
rea. 72. *C. oblonga* flava tota.  
*Habitat in Norvegia. D. C. Solander.*
- cervina. 73. *C. oblonga* livida.  
*Habitat in Europa.*  
*Color dorsi constat e pilis vix conspicuis glauco-fuscis.*



- ceram- 74. *C. oblonga nigra*, elytris testaceis, antennis ferratis.  
boides. *Habitat in Europa.*
- murina. 75. *C. oblonga nigra*, elytris pedibusque testaceis.  
*Habitat in Europa.*
- hirta. 76. *C. oblonga villosa nigra*, elytris testaceis.  
*Habitat in Europa.*
- inda. 77. *C. oblonga cyanea*, pedibus longitudine corporis.  
*M. L. U.*  
*Habitat in India.*  
*Magnitudo Scar. stercorarii. Elytra levia. Pedes lon-  
giores quam in reliquis.*
- elongata. 78. *C. elongata atra*, thorace rubro subvillosa.  
*Habitat in Germania. P. Forskâbl.*  
*Hæc reliquis longior & admodum angusta ratione con-  
generum.*

177. CURCULIO. *Antennæ subclavatæ, rostro in-  
fidentes.*

*Rostrum corneum prominens.*

\* *Longirostres femoribus simplicibus.*

- Palma- 1. *C. longirostris ater*, thorace ovato planiusculo, elytris  
rum. abbreviatis striatis. *M. L. U.*  
*Rumph. herb. 1. p. 79, 83. t. 17. f. G. Cossus Sa-  
guarius.*  
*Pet. gaz. t. 35. f. 5. Merian. surin. t. 48. f. 3.*  
*Habitat in Indiæ Palmis.*  
*Antennæ apice quasi bifariam truncatæ.*
- indus. 2. *C. longirostris ater*, thorace subovato excavato-puncta-  
to, elytris rugoso-fulcatis, tibiis spinosis. *M. L. U.*  
*Habitat in India.*  
*Magnitudo præcedentis. Rostrum apice bilobum.*
- hemipte- 3. *C. longirostris obscure purpurascens*, elytris abbreviatis  
rus. maculatis. *M. L. U.*  
*Habitat in India.*  
*Thorax lineis tribus nigris longitudinalibus.*



- violaceus. 4. *C. longirostris violaceus*, proboscide thoracis longitudine. *Fn. svec.* 451.  
*Habitat in Europa.*
- Alliariæ. 5. *C. longirostris violaceus totus.*  
*Fn. svec.* 465. *Curculio nigro-cærulescens.*  
*Habitat in Eryfimo Alliaria & affinibus.*
- cyaneus. 6. *C. longirostris ater*, elytris violaceis, scutello albo. *Fn. svec.* 467.  
*Habitat in Europa, imprimis in Salicibus.*
- aterimus. 7. *C. longirostris ater*, elytris nitidis. *Fn. svec.* 466.  
*Habitat in Europa.*
- Cerasi. 8. *C. longirostris ater*, elytris opacis oblongis. *Fn. svec.* 465. *It. scan.* 355.  
*Habitat in foliis Cerasi & Pyri, epidermidem exedens, commaculans.*
- acridulus. 9. *C. longirostris piceus*, abdomine ovato. *Fn. svec.* 463.  
*Habitat in Europæ plantis tetradynamiæ.*
- purpureus. 10. *C. longirostris purpureus nitens.* *Fn. svec.* 457.  
*Pet. gaz. t. 22. f. 5. Scarabæus miniatus minimus.*  
*List. loqu.* 394.  
*Habitat in Europa.*
- frumentarius. 11. *C. longirostris sanguineus.* *Fn. svec.* 475.  
*Act. Stockh.* 1750. p. 186. n. 1.  
*Leuwenh. arc.* 168. aug. 6. p. 83. f. 1.  
*Habitat in Europæ frumento.*
- granarius. 12. *C. longirostris piceus oblongus*, thorace punctato longitudine elytrorum. *Fn. svec.* 462.  
*Raj. inf.* 88. *Scarabæus parvus fordide s. obscure fulvus*, proboscide longa deorsum arcuata.  
*Habitat frequens in granulis avenaceis, in mercatorum tabernis frequens.*
- dorsalis. 13. *C. longirostris*, elytris rubris: futura nigra.  
*Fn. svec.* 475. *Curculio niger*, elytris in medio rufescentibus.  
*Habitat in Floribus.*

14. C.

---

*Curculionum longirostrium larvæ pleræque fructus & semina, brevirostrium vero folia consumunt; varia etiam caules perforant.*



- melano- 14. *C. longirostris cinereus*, coleoptris fascia cordata fu-  
cardius. sca. *M. L. U.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Macula utraque elytra combinans literam V refert.*
- Pini. 15. *C. longirostris*, elytris testaceis: fasciis nebulosis. *Fn.*  
*svec. 446.*  
*It. æl. 26.* Curculio subfuscus, elytris fasciis duabus  
testaceis.  
*Pet. gaz. 14. t. 8. f. 6.* Curculio norvegicus.  
β. Curculio longirostris, elytris macula ferruginea. *Fn.*  
*svec. 447.*  
*Habitat in Pini sylvestris cortice & resina.*  
*Vidi α & β copula junctos.*
- Rumicis. 16. *C. longirostris griseus nigro-nebulosus oblongus*, pe-  
dibus antennisque subfuscis. *Fn. svec. 454.*  
*Habitat in Rumicibus Lapathis, folia subtus exedendo*  
*maculans.*
- Lapathi. 17. *C. longirostris albo nigroque varius muricatus.*  
*Habitat in Rumicibus Lapathis.*
- cupreus. 18. *C. longirostris obscure æneus, subtus obscurior.*  
*Habitat in Europa.*
- scaber. 19. *C. longirostris cinereus, pedibus rufis, elytris scabris.*  
*Habitat in Europa.*
- T. album. 20. *C. longirostris ater, abdominis lateribus posticisque*  
*lacteis.*  
*Habitat in Westerbothnia. D. Solander.*  
*Major pediculo; ad abdominis latera juxta pectus linea*  
*utrinque alba T literam referens.*
- Quercus. 21. *C. longirostris pallide flavus, oculis nigris. Uddm.*  
*diff. 25.*  
*Habitat in Quercus Roboris foliis, inter venas majores*  
*subcutaneus, folia maculans. Magnitudo Pediculi.*
- arator. 22. *C. longirostris testaceus, coleoptrorum futura nigra*  
*repanda.*  
*Habitat in Svecia. T. Bergman.*  
*Thorax obscurior lineis 3 flavis. Elytra valde striata*  
*& lineis 3 nigris plerumque interruptis.*



- 2-puncta-23. *C. longirostris cinereus*, elytris macula nigra, tibiis flavescens. *Fn. suec. 470.*  
*Habitat in Europa.*
- 4-maculatus. 24. *C. longirostris nigricans*, coleoptris maculis quatuor albidis.  
*Habitat in Europa.*
- 5-maculatus. 25. *C. longirostris griseus*, coleoptris maculis quinque albidis.  
*Habitat in Europa.*
- pericarpus. 26. *C. longirostris subglobosus nebulosus*, coleoptris macula cordata alba. *Fn. suec. 461.*  
*Habitat in Scrophulariis cum sequente.*
- Scrophularia. 27. *C. longirostris subglobosus*, coleoptris maculis duabus atris dorsalibus.  
*Fn. suec. 460.* Curculio subglobosus punctis duobus nigris futuræ longitudinalis coleoptrorum, thorace exalbido.  
*List. loqu. 395.* Scarabæus exiguus cinereus, duabus maculis nigris.  
*Reaum. inf. 3. t. 2. f. 12.*  
*Habitat in Scrophularia, Verbasc.*  
*Larva viscosa exedit fructus, suosque folliculos substituit.*
- vittatus. 28. *C. longirostris*, elytris lineis albis luteisque.  
*Sloan. jam. 2. p. 210.* Scarabæus curculio proboscide longa deorsum arcuata, elytris fasciis albis & luteis variegatis.  
*Habitat in Europa.*
- paraplecticus. 29. *C. longirostris cylindricus subcinereus*, elytris mucronatis.  
*Fn. suec. 445. It. scan. 184.* Curculio fulcus oblongus, elytris rectis acuminatis.  
*Habitat in Phellandrio, Sio.*  
*Larva intra caulem sæpe sub aqua hæret. Equis Paraplectigiam cauffari creditur.*
- algirus. 30. *C. longirostris subcylindricus lævis fuscus* punctis prominulis adpersus.  
*Habitat Algiriæ. E. Brander.*



*Statura antecedentis; sed postice minus acutus & subcinerascens.*

- Bacchus. 31. C. longirostris aureus, rostro plantisque nigris.  
*Habitat in Vite.*
- Betulæ. 32. C. longirostris, thorace antrorsum sæpe spinoso, corpore viridi aurato, subtus concolore.  
*Fn. suec. 486. Curculio cæruleo-viridis nitens, antennis atris.*  
*Habitat in Betula, Alno.*  
*Alter sexus thoracis spinas habet; alter non.*
- Populi. 33. C. longirostris, thorace antrorsum spinoso, corpore viridi ignito subtus subatro.  
*Habitat in Populo, Corylo.*  
*Mas thorace utrinque spinoso, Femina vero non.*  
*\* \* Longirostres, saltatorii femoribus posticis crassis.*
- Alni. 34. C. longirostris, pedibus saltatoriis, elytris lividis: maculis duabus obscuris.  
*Fn. suec. 473. Curculio lividus, coleoptris maculis quatuor obscuris.*  
*Habitat in Alno Betule.*
- Salicis. 35. C. longirostris, pedibus saltatoriis, elytris atris: fasciis duabus albis.  
*Habitat in Salicis floribus.*
- Fagi. 36. C. longirostris, pedibus saltatoriis, corpore atro, femoribus pallidis. *Fn. suec. 469. It. scan. III.*  
*Habitat in Fagi foliis.*
- Segetis. 37. C. longirostris, pedibus saltatoriis, corpore piceo, elytris oblongis. *Fn. suec. 464.*  
*Habitat in agris super spicas.*  
*\* \* \* Longirostres femoribus dentatis.*
- Pomorum. 38. C. longirostris, femoribus anticis dentatis, corpore griseo nebuloso. *Fn. suec. 458.*  
*Frisch. inf. 1. p. 32. t. 8. Curculio in floribus arborum.*  
*Habitat in Floribus Pomonæ.*



- ovatus. 39. *C. longirostris*, femoribus omnibus dentatis, corpore ovato nigro albo-maculato.  
*Habitat in Europa.*
- carbonarius. 40. *C. longirostris*, femoribus omnibus dentatis, corpore nigro oblongo, elytris striatis.  
*Habitat in Europa. D. C. Solander.*
- mucosus. 41. *C. longirostris*, femoribus quatuor anterioribus dentatis, elytris polline flavescentibus supra apicem gibbosis.  
*M. L. U.*  
*Habitat in India.*
- pulio. 42. *C. longirostris*, femoribus quatuor posterioribus dentatis, elytris nigris striatis linea repanda grisea. *M. L. U.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Linea grisea repanda in singulo elytro longitudinaliter excurrit.*
- vaginalis. 43. *C. longirostris*, femoribus dentatis, elytris striatis: tuberculis sparsis juxta apicem mucronatis. *M. L. U.*  
*Habitat in America, Surinami.*  
*Thoracis fossula pro rostro. Elytrorum strie ex punctis cavis villosis.*
- stigma. 44. *C. longirostris*, femoribus dentatis, elytris macula ferruginea. *M. L. U.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Fossula inter pedes pro rostri receptione, ut in antecedente.*
- depressus. 45. *C. longirostris*, femoribus dentatis, thorace depresso lateribus obtuse angulato. *M. L. U.*  
*Habitat in America.*  
*Corpus griseum punctis nigris glabris prominulis*
- annulatus. 46. *C. longirostris*, femoribus dentatis, thorace elytris fasciis linearibus nigris. *M. L. U.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Thorax linea unica, elytra duabus cinguntur; oculi annulo albo.*
- dispar. 47. *C. longirostris*, femoribus dentatis, elytris emarginatis rubro-striatis. *M. L. U.*  
*Habitat in Indiis.*



*Antennae filiformes. Corpus nigrum. Femina rostro brevi valide forcipato.*

anchora- 48. *C. longirostris*, femoribus dentatis, elytris fava strigato.  
go. atis, thorace elongato. *M. L. U.*

*Habitat in Indiis.*

*Thorax longitudine saepe abdominis, unde structura singularis, & rostrum longitudine thoracis.*

Abietis. 49. *C. longirostris*, elytris fuscis: fasciis duabus linearibus interruptis griseis; femoribus dentatis.

*Fn. svec. 447. It. æl. 26. C. subfuscus.*

*Pet. gaz. 14. t. 8. f. 6. C. norvegicus.*

*Habitat in Pini sylvestris Cortice & resina.*

germanus. 50. *C. longirostris*, femoribus subdentatis, corpore ovato nigro punctis testaceis adsperso.

*Habitat in Germania. P. Forskühl.*

*Inter maximos Europæos. Rostrum crassiusculum. Thorax subrotundus utrinque punctis 3 ferrugineis. Coleoptera abdomen tegentia, ovata, nigra punctis ferrugineis adspersa. Femora postica obsolete dentata; anteriora 4 mutica cum rudimento dentis. Similis C. pini.*

Nucum. 51. *C. longirostris*, femoribus dentatis, corpore griseo longitudine rostri.

*Uddm diss. 24. Curculio ovatus griseus, rostro filiformi longitudine corporis.*

*Rœs. inf. suppl. 385. t. 67. f. 5. 6.*

*Habitat in Nucibus Coryli Avellanæ.*

5-punctatus. 52. *C. longirostris*, femoribus dentatis, elytris futura alba, maculisque duabus.

*Habitat in Europa.*

hispidus. 53. *C. longirostris*, femoribus dentatis, corpore falcato adsperso squamis erectis.

*Habitat in Europa.*

rectirostris. 54. *C. longirostris*, femoribus dentatis, rostro rubro, elytris obsolete fasciatis.

*Habitat in Europa.*

pedicularius. 55. *C. longirostris*, femoribus dentatis, corpore rubro, elytris albido-subfasciatis.

*Habitat in Europa.*



\* \* \* \* *Brevirostres femoribus dentatis.*

Ligustici. 56. *C. brevirostris*, femoribus subdentatis, abdomine subovato murino.

*Habitat in Ligustico Levistico.*

Pyri. 57. *C. brevirostris*, femoribus dentatis, æneo-fuscus. *Fn. Svec. 449.*

*Fn. Svec. 455. It. scan. 355. Curculio viridis opacus, pedibus antennisque magis fuscis.*

*Habitat in Pyri foliis.*

oblongus. 58. *C. brevirostris oblongus*, femoribus dentatis, antennis clytris pedibusque ferrugineis.

*Habitat in Svecia. D. C. Solander.*

*Magnitudo Dermestidis.*

argentatus. 59. *C. brevirostris*, femoribus dentatis, corpore viridi argentato. *Fn. Svec. 449.*

*Fn. Svec. 459. Curculio femoribus omnibus denticulo notatis, corpore viridi oblongo.*

*Habitat in Europæ Urtica.*

ovatus. 60. *C. brevirostris*, femoribus dentatis, abdomine ovato nigro, pedibus antennisque rufis.

*Habitat in Europa.*

cervinus. 61. *C. brevirostris*, femoribus dentatis, antennis basi rufescentibus.

*Habitat in Europa.*

\* \* \* \* \* *Brevirostres femoribus muticis.*

argyreus. 62. *C. brevirostris*, femoribus submuticis, corpore toto viridi-argenteo-aureoque maculato. *M. L. U.*

*Habitat in Indiis.*

*Facies C. argentati. Sub femoribus primoribus spina obsoleta.*

viridis. 63. *C. brevirostris*, femoribus muticis, corpore viridi supra obscuro, subtus flavidiore.

*Habitat in Europa.*

*Magnitudo & statura C. Pyri, supra totus e viridi fuscus, subtus e flavo viridis, quo colore etiam latera elytrorum lucent. Antennæ & Pedes nigri.*



- specio- 64. *C. brevirostris*, femoribus muticis, corpore luteo viri-  
sus. di-nitente, elytris spinis spartis. *M. L. U.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Elytra singula in dorso protuberant spinis quinque.*
- ruficor- 65. *C. brevirostris*, femoribus muticis, corpore atro, tho-  
nis. race bituberculato, antennis rubris.  
*Habitat in Europa.*
- albinus. 66. *C. brevirostris niger*, fronte anoque albis, thorace tu-  
berculato.  
*Uddm. diff. 27. Curculio niger, aculeis thoracis tri-  
bus, elytrorum sex.*  
*Habitat in Europa.*  
*Color fere Carculionis Lapatii.*
- lineatus. 67. *C. brevirostris griseus*, thorace striis tribus pallidioribus.  
*Fn. suec. 450.*  
*Habitat in Europa.*
- incanus. 68. *C. brevirostris cinereus oblongus*, elytris obtusifascalis.  
*Fn. suec. 452.*  
*Habitat in Europa.*
- cloropus. 69. *C. brevirostris niger*, antennis tibiisque ferrugineis.  
*Habitat in Europa.*  
*Magnitudo Palicis.*
- rufipes. 70. *C. brevirostris cinereus oblongus*, pedibus rufis. *Fn.*  
*suec. 483.*  
*Habitat in Europa.*
- nebulo- 71. *C. brevirostris oblongus canus*, elytris fasciis obliquis  
sus. nigris.  
*Fn. suec. 448. Curculio albo nigroque varius, probos-  
cide planiuscula carinata thoracis longitudine.*  
*Frisch. inf. 11. p. 32. t. 23. f. 3.*  
*Habitat in Europa.*
- ater. 72. *C. brevirostris oblongus ater*, antennis rufis.  
*Habitat in Europa.*
- emeritus. 73. *C. brevirostris niger*, thorace elytrisque spinosis, fron-  
te excavata. *M. L. U.*  
*Habitat in Indiis.*



*Facies tristis aranei. Elytra adpersa verrucis pilosis.  
Abdomen multum elytris tectum.*

barbarus. 74. *C. brevirostris ater, thorace subspinoso, elytris angulo  
duplici crispato.*

*Habitat Algeria. Brander.*

*Magnitudo fere Scarabæi stercorarii. Corpus totum ater-  
rimum. Caput, Thorax, Pedus, Pedes, unctis exca-  
vatis adpersa. Elytra coalitacum debili, ad latera  
inferiora punctis gibbis adpersa; supra in singulo li-  
nea due elevata punctis muricata. Thorax varie  
excavatus, ad latera quasi spina rotundata utrinque  
notabilis.*

cornutus. 75. *C. brevirostris cinereus, thorace elytrisque subspinosis,  
capite cornuto. M. L. U.*

*Habitat in Indiis.*

*Caput angulo utrinque supra antennas & alio utrinque  
supra basin; elytra quasi echinata punctis cum fascicu-  
lo pilorum adjecto.*

16-pun- 76. *C. brevirostris cærulescens, thorace punctis nigris qua-  
tatus. tuor, coleoptris duodecim. M. L. U.*

*Habitat in Indiis.*

*Magnitudo Cræbronis. Caput sulco notatum. Abdomen  
etiam subtus una alterave macula nigra.*

granula- 77. *C. brevirostris viridis striatus punctis nigris elevatis.  
tus. M. L. U.*

*Habitat in Indiis.*

*Magnitudo Scar. stercorarii.*

abbrevia- 78. *C. brevirostris subfuscus, elytris griseis: striis atris gla-  
tus. bris elevatis abbreviatis. M. L. U.*

*Habitat in Indiis.*

*Elytra griseo vellere quasi obducta præter strias & mar-  
gines.*

chinen- 79. *C. brevirostris griseus, elytris abbreviatis, antennis pe-  
lis. ctinatis, podice albo.*

*Habitat in Pisis omnis generis, e China allatis.*

apterus. 80. *C. brevirostris, pedibus muticis, corpore atro, thorace  
spinoso, elytris coadunatis, abdomine punctato.*

*Habitat in India. De Geer.*



*Maximus.* Thorax punctatus cruce quasi inustus. Abdomen subtus trifuriam rubro punctatum. Corpus nigrum.

178. ATTELABUS. Caput postice attenuatum, inclinatum.

Antennæ apicem versus crassiores.

Coryli. 1. A. niger, elytris rubris.

*Fa. suec.* 476. *It. æl.* 153. Curculio niger, elytris rubris, capite postice elongato.

*Habitat in foliis Coryli, quæ in cylindrum convolvit & utrinque claudit.*

furina- 2. A. elytris apice bidentatis.

mentis. *Habitat Salsicami. Rolander.*

*Similis A. pennsylvanico, minus A. coryli. Caput & thorax nigri. Antennæ albo ferrugine annulata. Femora ferruginei: femora annulo basibus albis. Elytra fusca striata, apice bidentata.*

pensyl- 3. A. niger, elytris rubris: fascia media apicisque nigro.

vanicus. *Habitat in Indiana. Kain.*

*Statura præcedentis minor, sed alius & minor. Caput elongatum, nigrum, postice elongatum, maxillis rufis. Antennæ piliformes, obtuse, basi flatiferae. Thorax obovatus, niger, glaber. Elytra rufa, fusca in medio nigra & alba ad apicem. Pedes rufi.*

Betulæ. 4. A. pedibus saltatoriis, corpore toto atro.

*Habitat in Betulæ foliis, quæ pulchre crispa rodendo reddidit. Rolander.*

formica- 5. A. niger, elytris fascia duplici alba basi rubris. *Faun.*

rius.

*suec.* 477. *Fonst. inf.* . . t. 15. *List. mut.* t. 31. f. 1.

*Raj. inf.* 103. n. 29.

*Habitat in Europa.*

lipylus. 6. A. viridis, elytris fascia duplici flava interrupta, thorace hirsuto. *M. L. U.*



*Habitat in Sipylo. Hasselqvist.*  
*Statura & magnitudo A. formicarii.*

apiarius. 7. *A. cærulescens*, elytris rubris, fasciis tribus nigris.  
*Swamm. bibl. . . t. 26. f. 3. Reaum. inf. 6. t. 8. f. 10.*

*Habitat in Germania. P. Forskåhl.*

*Facies A. formicarii, sed duplo major. Corpus totum atro-cærulescens, sed Caput & Thorax pilis nigris pubescentia. Pectus & Abdomen nitidius cærulescentia, ut & Femora postica, quæ longiora. Elytra rubra, fasciis tribus margine repandis atris; quarum prima vix marginem lateralem attingit; postrema in ipso apice elytri, cærulescens. Antennæ nigrae, clavatae.*

mollis. 8. *A. griseus pubescens*, elytris fasciis tribus pallidis.  
*Uddm. diff. 28. t. 1. f. 9. Curculio oblongus ruber, elytris nigris: fascia triplici albicante.*

*Habitat in Europa.*

Ceram- 9. *A. ater*, elytris rugosis.  
 boides. *Uddm. diff. 26. t. 1. f. 1. Curculio maximus ater oblongus, elytris irregulariter reticulatis.*

*Habitat in Boletto fomentario.*

Bupre- 10. *A. ater*, elytris nervosis, thorace subgloboso.  
 stoides. *Fn. suec. 554. Buprestis ater.*

*Habitat in Europa.*

179. CERAMBYX. *Antennæ attenuatae.*  
*Thorax spinosus aut gibbus.*  
*Elytra linearia.*

• *Thorace spinis lateralibus mobilibus.*

longima- 1. *C. thorace spinis mobilibus, elytris basi unidentatis apicis bidentatis, antennis longioribus.*

*Sloan. jam. 2. p. 209. Scarabæus Capricornus maximus nigricans, fasciis elytrorum coccineis & flavis.*

*Grew. mus. 163. t. 13. Merian. surin. t. 28.*

*Vincent. mus. t. 1. fig. infim. media.*

*Roes. inf. 2. scarab. 2. p. 11. t. 1. f. a.*

*Habitat in America.*

*In altero sexu tibiæ anticæ longissimæ, ut in Scar. longimano.*



- trochlea- 2. C. thorace spinis mobilibus, elytris fusco canoque variis:  
ris.  
punctis elevatis.  
*Habitat in India. De Geer.*
- \* \* *Thorace marginato dentibus lateralibus.*
- eervicor- 3. C. thorace marginato dentato, maxillis porrectis corni-  
nis.  
formibus utrinque spinosis, antennis brevibus.  
*Sloan. jam. 2. t. 237. f. 6. Merian. surin. t. 48.*  
*Roes. inf. 2. scarab. 2. p. 12. t. 1. f. 13. Pet. gaz. t. 44. f. 8?*  
*Brown. jam. 429. t. 44. f. 8.*  
*Habitat in America.*  
*Antennæ corpore breviores. Thoracis dentes 3 validi.*  
*Elytra lineata.*
- coriarius. 4. C. thorace marginato-dentato, corpore piceo, elytris mu-  
cronatis, antennis corpore brevioribus.  
*Fn. suec. 480. Cerambyx niger, thorace planiusculo:*  
*marginè utrinque tridentato, coleoptris piceis.*  
*Roes. inf. 2. scarab. 2. t. 1. f. 1. 2.*  
*Gadd sat. 79. Cerambyx cinereo nigricans, antennis &*  
*pedibus rufis.*  
*Habitat in Betulis putridis.*  
*Mas utrinque thorace unidentato, Femina tridentato.*
- cinnamo- 5. C. thorace marginato denticulato, corpore ferrugineo,  
meus.  
elytris mucronatis.  
*Merian. sur. t. 24. f. 1. 2.*  
*Habitat in America.*  
*Thoracis denticulus lateralis posticus validior. Elytra co-*  
*lore cort. cinnamomi.*
- festivus. 6. C. thorace utrinque bidentato, elytris bidentatis viridi-  
bus linea lutea.  
*Habitat in America. Rolander.*  
*Thorax rubro nigroque varius, Antennæ basi rubræ, vix*  
*corpore longiores. Elytra apice bidentata, viridia, stria*  
*duplici elevata; Linea longitudinalis lutea juxta mar-*  
*ginem exteriorem.*
- lineatus. 7. C. thorace marginato dentato, elytris nigris lineis albis,  
antennis compressis brevioribus.  
*Sloan. jam. 2. p. 209. t. 237. f. 34.*  
*Brown. jam. 430. t. 43. f. 7.*  
*Habitat in Jamaica.*



- spinibar- 8. *C. thorace marginato subcrenulato, capite sub maxillis*  
bis. *spinoso scabro, antennis brevibus.*  
*Habitat in America.*  
*Corpus nigrum. Antennæ corpore breviores.*
- \* \* \* *Thorace rotundato, spinis fixis lateralibus mucronato.*
- Batus. 9. *C. thorace spinoso rugoso, elytris bidentatis, antennis*  
*longis uncinato-aculeatis. M. L. U.*  
*Mus. petrop. 652. n. 154. Capricornus niger cornutus.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Antennæ articulis 1-5 subtus aculeo recurvo armatis.*
- Rulus. 10. *C. thorace spinoso, antennis subtus aculeatis, elytris*  
*bidentatis punctis quatuor albis.*  
*Habitat in India. De Geer.*  
*Magnus. Thorax utrinque spina fixa, subtus linea alba.*  
*Elytra lævia, basi punctis rugosa, apice bidentata.*
- ferrugi- 11. *C. thorace spinoso rugoso, elytris fastigiatis subferrugi-*  
neus. *neis, antennis longis.*  
*Habitat in India.*
- Sentis. 12. *C. thorace spinoso lævi, elytris fastigiatis biguttatis,*  
*antennis subtus aculeatis longioribus.*  
*Habitat in India.*  
*Antennæ corpore sesquialongiores. Corpus griseum. Elytra*  
*antice punctis elevatis subscabra. Macule duæ albæ*  
*parvæ longitudinales. Linea alba ab antennis per late-*  
*ra thoracis & abdominis versus anum ducta.*
- farinosus. 13. *C. thorace spinoso niger, elytris punctis albis sparsis*  
*farinosis.*  
*Mérian. surin. t. 24. f. infima.*  
*Habitat in America. De Geer.*
- depressus. 14. *C. thorace quadrispinoso, dorso depresso, elytris ne-*  
*bulosis: antice punctis elevatis sparsis.*  
*Habitat in India. De Geer.*
- glaucus. 15. *C. thorace quinquespinoso glaucus, elytris muricatis*  
*latere fasciæque nigris, antennis longioribus.*  
*Habitat in America. Rolander.*  
*Insectum supra albido-glaucum, subtus fuscum. Tho-*  
*rax supra spinis 4 & quinto in medio posterioribus. Elytra*  
*trun-*



*truncata, unidentata, antice echinato-muricata, lateribus nigra cum lineola, postice quatuor fasciis elytra secante. Antennæ corpore vix duplo longiores.*

lamed. 16. C. thorace spinoso pubescente, elytris fastigiatis lividis, fascia obscura longitudinali flexuosa, antennis brevioribus.

*Fn. swec. 498. Leptura nigra, elytris nigricante lividoque variis.*

*Habitat in Europa.*

nebulosus. 17. C. thorace spinoso, elytris fastigiatis punctis fasciisque nigris, antennis corpore longioribus. *Fn. swec. 483. It. gotl. 273.*

*Habitat in Abietum truncis.*

hispidus. 18. C. thorace spinoso, elytris subpræmorsis, punctisque tribus hispidis, antennis hirtis longioribus.

*Fn. swec. 484. t. 1. Cerambyx cinereus elytris præmorsis nigris fasciaque alba, antennis sesquialongioribus.*

*Habitat in Europa.*

desertus. 19. C. thorace spinoso albo-lineato, elytris bidentatis albo fasciatis, antennis longioribus. *M. L. U.*

*Habitat in America.*

*Thorax lineis 5 albis, quarum laterales sub thoracis margine sunt.*

succinctus. 20. C. thorace bispinoso rugoso, elytris fastigiatis fascia flava, antennis longioribus compressis. *M. L. U.*

*Habitat in America.*

virens. 21. C. thorace spinoso, elytris obrusis, corpore viridi, antennis longioribus, femoribus unidentatis. *M. L. U.*

*Sloan. jam. 2. . . t. 237. f. 39. 40.*

*Brown. jam. 430. t. 43. f. 8.*

*Habitat in India.*

moschatus. 22. C. thorace spinoso, elytris obtusis viridibus nitentibus, femoribus muticis, antennis mediocribus.

*Fn. swec. 478. Cerambyx viridi cæruleicens, antennis corpus subæquantibus.*



INSECTA COLEOPTERA. *Cerambyx*.

*Mouff. ins.* 133. *f. ultima.* *Frisch. ins.* 13. *t.* II.

*Raj. ins.* 31. *n.* 17.

*Habitat in Europa:*

alpinus. 23. *C.* thorace spinoso, coleoptris obtusis fascia maculisque quatuor atris, antennis longis.

*It. scan.* 260. *Cerambyx subcærulescens*, fascia maculique 4 nigris.

*Fonst. ins. t.* 15. *f.* 3.

*Rob. ic.* 8.

*Scheuch. itin.* I. *t.* I. *f.* 5.

*Habitat in Helvetia.*

ædilis. 24. *C.* thorace spinoso: punctis quatuor luteis, elytris obtusis ænulosis, antennis longissimis.

*Fn. svec.* 479. *It. æl.* 8. *Cerambyx nebulosus*, antennis corpore longioribus, thoracis punctis quatuor luteis.

*Pet. gaz. t.* 8. *f.* 8. *Capricornus rufficus.*

*Mouff. ins.* 151. *f.* 2. *Frisch. ins.* 13. *t.* 12.

*Habitat in truncis arborum Europæ.*

futor. 25. *C.* thorace spinoso, elytris obtusis atris subnebulosis, scutello pallido, antennis longissimis.

*Fn. svec.* 482. *Cerambyx ater*, elytris punctatis maculis pallidis sparsis, antennis corpore longioribus; thorace spinoso.

*Gadd. diss.* 27. *Cerambyx nigro nebulosus*, scutello pallido, elytris fusco æneis.

*Habitat in Europa.*

cerdo. 26. *C.* thorace spinoso rugoso nudo, corpore nigro, antennis longis: articulis quatuor primis clavatis.

*Habitat in Italia. M. Kähler. in Germania. Forskåhl.*

*Statura præcedentis; corpus & artus nigra. Elytra apice pallidiora s. picea. Antennæ corpore longiores: articulis 4 primis brevioribus clavatis s. apice rotundatis; reliquis compressis.*

textor. 27. *C.* thorace spinoso, elytris obtusis convexis atris, antennis mediocribus.

*Uddm. diss. n.* 29. *Cerambyx fordide niger*, punctis elevatis sparsis, antennis crassis corporis longitudinem subæquantibus.

*Habitat in Europa.*



- fuligi-  
nator. 28. C. thorace subspinoso niger, elytris cinerascens, antennis brevioribus.  
*Habitat in Germania. P. Forst. Abl.*  
*Minor Ape; totus ater. Antennæ vix corporis longitudine. Thorax rotundatus, parce spinosus. Elytra minus acuta, rore cinereo sordido inquinata.*
- coqvus. 29. C. thorace subspinoso hirsuto, elytris obtusis fulcatis atris antice ferrugineis, antennis mediocribus.  
*Habitat in Canada. Kalm.*  
*Spina thoracis villosi petius digitis quam oculis observantur.*
- cursor. 30. C. thorace spinoso, elytris obtusis rufis margine lineaque nigris, antennis mediocribus.  
*Fn. svec. 481. Cerambyx rufus, coleoptrorum lineis tribus nigris longitudinalibus.*  
*Habitat in Europa.*
- kæhleri. 31. C. thorace spinoso niger, thorace elytrisque macula magna nigra.  
*Habitat in Italia. M. Kæbler.*  
*Magnitudo media. Corpus & artus nigra. Thorax sanguineus macula in tergo magna, rotundata, nigra. Elytra sanguinea: macula magna, ovali, nigra, utroque elytro communi, a medio ad apices fere extensa. Femora apice emarginata, acuta. Antennæ vix corporis longitudine.*
- inquisi-  
tor. 32. C. thorace spinoso, elytris nebulosis fusco subfasciatis, antennis corpore brevioribus.  
*Fn. svec. 485. Cerambyx cinereus nigro nebulosus, antennis corpore dimidio brevioribus, thorace spinoso.*  
*Frisch. inf. 13. t. 14.*  
*β. Fn. svec. 486. Cerambyx cinereus coleoptris fasciis duabus flavis, antennis corpore dimidio brevioribus, thorace spinoso.*  
*Habitat in Europa.*
- fur. 33. C. thorace spinoso gibboso, coleoptris ovatis: fascia duplici albida, antennis filiformibus mediocribus.  
*Fn. svec. 487. Cerambyx testaceus, elytrorum fascia duplici albida, thorace spinoso.*

B b 5

Habi-

Antennæ Breves, quæ corpore breviores; Mediocres quæ longitudine corporis; Longæ quæ corpore longiores sunt, nobis dicuntur.



*Habitat in herbariis, insectorum collectionibus, arboribus exsiccatis, pelliculis, utensilibus, culinis, pessimis nobis hospes.*

*Genere anceps ob Antennas filiformes & quod caput Dermestidis more intra thoracem retrahat incurvatum.*

\* \* \* \* *Thorace inermi subcylindrico.*

careharias. 34. *C. thorace mutico cylindrico, corpore griseo nigro punctato, antennis mediocribus. Fn. suec. 493.*

*Gœd. inf. 2. t. 51. List. gœd. f. 106.*

*Pet. gaz. t. 2. f. 1.*

*Habitat in Europâ.*

scalaris. 35. *C. thorace mutico cylindrico, coleoptris linea flava dentata punctisque flavis, antennis mediocribus. Faun. suec. 494.*

*Habitat in Europa.*

*Variat linea carulescente loco flavæ.*

populneus. 36. *C. thorace mutico cylindrico flavo-lineato, elytris punctis quatuor flavis, antennis mediocribus.*

*Gadd sat. 79. Cerambyx fulco cinereus, antennis nigro alboque variegatis, elytrorum punctis octo luteis.*

*Habitat in Europa.*

cylindricus. 37. *C. thorace mutico cylindrico linea albida, elytris fastigiatis nigris, pedibus anticis pallidis.*

*Rœf. inf. 2. scarab. 2. t. 3.*

*Habitat in Europa.*

*Antennæ vix corpore longiores.*

oculatus. 38. *C. thorace mutico cylindrico luteo: punctis duobus nigris, elytris fastigiatis linearibus nigris.*

*Uddm. diff. 31. Cerambyx ferrugineo-rufus, elytris nigro cinereis punctis excavatis nigris.*

*Habitat in Europa.*

*Antennæ mediocres.*

zonarius. 39. *C. thorace mutico cylindrico rugoso, antennis longioribus, elytris obtusis fuscis: fascia lineari albida.*

*M. L. U.*

*Habitat in America.*



\* \* \* \* \* *Thorace inermi subrotundo s. ex gibbo depresso.*

- ferrati-  
cornis. 40. C. thorace matrico subrotundo, corpore lurido fusco, antennis compositis fere mediocribus.  
*Habitat in Europa.*
- ruficus. 41. C. thorace matrico subrotundo nudo, corpore lurido, antennis brevioribus subulatis.  
*En. p. 22. 42. Cerambyx rufus, punctis thoracis impressis.*  
*Habitat in Europa.*
- femora-  
tus. 42. C. thorace inermi subrotundo, corpore atro, femoribus rubris, antennis mediocribus.  
*Habitat in Germania.*  
*Sequenti dimidio minor, angustior; sola femora rubra. Antenne vix corporis longitudine.*
- viola-  
ceus. 43. C. thorace matrico subrotundo, corpore violaceo, antennis mediocribus.  
*En. p. 22. 43. Cerambyx violaceus nitens, antennis nigris, femoribus clavatis.*  
*Gadl. d. 1. 2. Cantharis nigra, thorace rotundato, elytris cæruleiscentibus.*  
*Frisch. inf. 12. t. 3. ic. 6. f. 1.*  
*Habitat in Europa.*
- auratus. 44. C. thorace dente laterali depresso viridi-auratus, antennis nigris, femoribus posticis cæruleis.  
*Habitat in America. Rolander.*  
*Similis C. violaceo. Caput & Thorax viridi-aurata. Dens thoracis utrinque postice a basi sinu excavatus. Elytra rubro-viridi-aurata. Antennæ nigre, vix corpore longiores. Abdomen & totum corpus subviridianeum. Pedes purpurei: femora postica cærulea.*
- stigma. 45. C. thorace submatrico subrotundo excavato punctato, corpore atro, elytris lævibus: stigmate albo.  
*Habitat in America. Rolander.*  
*Totus niger. Thorax hemisphaericus, submarginatus, punctis numerosis excavatus, postice ad angulum lateralem vix dentibus duobus utrinque excavatus. Scutellum læve, longius quam in reliquis. Elytra lævia, nigra,*



*nigra*, singula pone scutellum lineola extrorsum obliqua alba.

- striatus. 46. *C. thorace mutico subrotundo, corpore nigro, elytris striatis, antennis brevibus.*  
*Habitat in Europa.*
- testaceus. 47. *C. thorace mutico subrotundo glabro, corpore testaceo, antennis mediocribus. Fn. svec. 491.*  
*Habitat in Europa.*
- bajulus. 48. *C. thorace mutico subrotundo villoso, tuberculis duobus, antennis brevibus.*  
*Fn. svec. 489. Cerambyx nigricans, thorace villosō cinereo, punctis duobus glabris.*  
*Frisch. inf. 13. t. 10.*  
β. *Fn. svec. 490. Cerambyx testaceus, thorace villoso cinereo lineolis duabus glabris.*  
*Habitat in Europa; in America septentrionali. Kalm.*
- fennicus. 49. *C. thorace mutico subrotundo tuberculis subferrugineo obsoleto, elytris violaceis, antennis longiusculis.*  
*Uddm. diss. 33. Cerambyx elytris nigro cæruleis apice abdominis ferrugineo.*  
*Habitat in Europa.*
- undatus. 50. *C. thorace mutico subrotundo tuberculato, elytris fasciis duabus undulatis, antennis submediocribus. Fn. svec. 488.*  
*Habitat in Europa.*
- sanguineus. 51. *C. thorace mutico subrotundo elytrisque sanguineis, corpore nigro, antennis mediocribus.*  
*Habitat Upsaliæ in parietibus. Isac. Uddman.*  
*Statura omnino C. Bajuli, at Thorax supra Scutellum.*  
*Elytra, Anus omnino sanguinea, tomento vix conspicuo; reliqua atra. Thorax supra magis lateribus depressus, quam bajulus.*
- castaneus. 52. *C. thorace mutico subrotundo, corporeque nigro, elytris antennis pedibusque ferrugineis, antennis brevioribus.*  
*Habitat in Svecia.*  
*Magnitudo C. undati, sed paulo angustior. Femora postica nigra. Latera thoracis parum rubra. Antennæ corpore breviores. Affinis C. rustico, sed minor.*



180. LEPTURA. *Antennæ* setaceæ.*Elytra* apicem versus attenuata.*Thorax* teretiufculus.\* *Thorace ovato s. antrosum oblongiusculo angustiore. Elytris apice truncatis.*aquatica. 1. *L. deaurata*, antennis nigris, femoribus posticis dentatis.  
*Fn. suec. 509.**Raj. inf. 100.* Cantharis arundines frequentans.β. *Leptura subæneo-violacea*, femoribus posticis dentatis.  
*Fn. suec. 510.**Habitat in* plantis aquaticis, *Nymphæis*, *Caricibus*, *Pheilandrio*, *cujus radice adhæret pupa intra globum brunneum.*melanura. 2. *L. nigra*, elytris rubescentibus lividisve apice nigris. *Fn. suec. 499.**Frisch inf. 12. t. 3. ic. 6. f. 6.* Scarabæus arboreus major violaceo ruber.*Raj. inf. 499.* Cerambyx niger, elytris flavis extremitatibus nigris.*Pet. gaz. t. 30. f. 5.* Capricornus exiguus, vaginis rubentibus apice nigro.*Gad. diff. 27.* *Leptura* thorace nigro nitido, elytris obsolete fordideque flavescentibus.*Habitat in* Europa.rubra. 3. *L. nigra*, thorace elytris tibiisque purpureis. *Fn. suec. 500.*  
*Fn. suec. 497.* *Leptura* nigra, thorace elytrisque rufis.*Frisch. inf. 12. t. 3. ic. 6. f. 6.* Scarabæus arboreus major purpureo-ruber.*Habitat in* Europa.virens. 4. *L. viridi-flava*, antennis luteo viridique variis. *Faun. suec. 496.**Habitat in* Europa.sericea. 5. *L. viridi-cærulea*, elytris subfastigiatis.  
*Habitat in* Europa.4-maculata. 6. *L. nigra*, elytris lividis: maculis quatuor nigris. *Fn. suec. 502.**Habitat in* Europa.



- meridia- 7. *L. nigra*, abdomine pedibus basique elytrorum flavis.  
na. *Habitat in Germania. Forstsch.*  
*Statura L. melanara, sed major; labis antennarum rufa.*  
*Articuli pedum apice nigri. Elytrorum apices praemors.*
- interro- 8. *L. nigra*, elytris lividis: fascia longitudinali aeneata ma-  
gationis. culisque quatuor nigris.  
*Uddm. diff. 35. t. 1. f. 2. Leptura nigra, elytris fusco*  
*flavis: maculis octo nigris.*  
*Habitat in Europa.*
- 6-macu- 9. *L. nigra*, coleoptris testaceis: maculis sex nigris mar-  
lata. gine connexis. *En. swec. 504.*  
*Habitat in Europa.*
- 4-fascia- 10. *L. nigra*, elytris testaceis, fasciis quatuor nigris. *Faun.*  
ta. *swec. 505.*  
*Habitat in Europa.*
- attenuata. 11. *L. elytris fastigiatis attenuatis fulvis: fasciis quatuor*  
nigris, pedibus testaceis.  
*Habitat in Europa.*
- nigra. 12. *L. elytris fastigiatis, corpore nigro nitido, abdomi-*  
ne rufo.  
*Habitat in Europa.*  
*\* \* Thorace subgloboso, nec antice attenuato. Elytris*  
*apice obtusis, nec truncatis.*
- virginea. 13. *L. thorace globoso nigro, elytris violaceis, abdomi-*  
ne rufo.  
*Gadl. diff. 26. Leptura nigra, elytris caeruleiscentibus,*  
*toto abdomine rubro.*  
*Habitat in Europa.*
- collaris. 14. *L. thorace globoso abdomineque rubris, elytris nigris.*  
*Habitat in Europa.*
- rutilica. 15. *L. thorace globoso tomentoso, elytris cinereis: fasciis*  
linearibus albidis undatis.  
*Habitat in Europa.*
- mystica. 16. *L. thorace globoso tomentoso, elytris fusco-cinereis*  
antice rufis: fasciis linearibus arcuatis lataque canis.  
*Habitat in Europa.*



- necyda- 17. L. thorace subglobofo, elytris subulatis mucronatis  
lea. glauco-aureis.  
*Habitat in America. Rolander.*  
*Similis L. aquatica. Elytra attenuata & vere subula-  
ta, glaberrima, glauco-flavescentia, margine purpura-  
scente. Caput nigrum. Antennæ filiformes, nigrae,  
corpore  $\frac{1}{2}$  breviores. Femora clavata. Abdomen ni-  
grum, teres ut ichneumoni, incisuris margine albis.*
- detrita. 18. L. thorace globofo nigricante, elytris fuscis: fasciis  
quatuor transversis flavis, pedibus rufis.  
*Uddm. diss. 31. Cerambyx ferrugineo rufus, elytris ni-  
gro cinereis punctis excavatis nigris.*  
*Habitat in Europa.*
- arcuata. 19. L. thorace globofo nigro, elytris nigris: fasciis linea-  
ribus flavis: tribus retrorsum arcuatis, pedibus ferru-  
gineis.  
*Frisch. inf. 12. t. 3. ic. 4. f. 1. Scarabæus arboreus lu-  
teo pictus.*  
*Uddm. diss. 30. Cerambyx nigris elytris: fasciis 4 flavis  
arcuatis.*  
*Habitat in Europa.*
- arietis. 20. L. thorace globofo nigro, elytris nigris: fasciis flavis:  
secunda anteriorum arcuata, pedibus ferrugineis.  
*Fn. svec. 507. Leptura nigra, elytrorum lineis trans-  
versis flavis, pedibus testaceis.*  
*Raj. inf. 82. n. 22. Scarabæus niger, lineolis luteis  
pulchre variegatus.*  
*Frisch. inf. 12. t. 3. ic. 5. f. 3. List. mut. t. 31. f. 1.*  
*Habitat in Europa.*
- præusta. 21. L. thorace subglobofo fusco, elytris flavis, apice ni-  
gris, pedibus quatuor pallidis.  
*Fn. svec. 506. Leptura nigra, elytris flavis apice nigris.*  
*Habitat in Europa.*
- linearis. 22. L. thorace ovato, corpore cyaneo lineari, antennis  
longioribus. M. L. U.  
*Habitat in India.*  
*Antennæ corpore sesquialongiores. Variat femoribus clava-  
tis & linearibus.*



181. CANTHARIS. *Antennæ setaceæ.*  
*Elytra flexilia.*  
*Thorax planiusculus.*  
*Abdominis latera plicato-papillofa.*

\* *Clypeo semiorbiculato, antice rotundato. Femina aptera.*

Noctilu- 1. *C. oblonga nigra, thorace tenaceo margine laterali nigro. Fr. Svec. 584.*

*Aidrov. inf. 492.*

*Column. ecphr. 1. f. 38. t. 36.*

*Mouff. inf. 109. f. 1. 2. Fost. inf. t. 14. f. 2.*

*Raj. inf. 78. 79.*

*Bracl. nat. 26. f. 3.*

*Uddm. diff. 47.*

*Habitat in Europæ juniperetis graminosis.*

*Corpus nigrum. Elytra punctis excavatis, vix conspicuis.*

*Thorax testaceus totus.*

Pyralis. 2. *C. oblongiuscula fusca, elytris margine rufescentibus, thoraceque intra marginem purpurascente.*

*Habitat in America septentrionali.*

Lampyris. 3. *C. ovata, elytris fuscis: macula marginali triangulari flava.*

*Habitat in America. Rolander.*

*Clypeus thoracis flavus; macula fusca in fronte. Elytra fusca macula flava in medio margin. lateralis. Anus subtus apice flavus.*

ignita. 4. *C. ovata, elytris fuscis: macula marginali ovata lutea.*

*Habitat in America. Rolander.*

*Clypeus antice maculis 2 fuscis. Corpus fuscum. Alæ nigre. Abdomen totum subtus flavum.*

lucida. 5. *C. oblonga, elytris fuscis margine exteriori luteis, abdomine toto subtus flavo.*

*Habitat in America.*

*Simillima C. noctiluca, sed pallidior, & Abdomen totum flavum. Antennæ & Caput nigra.*

phosphorea. 6. *C. oblonga subtestacea, abdomine atro: postice flavissimo.*

*Habitat in America. Rolander.*

*Abdominis segmenta duo ultima flavissima, porisque duobus pertusa. Antennæ nigre.*



- maurita- 7. *C. elytris lividis, corpore fiavo.*  
 nica. *Habitat in Algeria. E. Brander.*  
*Duplo major prima. Clypeus s. thorax, Pectus, Abdo-*  
*men obsolete flava. Elytra exolete subfusca. Femina*  
*s. Aptera triplo major nostrate cum puncto flavo ad*  
*angulum anteriorem cujusvis segmenti corporis.*
- chinen- 8. *C. elytris testaceis apice nigris. Osb. iter. 224. \**  
 sis. *Habitat in Asia.*
- italica. 9. *C. elytris fuscis, thorace rufo: medio nigro.*  
*Habitat in Italia. J. Rathgeb. Equ.*  
*Minor reliquis. Fusca sunt Elytra, Caput, Antenne,*  
*Abdomen, exceptis 2 ultimis segmentis flavis. Thorax*  
*rufus medio macula nigra. Pectus, & Pedes lutei.*  
*Femina nigra, singulo segmento supra ad angulum*  
*marginalem macula testacea; in segmentis tribus pri-*  
*mis majoribus.*
- \* \* *Clypeo planiusculo utrinque truncato s. quadrato: la-*  
*teribus rotundatis marginatis.*
- fusca. 10. *C. thorace marginato rubro macula nigra, elytris fu-*  
*scis. Fn. svec. 586. It. æl. 38.*  
*Raj. inf. 84. n. 29. ♂ 101. n. 2.*  
*Frisch. inf. 12. t. 3. icon. 6. f. 5.*  
*Habitat in Europa frequens.*  
*Sævit sæpe in propriam speciem.*
- livida. 11. *C. thorace marginato, tota testacea.*  
*Fn. svec. 585. C. elytris testaceis, thorace rubro im-*  
*maculato.*  
*Raj. inf. 84. n. 26. Cantharis sepiarius major e rufo*  
*flavicans.*  
*Habitat in Europa.*
- rufa. 12. *C. thorace marginato, tota rufa, epigastrio alisque nigris.*  
*Habitat in Europa.*
- sanguinea. 13. *C. thorace marginato: macula nigra, tota rubra, ely-*  
*tris sanguineis.*  
*Fn. svec. 587. Cantharis elytris rubris, thorace rubro*  
*macula nigra.*

C e

Raj.



*Raj. inf.* 101. n. 4.      *Frisch. inf.* 12. t. 3. ic. 7. f. 2.  
*Habitat in Europa.*

obscura. 14. *C. thorace marginato marginibus rubris, elytris nigris.*  
*Habitat in Europa.*

*Similis C. fuscae, sed duplo minor; abdominis ultima segmenta subtus non rubra, sed nigra, quamvis latera segmentorum rufa. Thorax non rufus macula media fusca, sed niger solis marginibus lateralibus rubris.*

lateralis. 15. *C. thorace marginato rubro, corpore fusco, elytris margine exteriori flavescentibus.*  
*Habitat in Europa.*

ænea. 16. *C. thorace marginato, corpore viridi-æneo, elytris extrorsum undique rubris. Fn. suec. 588.*

*Raj. inf.* 77. *Scarabæus minor, corpore longiusculo, elytris rubicundis.*

*Schæff. monogr.* 1754. t. 2. f. 10, 11.

*Habitat in Europa.*

bipustulata. 17. *C. thorace marginato, corpore æneo-viridi, elytris apice rubris. Fn. suec. 589. It. æl. 127.*

*Raj. inf.* 101. n. 7.

*Habitat sæpe in Caricibus Larva rapax minorum insectorum.*

pedicularia. 18. *C. thorace marginato, corpore atro, elytris apice rubris.*

*Habitat in Europa.*

*Pediculo æqualis, quater minor præcedente.*

fasciata. 19. *C. thorace marginato virescente, elytris nigris: fasciis duabus rubris. Fn. suec. 590.*

*Habitat in Europa.*

biguttata. 20. *C. thorace marginato atro, elytris nigris apice flavis.*  
*Fn. suec. 591.*

*Habitat in Europa.*

minima. 21. *C. thorace marginato rufo macula nigra, corpore fusco, elytris apice flavis. Fn. suec. 592.*

*Fn. suec. 593. Necdalis elytris apice puncto flavo.*

*Habitat in Europa.*



- testacea. 22. *C. thorace marginato flavo macula nigra, corpore nigro, elytris pedibusque lividis.*  
*Fn. swec. 502. Cantharis nigra, elytris lividis.*  
*Habitat in Europa.*
- pectinata. 23. *C. atra, clypei lateribus basique exteriore elytrorum luteis, antennis pectinatis.*  
*Habitat in America. Rolander.*  
*Antennæ atræ, pectinato-serratæ. Elytra atra, striata punctis excavatis.*
- ferrata. 24. *C. flavescens, elytris striatis: fasciisque tribus nigris, antennis ferratis.*  
*Habitat in America. Rolander.*  
*Antennæ compressæ, serratæ, nigre, longitudine corporis.*
- tropica. 25. *C. thorace marginato lateribus rubro, elytris nigris fascia alba, antennis pectinatis. M. L. U.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Elytra lata, submembranacea, apicem versus latiora & rotundata.*
- pectini- 26. *C. thorace orbiculato, elytris rufo-testaceis, anten-*  
 cornis. *nis pectinatis.*  
*Habitat in Europa.*
- \* \* \* *Thorace teretiusculo.*
- cærulea. 27. *C. thorace teretiusculo, corpore cæruleo.*  
*Habitat in Europa.*
- viridissi- 28. *C. thorace teretiusculo, corpore viridi.*  
 ma. *Habitat in Europa.*  
*Hæc dimidio præcedenti minor, cum qua convenit figura thoracis subcylindrica ad Cicindelas accedente, sed neque cornu prominentes, neque maxilla eajerte, neque cursus celer & expeditus.*
- navalis. 29. *C. thorace teretiusculo, corpore luteo, elytris margi-*  
*ne apiceque nigris.*  
*It. Wgoth. 153. t. 2.*  
*Habitat intra Querci lignum.*
- melanu- 30. *C. thorace rotundato, corpore luteo, elytris apice*  
 ra. *nigris.*  
*Habitat in Europa.*



181. ELATER. *Antennæ setaceæ.*

*Corpus* dorso impositum exsiliens  
mucrone thoracis e foramine  
abdominis resiliente.

- oculatus. 1. E. thorace ocellis binis atris : iridibus albis, corpore nigricante. *M. L. U.*  
*Pet. gaz. t. 10. f. 4.* Scarabæus elasticus major, capite bimaculato.  
*Act. anglic. 246. p. 396. n. 13. & 271. p. 842. n. 32.*  
*Habitat in America septentrionali.*
- noctilu- 2. E. thoracis lateribus macula flava glabra. *M. L. U.*  
cus. *Sloan. jam. 2. p. 206. t. 237. f. 1.* Scarabæus medius fuscus, thorace angulato lucem emittente.  
*Brown. jam. 432. t. 44. f. 10.* Elater major fuscus phosphoricus.  
*Habitat in America.*  
*Thoracis ocellis noctu lucet uti Cantharis noctiluca & Cicada laternaria.*
- phospho- 3. E. fuscus, thorace postice maculis duabus flavis glabris.  
reus. *Habitat in America. Rolander.*  
*Similis precedenti, sed dimidio minor. Antennæ setaceæ.*  
*Elytra pilis adpressis fusca, striata. Maculæ s. puncta lutea thoracis, non ad latera, sed intra marginem posticum s. inter dentes thoracis posticos, noctu etiam lucent.*
- brunneus. 4. E. thorace nigro utrinque rufo, elytris corporeque ferrugineis.  
*Habitat in Europa.*
- syriacus. 5. E. thorace rufo, elytris fascia duplici alba, corpore nigro. *M. L. U.*  
*Habitat in Syria. Hasselqvist.*
- cruciatus. 6. E. thorace nigro lateribus ferrugineis, coleoptris flavis : cruce nigra margineque nigro.  
*Habitat in Europa.*
- linearis. 7. E. thorace nigro lateribus rufis, elytris testaceis linearibus.



*Fn. suec.* 582. Elater thorace rubro, elytris griseis.  
*Uddm. diff.* 46. Elater canthariformis niger, ano rufo,  
 elytris ex rufo pallide fuscis striatis.

*Habitat in Europa.*

ruficol- 8. E. thorace rubro nitido antice nigro, elytris corpore-  
 lis. que nigris.

*Fn. suec.* 576. Elater niger, thorace rubro.

*Habitat in Europa.*

mesome- 9. E. thorace margineque elytrorum ferrugineis, corpore  
 lus. elytrisque nigris.

*Habitat in Europa.*

*Antecedenti paulo major. Pectus in medio nigrum. An-  
 nus flavus. Thorax rugis aliquot impressis.*

castaneus. 10. E. thorace testaceo pubescente, elytris flavis apice ni-  
 gris, corpore atro. *Fn. suec.* 573.

*List. loqu.* 387. Scarabæus ex fusco rufescens s. ca-  
 staneus.

*Habitat in Europa.*

ferrugi- 11. E. corpore toto ferrugineo.

neus. *Habitat in Svecia.*

*Reliquis nostratibus major, Thorace obscure ferrugineo.  
 Antennæ serratæ, thorace paulo longiores.*

sangui- 12. E. thorace atro, elytris rubris, corpore nigro. *Faun.*

neus. *suec.* 574.

*Habitat in Europa.*

balteatus. 13. E. thorace atro, elytris antice dimidiato-rubris, cor-  
 pore nigro. *Fn. suec.* 580.

*Raj. inf.* 78. n. 13. Scarabæus minor, longo & angu-  
 sto corpore, elytris bicoloribus e fulvo & nigro,  
 saltatrix.

*Habitat in Europa.*

margina- 14. E. thorace subfusco, elytris testaceis margine undique  
 tus. nigris.

*Habitat in Europa.*

sputator. 15. E. thorace fusco nitido, elytris testaceis, corpore  
 nigro.



- Fn. svec.* 583. Elater niger elytris fuscis, antennis pedibusque rufis.  
*Habitat in Europa.*
- obscurus. 16. E. thorace fusco obicuro, elytris obscure testaceis.  
*Habitat in Europa.*  
*Similimus precedenti, sed latior antennisque brevioribus.*
- trittis. 17. E. thorace atro nitido, elytris basi margineque exteriore lividis.  
*Habitat in Europæ lignis putridis.*
- fasciatus. 18. E. thorace nigricante, elytris nigricantibus: fascia alba undulata.  
*Habitat in Europa.*
- murinus. 19. E. thorace obscure cinereo, elytris cinereo-nebulosis, plantis rufis.  
*Habitat in Europa.*
- tessellatus. 20. E. thorace obscure æneo, elytris fuscis: maculis pallidioribus confertis, unguibus rubris.  
*Gadd sat.* 80. Elater niger, pilis minimis flavo-æneis junctim intermixtis.  
*Habitat in Europa.*
- æneus. 21. E. thorace elytrisque cærulescenti-æneis, pedibus sanguineis.  
*Fn. svec.* 578. Elater viridi-æneus, pedibus fulvis.  
*Habitat in Europa.*
- pectini-cornis. 22. E. thorace elytrisque æneis, antennis pectinatis.  
*Fn. svec.* 575. Elater fusco-viridi-æneus.  
*List. Inq.* 387. *mut. t.* 17. f. 14. Scarabæus nigro-virescens, corniculis altero tantum versu pectinatis.  
*Habitat in Europa.*
- niger. 23. E. thorace elytris pedibus corporeque nigris.  
*Fn. svec.* 577. Elater totus nigro-fuscus.  
*Habitat in Europa.*
- minutus. 24. E. thorace nigro nitido, elytris nigris obscuris.  
*Habitat in Europa.*  
*Magnitudo vix dupla Pediculi.*



183. CICINDELA. *Antennæ* feraceæ.*Maxillæ* prominentes, denticulatae.*Oculi* prominuli.*Thorax* rotundato-marginatus.

- campestris. 1. *C. viridis*, elytris punctis quinque albis. *Fn. suec.* 548.  
*Mouff. ins.* 145. f. *infima.* *Fonst. ins. t.* 16.  
*List. loqu.* 386. *mut. t.* 17. f. 12.  
*Habitat in Europæ campis arenosis.*
- hybrida. 2. *C. subpurpurascens*, elytris fascia lunulisque duabus albis.  
*Habitat in Europa.*
- germanica. 3. *C. viridis*, elytris punctis duobus albis cum lineola apicum.  
*Habitat in Germania. P. Forskål.*  
*Simillima C. campestri, sed triplo minor, tota aeneo-viridis. Elytra viridia apice lineola albicante & punctis 2 albis ad marginem exteriorem.*
- sylvatica. 4. *C. nigra*, elytris fascia punctisque duobus albis.  
*Fn. suec.* 549. *Cicindela atra*, coleoptris maculis sex fasciisque albis.  
*Habitat in Europæ Pinetis.*
- maura. 5. *C. nigra*, elytris punctis sex albis: tertio & quarto confluentibus.  
*Habitat Algeriæ. E. Brander.*  
*Statura C. campestris. Frons alba. Elytra punctis 6 albis longitudinalibus ad marginem exteriorem: sed 3 & 4 transverse positae confluentibus.*
- riparia. 6. *C. viridi-aenea*, elytris punctis latis excavatis. *Fn. suec.* 550. *It. æl.* 38. 121.  
*List. loqu.* 385. *Scarabæus parvus inauratus.*  
*Habitat in Europæ humentibus.*



- aquati- 7. *C. ænea nitida*.  
ca. *Fn. svec.* 558 *Buprestis fusco-ænea nitida*, thorace  
submarginato.  
*List. mut. t.* 31. *f.* 13.  
*Habitat in Europæ aquis.*

184. BUPRESTIS. *Antennæ fetacæ longitudine thoracis.*

*Caput dimidium intra thoracem retractum.*

\* *Elytris fastigiatis.*

- gigantea. 1. *B. elytris fastigiatis bidentatis rugosis*, corpore inaurato. *M. L. U.*  
*Sloan. jam.* 2 *p.* 210. *t.* 236. *f.* 1, 2. *Cantharis maxima*, elytris cuprei coloris fulcatis.  
*Mer. sur.* *t.* 50. *f. infima.* *Grew. mus.* 165. *t.* 13.  
*Habitat in America, Asia.*

- 8-gutta- 2. *B. elytris fastigiatis muticis maculis quatuor albis*, cor-  
ta. pore cæruleo.

*It. scan.* 23. *Uddm. diff.* 42.

*Habitat in Oceano ad Norvegiam.*

*Magnitudine cedit nostratibus majoribus. Antennæ nigre longitudine thoracis. Caput nigrum aut cæruleum, lineola alba ante oculos. Thorax niger aut cæruleus margine albo. Elytra nigra aut cærulea striata, obtusissima, maculis octo albis longitudinaliter digestis. Abdomen cæruleum cum linea alba utrinque versus basin transversa, & in singulo segmento utrinque par punctorum alborum, ut sint sub abdomine macule 18 albæ. Pedes cærulei cum puncto albo in femoribus quatuor posterioribus. Variat colore cæruleo, nigro, aureo absque vel cum maculis.*

\* \* *Elytris versus apicem ferratis.*

- gnita. 3. *B. elytris ferratis*, thorace impresso, corpore inaurato, tibiis teretibus. *M. L. U.*  
*Grew. mus.* 166. *t.* 13. *Beetle.*  
*Pet. gaz t.* 20. *f.* 8. *vel t.* 48. *f.* 5?  
*Habitat in Indiis.*  
*Elytra apice imprimis colore auri candefacti.*

4. B.



- stricta. 4. B. elytris ferratis fulcatis, tibiis angulatis, abdomine glabro. *M. L. U.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Thorax a tergo minime impressus.*
- sternicor- 5. B. elytris ferrato-tridentatis, thorace punctato, pectore nis.  
 antrorsum mucronato: corpore inaurato. *M. L. U.*  
*Grew. mus. 167. t. 13. Carabus orientalis crassus.*  
*Habitat in India.*  
*Elytra basi notata puncto depresso latiore, colore variant.*
- mariana. 6. B. elytris ferratis longitudinaliter rugosis: maculis duabus impressis, thorace sulcato.  
*Fn. svec. 557. Buprestis æneo-nitida supra cinerea, coleoptris apice attenuatis.*  
*Pet. gaz. t. 2. f. 2. Cantharis marianus viridis perelegans, vaginis fulcatis signaturis flavescentibus notatis.*  
*Habitat in Europa, America.*
- chryso- 7. B. elytris ferratis longitudinaliter fulcatis, maculis tigma.  
 duabus aureis impressis, thorace punctato.  
*Fn. svec. 556. Buprestis fusco-ænea, elytris maculis æneis impressis.*  
*Habitat in Europa.*
- rustica. 8. B. elytris striatis, thorace punctato.  
*Fn. svec. 555. Buprestis viridi-ænea immaculata.*  
*Habitat in Europa.*  
 \* \* \* *Elytris integris.*
- fascicu- 9. B. elytris integerrimis striatis: punctis fasciculato-villo- laris.  
 sis, corpore inaurato hirsuto. *M. L. U.*  
*Seb. mus. 2. p. 22. t. 20. f. 5. Scarabæus amboinensis.*  
*Pet. gaz. t. 13. f. 5. Scarabæus obscure viridis aureus papillis pilis albis obsitis undique hirtus.*  
*Habitat in India.*  
*Elytra punctis quintuplici serie digestis, barbato-fasciculatis.*
- hirta. 10. B. elytris integerrimis, pedibus ferrugineis, corpore hirsuto. *M. L. U.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Thorax & Elytra hirta.*



- nitidula. 11. B. elytris integerrimis, thorace marginato utrinque depresso, corpore nitidissimo.  
*Habitat in Europæ aquosis.*  
*Magnitudo Culicis. Corpus undique nitidissimum & colore varians e viridi, cæruleo aut aureo.*
- bimaculata. 12. B. elytris integerrimis striatis macula rubra, corpore fusco-viridi. *M. L. U.*  
*Habitat in India.*  
*Elytra striis elevatis glabris cum interjectis minoribus crenulatis.*
- tristis. 13. B. elytris integerrimis marginatis, corpore cupreo, abdomine punctis decem nigris. *M. L. U.*  
*Habitat in Indiis.*
- cuprea. 14. B. elytris integerrimis, thoracis lateribus scabris, scutello tuberculari, corpore cupreo lævi. *M. L. U.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Scutelli loco punctum prominens.*
- nobilis. 15. B. elytris integerrimis: fasciis linearibus duabus undatis inauratis, corpore fusco. *M. L. U.*  
*Habitat in Indiis.*
- 4-punctata. 16. B. elytris integerrimis punctatis, thorace punctis quatuor impressis, corpore obscuro.  
*Fn. suec. 559. Buprestis atra, thorace punctis impressis.*  
*Habitat in Europa.*
- minuta. 17. B. elytris integerrimis transverse rugosis, thorace subtrilobo lævi, corpore ovato.  
*Habitat in Europa.*
- viridis. 18. B. elytris integerrimis linearibus punctatis, thorace deflexo, corpore viridi elongato.  
*Habitat in Europa.*
- linearis. 19. B. lineari-oblonga murino-ænea, thorace postice trilobo.  
*Habitat in America. Rolander.*



185. DYTISCUS. *Antennæ* setaceæ aut clavato-perfoliatæ.

*Pedes* postici villosi, natatorii, submutici.

\* *Antennis perfoliatis.*

piceus. 1. D. *antennis perfoliatis*, corpore lævi piceo acuminato.  
*Fn. svec.* 561. Dytiscus *antennis perfoliatis fuscis.*  
*Lyonnet less. tab.* 1, f. 15. 16. 12.  
*Habitat in Europa.*  
*Nidus natans mucrone eminente instructus.*

caraboides. 2. D. *antennis perfoliatis*, corpore glabro striis aliquot recurvis.  
*Fn. svec.* 562. Dytiscus *antennis perfoliatis nigris*, elytris lævibus.  
*Rœs. aqu.* 1. t. 4. f. 1. 2.  
*Habitat in Europa.*

fuscipes. 3. D. *antennis perfoliatis*, elytris striatis margine lividis, pedibus fuscis. *Fn. svec.* 563.  
*Habitat in Europæ Aquis.*

\* \* *Antennis setaceis.*

latissimus. 4. D. niger, elytrorum marginibus dilatatis linea flava.  
*Fn. svec.* 564.  
*Frisch. inf.* 2. t. 7. f. 1, 2. Scarabæus aquaticus magnus niger margine luteo.  
*Habitat in Europæ Aquis.*

marginalis. 5. D. niger, thorace elytrorumque margine flavis. *Fn. svec.* 565.  
*Raj. inf.* 93. n. 1. *Mouff. inf.* 164. f. bona.  
*Aldr. inf.* 707. *List. mut. t.* 5. f. 2.  
*Rœs. inf.* 2. *aquat.* 2. p. 7. t. 1. f. 9. 10.  
*Habitat in Europæ Aquis.*

striatus. 6. D. fuscus, elytris transverse subtilissime striatis.  
*Habitat in Europæ aquosis.*

fuscus. 7. D. fuscus, elytris transverse substriatis.  
*Habitat in Europæ Aquis.*

8. D.

Dytisci Larvæ subaquaticæ sunt voracissimi aquatiliùm Crocodyli. Volatilia noctu exeunt volitantque ad alias aquas.



- cinereus. 8. *D. cinereus*, elytrorum margine thoracisque medietate flavis. *Fn. svec.* 566.  
*Hoffm. inf.* 2. t. 12. *List. mut.* t. 5. f. 1.  
*Rœs. inf.* 2. aqu. 1. t. 3. f. 6.  
*Habitat in Europæ Aquis.*
- canistria-9. *D. fuscus*, elytris feminae sulcis dimidiatis decem villosis.  
*α.* *Dytiscus supra fuscus, subtus ater.* *Fn. svec.* 568.  
*β.* *Dytiscus elytris striis viginti dimidiatis.* *Fn. svec.* 567.  
*Raj. inf.* 94. n. 2. *Hydro-Cantharus elytris striatis f. canaliculatis.*  
*Frisch. inf.* 2. t. 7. f. 4. *Rœs. inf.* 2. aqu. 1. t. 1. f. 10.  
*Habitat in Europæ Aquis.*
- fulcatus. 10. *D. elytris sulcis decem longitudinalibus.* *Fn. svec.* 569.  
*Frisch. inf.* 13. p. 13. t. 7. *Rœs. aquat.* 1. t. 3. f. 7.  
*Bradl. natur.* t. 26. f. 2. *A.*  
*Raj. inf.* 569. *Hydrocantharus minor, corpore rotundato plano.*  
*Habitat in Europæ Aquis.*
- erythrocephalus. 11. *D. ovato-oblongus niger, capite pedibusque rufis.* *Fn. svec.* 570.  
*Habitat in Europæ Aquis.*
- maculatus. 12. *D. ovatus niger, thorace nigro fascia pallida, elytris albo-maculatis.*  
*Uddm. diff.* 43.  
*Habitat in Europæ Aquis.*
- minutus. 13. *D. elytris fuscis basi lateribusque pallidis, thorace flavo immaculato, corpore ovato.*  
*Habitat in Europæ aquosis.*  
*Elytra punctis vix conspicuis adpersa.*  
 \* \* \* *Antennis clavatis.*
- natator. 14. *D. ovatus glaber, antennis capite brevioribus obtusis.* *Fn. svec.* 572.  
*Pet. gaz.* t. 13. f. 9. *Scarabæus niger supra aquam velociter circumnatans.*

*Raj.*



*Raj. inf.* 87. n. 9. Scarabæus  $\nabla$  subrotundus e cæruleo viridi splendente undique tinctus.

*Rœf. app.* 1. p. 195. f. 31.

*Habitat in Europæ lacubus, cursitans supra aquam velocissime; in America. Kalm.*

Scara- 15. D. ovalis convexus ater lævissimus, antennis filiformibus triarticulatis.

*Rœf. inf.* 2. aqu. 1. t. 4.

*Habitat in Europæ aquis.*

*Magnitudo Scarabæi.*

186. CARABUS. *Antennæ setaceæ.*

*Thorax* obcordatus apice truncatus, marginatus.

*Elytra* marginata.

\* *Majores.*

coria- 1. C. apterus ater opacus, elytris punctis intricatis subrugosis.

*Habitat in Germania. P. Forskål.*

*Inter maximos Europæos numerandus. Totus ater, lævis. Elytra absque sulcis ex punctis confusis excavatis confluentibus confertis. Antennæ corpore breviores.*

granula- 2. C. apterus, elytris longitudinaliter punctatis.

tus, *Fn. suec.* 511. Carabus ater, elytris convexe punctatis striatisque.

$\beta$ . Carabus niger, elytris subvirescentibus convexe punctatis striatisque. *Fn. suec.* 512.

$\gamma$ . Carabus purpurascenti-niger, elytris convexe punctatis striatisque. *Fn. suec.* 513.

*Raj. inf.* 96. n. 2. Cerambyx purpurea punctata.

*List. mut. t.* 18. f. 4. *Hoffm. inf.* 2. t. 3.

*Habitat in Lignis putridis.*

leucoph- 3. C. apterus, elytris lævibus: striis obsoletis octonis.

thalmus. *Fn. suec.* 515. Carabus ater, elythro singulo striis octo.

*Habitat in Europa.*

*Thorax, ratione magnitudinis insecti, minor quam in reliquis.*

4. C.

Carabi Larvæ sæpe intra Ligna putrida, muscos, terram &c. degunt; Volatilia vero insectorum imprimis Larvarum Leones sunt, cursu festinantes.



- nitens. 4. *C. apterus*, elytris porcatis: sulcis scabriusculis inauratis.  
*Fn. Svec. 517. ♂ 518. It. æl. 96.*  
*Raj. inf. 96. n. 6. Cerambyx dorso in longas rugulas*  
*diviso, omnium pulcherrimus.*  
*Habitat in Europæ sylvis.*
- hortensis. 5. *C. apterus*, elytris porcatis: punctis æneis excavatis  
 triplici serie.  
*Habitat in Europæ sylvis, Hortis.*
- violaceus. 6. *C. alatus*, elytris læviusculis nigris margine aureo, tho-  
 race subviolaceo. *Fn. Svec. 516.*  
*Frisch. inf. 13. t. 23. Scarabæus terrestris nigricans.*  
*Raj. inf. 96. n. 1. Scarabæus major, corpore oblongo,*  
*e purpura nigricans.*  
*Habitat in Europæ sylvis.*
- cephalotes. 7. *C. apterus*, elytris atris lævibus, thorace exserto oblongo.  
*Frisch. inf. 13. p. 25. t. 22. Scarabæus.*  
*Habitat in Europa.*
- inquisitor. 8. *C. elytris striatis viridi-æneis: punctis triplici ordine.*  
*Roland. act. Stockh. 1750. p. 292. t. 7. f. 3. Carabus ala-*  
*latus viridi-æneus, concave punctatis striatisque, pedi-*  
*bus antennisque nigris.*  
*Habitat in Europæ arboribus larvis Papilionum Phala-*  
*narumque victitans.*  
*Elytra aurata margine viridi. Thorax brevissimus.*
- lycophanta. 9. *C. aureo-nitens*, thorace cæruleo, elytris aureo-vi-  
 ridibus striatis, abdomine subatro.  
*Reaum. inf. 2. t. 37. f. 18.*  
*Habitat in Europa.*  
*Maximus europæus. Caput & Antennæ nigra; mar-*  
*gines thoracis elytrorumque aurei. Elytra striis 15*  
*crenatis.*
- \* \* *Minores.*
- lividus. 10. *C. thorace ferrugineo, elytris nigris: lateribus lividis.*  
*Habitat in Europa.*
- crepitans. 11. *C. thorace capite pedibusque ferrugineis, elytris*  
*nigris.*



*Roland. Act. Stockh. 1750. p. 292. t. 7. f. 2.* Cicindela capite thorace pedibusque rufis, elytris nigro-cæruleis.

*Habitat in Europa.*

americana- 12. C. niger, thorace pedibus antennisque ferrugineis.

nus. *Habitat in America. Rolander.*

*Similis C. crepitanti, sed quadruplo major.*

spinipes. 13. C. piceus, thorace linea excavata longitudinali, manibus spinosis.

*Habitat in Europa.*

*Postice pallidior est.*

cyanoccephalus. 14. C. thorace pedibusque ferrugineis, elytris capiteque cyaneis.

*Fn. suec. 525.* Carabus capite elytrisque cæruleis, thorace rubro.

*Habitat in Europa.*

melanocephalus. 15. C. thorace pedibusque ferrugineis, elytris capiteque atris.

*Fn. suec. 526.* Carabus capite elytrisque atris, thorace rubro.

β. *Fn. suec. 524.* Carabus niger, thorace antennis pedibusque ferrugineis.

*Habitat in Europa.*

vaporariorum. 16. C. thorace fusco, pedibus antennis elytrisque antice ferrugineis.

*Fn. suec. 529.* Carabus ater, elytris antice griseis.

*Habitat in Europa.*

latus. 17. C. niger, pedibus antennisque rufis. *Fn. suec. 521.*

*Habitat in Europa; in America septentrionali. Kalm.*

ferrugineus. 18. C. ferrugineus, thorace glaberrimo.

*Habitat in Europa.*

germanus. 19. C. niger, capite pedibus elytrisque testaceis, elytris apice violaceis.

*Habitat in Germania. P. Forškål.*

vulgaris. 20. C. nigro-æneus, pedibus antennisque nigris. *Faun.*

*suec. 527.*

*Habitat in Europa.*



- cærule- 21. C. nigro-cæruleus, antennis basi rubris.  
scens. *Habitat in Europa.*
- cupreus. 22. C. æneus, antennis basi rubris.  
*Habitat in Europa.*
- piceus. 23. C. niger, pedibus antennisque piceis.  
*Habitat in Europa.*
- margina- 24. C. niger, elytris margine flavis.  
tus. *Habitat in Europa.*  
*Corpus totum viridissimum. Elytra vix manifeste stria-  
ta. Thoracis margo ferrugineus, sed vix conspicuus.*  
*Elytrorum margo exterior omnino flavus. Pedes sub-  
fusci. Antennæ nigrae. Variat capite thoraceque æneis.*
- multipun- 25. C. subæneus, elytris punctis vagis plurimis impressis.  
ctatus. *Habitat in Europa.*
- 6-puncta- 26. C. subæneus, elytris punctis longitudinalibus sex im-  
tus. pressis.  
*Fn. svec. 519. Carabus nitens, capite thoraceque cya-  
neo, elytris purpureis.*  
*Habitat in Europa.*
- ustulatus. 27. C. thorace nigricante, elytris obscuris bifasciatis.  
*Fn. svec. 528. Carabus niger, coleoptris pone fascia  
ferruginea; lateribus macula ferruginea.*  
*Habitat in Europa.*
- crux ma- 28. C. thorace capiteque nigro-rubescente, coleoptris fer-  
jor. rugineis cruce nigra.  
*Habitat in Europa.*
- crux mi- 29. C. thorace luteo glabro, elytris postice nigris: ma-  
nor. culis duabus flavis.  
*Habitat in Europa.*
- 4-macu- 30. C. thorace flavo, elytris obtusissimis fuscis: maculis  
latus. duabus albis.  
*Fn. svec. 532. Carabus niger, thorace ferrugineo, ely-  
trorum maculis 4 lividis.*  
*Habitat in Europa.*
- atricapil- 31. C. flavus, capite nigro, elytris obtusissimis.  
lus. *Habitat in Germania. P. Forstål.*



187. TENEBRIO. *Antennae* moniliformes articulo ultimo subrotundo.

*Thorax* plano-convexus, marginatus. *Caput* exsertum.

*Elytra* rigidiuscula.

\* *Alati.*

molitor. 1. *T. niger* totus.

*Fn. suec.* 547. Mordella antennarum articulis lentiformibus: ultimo globoso.

*Frisch. inf.* 4. p. 1. t. 1.

*Habitat in* Farina *florum, Molendinis, Pane sicco, Saccharato.*

*Larva pallida, 13 segmentis, glabra, Lusciniis accepta.*

mauritanicus. 2. *T. niger* subtus piceus, thoracis marginibus antice posticeque dente angulatis.

*Habitat* Algeriæ. *E. Brander.*

*Similis precedenti, sed quintuplo minor, supra totus niger, subtus, pedibus antennisque, piceus. Elytra striata. Thoracis margo antice dente utrinque prominulo, & postice dente obsoleto.*

culinaris. 3. *T. ferrugineus*, elytris striatis.

*Fn. suec.* 546. Mordella ferrugineo-rufa, thorace antice depresso.

*Habitat in* quisquiliis.

barbarus. 4. *T. ater* glaberrimus, thorace orbiculato, capitis clypeo antice margine elevato.

*Habitat in* Mauritania. *E. Brander.*

*Glaber & nitidus, magnitudinis Carabi mediocris; Elytra coherent postice vix acuta.*

Fossor. 5. *T. piceus*, digitis anticis palmato-digitatis.

*Habitat in* collibus arenosis, quos perfodit Upsaliæ. *Roslander.*

*Pedes anteriores Scarabæi, dentati; Thorax postice magis elongatus. Præcedentibus quadruplo minor.*

D d

6. T.

*Tenebrionis Larvæ vivunt in suffocatis locis & quisquiliis; plures in farina aliisque cibariis,*



- Cursor. 6. *T. fuscus*, thorace oblongo: angulis quinque denticulatis.  
*Habitat in Sveciæ domibus.*  
*Longitudo Pediculi, subcylindricus, angustus.*
- pedicula- 7. *T. niger*, elytris fasciis duabus flavis latis.  
 rius. *Habitat in Europa.*
- erraticus. 8. *T. niger*, antennis thorace suborbiculato elytrisque ferrugineis, elytris apice fuscis.  
*Habitat in Europa.*
- pallens. 9. *T. pallide testaceus.*  
*Habitat in Europa.*
- \* \* *Apteri.*
- mortifa- 10. *T. apterus*, coleoptris mucronatis.  
 gus. *Fn. svec. 594. Tenebrio ater, coleoptris acuminatis.*  
*Mouff. inf. 139. Blatta foetida. Aldr. inf. 499.*  
*Fonst. inf. t. 16. f. . . Frisch. inf. 13. t. 25.*  
*Pet. gaz. t. 24. f. 7. Scarabæus impennis tardipes.*  
*Habitat in umbrosis suffocatis.*
- murica- 11. *T. apterus*, coleoptris obtusis: striis muricatis. *M. L. U.*  
 tus. *Pet gaz. 11. t. 92. f. 14.*  
*Habitat in Hispania.*
- cæruleus. 12. *T. apterus cærulescens*, thorace suborbiculato, coleoptris obtusis.  
*Pet. gaz. t. 22. f. 6. List. angl. app. 4. f. 14.*  
*Habitat in Hispania.*
- angula- 13. *T. apterus*, thorace teretiusculo, coleoptris angulatis.  
 tus. *M. L. U.*  
*Habitat in Ægypto.*  
*Elytra singula striis 4 elevatis: tertia laterali elevata carinata crenata.*
- Caraboi- 14. *T. apterus*, thorace ovali marginato, coleoptris carinatis.  
 des. *Fn. svec. 595. Tenebrio ater, coleoptris pone rotundatis, maxillis prominentibus.*  
*Habitat in Europa.*



188. MELOE. *Antennæ* moniliformes articulo ultimo ovato.

*Thorax* subrotundus.

*Elytra* mollia, flexilia.

*Caput* inflexum, gibbum.

\* *Apteri elytris abbreviatis absque alis.*

Profca- 1. *M. apterus*, corpore violaceo.  
rabæus. *Fn. suec.* 596. *Mouff. inf.* 162. f. med.  
*Fonst. inf.* t. 15. *Gœd. inf.* 2. t. 42.  
*Frisch. inf.* 6. t. 6. f. 5. *Lit. gœd.* f. 120.  
*Clut. hemerob.* 31. 73. *Vermis majalis.*  
*Habitat in apricis campis, edit Ranunculos, Veratrum;*  
*vernalis.*

majalis. 2. *M. apterus*, segmentis dorsalibus abdominis rubris.  
*Frisch. inf.* 6. t. 6. f. 4. *Proscarabæus alter.*  
*Habitat in Europa australiore; in America. Kalm; in*  
*Africa. E. Brander.*

\* \* *Alati elytris longitudine corporis alas tegentibus.*

vesicato- 3. *M. alatus viridissimus.*  
rius. *It. scan.* 186. *Cantharis officinarum.*  
*Mouff. inf.* 144. *Fonst. inf.* t. 7.  
*Raj. inf.* 101. *Aldr. inf.* 276.  
*Habitat in Ligustro, Fraxino, Sambuco.*  
*Officinalis pro vesicatorio.*

syriacus. 4. *M. alatus viridi-cæruleus*, thorace luteo. *M. L. U.*  
*Habitat in Syria.*

Cichorii. 5. *M. alatus niger*, thorace hirsuto, elytris fasciis tribus  
flavis.  
*Hasselqv. iter.* 410. n. 101. *Chrysomela cichorii.*  
*Imperat. nat.* 78. *Cantharis fasciata*  
*Habitat in Cichoriis totius orientis.*  
*Magnitudine accedit ad Proscarabæum. Fascia prima*  
*elytrorum ad eorum basin; ultima ante eorum apicem*  
*reliquis magis undata. An Cantharides Imperati?*  
*Variat maculis elytrorum; in quibusdam, loco cujusvis*  
*fasciæ, maculæ duæ nigrae.*



algericus. 6. *M. alatus niger*, elytris testaceis.

*Habitat* Algeriæ.

*Statura* *Cantharidis*. *Elytra* *flexilia*.

Schæffe- 7. *M. alatus viridis*, pedibus luteis, antennis abbreviatis clari-  
ri. vatis brevibus irregularibus.

*Habitat* in Germania. Schæffer.

*Statura* *M. vesicatorii*, sed dimidio minor. *Antennæ* luteæ, vix thorace longiores, terminatæ capitulo compresso fusco, infimo articulo crasso. *Palpi* gibbi.

floralis. 8. *M. alatus niger*, elytris fasciis duabus ferrugineis obsoletis.

*Habitat* in Floribus *Cardui* Europæ.

*Vix* *Pediculo* major.

189. MORDELLA. *Antennæ* filiformes.

*Caput* inflexum sub collo.

*Elytra* deorsum curva apicem versus.

*Ante* femora lamina lata ad basin abdominis.

aculeata. 1. *M. atra*, abdomine spina terminato.

*Fr. svec.* 534. *Mordella oblonga atra*, cauda aculeo terminata.

*Habitat* in Europa.

humera- 2. *M. atra*, lateribus thoracis baseosque elytrorum flavescens.  
lis. scentibus.

*Habitat* in Europa.

frontalis. 3. *M. atra*, fronte pedibusque flavescens.

*Habitat* in Europa.

thoraci- 4. *M. atra*, capite thoraceque flavis.

ca.

*Habitat* in Europa. T. Holm.

flava. 5. *M. flava*, elytrorum apicibus nigris.

*Habitat* in Europa.



190. NECYDALIS. *Antennæ fetaceæ.*  
*Elytra dimidiata. Alæ nudæ.*  
*Cauda simplex.*

major. 1. N. elytris ferrugineis immaculatis, antennis corpore brevioribus.  
*Schæff. monogr. 1753. f. 1, 2. Musca-Cerambyx major.*  
*Habitat in Europa.*

minor. 2. N. elytris testaceis: apice lineola alba, antennis corpore longioribus.  
*Fn. suec. 697. Necydalis elytris flavis lineola alba.*  
*It. æl. 74.*  
*Schæff. monogr. 1753. f. 6, 7. Musca Cerambyx minor.*  
*Habitat in Europa.*

191. STAPHYLINUS. *Antennæ moniliformes.*  
*Elytra dimidiata. Alæ rectæ.*  
*Cauda simplex exserens duas vesiculas oblongas.*

hirtus. 1. S. hirsutus niger, thorace abdomineque postice flavis.  
*Fn. suec. 601.*  
*Schæff. monogr. 1754. t. 2. f. 12.*  
*Habitat in locis arenosis.*

murinus. 2. S. pubescens cinereus nigro-nebulosus. *Fn. suec. 602.*  
*Habitat in fimo equino.*

maxillo- 3. S. pubescens niger, fasciis cinereis, maxillis longitudine  
 fus. capitis.  
*Fn. suec. 603. Staphylinus ater glaber, maxillis longitudine capitis.*  
*Raj. ins. 109. n. 1. Staphylinus major totus niger.*  
*List. loqu. 391. Scarabæus majusculus niger forcipibus infestis.*  
*Mouff. ins. 197. Fonst. ins. t. 17. f. 1. 2. 3.*  
*Habitat in sylvis Europæ.*  
*Junior undique tomentosus per elytra & abdomen, cum fascia cinerea elytrorum & abdominis; provecior glaber & totus ater evadit.*



- erythro- 4. *S. ater*, elytris pedibusque rufis. *Fn. svec.* 604.  
 pterus. *Frisch. inf.* 5. t. 25 *Scarabæus rapax*, elytris brevibus.  
*Habitat sæpius in fimo.*
- politus. 5. *S. niger*, thorace elytrisque nigricantibus nitidissimis.  
*Fn. svec.* 605 *Staphylinus niger*, thorace æneo nitido,  
 elytris atro-cæruleis.  
*Habitat in Europa.*  
*Variat capitis thoracis elytrorumque colore nigro & vi-*  
*ridi s. cærulescenti-æneo.*
- rufus, 6. *S. rufus*, capite elytrorum abdominisque posticis nigris.  
*Fn. svec.* 606.  
*Gadd sat.* 80. *Staphylinus pallide rufus*, elytris cæru-  
 lescentibus, capite & apice abdominis nigro.  
*Habitat in Europa.*
- riparius. 7. *S. rufus*, elytris cæruleis, capite abdominisque apice  
 nigris.  
*Fn. svec.* 607. *It. gotl.* 173.  
*Habitat in Europa.*
- ligno- 8. *S. fuscus*, elytris futura abdomine pedibusque ferrugineis.  
 rum, *Fn. svec.* 608.  
*Habitat in Europa.*
- subterra- 9. *S. niger*, elytris antice extrorsum flavis, pedibus nigris.  
 neus. *Habitat in Europa.*
- flave- 10. *S. ater*, pedibus rufis, elytrorum margine flavo. *Fn.*  
 scens. *svec.* 610.  
*Habitat in Europa.*
- 2-gutta- 11. *S. niger*, elytris puncto fulvo.  
 tus. *Habitat in Europa.*
- littoreus. 12. *S. niger*, elytris antice griseis, pedibus rufis. *Fn. svec.*  
 611. *It. gotl.* 173.  
*Habitat in littoribus.*
- sanguini- 13. *S. niger*, elytris sanguineis. *Fn. svec.* 612.  
 neus. *Habitat in Europa.*
- Caraboi- 14. *S. flavus*.  
 des. *Fn. svec.* 613. *Staphylinus totus testaceus*.  
*Habitat in Europa.*



- chryso- 15. *S. niger*, thorace elytris pedibusque subtestaceis. *Faun.*  
melinus. *svec.* 614.  
*Habitat in Europa.*
- flavipes. 16. *S. niger*, elytris antennis pedibusque ferrugineis. *Fn.*  
*svec.* 615.  
*Habitat in Europa.*
- fuscipes. 17. *S. niger*, elytris tibiisque fuscis. *Fn. svec.* 616.  
*Habitat in Europa.*
- rufipes. 18. *S. ater glaber*, pedibus rufis. *Fn. svec.* 609.  
*Habitat in Europa.*
- Boleti. 19. *S. fuscus*, elytris pallidioribus, antennis pedibusque li-  
vidis.  
*Habitat in Boletis abietinis gregarius, cujus fistulas, tan-*  
*quam Apis suos favos cellulosos, intrat jucundo specta-*  
*culo. Rolander.*  
*Palice dimidio minor & inter minima insecta.*

192. FORFICULA. *Antennæ setaceæ.*  
*Elytra dimidiata. Alæ rectæ.*  
*Cauda forcipata.*

- auricula- 1. *F.* elytris apice albis. *Fn. svec.* 599.  
ria. *Mouff. inf.* 171. *f. infima.* Forficula f. *Auricularia*  
*vulgaris.*  
*Frisch. inf.* 8. *p.* 31. *t.* 15. *f.* 1, 2. *Vermis auricu-*  
*larius.*  
*Fonst. inf. t.* 16. *f.* 2. *Merian. inf. t.* 30.  
*Pet. gaz. t.* 74. *f.* 5.  
*List. loqu.* 391. *mut. t.* 31. *f. A.* *Scarabæus subrufus,*  
*cauda forcipata.*  
*Habitat in Europa.*
- minor. 2. *F.* elytris testaceis immaculatis.  
*Fn. svec.* 600. Forficula alis elytræ concoloribus.  
*Habitat in Europa.*



193. BLATTA. *Caput inclinatum.*

*Antennæ fetaceæ.*

*Elytra Alæque planæ, subcoriaceæ.*

*Thorax planiuculus, orbiculatus, marginatus.*

*Pedes cursorii.*

*Cornicula duo supra caudam.*

gigantea. 1. *B. livida, thoracis clypeo macula quadrata fusca. M. L. U.*

*Habitat in America.*

*Diametro ovi gallinæci.*

ægyptiaca. 2. *B. atra, thoracis margine antico albo. M. L. U.*

*Habitat in Ægypto.*

surinama. 3. *B. livida, thoracis margine antico albo.*

*Habitat Surinami.*

americana. 4. *B. ferruginea, thoracis clypeo postice exalbido.*

na.

*Habitat in America.*

*Major B. orientali, sed simillima. Elytra Alæque corpore longiores. Antennæ longæ.*

nivea. 5. *B. alba, antennis flavis.*

*Habitat in America.*

*Magnitudo Tabani.*

africana. 6. *B. cinerea, thoracis clypeo villoso. M. L. U.*

*Habitat in Africa.*

*Similis B. ægyptiacæ, sed minor & villosa.*

orientalis. 7. *B. ferrugineo-fusca, elytris fulco oblongo impresso.*

lis.

*Fn. svec. 617.*

*Mouff. inf. 138. f. 2. 3. Blatta molendinaria.*

*Col. ecphr. 1. p. 40. t. 36.*

*Fonst. inf. t. 13. f. A.*

*Raj. inf. 68. n. 1.*

*Frisch. inf. 5. t. 3.*

*Kalm. itin. 2. p. 496.*

*Habitat in America, Oriente: imprimis in farina, Pane*

*&c. hodie in Russia adjacentibus regionibus frequens;*

*ince-*

---

*Blattæ lucifragæ cum Larva, facit rodunt cibaria, coria, putridaque varia, celeri cursu se subtrahentes.*



*inceptit nuperis temporibus Holmiæ, uti dudum in Finlandia.*

*Consumit Panem, cibaria, calceos &c. lucifuga.*

lapponi- 8. *B. flavescens, elytris nigro maculatis. Fn. svec. 618.*  
ca. *Habitat in, Lapponiæ imprimis, Casis, consumit Pisces.*

oblonga- 9. *B. oblonga livida, thorace punctis duobus lunulaque*  
ta. *nigris.*

*Habitat in America. Rolander.*

*Oblonga uti Cantharis, pallide testacea s. livida. Antennæ clavatæ, atræ. Pedes valde hirti. Clypeus thoracis orbiculatus, convexus, glaber, lividus, postice lunula nigra, in medio punctis 2 nigris instar oculorum.*

194. GRYLLUS. *Caput nutans, maxillosum, palpis quatuor ad maxillas.*

*Antennæ setaceæ.*

*Alæ deflexæ: superiores flexiles, submembranaceæ.*

*Pedes saltatorii plerisque.*

\* MANTIS. *Thorax elongatus, sublinearis. Pedes antici remotissimi a reliquis.*

gigas. 1. *G. M. thorace teretiufculo scabro, elytris brevibus, pedibus spinosis. M. L. U.*

*Rœs. inf. 2. Gryll. t. 19. f. 9. 10.*

*Bradl. natur. t. 27. f. 6.*

*Habitat in Amboina.*

*Elytra abdomine dimidio breviora. Alæ maximæ.*

phthi- 2. *G. M. thorace teretiufculo muricato, elytris brevissimis,*  
cus. *pedibus inermibus. M. L. U.*

*Habitat in Indiis.*

*Elytra brevissima, medio carina gibba, extus s. posterius nigra.*

ficcifo- 3. *G. M. thorace denticulato, femoribus ovatis membra-*  
lius. *naceis. M. L. U.*

*Rœs. inf. 2. gryll. t. 17. f. 4. 5.*

*Habitat in Indiis.*



*Abdomen ovatum, membranaceo-planum. Elytra virescentia, facie foliorum lauri, parallela.*

- gongylo-4. G. M. thorace ciliato, femoribus anticis spina terminatis; reliquis lobo. *M. L. U.*  
*Amœn. acad. 1. p. 504. Gryllus thorace lineari alarum longitudine: margine denticulis ciliato.*  
*Aldr. inf. t. 13. f. 21. Mantis.*  
*Act. angl. 301. t. 20. f. 3. Marcgr. bras. 246. Gaayara.*  
*Rœs. inf. 2. gryll. t. 7. f. 1, 2, 3.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Caput vertice subulata bifido. Larvæ pedes lobis membranaceis alati.*
- religio-5. G. M. thorace levi subcarinato elytrisque viridibus im-  
 fus. maculatis.  
*Rœs. inf. 2. gryll. t. 1, 2.*  
*Habitat in Africa. E. Brander.*  
*Corpus totum viride.*
- oratorius. 6. G. M. thorace lævi, elytris viridibus, alis macula nigra antice rufescentibus.  
*Habitat in Africa. E. Brander.*  
*Parvus est; macula magna nigra in medio alæ fusco reticulatæ.*
- precarius. 7. G. M. thorace subciliato, elytris flavis ocello ferrugineo. *M. L. U.*  
*Mer. sur. t. 66.*  
*Habitat in America, Africa.*
- bicornis. 8. G. M. thorace lævi, capite bipartito subulato. *M. L. U.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Caput vertice bipartito, subulato, divaricato. Pedes inermes.*
- tricolor. 9. G. M. thorace lateribus expanso-lobato, capite cornuto, pedibus anticis latissimis. *M. L. U.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Oculi in cornicula lateralia auriformia acuminata desinunt.*
- strumarius. 10. G. M. thorace utrinque membranaceo-dilatato obcordato.  
*Rœs. inf. 2. gryll. t. 3.*  
*Habitat in Indiis.*



\* \* ACRIDA. *Caput conicum thorace longius, Antennis ensiformibus.*

nasutus. 11. G. A. capite conico, antennis ensiformibus, elytris lineâ pallida subinterrupta, alis sanguinolentis.

*Rœf. inf. 2. gryll. 1, 4.*

*Habitat in Africa.*

turritus. 12. G. A. capite conico, antennis ensiformibus, elytris viridibus, alis hyalinis.

*Habitat in Africa.*

*Hæc ♂ antecedens singulares Capite conico, thorace ipso longiore, apice antennis, basi ore instructo. Antennæ etiam admodum diversæ a reliquis, quod thorace non longiores, latæ, ensiformes, articulatæ.*

\* \* \* BULLA. *Thorax carinatus. Antennæ thorace breviores.*

unicolor. 13. G. B. unicolor, thorace carinato brevissimo, antennis scutello brevioribus. *M. L. U.*

*Habitat in Indiis.*

*Structura sequentis, sed thorax non cristatus. Color flavus aut ruber.*

variolosus. 14. G. B. calloso-punctatus, thoracis carina subtridentata antennis brevibus, fronte verrucoso. *M. L. U.*

*Habitat in Indiis.*

*Corpus virescens. Scutellum carinatum, duplo longius capite cum thorace. Elytra membranacea. Pedes postici abdomine ventricoso non longiores.*

ferratus. 15. G. B. thorace cymbiformi carinato denticulato, capite acuminato, abdomine cæruleo.

*Rœf. inf. 2. gryll. t. 16. f. 2.*

*Habitat in Indiis.*

carinatus. 16. G. B. thorace cymbiformi lævi, vertice depresso. *M. L. U.*

*Habitat in Indiis.*

bipunctatus. 17. G. B. thoracis scutello abdominis longitudine.

*Fn. suec. 623. Gryllus elytris nullis, thorace in elytron longitudinale extenso macula utrinque nigra rhombea.*

*Habitat in Europa.*

18. G. B.



subulatus. 18. G. B. thoracis scutello abdomine longiore.

*Fn. suec.* 624. Gryllus elytris nullis, thorace producto abdomine longiore.

*Habitat in Europa ad fossas & aquas stagnantes.*

\* \* \* \* ACHETA. *Cauda setis duabus.*

Gryllotalpa. 19. G. A. thorace rotundato, alis caudatis elytro longioribus, pedibus anticis palmatis tomentosis.

*Fn. suec.* 619. Gryllus pedibus anticis palmatis.

*Mouff. inf.* 104. Gryllotalpa. *Aldr. inf.* 571.

*Velsch. hecast.* 1. p. 39. *Fonst. inf. t.* 12. 13.

*Gœd. inf.* 1. t. 76. *Raj. inf.* 64. 67.

*Blanck, herb. t.* 81. f. 10.

*Rœs. inf.* 2. gryll. t. 14, 15.

*Frisch. inf.* 11. t. 5. *Catesb. car.* 1. t. 8.

*Habitat in Europæ & Americæ borealis herboris & cultis, Hortorum hostis.*

domesticus. 20. G. A. thorace rotundato, alis caudatis elytro longioribus, pedibus simplicibus, corpore glauco.

*Faun. suec.* 620. Gryllus cauda bifeta, alis inferioribus acuminatis longioribus, pedibus simplicibus.

*Mouff. inf.* 135. Gryllus domesticus.

*Raj. inf.* 63. *Fonst. inf. t.* 12.

*Rœs. inf.* 2. gryll. t. 12.

*Habitat hodie in Europæ muris domesticis.*

campestris. 21. G. A. thorace rotundato, cauda bifeta stylo lineari, alis elytro brevioribus, corpore nigro.

*Frisch. inf.* 1. t. 1. *Rœs. inf.* 2. gryll. t. 13.

*Habitat in Europa australiore.*

umbraculatus. 22. G. A. niger, elytris apice albis, umbraculo frontis deflexo.

*Habitat in Mauritania. E. Brander.*

*Facies G. campestris; totus niger, sed thorax magis ferrugineus. Elytra abdomine breviora, ad apicem lactea. Antennæ longitudine corporis. Setæ 2 ad caudam corpore paulo breviores. Singularis est Umbraculo ex membrana obovata, e fronte ante caput deflexa, marginibus lateralibus involuta, magnitudine ipsius capitatis, nigra.*



\* \* \* \* \* TETTIGONIA. *Cauda ensifera feminis.*

- citrifolius. 23. G. T. thorace tetragono angulis scabro. *M. L. U.*  
*Ræf. inf. 2. gryll. t. 16. f. 1.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Elytra ovato-oblonga, folia lauri pallida referentia.*
- laurifolius. 24. G. T. thorace subtetragono lævi trilobo, alis angulatis elytro obtusiore longioribus. *M. L. U.*  
*Sloan. jam. 2. p. 201. t. 236. f. 1. Locusta maxima viridis, alis latissimis.*  
*Marcgr. bras. 246. Tucurubi.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Elytra ovato-oblonga viridia. Alæ acutiores.*
- myrtifolius. 25. G. T. thorace subtetragono lævi, alis deflexis elytro longioribus, tibiis muticis.  
*Habitat Surinami. Rolander.*  
*Antennæ longitudine corporis. Thorax lævis, subtetragonus, postice rotundatus. Elytra ovata, deflexa, viridia, quasi 2 folia, margine superiore magis convexa. Alæ paulo longiores, albidae. Pedes inermes. Magnitudo quadruplo minor G. laurifolio.*
- elongatus. 26. G. T. thorace subquadrato lævi, elytris alisque corpore longioribus. *M. L. U.*  
*Habitat in India.*  
*Elytra sublinearia maculis lunatis fuscescentibus.*
- lamellatus. 27. G. T. thorace subquadrato, foliolis ovatis ante femora postica. *M. L. U.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Ad insertionem femorum posteriorum foliola duo ovata concava. Corpus primæ magnitudinis.*
- ocellatus. 28. G. T. thorace rotundato, alis posticis ocello notatis. *M. L. U.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Gryllus primæ magnitudinis. Ocellus magnus in alis, notatus lunulis duabus albis.*
- acuminatus. 29. G. T. thorace rotundato, vertice subulato, alis virescentibus. *M. L. U.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Ensis latior quam in reliquis.*



- triops. 30. G. T. thorace rotundato, vertice acuminato subtus puncto oculo nigro, alis viridibus. *M. L. U.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Abdomen breve. Ensis longitudine abdominis.*
- rugosus. 31. G. T. thorace rotundato rugoso cristato, capite acuminato, femoribus posticis subtus repandis.  
*M. L. U.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Thorax versus apicem crista compressa crenata.*
- coronatus. 32. G. T. thorace spinis erectis coronato, elytris variegato-concavis.  
*Habitat in Indiis. De Geer.*  
*Antennæ corpore triplo longiores, filiformes, luteo griseoque variegatæ. Thorax supra postice cinctus margine valde dentato; antice juxta caput spina 1, in medio 2. Elytra grisea adpersa punctis magnis, excavatis, fuscis. Alæ nigricantes. Pedes & femora valde spinosa. Ensis lanceolatus, longus.*
- aquilinus. 33. G. T. thorace rotundato subverrucoso, alis latissimis: nervis quindecim. *M. L. U.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Corpus primæ magnitudinis. Elytra lanceolata. Alæ omnium latissimæ. Tibiæ quadrifariam spinis hispidae.*
- melanopterus. 34. G. T. thorace rotundato lævi, elytris abdomine dimidio brevioribus, alis nigris. *M. L. U.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Elytra longitudine thoracis ovali-oblonga.*
- fastigiatus. 35. G. T. thorace rotundato lævi, elytris ovatis, alis truncatis, spinis tibiæ filiformibus. *M. L. U.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Spinæ tibiæ longiores, quam in reliquis.*
- coriaceus. 36. G. T. thorace rotundato lævi, elytris coriaceis, alis pallidis, antennis longissimis.  
*Habitat in Indiis.*  
*Corpus magnum, colore flavo corii. Femora teretia.*
- viridissimus. 38. G. T. thorace rotundato, alis viridibus immaculatis, antennis setaceis longissimis.  
*Frisch. inf. 12. t. 2. f. 1. Locusta major viridis.*



*Rœs. ins. 2. gryll. t. 10, 11.*

*Habitat in Europa.*

*Ensis rectissimus, strictus.*

- verrucivorus. 38. G. T. thorace subquadrato lævi, alis viridibus fusco maculatis, antennis fetaceis longitudine corporis.  
*Fn. suec. 621. It. wgoth. 253. Gryllus cauda ensifera recta, corpore subviridi.*  
*Fonst. ins. t. 11. f. 1. 2. 3. Merian. ins. t. 176.*  
*Rœs. ins. 2. t. 8.*  
*Habitat in Europa.*

- Pupus. 39. G. T. aptera, thorace spinoso, femoribus punctatis.  
*Amœn. acad. 1. p. 322.*  
*Pet. gaz. t. 13. f. 7. Locusta-Talpa capensis, pedibus longis.*  
*Rœs. ins. 2. gryll. t. 6. f. 3.*  
*Habitat in Æthiopia.*  
*Habet supra enses duo puncta prominula, quæ indicant affinitatem cum Gryllo-Talpis.*

\* \* \* \* \* **LOCUSTA. Cauda simplex.**

- Elephas. 40. G. L. thorace carinato integro, corpore aptero.  
*Rœs. ins. 2. gryll. t. 6. f. 2.*  
*Habitat in Africa.*  
*Reliquis omnibus major & ponderosior. Antennæ filiformes. Corpus totum viride, punctis excavatis adpersum; thoracis dorsum carina elevata integerrima. Femora mutica. Rudimenta alarum duo, nec quatuor ut in Pupis Gryllorum.*

- cristatus. 41. G. L. thorace cristato: segmento triplici. *M. L. U.*  
*Amœn. acad. 1. p. 21. t. 17. f. 4. Gryllus crista thoracis quadrifida.*  
*Olear. mus. t. 17. f. 5. Gryllus ex ægypto.*  
*Frisch. ins. 9. t. 1.*  
*Rœs. ins. 2. gryll. t. 5.*  
*Hasselqv. iter. 413. Gryllus arabicus.*  
*Habitat in America, Arabia, Asia.*  
*Hic Arabibus esculentus est. Act. Stockh. 1752.*  
*Thoracis carina in 4 s. 5 lobos transversim dissecta.*

- morbillo-  
 sus. 42. G. L. thorace quadrato verrucoso, elytris verrucosis, alis rufis. *M. L. U.*



*Rœs. inf. 2. gryll. t. 18. f. 6.*

*Habitat in Indiis.*

miliaris. 43. G. L. thorace subquadrato dentato verrucoso, elytris punctis callofis. *M. L. U.*

*Habitat in America.*

hæmato- 44. G. L. thorace subcarinato scabro, capite obtuso, femora piloso-ciliatis. *M. L. U.*

*Habitat in Indiis.*

*Femora postica angulo utrinque pilis longis ciliata.*

migrato- 45. G. L. thorace subcarinato: segmento unico, capite riuus, obtuso, maxillis atris. *M. L. U.*

*Frisch. inf. 9. t. 1. f. 8. Gryllus migratorius.*

*Rœs. inf. 2. gryll. t. 24.*

*Edw. av. 208. t. 208.*

*Habitat in Tataria, inde Europam variis annis adiit, exedit omne vegetans; vide Rappolt, Rathles, Kundman.*

tataricus. 46. G. L. thorace subcarinato: segmentis tribus, capite rotundato, maxillis concoloribus. *M. L. U.*

*Habitat in Tataria.*

*Alæ costa rubra à priori manifeste distinctus.*

variegatus. 47. G. L. thorace lineato flavo: elytris viridibus, alis cæruleis. *M. L. U.*

*Habitat in America.*

*Frons rubra characteribus atris.*

cærule- 48. G. L. thorace subcarinato, alis virescenti-cæruleis: scens, fascia nigra.

*Rœs. inf. 2. gryll. t. 21. f. 4.*

*Habitat in Meridionalibus.*

italicus. 49. G. L. thorace subcarinato, alis rubris: apice cinereis.

*Rœs. inf. 2. gryll. t. 21. f. 6.*

*Habitat in Europa australi.*

stridulus. 50. G. L. thorace subcarinato, alis rubris extimo nigris, elytris nebulosis.

*Fn. svec. 625. It. æl. 158. Gryllus elytris nebulosis, alis rubris extimo nigris.*

*Frisch.*

---

*Grylli Larvæ pleræque habitant sub terra, pupæ etiam excurrunt & cum parentibus plantas vorant, dum mares stridenti musica sonant,*



*Frisch. inf. 9. t. 1. f. 2.**Uddm. diff. 50.**Rœs. inf. 2. gryll. t. 21. f. 2.**Habitat in Europa.*

carolinus. 51. G. L. thorace subcarinato, alis nigris margine postico flavis.

*Catesb. car. 2. n. 89. t. 89* Locustella carolina, elytris fuscis, alis inferioribus nigris ad extremitates luteis.

*Habitat in America.*

obscurus. 52. G. L. thorace subcarinato, alis nigris basi rubris, apice albis. *M. L. U.*

*Habitat in Africa.*

flavus. 53. G. L. thorace subcarinato, alis disco flavo fascia nigra. *M. L. U.*

*Pet. gaz. 6. t. 3. f. 6.*

*Habitat in Africa.*

apricarius. 54. G. L. thorace crucigero, antennis longitudine corporis. *Fn. swec. 628. It. æl. 157.*

*Habitat in Europæ campis.*

viridulus. 55. G. L. thorace cruciato, corpore supra viridi, elytrorum margine albido. *Fn. swec. 626.*

*It. wgoth. 276.* Gryllus capite thorace elytrisque superne viridibus.

*Habitat in Europa.*

biguttulus. 56. G. L. thorace cruciato, elytris nebulosis puncto oblongo albo versus apices.

*Habitat in Europa.*

rufus. 57. G. L. thorace cruciato, corpore rufo, elytris griseis, antennis subclavatis.

*Fn. swec. 629.* Gryllus antennis subclavatis acutis.

*Habitat in Europa.*

grossus. 58. G. L. femoribus sanguineis, elytris virescenti-subrufis, antennis cylindricis. *Fn. swec. 627.*

*Habitat in Europa.*

pedestris. 59. G. L. colore livido incarnato, corpore aptero.

*Habitat in Europa.*

E e

II. HE-



## II. HEMIPTERA.

Rostrum inflexum sub Pectore.

Alæ vel semicoleoptra: alis superioribus dimidiato - cartilagineis vel alteri sexui tantum.

195. CICADA. Rostrum inflexum.

Antennæ thorace breviores.

Alæ IV, membranaceæ, deflexæ.

Pedes plerisque saltatorii.

\* NOCTILUCÆ. Capite antice protracto in vesicam oblongam.

Laternaria. 1. C. fronte rostrata ovali recta, alis lividis: posticis ocellatis.

Grew. mus. 158. t. 12. Cucujus peruvianus.

Merian. sur. t. 49. Laternaria.

Reaum. ins. 5. t. 20. f. 6. 7.

Rœs. ins. 2. gryll. t. 28. 29.

Habitat in America calidiore.

Prominente fronte noctu lucem vivacissimam spargit.

Candalaria. 2. C. fronte rostrata subulata adscendente, elytris viridibus luteo punctatis, alis flavis: apice nigris.

Act. Stackh. 1746. p. 63. t. 1. f. 5. 6.

Edw. av. t. 120.

Rœs. ins. 2. gryll. 189. t. 30.

Habitat in China.

phosphorea. 3. C. fronte rostrata subulata adscendente, corpore griseo-glaucis.

Habitat in America. Rolander.

noctivida. 4. C. fronte rostrata acuminata adscendente, corpore viridi, alis hyalinis.

Habitat in America. Rolander.

lucernaria. 5. C. fronte rostrata prominente, corpore supra viridescente subtus flavo.

Habitat in America. Rolander.



\* \* FOLIACEÆ. Thorace compresso-membranaceo, corpore majore.

- foliata. 6. C. foliaceã rotundata nigra arcu albo.  
*Merian. Surin. t. 5. f. ult.*  
*Habitat in India. De Geer.*  
 Thorax e folio perpendiculari, semicordato, atro, antice rotundato, utrinque, in altero sexu, arcu albo, in altero vero antice linea alba, postice arcu albo. Postice subtus corpus Elytris 2 nigris Alisque 2 albis. Pedes anteriores extimo articulo gibbosi.
- fronditia. 7. C. foliacea dorso repando: rostro obtusissimo.  
*Habitat in America. Rolander.*  
 Thorax e folio perpendiculari griseo margine superiore repando, antice producto in rostrum subtruncatum; postice angustatum, longitudine corporis, deorsum acutum. Elytra obovata, concolorata. Alæ hyalinæ. Pedes breves.
- squamigera. 8. C. foliacea antice posticeque rostrata acuta.  
*Habitat in America. Rolander.*  
 Simillima priori, sed minor, livido-grisea. Thorax antice ascendens in rostrum acutiusculum, postice acute descendens. An prioris Mas?
- \* \* \* CRUCIATÆ Thorace utrinque cornuta.
- CruX. 9. C. thorace cruciformi corpus tatum tegente.  
*Habitat in Indiis.*  
 Thorax forma crucis: brachiis expansis compressis; columna postice longitudine abdominis, latior, subcarinata.
- cornuta. 10. C. thorace bicorni postice producto, alis nudis. *Fr. spec. 641.*  
*Pet. gaz. t. 47. f. 2. 3. Ranatra cornuta.*  
*Habitat in Carduis, Salicibus.*
- aurita. 11. C. thorace biaurito, capitis clypeo antrorsum dilatato rotundato.  
*Habitat in Germania. P. Forskål.*  
 Magnitudo Tabani, tota cinerea. Thorax à tergo gerit cornua duo, compressa, erectiuscula, rotundata, at



*clypeus capiti impositus antrorsum dilatatus, rotundatus, supra rugosus, fere membranaceus. Alæ 4, deflexæ.*

\* \* \* \* MANNIFERÆ.

- ciliaris. 12. C. alis pollicis ferrugineo-fuscis: vittis longitudinalibus luteis, abdominis segmentis ciliatis. *M. L. U.*  
*Habitat in Indiis.*
- 4-fasciata. 13. C. flava, fasciis quatuor fuscis.  
*Habitat in America. Rolander.*
- bifasciata. 14. C. fusca, fasciis alarum binis albis.  
*En. suec. 633.*  
*Habitat in Svecia.*
- fornicata. 15. C. thorace virescente, abdomine fornicato. *M. L. U.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Latera abdominis margine dilatata, ut abdomen duplo latius conspiciatur, quam est.*
- stridula. 16. C. elytris margine dilatato, punctis septem albis.  
*M. L. U.*  
*Habitat in Indiis.*
- Orni. 17. C. elytris intra marginem tenuiorem punctis sex fuscis concatenatis.  
*Reaum. inf. 5. t. 5. f. 16, 17, 18, 19.*  
*Habitat in Italia, Apulia &c.*  
*His strident arbusta cicadis.*
- repanda. 18. C. elytris linea flexuosa, alis margine hyalino.  
*Habitat in Indiis.*
- reticulata. 19. C. grisea, thoracis linea alba, elytris albo reticulatis.  
*Habitat in America. Rolander.*
- Tibicen. 20. C. scutelli apice emarginato.  
*Merian. surin t. 49. Tibicen.*  
*Habitat in America.*
- septendecim. 21. C. nigro-virescens, elytris margine flavescente, capite utrinque octo-striato.



*Kalm. act. Stockh. 1756. p. 101.* Cicada maxilla utraque lineis octo transversis concavis, alarum margine inferiore lutescente.

*Habitat in America boreali.*

violacea. 22. *C. violacea*, alis apice fuscis.

*Habitat in Meridionalibus calidis.*

*Femora antica dentibus tribus armata.*

\* \* \* \* \* SPUMANTES.

colcop- 23. *C. elytris* totis coriaceis alas tegentibus.

trata. *Habitat in Europa.*

spumaria. 24. *C. fusca*, elytris maculis binis albis lateralibus: fascia duplici interrupta albida. *Fn. svec. 636.*

*De Geer Act. Stockh. 1741. p. 221. t. 7.*

*Swamm. quart. p. 83.*

*bibl. 1. p. 215.*

*Raj. inf. 67.*

*Act. par. 1705. p. 162.*

*Merian. inf. 77. t. 51.*

*Rœs. inf. 2. gryll. 139. t. 23.*

*Blank. inf. 97. t. II. f. N. O. P. Frisch. inf. 8. p. 26. t. 12.*

*Habitat in Europæ Plantis variis, frequens in Salice viminali, latitans intra spumam.*

nervosa. 25. *C. fusca*, alis hyalinis fusco maculatis: nervis punctatis. *Fn. svec. 632.*

*Habitat in Europa.*

leucoph- 26. *C. nigra*, oculis albis.

thalma. *Habitat in Europa.*

albifrons. 27. *C. nigra*, fronte albo.

*Habitat in Europa.*

leucoce- 28. *C. nigra*, capite albo. *Fn. svec. 640.*

phala. *Habitat in Europa.*

lateralis. 29. *C. nigra*, elytris latere albis. *Fn. svec. 639.*

*Habitat in Europæ pratis.*

striata. 30. *C. elytris* albido nigroque ad angulum acutum suturæ dorsalis striatis. *Fn. svec. 642.*

*Habitat in Europa.*

E e 3

31. C.

Cicadæ spumantis Larva ramis insidentes ano evacuant numerosas vesiculas, ut lateant intra spumam; dum maiores intra terram occultantur usque in volatilia, quæ duabus lamellis sub abdomine masculæ in arbutis strident.



- lineata. 31. *C. exalbida*: linea utrinque longitudinali nigra. *Faun. suec. 637.*  
*Habitat in Europa.*
- interru-  
pta. 32. *C. elytris flavis*: linea nigra duplici interrupta longitu-  
dinali. *Fn. suec. 631.*  
*Habitat in Europa.*
- vittata. 33. *C. flava*: fascia longitudinali duplici repando dentata.  
*Fn. suec. 634.*  
*Habitat in Europa.*
- aptera. 34. *C. aptera atra*, elytris abbreviatis, tibiis antennisque  
pallidis.  
*Habitat in Sudermannia ad Ackeröam.*  
*Magnitudo Pulicis.*
- \* \* \* \* \* DEFLEXÆ. *Alis deflexis latera obvolvén-*  
*tibus.*
- Phalænoi-  
des. 35. *C. exalbida*, alis deflexis patulis antice fusco pun-  
ctatis.  
*Habitat in America. De Geer.*  
*Similis Hemerobio Perla. Corpus flavescens. Alæ al-*  
*bida, deflexæ ut in Phalæna, glabræ: exteriores anti-*  
*ce versus marginem utrumque irroratæ punctis nigris*  
*sparsis. Inferiores alæ niveæ.*
- lanata. 36. *C. alis deflexis nigris*: punctis cæruleis, fronte lateri-  
busque rubris. *M. L. U.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Corpus nigricans. Abdomen postice lana densissima, mol-*  
*lissima.*
- rubra. 37. *C. rubra*, alis deflexis fuscis: fasciis duabus flavis.  
*Habitat in America. Rolander.*
- viridis. 38. *C. elytris viridibus*, capite flavo punctis nigris. *Faun.*  
*suec. 630.*  
*Pet. gaz. 73. t. 47. f. 6. Ranatra viridescens.*  
*Raj. inf. 68. n. 3. Locusta-pulex tertia.*  
*Habitat in Europa.*
- flava. 39. *C. flava compressa.* *Fn. suec. 643.*  
*Habitat in Europa.*



- aurata. 40. C. flava, elytris fulvo pictis: maculis quatuor nigris posticeque auratis. *Fn. svec. 635.*  
*Habitat in Europa.*
- Ulmi. 41. C. alis viridi-luteis: apicibus nigricantibus inauratis.  
*Fn. svec. 644.*  
*Habitat in Ulmo.*
- Rosæ. 42. C. flava, alis albis: apicibus membranaceis. *Faun. svec. 648.*  
*Frisch. ins. 11. p. 13. t. 20.*  
*Habitat in Rosæ foliis.*

196. NOTONECTA. *Rostrum inflexum.**Antennæ thorace breviores.**Alæ IV, cruciatio-complicatæ, antice coriaceæ.**Pedes posteriores pilosi, natatorii.*

- glaucæ. 1. N. grisea, elytris griseis margine fusco punctatis. *Fn. svec. 688.*  
*Frisch. ins. 6. p. 28. t. 13. Bradl. nat. t. 26. f. 2. E. Pet. gaz. t. 72. f. 5. Rœs. ins. app. 1. p. 165. t. 27.*  
*Habitat in Europæ Aquis.*
- striata. 2. N. elytris pallidis; lineolis transversis undulatis striatis.  
*Fn. svec. 689.*  
*Pet. gaz. t. 72. f. 7. Notonecta vulgaris compressa fusca.*  
*Rœs. ins. app. 1. p. 177. t. 29.*  
*Joblot. micr. 1. pp. 1. t. 7. f. 2, 3.*  
*Habitat in Europæ Aquis.*
- minutis-  
sima. 3. N. elytris cinereis: maculis fuscis longitudinalibus.  
*Fn. svec. 690. N. arenulæ magnitudinis.*  
*Habitat in Europæ Aquis.*



197. NEPA. *Rostrum inflexum.**Antennæ . . .**Alæ* IV. cruciata - complicatæ: antice coriaceæ.*Pedes* anteriores cheliformes; reliqui 4 ambulatorii.

- grandis. 1. *N. testacea*, scutello lævi, alis albis inaculis venisque flavis. *M. L. U.*  
*Marogr. bras.* 258. f. 259. Insectum magnitudinis brusci.  
*Merian. surin.* t. 56.  
*Kœs. inf.* 3. t. 26.  
*Habitat in America.*
- rubra. 2. *N. fusca*, abdomine supra alarumque nervis rubris: *M. L. U.*  
*Habitat in Calidis regionibus.*
- fulva. 3. *N. fusca*, scutello rugoso, alis niveis. *M. L. U.*  
*Habitat in Calidis regionibus.*
- atra. 4. *N. atra*, thorace inæquali, corpore oblongo.  
*Habitat in Africa. Brander.*  
*Simillimus insequenti, sed duplo major, duplo longior & tota atra.*
- cinerea. 5. *N. cinerea*, thorace inæquali, corpore ovato.  
*Fn. suec.* 691. *Nepa* abdominis margine integro.  
*Montf. inf.* 321. *Scorpio palustris.*  
*Jonst. inf.* 27. f. 1. 2. & t. 28. f. ad. verb. stell.  
*Pes. gaz.* t. 74. f. 4.  
*Bradl. nat.* t. 26. f. 2. C.  
*Swamm. bibl.* 1. t. 3. f. 4.  
*Rœs. inf. app.* 1. p. 136. t. 22. f. 6. 7. 8.  
*Bauh. ballon.* 212. f. 2. *Araneus aquaticus.*  
*Habitat in Europæ Aquis.*
- Cimicoi-6. *N. abdominis margine ferrato.* *Fn. suec.* 692.  
 des. *Frisch. inf.* 6. p. 31. t. 14. *Cimex aquaticus latior.*  
*Rœs. inf. app.* 176. t. 28.  
*Habitat in Europæ aquis.*



linearis. 7. *N. linearis*, manibus spina laterali pollicatis.

*Svamm. bibl.* 1. p. 233. t. 3. f. 9.

*Frisch. inf.* 7. p. 24. t. 16.

*Rœf. inf. app.* 141. t. 23.

*Habitat in* Europa.

198. CIMEX. *Rostrum* inflexum.

*Antennæ* thorace longiores.

*Alæ* IV, cruciatio - complicatæ: superioribus antice coriaceis.

*Dorsum* planum thorace marginato.

*Pedes* cursorii.

\* a \* APTERI.

lectularius. 1. *C. apterus*. *Fn. svec.* 645.

*Mouff. inf.* 269. f. superiores. *Cimex domesticus*.

*Bonans. microsc.* t. 65.

*Fonst. inf.* 89.

*Aldr. inf.* 534.

*Raj. inf.* 7.

*Habitat in* Domibus Exoticus, sed ante epocham salutarum in Europa, at in Anglia vix ante 1670 visus teste Southall.

Pellitur nidore carbonum, & Terebinthinae accenso, *Mentha arvensis*, *Lepido ruderali*, *Myrica*, *Geranio robertiano*, *Agarico muscario*, *Cimicifugæ Aëtaæ*, *Medusa*, *Cimice personato*.

*Monographia Southall Treatise of Buggs.* Lond. 1730. Oct.

\* b \* SCUTELLATI: *Scutello* longitudine abdominis.

Stockerus. 2. *C. scutello* abdomen operiente, corpore viridi maculis nigris. *M. L. U.*

*Pet. gaz.* 34. t. 21. f. 12. *Stockerus benghalensis* viridis nigromaculatus.

*Habitat in* Asia.

Scarabæoides. 3. *C. scutello* abdomen operiente, corpore atro. *Habitat* . .

maurus. 4. *C. scutello* longitudine abdominis, corpore griseo. *Habitat in* Mauritania, in Svecia paullo minor.

E e 5

5. C.

*Cimicis Larvæ* obambulant, & more volatiliam vestro exhauiunt, imprimis reliqua insecta molliora; plerique cimices fetent.



- lineatus. 5. *C. niger*, thorace lineis quinque, scutello tribus luteis, abdomine flavo punctis nigris.  
*Habitat in Mauritania. E. Brander.*  
 Supra *niger*: lineis luteis capitis 3, thoracis 5, scutelli 3. Alæ basi luteæ, apice fuscæ. Subtus totus flavus punctis nigris. Femora fulva puncto nigro.
- arabs. 6. *C. scutello* longitudine abdominis, thorace spinoso, corpore ovato livido, ano bidentato. *M. L. U.*  
*Sloan. jam. 2. t. 237. f. 15, 16. Cimex sylvaticus foetens viridis triangularis?*  
*Habitat in Arabia.*
- ferratus. 7. *C. scutello* longitudine abdominis, thorace spinoso, corpore livido, abdominis marginibus ferratis. *M. L. U.*  
*Habitat in India.*
- stolidus. 8. *C. scutello* longitudine abdominis, thorace subangulato, corpore supra viridi, subtus flavo, ano bidentato.  
*M. L. U.*  
*Habitat in Indiis.*
- Histrion. 9. *C. scutello* longitudine abdominis, thorace scabro depresso griseo pallidoque vario. *M. L. U.*  
*Habitat in Indiis.*
- \* c \* COLEOPTERATI: *Elytris fere totis coriaceis.*
- littoralis. 10. *C. elytris* abdomen occultantibus sordidis albo punctatis, alis abbreviatis, corpore nigro.  
*Habitat in Europæ littoribus.*
- rugosus. 11. *C. elytris* abdomen occultantibus pallidis, corpore oblongo.  
*Habitat in Europa.*
- clavicornis. 12. *C. elytris* abdomen occultantibus reticulato punctatis, antennis clavatis. *Fn. suec. 687.*  
*Habitat in Europa.*
- \* d \* MEMBRANACEI & valde depressi ut foliolum.
- corticalis. 13. *C. abdomine* membranaceo depresso margine imbricatum lecto, corpore nigricante. *Fn. suec. 649.*  
*Habitat in Europæ Arboribus sylvaticis.*



Betulæ. 14. C. abdomine membranaceo depresso, thorace denticulato: capite muricato, elytris antice dilatatis.  
*Habitat in Betula alba.*

erosus. 15. C. abdomine membranaceo depresso flavo: fascia nigra, thorace rugoso, tibiis anticis incrassatis.  
*Habitat in America. Rolander.*

*Antennæ clavatæ. Thorax niger, antice flavescens, rugosus, margine undique erosus. Abdomen rhombeum, membranaceum, alis latius, flavum fascia nigra. Alæ griseæ. Tibiæ anticæ breves, sed crassissimæ, ut in Mante.*

Filicis. 16. C. abdomine membranaceo depresso, elytrorum apicibus capite pedibusque lividis, corpore nigro.  
*Habitat in Filicibus.*

Cardui. 17. C. abdomine membranaceo depresso, scutello lineis tribus elevatis, antennis apice nigris. *Fn. svec. 660.*  
*Habitat in Cardui capitulis.*

\* e \* SPINOSI: *Thorace spina utrinque armato.*

bidens. 18. C. ovatus griseus, thorace acute spinoso, antennis rufis. *Fn. svec. 652.*  
*Habitat in Europa.*

rufipes. 19. C. ovatus griseus, thorace obtuse spinoso, pedibus rubris. *Fn. svec. 651.*  
*Habitat in Europa.*

margina- 20. C. oblongo-ovatus griseus, thorace obtuse spinoso, tus. antennis medio rubris.  
*Fn. svec. 662. Cimex oblongus rufus immaculatus, thorace utrinque angulato.*  
*Habitat in Europa.*

2-pustu- 21. C. oblongiusculus niger, thorace spinoso, punctis ver-  
latus. ticis duobus coccineis.  
*Habitat in America. Rolander.*

*Corpus oblongiusculum, magnum, totum nigrum capite, thorace, pedore, alis. Abdomen rubrum. Elytra livida. Inter oculos puncta 2 globosa purpurea nitida.*

ypsilon. 22. C. ovatus lividus, thorace spinoso, scutello ypsilo flavo inscripto.

*Habi-*



*Habitat in America. Rolander.*

Corpus ovatum, lividum. Thorax utrinque acute spinosus. Antennæ nigræ annulis duobus albis. In Elytris singulis punctum album. Scutellum totum y græco inscriptum. Abdomen flavescens.

punctatus. 23. C. ovatus fusco punctatus, thorace subspinoso, tibiis annulo albo.

*Habitat in Europa.*

hæmorrhoidalis. 24. C. ovato oblongus griseus, thorace acute spinoso, antennis nigris.

*Habitat in Europa.*

valgus. 25. C. oblongus niger, thorace spinoso, femoribus posticis incurvis, tibiisque posticis unidentatis. M. L. U.

*Habitat in Indiis.*

*Abdominis basis subtus notata prominentiis tribus.*

4-spinosus. 26. C. oblongus ruber, thorace quadrispinoso.

*Habitat in America. Rolander.*

Corpus oblongum ut C. lacustris, rubrum. Antennæ longissimæ, capillares. Thorax spinis 4 teretibus: una utrinque & 2 a tergo. Alæ rubræ. Pedes longi, nigri.

Acantharis. 27. C. oblongus, thorace spinoso, abdomine spinis ciliato.

*Brown. jam. 434. t. 44. f. 11. Acantharis.*

*Habitat in Jamaica.*

\* f \* ROTUNDATI s. ovati, thorace mutico.

viridulus. 28. C. rotundatus supra flavus punctis viridibus, subtus viridis. M. L. U.

*Habitat in Indiis.*

peregrinator. 29. C. suborbiculatus depressus griseo pallidoque varius, thorace scabro, M. L. U.

*Habitat in Indiis.*

2-punctatus. 30. C. ovatus pallide griseus: puncto albo utrinque ad basin scutelli. M. L. U.

*Habitat in Indiis.*

6-punctatus. 31. C. rotundatus luteo nigroque varius, thorace luteo, punctis sex nigris. M. L. U.

*Habitat in Indiis.*



- griseus. 32. *C. ovatus* griseus, abdominis lateribus albo nigroque variis, alis nebulosis. *Fn. suec. 657.*  
*Habitat in Europa.*
- interstin- 33. *C. ovatus* griseus, abdominis lateribus rubro nigroque  
ctus. variis, alis albis. *Fn. suec. 658.*  
*Habitat in Europa.*
- bacca- 34. *C. ovatus* griseus, abdominis margine nigro maculatus.  
rum. *Fn. suec. 650.*  
*List. loqv. 396. mut. t. 31. f. 19.* Cimex ex luteo rescenti infuscatus, ad alvi margines nigris maculis.  
*Raj. inf. 54. n. 2.* Cimex sylvestris, corpore breviori, subfuscus, scapulis magis extantibus.  
*Fonst. inf. t. 17. f. 9.*  
*Habitat in Europæ sylvis.*
- dumofus. 35. *C. subrotundus* griseus, margine undique sanguineo.  
*Habitat in Europa.*
- variolo- 36. *C. ovatus* flavus, thorace subspinoso punctis fuscis  
sus. excavatis varioloso, scutello basi gibbo.  
*Habitat in America. Rolander.*  
*Corpus majusculum. Margo abdominis serratus. Thorax angulis vix spinosus, flavus, punctis confertis vario sparsis excavatis subfuscis variolosus. Elytra jlava.*
- Juniperi- 37. *C. subrotundatus* viridis, margine undique flavo. *Fn.*  
nus. *suec. 648.*  
*Raj. inf. 53. n. 1.*  
*Habitat in Juniperis.*
- cæruleus. 38. *C. ovatus* cæruleus immaculatus.  
*Habitat in Europa.*
- lineola. 39. *C. ovatus* thorace lævi antice atro postice livido distincto punctis excavatis.  
*Habitat in America. Rolander.*  
*Magnitudo fere Tabani. Caput & Pectus atra. Thorax adpersus punctis excavatis, antice ater, postice albidus, qui colores distincti linea transversa ex punctis excavatis. Abdomen ovatum, triquetrum, flavum, latere maculatum. Elytra incarnata pallidaque.*



- olera- 40. *C. ovatus* cæruleo-æneus, thorace lineola scutelli a-  
ceus. pice elytrisque puncto albo rubrove. *Fn. svec.* 654.  
*Raj. inf.* 59. n. 6. Cimex sylvestris cærulescens.  
*Habitat in Europa.*
- bigutta- 41. *C. ovatus* niger margine undique albo, elytris puncto  
tus. albo.  
*Habitat in Europa.*
- bicolor. 42. *C. ovatus* niger, elytris nigro alboque variis, alis al-  
bis. *Fn. svec.* 655.  
*Pet. gaz. t.* 14. f. 7. Cimex niger albo maculatus.  
*List. loqu.* 396. Cimex niger maculis candidis.  
*Raj. inf.* 54. n. 5. Cimex sylv. parvus, corpore ro-  
tundiore.  
*Habitat in Europa.*
- ornatus. 43. *C. rotundato-ovatus*, nigro rubroque varius, capite  
alisque nigris. *Fn. svec.* 661.  
*Habitat in Europa.*
- ruber. 44. *C. ruber*, alis fuscis. *Fn. svec.* 653.  
*Habitat in Europæ Urticis aliisque.*
- acumi- 45. *C. ovalis* antice attenuatus cinereo exalbidus, anten-  
natus. nis incarnatis. *Fn. svec.* 656.  
*Raj. inf.* 56. n. 6. Musca cimiciformis.  
*List. mut. t.* 31. f. 20.  
*Habitat in Europa.*
- leucoce- 46. *C. ovatus* niger, capite pedibusque flavis.  
phalus. *Habitat in Europa.*
- minutus. 47. *C. ovatus*, elytris lividis apice fuscis. *Fn. svec.* 659.  
*Habitat in Europa.*
- \* g \* SETICORNES. *Antennis apice setaceis.*
- persona- 48. *C. rostro arcuato*, antennis apice capillaceis, corpore  
tus. oblongo subvillosa fusco. *Fn. svec.* 647.  
*Frisch. inf.* 10. t. 20. Cimex stercorarius major oblon-  
gus.  
*Raj. inf.* 56. n. 3. Musca cimiciformis.  
*Habitat in Europa.*  
*Consumit Cimices Larva horrida, personata.*



annulatus. 49. C. rostro arcuato, antennis apice capillaribus, corpore oblongo: subtus sanguineo maculato.

*Habitat in Europa.*

ater. 50. C. antennis apice capillaribus, corpore oblongo atro.

*Faun. suec. 677.*

*Habitat in Europa.*

gothicus. 51. C. antennis apice capillaribus, corpore oblongo nigro, scutello elytrorumque apicibus coccineis.

*Habitat in Europa.*

\* h \* OBLONGI.

indus. 52. C. oblongus, abdomine rubro bidentato, elytris fuscis pallido-striatis. *M. L. U.*

*Habitat in Indiis.*

Hyoscyami. 53. C. oblongus rubro nigroque varius, alis fuscis immaculatis. *Fa. suec. 664. 665. It. æl. 155.*

*Pet. gaz. t. 62. f. 2. Cimex hyoscyamoides ruber, maculis nigris.*

*List. loqu. 397. mut. t. 31. f. 21. Cimex miniatus, nigris maculis, hyoscyami.*

*Raj. inf. 55. Cimex sylvestris minor, corpore oblongo angusto.*

*Habitat in Hyoscyamo.*

equestris. 54. C. oblongus rubro nigroque varius, alis fuscis albo maculatis. *Fa. suec. 664. It. æl. 155.*

*Habitat in Svecia.*

*Præcedenti duplo major, nec in Hyoscyamo obuius.*

apterus. 55. C. oblongus rubro nigroque varius, elytris rubris punctis duobus nigris.

*Habitat in Malva sylvestri Germanie. P. Forstål.*

*Simillimus C. Hyoscyami. Corpus nigrum, sed Thorax undique cinctus margine rubro. Pectus fasciis rubris. Anus fascia rubra. Elytra sanguinea apice nigricantia; in singuli elytri medio punctum majusculum, atrum, & punctura minimum ad elytri basin. Alæ plane nullæ.*

ægyptius. 56. C. oblongus rubro nigroque varius, elytris rubris puncto nigro. *M. L. U.*

*Habitat in Ægypto.*



Andræ. 57. *C. oblongus sanguineus*, antennis tibiis rostro alisque nigris.

*Sloan. jam. 2. t. 237. f. 29. 30.* Cimex sylvestris oblongus e cinereo & nigro variegatus, supina parte cruce s. andræ notatus.

*Habitat in America.*

Kalmii. 58. *C. oblongus viridis*, scutello macula cordata flava, elytris maculis duabus nigris. *Fn. suec. 663.*

*Habitat in Europa.*

pratensis. 59. *C. oblongus griseus*, scutello macula cordata flava, elytris apice puncto fusco. *Fn. suec. 666.*

*Habitat in Europa.*

campe- 60. *C. oblongus viridis*, scutello macula cordata viridi, stris. elytris macula ferruginea. *Fn. suec. 667.*

*Habitat in Europa.*

umbrati- 61. *C. oblongus niger*, elytris albo maculatis. *Faun. lis. suec. 673.*

*Habitat in Europa.*

crassicorn- 62. *C. oblongus subgriseus rubro-punctatus*, antennis clavatis. *vatis.*

*Habitat in Europa.*

saltato- 63. *C. oblongus niger*, elytris striatis, alis postice flavo maculatis. *Fn. suec. 676. It. æl. 121.*

*Raj. ins. 57. n. 2.* Cimex brevis & fere rotundus nigricans.

*Habitat in Europa.*

arenarius. 64. *C. oblongus niger*, elytris cinereis antice nigris, alis postice albis. *Fn. suec. 678. It. æl. 121.*

*Habitat in Europa.*

Pini. 65. *C. oblongus ater*, elytris fuscis macula rhombea nigra. *Fn. suec. 674.*

*Habitat in Pinetis.*

Rolandri. 66. *C. oblongus ater*, elytris membranaceis macula flava.

*Habitat in Europa.*



- nigripes. 67. *C. oblongus*, elytrorum basi antennis pedibusque rubris, tibis anticis nigris hirsutissimis.  
*Habitat in America. Rolander.*  
Corpus *marum*, *nigrum*. Abdomen *rubrum*. Antennæ *basi nigrae*. Tibiæ *anticae longiores, crassiores, atrae, valde hirsutae*.
- \* i \* *Antennis setaceis longitudine corporis.*
- lævigatus. 68. *C. oblongus exalbidus*, lateribus albis. *Fn. suec. 679.*  
*Habitat in Europa.*
- dolabratus. 69. *C. oblongus pallido-fuscus*, antennis nigris, linea thoracis longitudinali alba. *Fn. suec. 681.*  
*Habitat in Europa.*
- striatus. 70. *C. oblongus niger*, elytris luteis fusco striatis apice pedibusque rubris. *Fn. suec. 680.*  
*Habitat in Ulmi campestris foliis.*
- erraticus. 71. *C. oblongus nigricans*, elytris albis, antennis lividis: infimo articulo nigro. *Fn. suec. 682.*  
*Habitat in Europa.*
- ferus. 72. *C. oblongus griseus immaculatus*, antennis setaceis. *Fn. suec. 668.*  
*Habitat in Europa.*
- Populi. 73. *C. oblongus albo fuscoque nebulosus*, antennis setaceis. *Fn. suec. 669.*  
*Habitat in Populo tremula.*
- Ulmi. 74. *C. oblongus supra rubiginosus*, elytris striis sanguineis, alis postice albo fuscoque variis. *Fn. suec. 670.*  
*Habitat in Ulmo campestri.*
- sylvestris. 75. *C. oblongus niger*, alis elytrisque albo fuscoque variis, pedibus rufis. *Fn. suec. 671.*  
*Habitat in Europa.*
- 2-maculatus. 76. *C. oblongus niger*, alis superioribus macula testacea, antennis setaceis.  
*Habitat in Europa.*
- mutabilis. 77. *C. oblongiusculus niger*, alis inferioribus cæruleis, antennis pedibusque flavis.



*Habitat in Svecia.*

*Totus niger. Alæ membranacæ, glaucescentes, abdomini impositi atro valde carulei elucent.*

\* k \* SPINIPEDES. *Tibiis spina notatis.*

calcaratus. 78. C. oblongus niger, femoribus posticis subtus dentatis.  
*Habitat in Europa.*

Abietis. 79. C. oblongiusculus maculato-fulvus, pedibus rufis: femoribus anticis crassioribus dentatis. *Fn. svec. 672.*  
*Habitat in Pinu Abiete.*

kermesinus. 80. C. oblongus rufus: fascia albida nigro punctata, femoribus posticis multidentatis.

*Brown. jam. 435. t. 43. f. 16. Bruchus kermesinus.*

*Habitat in America.*

*Corpus triste rubrum, magnitudine majoris nostratis. Antennæ fuscae. Fascia elytrorum linearis, albida, ad apicem scutelli. Puncta atra in singulo elytro antice 4, postice 3.*

\* l \* *Corpore angusto & lineari.*

lacustris. 81. C. linearis supra niger depressus, pedibus anticis brevissimis. *Fn. svec. 684.*

*It. wgoth. 182.*

*Raj. inf. 57. n. 1. Cimex aquaticus figuræ longioris.*

*Bauh. ballon. 213. f. 1. Insectum Tipula dictum.*

*List. mut. t. 5. f. 4.*

*Bradl. natur. t. 26. f. 2. D.*

*Habitat in Europæ aquis pacatis.*

stagnorum. 82. C. linearis nigricans compressus, pedibus anticis brevissimis. *Fn. svec. 688.*

*Pet. gaz. t. 9. f. 12. Tipula londinensis angustissima.*

*Habitat in Europæ aquis pacatis.*

vagabundus. 83. C. linearis variegatus, pedibus anticis brevissimis crassis inflexis.

*Fn. svec. 683. Cimex linearis, pedibus quatuor longioribus, antennis longissimis albo fuscoque variis.*

*Frisch. inf. 7. p. 11. t. 6. Cimex arborum oblongus, alarum signatura alba.*

*Habitat in Europæ Arboribus.*



Tipularius. 84. C. linearis exalbidus, pedibus omnibus longioribus, femoribus clavatis. *Fn. suec. 676*  
*Frisch. inf. 7. p. 28. t. 20* Cimex arboreus caliciformis  
*Habitat in Europæ arboribus.*

Coryli. 85. C. oblongus niger, pedibus antennisque setaceis. *Fn. suec. 675.*  
*Habitat in Corylo Avellana.*

199. APHIS. *Rosarium inficium.*  
*Antennæ thorace longiores.*  
*Alæ IV erectæ aut nullæ.*  
*Pedes ambulatorii.*  
*Abdomen postice sæpius bicornè.*

Ribis. 1. A. Ribis rubri. *Fn. suec. 704.*  
*Leuw. arc. epist. 90. p. 545. t. 548.*  
*Blank. inf. 164. t. 14. f. D. E.*  
*Frisch. inf. 11. p. 9. t. 14.*  
*Reaum. inf. 3. t. 22. f. 7-10.*  
*Habitat in Ribe rubra.*

Ulmi. 2. A. Ulmi campestris. *Fn. suec. 705. It. scan. 203.*  
*Reaum. inf. 3. t. 25. f. 4-7.*  
*Habitat in Ulmo campestri.*

Pastinacæ. 3. A. Pastinacæ sativæ. *Fn. suec. 706.*  
*Habitat in Pastinaca sativa.*

Sambuci. 4. A. Sambuci nigræ. *Fn. suec. 707.*  
*List. loqu. 391. Cimex exiguus cæsius.*  
*Frisch. inf. 11. p. 14. t. 18.*  
*Reaum. inf. 3. t. 21. f. 5-15.*  
*Habitat in Sambuco nigra.*

Rumicis. 5. A. Rumicis Lapathi. *Fn. suec. 708.*  
*Habitat in Rumicibus Lapathis dictis.*

Lychnidis. 6. A. Lychnidis dioicæ.  
*Fn. suec. 719. Aphis Cucubali.*  
*Habitat in Lychnide dioica.*

Padi. 7. A. Pruni Padi.  
*Reaum. inf. 3. t. 23. f. 9. 10.*  
*Habitat in Pruno Pado.*



- Rosæ. 8. A. Rosæ.  
*Reaum. inf. 3. t. 21. f. 1-4.*  
*Habitat in Rosis.*
- Tiliæ. 9. A. Tiliæ europææ.  
*Frisch. ins. 11. p. 13. t. 17. Pediculus arboreus Tiliæ.*  
*Reaum. inf. 3. t. 23. f. 1-8.*  
*Habitat in Tilia europæa.*
- Brassicæ. 10. A. Brassicæ oleraceæ.  
*Frisch. inf. 11. p. 10. t. 3. f. 15. Pediculus Brassicæ.*  
*Habitat in Brassica.*
- Craccæ. 11. A. Viciæ Craccæ.  
*Habitat in Vicia Cracca.*
- Lactucæ. 12. A. Lactucæ.  
*Reaum. inf. 3. t. 22. f. 3. 4. 5.*  
*Habitat in Lactuca oleracea.*
- Cirsii. 13. A. Serratulæ arvensis. *Fn. svec. 713. It. wgotb. 307.*  
*Habitat in Serratula arvensi.*
- Cardui. 14. A. Cardui. *Fn. svec. 714.*  
*Habitat in Carduis.*
- Tanace- 15. A. Tanaceti vulgaris.  
ti. *Habitat in Tanaceto vulgari.*
- Abfin- 16. A. Artemisiæ Absinthii. *Fn. svec. 715.*  
thii. *Habitat in Artemisia Absinthio.*
- Jaceæ. 17. A. Centaureæ Jaceæ. *Fn. svec. 716.*  
*Habitat in Centaurea Jacea.*
- Betulæ. 18. A. Betulæ albæ. *Fn. svec. 717.*  
*Habitat in Betula alba.*
- Roboris. 19. A. Quercus Roboris nigra, corniculis obsoletis atris  
medii abdominis.  
*Habitat in Quercu Robore.*

Aphides pariunt æstare viros fetus, autumnis ponunt ova. A copula tantum fecundus nasci solent, septes, pronestes, conepes offerant entomologi. Aliæ apteræ, aliæ alaræ, aliæque sexus discernunt in eadem specie; Fieri et duo cornua postica in do. d. g. gerunt, quibus excernant totum ælium hie Pomicarum vacca! Species difficile distinguuntur, difficilius definiuntur.



- Quercus. 20. A. Quercus proboscide longissima.  
*Reaum. inf. 3. t. 28. f. 5-14.*  
*Habitat in corticibus Quercus, in Gallia.*
- Pini. 21. A. Pini sylvestris. *Fn. suec. 718.*  
*Habitat in Pino sylvestri.*
- Salicis. 22. A. Salicis.  
*Reaum. inf. 3. t. 22. f. 2.*  
*Habitat in Salicibus.*
- Populi. 23. A. Populi tremulæ.  
*Habitat in Populo tremula.*
- burfaria. 24. A. Populi nigræ. *Fn. suec. 1355. It. scan. 311.*  
*Swamm. bibl. 45. f. 22-25. Hoffm. alt. hort. 51.*  
*Reaum. inf. 3. t. 27. f. g. h. Seb. mus. 1. t. 37. f. 8.*  
*Amb. hort. t. 96.*  
*Merian. europ. 1. p. 15. t. 42.*  
*Habitat in Populi nigræ foliis saccatis.*
- Urticæ. 25. A. Urticæ, alba lanata postice truncata.  
*Frisch. inf. 8. p. 34. t. 17.*  
*Habitat in Urtica Germaniæ. P. Forskål.*  
*Inter maximas hujus generis, tota alba, obteeta quasi*  
*setis; subtus vero lana alba, postice valde obtusa;*  
*de genere hæreo, utrum ad Aphides aut Chermes*  
*accedat.*

200. CHERMES. *Rostrum* pectorale.  
*Antennæ* thorace longiores.  
*Alæ* IV deflexæ.  
*Thorax* gibbus.  
*Pedes* saltatorii.

- Grami- 1. C. Airæ flexuosæ.  
 nis. *Fn. suec. 693. Chermes graminis.*  
*Habitat in Graminibus, imprimis in Aira flexuosa.*
- Ulmi. 2. C. Ulmi campestris. *Fn. suec. 694.*  
*Habitat intra folia revoluta Ulmi campestris.*



- Cerastii. 3. *C. Cerastii viscosi*. *Fn. suec.* 695.  
*Habitat in foliis Cerastii viscosi conniventibus in capitulum.*
- Pyri. 4. *C. Pyri communis*.  
*Habitat in Pyri communis foliis.*
- Buxi. 5. *C. Buxi*.  
*Reaum. inf. 3. t. 29. f. 1-14.*  
*Habitat intra Buxi folia summa conniventia; in Gallia.*
- Urticæ. 6. *C. Urticæ dioicæ*. *Fn. suec.* 702.  
*Reaum. inf. 3. t. 29. f. 20. 22. 13.*  
*Habitat in foliis Urticæ dioicæ.*
- Betulæ. 7. *C. Betulæ albæ*. *Fn. suec.* 697.  
*Habitat in Betula alba.*
- Alni. 8. *C. Betulæ Alni*. *Fn. suec.* 698. *Kalm. it. 2. p. 275.*  
*Frisch. inf. 8. t. 13. Vermis factorius Alni.*  
*Reaum. inf. 3. t. 26. f. 1. 2. 3.*  
*Habitant in Betulæ Alni ramulis Larvæ, caudis plumosis rectæ; in America septentrionali. Kalm.*
- Quercus. 9. *C. Quercus Roboris*.  
*Habitat in Quercus foliis.*  
*Corpus flavo albicans; Elytra ad marginem exteriorem lituris 4 fasciis; unica vero ad interiorem.*
- Abietis. 10. *C. Pini Abietis*. *Faun. suec.* 700. *Fl. lapp.* 218.  
*p. 347. E.*  
*Clus. pan. 20. 21. Picea pumila.*  
*Frisch. inf. 12. p. 10. t. 2. f. 3. Insectum tuberculi muricati.*  
*Habitat in Pini Abietis apicibus turionum, quæ inde basidilatatis foliolis abbreviatisque baccam mentiuntur.*
- Salicis. 11. *C. Salicis*.  
*Habitat in Salicibus variis.*
- Fraxini. 12. *C. Fraxini excellioris*. *Fn. suec.* 703.  
*Habitat in Fraxino excelliore.*
- Aceris. 13. *C. Aceris platanoidis*. *Fn. suec.* 696.  
*Habitat in Acere platanoides.*



- Ficus. 14. C. Ficus Caricæ.  
*Reaum. inf. 3. t. 29. f. 22.-24.*  
*Habitat in Fico Carica.*
201. COCCUS. *Rostrum pectorale.*  
*Abdomen postice setosum.*  
*Alæ II erectæ masculis. Fæminæ*  
*apteræ.*
- Hesperidum. 1. C. Hybernaculorum.  
*Fn. svec. 722. Coccus hesperidum.*  
*Act. paris. 1692. p. 14. t. 14.*  
*Frisch. inf. 12. p. 12.*  
*Reaum. inf. 4. t. 1.*  
*Habitat in arboribus sempervirentibus Hybernaculi.*
- Aonidum. 2. C. indarum arborum.  
*Habitat in Asiæ arboribus sempervirentibus, ut in Camellia, aliisque.*  
*Præcedenti minor, sed similis: Testa orbiculata, planiuscula, atro-purpurascens, centro s. vertice tuberculo rotundo rubro, quod in senescentibus aperitur. Mas apterus, flavescens, oblongus, apice caudæ aliquot pilis rectis. Antennæ longitudine fere thoracis, filiformes.*
- Quercus. 3. C. Quercus Roboris.  
*Reaum. inf. 4. t. 6. f. 1-4 & alia f. 8. 9. 10.*  
*Habitat in Quercu Robore.*
- Ilicis. 4. C. Quercus cocciferæ.  
*Garid. aixens. 250. t. 53. & 2. Geoffr. mat. 2. p. 782.*  
*Reaum. inf. 4. t. 5.*  
*Habitat in Galloprovinciæ Quercu coccifera.*  
*Aceto immerguntur, exsiccantur supra lintea.*
- Betulæ. 5. C. Betulæ albæ. *Fn. svec. 723.*  
*Habitat in Betula alba.*
- Carpini. 6. C. carpini Betuli. *It. scan. 47.*  
*Habitat in Carpino Betulo.*
- Ulmi. 7. C. Ulmi campestris.  
*Reaum. inf. 4. t. 2. 5. f. 5-7 & alia t. 7. f. 1-10.*  
*Habitat in Ulmo campestri.*



- Coryli. 8. *C. Coryli*.  
*Reaum. inf. 4. t. 3. f. 4-10.*  
*Habitat in Corylo Avellana.*
- Tiliae. 9. *C. Tiliae*.  
*Reaum. inf. 4. t. 3. f. 1-3.*  
*Habitat in Tilia europaea.*
- Rusci. 10. *C. Rusci*, testa octo clypeolis cincta.  
*Column. purp. 16. 4: 17. Lepas nova f. myrti morbus.*  
*Klun. ostr. 1 6 Lepas tessellata.*  
*Habitat in Apulia. M. Kähler.*  
*Testa truncata, octagona, perforata, cincta octo clypeolis*  
*instar testudinis: horum omnes in medio granulo nota-*  
*ti, exceptis duobus lateralibus oppositis.*
- Salicis. 11. *C. Salicis hermaphroditicæ*.  
*Habitat in Salicis hermaphroditicæ cortice, vix conspicuus.*
- Vitis. 12. *C. Vitis viniferæ*.  
*Reaum. inf. 4. t. 6. f. 5-7.*  
*Act. boron. 2. pp. 2. p. 279. t. 284.*  
*Habitat in Vite vinifera.*
- poloni- 13. *C. radicis Scleranthi perennis*.  
 cus. *Fn. suec. 720. Coccus radicum purpureus.*  
*Camer. epit. 691. Polygonum cocciferum.*  
*Bauh. pin. 281. Bauh. hist. 3. p. 378.*  
*Breyn. E. N. C. 1731. Reaum. inf. 4. p. 1.*  
*Kopp. jen. 86. Frisch. inf. 5. p. 6. t. 2.*  
*Act. ups. 1742. p. 54. t. 1.*  
*Habitat in Scleranthi perennis radicibus.*
- Pilosei- 14. *C. radicis Hieracii Pilosellæ*.  
 læ. *Sm. Paul quadr. 113. Act. ups. 1742. p. 54. t. 2.*  
*Habitat in Hieracii Pilosellæ radicibus.*
- Phalari- 15. *C. radicum Phalaridis*. *Fn. suec. 721.*  
 dis. *Habitat in Phalaridis canariensis radicibus.*
- Oxya- 16. *C. Cratægi Oxyacanthæ*.  
 canthæ. *Reaum. inf. 4. t. 6. f. 11. 12.*  
*Habitat in Cratago Oxyacantha.*

17. *C.*

Cocci tardi, impernis matres gravidæ, plantis adherent, sæpe ramis, aliæ radici-  
 bus fere immobiles, Mares volatu saltant.



- Cacti. 17. *C. cacti coccinelliferi.*  
*Brown. jam. 435. Coccinella alis destituta corpore ru-*  
*golo.*  
*Sloan. jam. 2. p. 153. præf. t. 9.*  
*Pet. gaz. 3. t. 1. f. 5. Hern. mex. 78.*  
*Reaum. inf. 4. t. 7. f. 11-19.*  
*Habitat in Cactis Opuntiis variis Americæ. Virus*  
*transmissus a D. Rolando in Hort. Upsaliensium 1756.*  
*Corpus depressum, tomentosum, rugis transversis, &*  
*margines laterales dorsi utrinque duplices: superiore*  
*breviore. Abdomen purpurascens. Os: punctum su-*  
*bulatum e medio pectoris. Antennæ subulatae, corpo-*  
*re  $\frac{1}{3}$  breviores. Pedes breves, nigri.*

202. **THRIPS.** *Rostrum* obscurum.  
*Antennæ* longitudine thoracis.  
*Corpus* lineare. Abdomen sursum  
 reflexile.  
*Alæ* IV, rectæ, dorso incumbentes,  
 longitudinales, angustæ.

- Phyfa- 1. *T. elytris* glaucis, corpore atro. *Fn. suec. 726.*  
 pus. *De Geer. act. Stockh. 1744. p. 3. t. 4. f. 4. Physapus*  
*ater, alis albis.*  
*Habitat in floribus semiflosculosorum. Loti corniculatæ*  
*flores clausos tumidosque reddit, spicas Secales inanit.*
- minutis- 2. *T. elytris* corporeque glauco, oculis fuscis.  
 sima. *Habitat in Europa.*
- Juniperi- 3. *T. elytris* niveis, corpore fusco:  
 na. *De Geer. act. Stockh. 1744. p. 6. t. 1. f. 2. Physapus*  
*fuscus, alis albicantibus.*  
*Habitat in Juniperis.*
- fasciata. 4. *T. elytris* albis nigrisque fasciatis, corpore fusco. *Fn.*  
*suec. 727.*  
*Habitat in floribus.*



## III. LEPIDOPTERA.

Alæ IV, imbricate squamis.

Os Lingua involuta spirali.

Corpus pilosum.

203. PAPILIO. *Antennæ* apicem versus crassiores, sæpius clavato - capitatae.

*Alæ* (sedentis) erectæ, sursumque conniventes (volatu diurno).

## \* EQUITES Trojani.

Priamus. 1. P. E. alis denticulatis tomentosiss supra viridibus : institis atris ; posticis maculis sex nigris.

*Vincet. mus.* 10. Papilio amboinensis viridi & nigro-holofericeus insignis.

*Mus. petrop.* 664. Papilio f. Atlas amboinensis, alis superioribus holoferice nigris : institis viridibus.

*Habitat in Amboina.*

*Papilionum omnium Princeps longe augustissimus, totus holofericeus, ut dubitem pulchrius quidquam a natura in insectis productum.*

Cor-

Papiliones dividuntur in VI phalanges :

a. Equites alis primoribus ab angulo postico ad apicem longioribus, quam ad basin ; his sæpe Aeneæ filiformes.

-- -- Troiani ad Pectus maculis sanguineis, (sæpius nigris), 1-17.

-- -- Aeneæ Pectore interno, oculo ad angulum ani :

-- -- Alis absque fasciis. 18, 19.

-- -- Alis fasciatis. 20-40.

b. Heliconii alis angustis integerrimis striatis : primoribus oblongis ; posticis brevissimis. 41-55.

c. Danaï alis integerrimis.

Candidi alis albidis 56-74.

Pæoni alis variegatis 75-87.

d. Nymphales alis denticulatis :

Gemmati alis ocellatis :

Ocellis in alis omnibus 88-103.

in alis primoribus 104-106.

in alis posticis 107-110.

Phalerati alis cæcis absque ocellis 111-144.

e. Plebei parvi Larva sæpius contracta :

Rurales alis maculis obscurioribus 145-161.

Urbicolæ alis sæpius maculis pellucidis 162-168.

f. Barbari corollari loco adjecti, ad ordines non relati. 169-192.



Corpus *imæ magnitudinis*. Caput & Pedes *nigra*. Thoracis *latera lineis transversis coccineis*. Abdomen *flavissimum*. Antennas *non vidi*.

Alæ primores supra *virides margine nigrae* : macula *nigra ovato-oblonga magna disci* ; Subtus *nigricantes* : Macula *viridis linearis versus marginem anteriorem & apicem* ; Macula *viridis parva duplicata in disco* ; Macula *viridis magna disci versus marginem posticum, in qua Puncta 6 nigra oblonga*.

-- Secundariæ supra *virides margine nigro* : Maculae *4 nigrae versus marginem posticum* ; Macula *fulva major, tecta ab alis primoribus*. Subtus *virides margine nigro dentato* ; Maculae *6 nigrae, rotundatae, intra marginem* ; Macula *fulva, magis oblonga, ante primores* ; Margo *interior niger, lana ferruginea longissima*.

Hector. 2. P. E. alis caudatis concoloribus nigris : primoribus fascia alba ; posticis maculis rubris. *M. L. U.*

*Raj. inf. 134. ♂ 137. Papilio indica maxima nigra. Habitat in Indiis.*

Alæ Primores *fascia alba ex maculis 8 ovalibus bifidis, præter reliquas* ; Posticæ *arcu duplici e maculis coccineis retrorsum lunatis*.

Paris. 3. P. E. alis caudatis nigris : posticis macula cærulea ocelloque purpureo ; subtus ocellis septem. *M. L. U.*

*Knorr. delic. t. C. 3. f. 1.*

*Habitat in Asia.*

Alæ supra *atomis cæruleis* ; Posticæ *subtus atomis albis & ocellis 7 intra marginem posticum. Datur etiam e-caudatus*.

Helenus. 4. P. E. alis caudatis nigris : posticis macula alba : subtus tribus albidis lunulisque septem ferrugineis. *M. L. U.*

*Habitat in Asia.*

Troilus. 5. P. E. alis caudatis nigris : primoribus punctis marginalibus pallidis ; posticis subtus maculis fulvis. *M. L. U.*

*Habitat in Indiis.*

Deiphobus. 6. P. E. alis caudatis nigris : subtus basi rubro maculatis ; posticis maculis septem rubris subannularibus. *M. L. U.*



*Pet. gaz. t. II. f. 8.* Papilio luz. maximus nigrescens:  
maculis coccineis.

*Habitat in Asia.*

Polytes. 7. P. E. alis caudatis nigris concoloribus: posticis lunulis  
rubris maculaque quintuplici alba. *M. L. U.*

*Ehret. pict. t. 10.*

*Habitat in Asia.*

Pammon. 8. P. E. alis caudatis nigris concoloribus: omnibus mar-  
gine maculatis; posticis fascia maculis septem albis.

*Habitat in Asia.*

Glaucus. 9. P. E. alis subcaudatis nebulosis concoloribus: primori-  
bus macula flava; posticis macula ani fulva. *M. L. U.*

*Habitat in America.*

*Alæ Posticæ Linea transversa fusca bifida; ceterum  
Troilo similis.*

Anchises. 10. P. E. alis dentatis nigris concoloribus: posticis macu-  
lis septem coccineis ovatis. *M. L. U.*

*Merian. surin. 17. t. 17.*

*Sloan. jam. 2. p. 216. t. 239. f. 19, 20.*

*Edw. av. t. 207.*

*Ehret. pict. t. 9.*

*Habitat in Citro Americæ. Larva tentaculata.*

Polyda- 11. P. E. alis dentatis nigris fascia interrupta flava, po-  
mas. sticis subtus rubro notatis. *M. L. U.*

*Merian. sur. 31. t. 31.*

*Habitat in Hibisco mutabili Americæ.*

*Alæ supra fascia lutea e maculis parallelis sagittatis;  
Posticarum margo subtus maculis 7, linearibus, flexu-  
osis (3), coccineis.*

Mem- 12. P. E. alis dentatis nigris: omnibus basi subtus rubro  
non. notatis. *M. L. U.*

*Pet. gaz. t. II. f. 8.*

*Raj. ins. 135.*

*Habitat in Asia.*

*Alæ Primores subtus macula ovata, rubra: Posticæ pa-  
ribus 6 subrotundis, atris.*

Agenor. 13. P. E. alis dentatis nigris basi sanguineis: primoribus  
striatis; posticis disco albo maculis nigris.

*Habitat in Asia.*



Alæ Primores concolores, albo late striatis. Posticæ atræ disco albo, postice cinctæ maculis 7 nigris, versus anum rubro infectis. Similis Deiphobo.

Sarpedon. 14. P. E. alis dentatis nigricantibus fascia viridi: posticis subtus linea basios maculisque quinque rubris.  
*Habitat in Asia.*

Æneas. 15. P. E. alis dentatis atris: primoribus supra macula viridi; posticis macula palmata sanguinea.  
*Rœs. inf. 4. p. 24. t. 2. f. 2.*  
*Habitat in Asia.*

Alæ posticæ subtus maculis 5, sanguineis, basi approximatis.

Panthous. 16. P. E. alis dentatis nigris concoloribus: primoribus albo maculatis; posticis maculis albis nigra fœtis.  
*M. L. U*  
*Habitat in Indiis.*

Pandarus. 17. P. E. alis subdentatis nigricantibus albo-maculatis concoloribus; posticis flavis: ocellis septem nigris.  
*Habitat in India,*

\* *Equites Achivi.*

Helena. 18. P. E. alis dentatis atris concoloribus: posticis disco communi aurato.  
*Mer. surin. in tabula titulo præfixa, figura maxima.*

*Habitat in floribus Arecæ Americæ.*

*Speciosissimus colore fulgentissimi auræ, utrinque in disco alarum posticarum.*

Mene-laus. 19. P. E. alis dentatis: supra cæruleis nitidissimis; subtus nebulosis punctis fuscis.

*Merian. surin. 53. t. 55.*

*Knorr. delic. t. C. 4. f. 2.*

*Habitat in America meridionali.*

*Color alarum cæruleus paginae superioris adeo solitus nitidusque, ut vix simile in rerum natura conspiciatur.*

*Sexus alter in pagina inferiore alarum primorum Ocellos 2, in posticarum 3 gerit.*

20. P. E.



- Ulysses. 20. P. E. alis caudatis nigris: disco cœruleo radiante; posticis subtus ocellis septem.  
*Habitat in Asia.*  
 Alæ primores atræ: a basi ad medium macula cœrulea septem-dentata: maculis 7 fuscis lanceolatis parallelis, in parte alarum nigra, simili aream cœruleam intrantibus.
- Agamemnon. 21. P. E. alis caudatis nigris viridi-maculatis; posticis subtus ocello lunato maculisque rubris.  
*Habitat in Asia. Osbeck.*  
 Alæ posticæ subtus maculis nigris apice rubris. Similis Teucro, sed magis niger maculisque minoribus flavis.
- Diomedes. 22. P. E. alis caudatis nigris: supra introrsum viridibus; posticis lunulis cyaneis.  
*Habitat in Indiis.*  
 Alæ posticæ supra versus basin cyaneæ, lunulisque inter dentes cyaneis; subtus maculis marginibus 3 semio-cellatis.
- Patroclus. 23. P. E. alis caudatis concoloribus fuscis: fascia lineari alba apicibusque albis.  
*Habitat in Indiis.*  
 Antennæ filiformes ut in Idomeneo, Telepho, Achille.
- Pyrrhus. 24. P. E. alis bicaudatis fuscis fascia communi alba: primorum dimidiata.  
*Habitat in Indiis.*  
 Alæ posticæ dentibus 2 longioribus; his margo flavus lunulis 3 rufis: quarta remotiore.
- Leilus. 25. P. E. alis caudatis concoloribus nigris: fascia lineisque viridibus nitentibus numerosis.  
*Merian. sur. 29. t. 29.*  
*Sloan. jam. 2. p. 215. t. 239. f. 11, 12.*  
*Knorr. delic. t. C. f. 1.*  
*Habitat in Citro Americis.*
- Ajax. 26. P. E. alis obtuse caudatis concoloribus fuscis: fasciis flavescensibus, angulo ani fulvo.  
*Raj. inf. 111. n. 2. Edw. av. 34.*  
*Habitat in America boreali.*
- Machaon. 27. P. E. alis caudatis concoloribus flavis: fasciis fuscis: angulo ani fulvo. *Fn. suec. 791.*



*Mouff. inf.* 99. t. 968. *Merian. eur.* 1. 94 & 163  
*Alar. inf.* 96. n. 5, 6. f. 1. *Frisch. inf.* 2. t. 10.  
*Fonst. inf.* t. 5, 7. *Reaum. inf.* 1. t. 29. f. 1. & t. 30.  
*Column. ecph.* 2. t. 86. *Rœf. inf.* 1. pap. 2. t. 1.  
*Raj inf.* 110. n. 1. *Wilk. pap.* 47. t. 1. a. 1.  
*Habitat in Europæ Umbellatis & Ruta.*

Antilo- 28. P. E. alis caudatis concoloribus flavis: fasciis margi-  
 chus. neque nigris, caudis albis longitudine aë.

*Pet. mus.* 50. n. 505. Papilio caudatus maximus, striis  
 umbrisque nigris.

*Catesb. carol.* 2. t. 83.

*Habitat in America septentrionali.*

Protes- 29. P. E. alis caudatis subconcoloribus albidis: fasciis fu-  
 laus. scis: unica subtus sanguinea, angulo ani rubro.

*Pet. mus.* 50. n. 502.

*Sloan. jam.* 2. p. 218. t. 239. f. 1, 2.

*Mer. surin.* 43. t. 43.

*Sch. mus.* 1. t. 11. f. 2.

*Catesb. car.* 2. t. 100.

*Habitat in America septentrionali.*

*Simillimus Podalirio Europæ australis & Africæ; an  
 satis diversus?*

Nestor. 30. P. E. alis dentatis supra fuscis maculis discoque cæru-  
 leis, subtus ocellis tribus binisque. †

*Mer. surin.* 9. t. 9.

*Habitat in Punica Americæ.*

Telema- 31. P. E. alis dentatis supra fuscis immaculatis: area com-  
 chus. muni cærulea radiata; singulis subtus ocellis sex. †

*Merian. surin.* 68. t. 68.

*Habitat in America.*

*Simillimus parenti, sed minor, nec caudatus.*

Achilles. 32. P. E. alis dentatis: supra nigris fascia cærulea, subtus  
 fuscis: ocellis tribus quinisque. *M. L. U.*

*Me-*

---

Larva Machaonis, Archifec & plurimum Fœntana Tentaculi duo supra caput exse-  
 rit, uti Larva Apollinis, utrum vero idem in reliquis Equitibus obtineat,  
 dies docebit.

Podalirius. *Raj. inf.* 111. n. 3. *Rœf. inf.* 1. pap. 2. t. 2. *Reaum. inf.* 1. t. 11.  
 f. 4, 3.

*Habitat in Europæ australis & Africæ Brassica*

Hic tam multa habet cum Proctilao communia, ut Larva magis immotescat, an-  
 tequam vere distinguatur.



*Merian. surin. 7. t. 7.*

*Knorr. delic. t. C. 2. f. 1, 2.*

*Habitat in Psidio Americes.*

**Teucer.** 33. P. E. alis subrepandis lividiusculis, subtus nebulosis; posticis ocellis tribus: postremo maximo. *M. L. U.*

*Merian. surin. 23. t. 23.*

*Stam. jam. 2. p. 219. n. 24.*

*Knorr. delic. t. C. 1. f. 1, 2?*

*Pet. gaz. t. 28. f. 1?*

*Habitat in Musa Americes.*

**Idome-  
neus.** 34. P. E. alis subcrenatis fasciescentibus, subtus nebulosis: oculo magno flavescente. *M. L. U.*

*Pet. gaz. t. 28. f. 1.*

*Merian. surin. 60. t. 60.*

*Habitat in America meridionali.*

**Demo-  
leus.** 35. P. E. alis dentatis rufis: maculis fasciaque maculosa flavis; posticis ocellis binis. *M. L. U.*

*Ehret. pict. t. 5.*

*Habitat in Asia.*

*Ocellus caruleus ad marginem anteriorem, ruber ad angulum ani.*

**Demo-  
phon.** 36. P. E. alis dentatis: supra nigris fascia viridi, subtus griseo marmoratis. *M. L. U.*

*Roes. ins. 4. t. 4. f. 1?*

*Habitat in Indiis.*

*Mas intra marginem alarum posticarum punctis 5 albis; Femina vero ocellis 2.*

**Eurypy-  
lus.** 37. P. E. alis dentatis nigris: fascia interrupta viridi; posticis subtus rubro maculatis. *M. L. U.*

*Habitat in Indiis.*

*Alæ primores subtus maculis 6 atro-sanguineis in disco. Variat maculis alarum albis loco viridium, an sexu?*

**Nireus.** 38. P. E. alis dentatis nigris fascia inaurata viridi, subtus nigricantibus.

*Habitat in Indiis.*

39. P. E.

Concolores Alæ in Papilionibus dicuntur, quæ in utraque pagina, superiore scilicet & inferiore, eundem colorem gerunt.



Stelcnes. 39. P. E. alis dentatis supra fuscis: fascia virescente obtusa interrupta.

*Pet. gaz. t. 13. f. 1.*

*Merian. surin. 2. t. 2.*

*Sloan. jam. 2. p. 217. t. 239. f. 9, 10.*

*Habitat in America.*

Philoctetes. 40. P. E. alis angulatis fuscis: posticis supra maculis duabus cæruleis pupilla nigra.

*Habitat in Indiis.*

*Alæ Primores punctis 4 albis & maculis 3 violaceis; subtus fascia linearis alba; linea transversa atra ad basin. Posticæ punctis nigris albis maculisque duabus.*

\* HELICONII:

Apollo. 41. P. H. alis oblongis integerrimis albis: posticis ocellis supra quatuor, subtus septem. *Faun. suec. 802. It. goth. 230.*

*Mouff. inf. 94. f. 2, 3. De Geer. inf. 1. t. 18. f. 12, 13.*

*Pet. mus. 49. n. 502. Ræf. inf. 4. pap. 29. t. 4. f. 1, 2. gaz. t. 23. f. 8.*

*Schæff. monogr. 1754. t. 2. f. 2, 3.*

*Raj. inf. 193. n. 2.*

*Habitat in Sedo Telephio, Saxifr. Cotyledon. frequens in Svecia.*

*Larva Tentaculis 2 ad occiput, quemadmodum E. Machaonis.*

Mnemo-sync. 42. P. H. alis oblongis integerrimis albis nigro-nervosis: primoribus maculis duabus nigris marginalibus.

*Uddm. diff. 55.*

*Habitat in Finlandia.*

*Præcedenti similis, licet specie distinctissimas.*

Piera. 43. P. H. alis oblongis integerrimis hyalinis diaphanis, posticis ocellis binis. *M. L. U.*

*Habitat in Indiis.*

Aglaja. 44. P. H. alis nigris albo subradiatis puncto centrali albo; posticis subtus luteis basi cruentatis.

*Habitat in Asia.*

*Statura P. Apollinis sed dimidio minor. Alæ omnes supra nigrae versus basin cærulescentes, in ambitu radiatæ striis albis rhombeis. Punctum album in centro cuiusvis alæ. Subtus alæ concolores; Posticæ*



*alæ subtus sulphuræ venis nigris, sed margine nigra, & basi sanguineæ. Hæ alæ etiam ad marginem ant supra flavescunt.*

- Terpsi- 45. P. H. alis oblongis integerrimis flavis, posticis saturatioribus: maculis nigris imparis. *M. L. U.*  
*Pet. gaz. t. 40. f. 4.*  
*Habitat in Asia.*
- Calliope. 46. P. H. alis oblongis integerrimis luteis: primoribus striis tribus; posticis fasciis tribus nigris. *M. L. U.*  
*Habitat in Indiis.*
- Poly- 47. P. H. alis oblongis integerrimis luteis; primoribus  
 mnia. fascia flava; posticis fasciis tribus nigris. *M. L. U.*  
*Pet. gaz. t. 12. f. 8.*  
*Edw. av. t. 175. Rœs. inf. 4. p. 43. t. 5. f. 2.*  
*Habitat Surinami.*
- Urania. 48. P. H. alis oblongis integerrimis fuscescentibus disco albis; posticis ocellis utrinque binis.  
*Habitat in Indiis.*
- Euterpe. 49. P. H. alis oblongis integerrimis nigris albo-punctatis fascia fulva. *M. L. U.*  
*Pet. gaz. t. 4. f. 2.*  
*Habitat in America.*
- Ricini. 50. P. H. alis oblongis integerrimis fuscis; primoribus utrinque fasciis duabus flavis. *M. L. U.*  
*Ebræt. pict. t. 1.*  
*Merian. sur. 30. t. 30.*  
*Rœs. inf. 4. p. 42. t. 5. f. 1. mas.*  
*Habitat in Ricinò Americæ,*  
*Mas alas posticas basi purpureas gerit.*
- Psidii. 51. P. H. alis oblongis integerrimis fuscis; primoribus fasciis tribus; posticisque duabus hyalinis. *M. L. U.*  
*Pet. gaz. t. 40. f. 3.*  
*Mer. surin. 19. t. 19.*  
*Edw. av. t. 80.*  
*Rœs. inf. 4. p. 25. t. 2. f. 3.*  
*Sloan. jam. 2. p. 217. t. 239. f. 15, 16.*  
*Habitat in Americæ, Asiæ Psidio*



Clio. 52. P. H. alis oblongis integerrimis fuscis: primoribus albo maculatis; posticis fascia a. a. *M. L. U.*

*Mer. surin. 35. t. 35.*  
*Habitat in Sophora Americes.*

Thalia. 53. P. H. alis oblongis integerrimis fuscis: primoribus flavo-maculatis; posticis striatis. *M. L. U.*

*Habitat in Indiis.*

Erato. 54. P. H. alis oblongis integerrimis atris: primoribus flavo-maculatis basi rubri; posticis rubro-striatis.

*Habitat in Indiis.*

Melpomene. 55. P. H. alis oblongis integerrimis nigris, basi subtus rubris: primoribus utrinque fascia rubra.

*Edw. av. t. 38.*  
*Sloar. jam. 2. p. 219. t. 239. f. 25, 26.*  
*Pet. gaz. t. 6. f. 7.*  
*Roes. inf. 4. p. 27. t. 3. f. 6.*  
*Habitat in America.*

\* DANAI candidi.

Anacardi. 56. P. D. alis integerrimis angulatis virescenti-albidis apice fuscis; posticis ocellis duobus. *M. L. U.*

*Mer. surin. 16. t. 16.*  
*Habitat in Anacardio Americes.*  
*Larva lanata alba, lana longa ad latera reflexa.*  
*Alæ primores supra ocellis 2 cæcis ad marginem posticum. Posticæ ocellis 2 cæcis ad marginem posteriorem & incarnata ad angulum ani.*

Cratægi. 57. P. D. alis integerrimis rotundatis albis: venis nigris.

*Faun. suec. 796. It. gotland. 182.*  
*Aldr. ins. 246. f. 6. Merian. eur. 2. t. 35.*  
*Mouff. inf. 103. Reaum. inf. 2. t. 2. f. 9, 10.*  
*Pet. mas. 33. n. 301. De Geer. inf. 1. t. 14. f. 19, 20.*  
*Raj. inf. 115. n. 5. Roes. inf. 1. p. 2. t. 3.*  
*Albin. inf. 2. t. 2. Wilk. pap. 49. t. 2. a. 1.*  
*Habitat in Pruno, Cratægo, Sorbo.*

Brassicæ. 58. P. D. alis integerrimis rotundatis: primoribus maculis duabus apicibusque nigris, major. *Fa. suec. 799.*

G g 2. Mouff.



- Mouff. inf.* 189. f. 1. *Vallisn. nat.* 1. t. 1.  
*Gœd. inf.* 1. t. 11. *Swamm. bibl. t.* 37. f. 6.  
*List. gœd.* 16. f. 7. *quart. t.* 13. f. 6.  
*Blank. inf. t.* 4. f. A-D. *Reaum. inf.* 1. t. 29. f. 1.  
*Raj. inf.* 113. n. 1. & 348. *t.* 10. f. 7.  
*cantabr.* 134. *Rœs. inf.* 1. pap. 2. t. 4.  
*Pet. gaz. t.* 62. f. 3. *Wilk. pap.* 49. t. 2. a. 2.  
*Habitat in Brassica.*
- Rapæ.** 59. P. D. alis integerrimis rotundatis: primoribus maculis  
 duabus apicibusque nigris, minor. *Fn. suec.* 798.  
*Mouff. inf.* 971. f. 9, 10. *Pet. gaz. t.* 64. f. 4.  
*Gœd. inf.* 1. t. 27. *Alb. inf. t.* 51. f. C-F.  
*List. gœd.* 22. f. 8. *Reaum. inf.* 1. t. 29. f. 7, 8.  
*Blank. inf. t.* 5. f. A-D. *2. t.* 2. f. 3.  
*Raj. inf.* 114. n. 1, 2, 3. *Rœs. inf.* 1. pap. 2. t. 5.  
*Robert. ic. t.* 6. *Wilk. pap.* 50. t. 2. a. 3.  
*Habitat in Brassicis, Tropæolo.*
- Napi.** 60. P. D. alis integerrimis rotundatis albis: subtus venis  
 dilatato-virescentibus. *Fn. suec.* 797.  
*Raj. inf.* 114. n. 4. *Alb. inf. t.* 52. f. F. G.  
*Pet. gaz. t.* 62. f. 4. *Wilk. pap.* 50. t. 2. a. 4.  
*Merian. eur.* 2. t. 39.  
*Habitat in Brassica & affinibus.*
- Sinapis.** 61. P. D. alis integerrimis rotundatis albis immaculatis:  
 apicibus fuscescentibus. *Fn. suec.* 800.  
*Habitat in Brassica & affinibus.*
- Daplidi-** 62. P. D. alis integris rotundatis albis margine fuscis,  
**ce.** subtus luteo-griseis albo maculatis.  
*Pet. gaz. t.* 1. f. 7. *Raj. inf.* 116. n. 10.  
*Habitat in Europa australi & Africa.*  
*Statura P. Napi. Alæ apicibus primorum imprimis ni-*  
*græ cum macula una alterave obsolete fusca; omnes*  
*subtus venis dilatatis luteo griseis albo maculatæ; in*  
*Mare alæ posticæ supra albæ immaculatæ.*
- Cardami-** 63. P. D. alis integerrimis rotundatis albis: primoribus  
**nes.** medio fulvis; posticis subtus viridi nebulosis.  
*Fn. suec.* 801. P. Aurora.  
*Mouff. inf.* 106. f. 2, 3, 4. *Merian. eur. t.* 181.  
*Fonst. inf. t.* 5. *Edw. av. t.* 125.  
*Raj. inf.* 115. n. 6, 7. *Rœs. inf.* 1. pap. 2. t. 8.  
*Robert.*



*Robert. ic. t. 21. Wilk. pap. 50. t. 2. a 5.*  
*Valent. herb. t. 183.*  
*Habitat in Cardamine, Brassica campestri, Thlaspi.*  
*Sexus alter caret macula fulva in alis primoribus.*

Euippe. 64. P. D. alis integerrimis rotundatis flavescentibus : primoribus apice (medio fulvo) nigris ; posticis subtus albis. *M. L. U.*

*Pet. gaz. t. 9. f. 10.*  
*Habitat in Asia.*  
*Macula fulva intra nigredinem apicum, nec infra ut in precedente ; Alæ posticæ subtus albæ, nec nebulosæ.*

Glaucipe. 65. P. D. alis integerrimis rotundatis albis : primoribus apice (medio fulvo) nigris ; posticis subtus cinereis.

*Edw. av. 128. t. 128.*  
*Habitat in Asia.*

Pyranthe. 66. P. D. alis integerrimis rotundatis albidis : supra puncto apiceque nigris, subtus griseo-albis puncto fulvo.

*Habitat in Asia.*

Arfalte. 67. P. D. alis integerrimis rotundatis albis ; striis marginalibus nigris : primoribus antice basi flavescentibus. *M. L. U.*

*Habitat in Indiis.*

Hyparete. 68. P. D. alis integerrimis rotundatis albis ; posticis subtus venis maculisque sanguineis.

*Habitat in Indiis.*

Damone. 69. P. D. alis integerrimis rotundatis albis ; primoribus maculis nigris.

*Habitat in Indiis.*

Trite. 70. P. D. alis integerrimis flavis : primoribus supra margine nigris, singulis subtus linea transversa ferruginea.

*M. L. U.*

*Habitat in Calidioribus regionibus.*

*Sequenti adeo similis, ut forte sola sexus differentia.*

Hyale. 71. P. D. alis integerrimis rotundatis flavis ; posticis macula fulva, subtus puncto sesquialtero argenteo.

*Pet. gaz. t. 14. f. 11.*

*Raj. inf. 112. n. 6.*

*Ræs. inf. 3. t. 46. f. 4, 5.*

*Uddm. inf. 56.*

*Habitat in Europa, Africa.*



Sennæ. 72. P. D. alis integerrimis rotundatis flavis apice nigris, singulis subtus puncto gemino ferrugineo argenteo.

*Sloan. jam. 2. t. 236. f. 11, 12.*

*Raj. inf. 112. n. 5.*

*Merian. surin. 58. t. 58.*

*Habitat in Cassia Americæ.*

Rhamni. 73. P. D. alis integerrimis angulatis flavis: singulis puncto travo: subtus ferrugineo. *Fn. suec. 795.*

*Mez. inf. 198. t. 193. f. 1. Raj. inf. 112. n. 4.*

*Fonst. inf. t. 5, 6.*

*De Geer. inf. 1. t. 15. f. 8, 9.*

*Robert. ic. t. 13.*

*Kaf. inf. 3 t. 46. f. 1, 2, 3.*

*Alb. inf. t. 2. f. 3.*

*Wilk. pap. 48. t. 1, a. 2.*

*Habitat in Rhamno Europæ, Africa.*

Hecabe. 74. P. D. alis integerrimis rotundatis flavis extimo nigris: singulis subtus punctis pallidis.

*Pet. gaz. t. 28. f. 9.*

*Habitat in Asia.*

\* DANAI festivi.

Midamus. 75. P. D. alis integerrimis nigris albido punctatis: primoribus supra carulescentibus; posticis punctorum alborum linea.

*Act. Stockh. 1748. t. 6. f. 1, 2.*

*Ehret. pict. t. 3. G. 11.*

*Habitat in Asia.*

*Corpus atrum punctis albis. Alæ atro-carulescentes. Posticæ serie intra marginem e punctis albis & alia serie interiore punctis majoribus albis.*

Niavius. 76. P. D. alis integerrimis nigris: primoribus fascia alba; posticis macula basæos communi alba. *M. L. U.*

*Habitat in Indiis.*

*Alæ posticæ subtus carulescentes, venis striatæ, basi albida.*

Enceladus. 77. P. D. alis integerrimis fuscis: punctis marginalibus disci octo albis. *M. L. U.*

*Habitat in Indiis.*

Obtinus. 78. P. D. alis integerrimis supra nigris fascia cyanea, subtus viridibus fascia albida. *M. L. U.*

*Habitat in India.*



- Perius. 79. P. D. alis subintegerrimis: supra fuscis, subtus flavescen-  
tibus: fasciis albis; posticis punctis septem albis. *M.L.U.*  
*Habitat in Indiis.*
- Plexip- 80. P. D. alis integerrimis fulvis: venis nigris dilatatis,  
pus. margine nigro punctis albis.  
*Pet. mus. 58. n. 527. Raj. inf. 138. n. 3.*  
*Sloan. jam. 2. p. 214. t. 239. f. 5, 6.*  
*Catesb. car. 2. t. 88.*  
*Habitat in America septentrionali.*  
*Alæ primores fascia alba, ut in sequente, cui similis.*
- Chrysip- 81. P. D. alis integerrimis fulvis margine nigro punctis  
pus. albis, posticis disco punctis nigris.  
*Raj. inf. 139. n. 1.*  
*Edw. av. 189. t. 189.*  
*Habitat in Aëgypto, America.*
- Cassiæ. 82. P. D. alis integerrimis fuscis: primoribus posticarum-  
que margine fascia ferruginea, omnibus subtus ocella-  
tis. *M. L. U.*  
*Merian. surin. 32. t. 32.*  
*Habitat in Cassiis Americis.*  
*Simillima P. Sophoræ, sed Larva diversissima.*
- Sophoræ. 83. P. D. alis integerrimis fuscis; fascia ferruginea; sub-  
tus primoribus ocello unico, posticis tribus. *M. L. U.*  
*Merian. surin. 35. t. 35. f. 1. 2.*  
*Habitat in Sophora Americis.*
- Mineus. 84. P. D. alis integerrimis subfuscis: subtus posticis ocel-  
lis septem; anticis duobus: supra unico.  
*Habitat in China.*  
*Magnitudo Pap. Urticæ. Alæ supra cinereo-fuscæ.*  
*Primores supra ocello 1 nigro; subtus duobus. Posticæ*  
*subtus ocellis 7, quorum 1, 4, 5 majores.*
- Hyperan- 85. P. D. alis integerrimis fuscis; primoribus subtus ocel-  
tus. lis tribus; posticis utrinque quinque. *Fn. svec. 788.*  
*Pet. mus. 34. n. 313. Raj. inf. 129. n. 7.*  
*Habitat in Europæ sylvis.*



Pamphi- 86. P. D. alis integerrimis fulvis; subtus primoribus ocellus,  
lo unico; posticis fascia alba.

*Fr. svec.* 789. Tityrus.

*Pet. mus.* 34. n. 311.

*Merian. eur.* t. 154.

*Raj. ins.* 125. n. 19.

*Ræf. ins. app.* 1. t. 34. f. 7, 8.

*Habitat in Europa.*

*Sexus alter minor. Alis posticis subtus ocellis 6: primo majore.*

Xanthus, 87. P. D. alis integerrimis: supra fuscis fascia ferruginea; posticis subtus ocellis duobus: altero lunari. *M. L. U.*

*Habitat in Calidis regionibus.*

*Alæ Primores subtus intra apicem saepe ocello notatæ.*

*Posticæ subtus ad marginem anticum ocello majore littera C. alba notato & altero in medio alæ.*

\* NYMPHALES *Gemmati.*

Io. 88. P. N. alis angulato-dentatis fulvis nigro-maculatis: singulis subtus ocello cæruleo.

*Fr. svec.* 776. Oculus pavonis.

*Mourff. ins.* 968. t. 99. f. *ins.* *Hoffm. pict.* t. 12. f. 9.

*Jonst. ins.* 40. t. 5.

*Mer. eur.* 1. t. 26.

*Pet. mus.* 34. n. 314.

*Alb. ins.* t. 3. f. 4.

*Valent. herb.* t. 57.

*Reaumur. ins.* 1. t. 25. f. 1, 2.

*Raj. ins.* 122. n. 14.

*Ræf. ins.* 1. *pap.* 1. t. 3.

*Gœd. ins.* 1. t. 1.

*Wilk. pap.* 55. t. 3. a. 2.

*List. gœd.* f. 1.

*Habitat in Urtica, Humulo.*

Almana, 89. P. N. alis angulatis luteis: singulis supra ocellis sesquialteris: anteriore pupilla gemina.

*Edw. av.* t. 84.

*Habitat in Asia.*

*Similis Asterie, sed Alæ magis angulatæ.*

Asterie, 90. P. N. alis dentatis luteo-variis: singulis utrinque ocellis sesquialteris: anteriore pupilla geminata. *M. L. U.*

*Habitat in India.*

Aonis, 91. P. N. alis angulatis griseis, primoribus flavescenti-nubulosis: supra ocellis sesquialteris. *M. L. U.*

*Habitat in Asia.*

*Varietas alis subtus lividis & purpurascens. Ocelli subtus obsoleti sunt.*



Oenone. 92. P. N. alis denticulatis : primoribus albido-maculatis subbiocellatis; posticis basi cyaneis ocellis duobus.

*Pet. gaz. t. 4. f. 3.*

*Edw. av. t. 37. mas & femina.*

*Habitat in Asia.*

*Aliis Ocelli in pagina superiore, aliis in inferiore, aliis nulli in pagina superiore.*

Lemonias. 93. P. N. alis dentatis griseis punctis flavescens : omnibus ocello unico. *M. L. U.*

*Habitat in Indiis.*

*Ocellus in alis Anticis ad angulum posticum; in Posticis contra ad angulum anticum.*

Orithya. 94. P. N. alis dentatis fuscis : omnibus supra ocellis utrinque duobus; primoribus subtus unico. *M. L. U.*

*Edw. av. t. 26.*

*Habitat in Indiis*

*Ocelli ad marginem exteriorem: posteriore majore in alis primoribus.*

Feronia. 95. P. N. alis dentatis supra cæruleo fuscoque undulatis : omnibus ocellis sex.

*Habitat in India.*

*Alæ posticæ subtus quatuor literis o similibus; hexapus.*

Mæra. 96. P. N. alis subdentatis fusco-nebulosis : utrinque primoribus sesquiocello; posticis ocellis supra tribus.

*Fn. svec. 785. Satyrus.*

*Mouff. inf. 972. t. 104. f. 10. Raj. inf. 123. n. 15.*

*Aldr. inf. t. 244. f. 12. Robert. icon. t. 15. f. 2.*

*Fonst. inf. t. 58. f. 6. Merian. eur. 1. t. 27. f. 16, 17.*

*Pet. mus. 34. n. 312. Wilk. pap. 53. t. 2. b. 3.*

*Habitat in Gramine sylvarum.*

*Alæ posticæ subtus Ocellis sex, quorum ultimus pupilla gemina.*

Ligea. 97. P. N. alis subdentatis fuscis fascia rufa : utrinque primoribus ocellis quatuor, posticis tribus.

*Fn. svec. 787. Alexis.*

*Alb. inf. t. 5. f. 1.*

*Habitat in Europæ sylvis.*

Ægeria. 98. P. N. alis dentatis fuscis luteo-variegatis : primoribus ocello utrinque unico; posticis supra tribus.



*Reaum. inf. 1. t. 27. f. 16, 17.*

*Wilk. pap. 53. t. 2. b. 4.*

*Habitat in Europæ australioris Gramine, & in Mauri-*  
*tania.*

*Statura P. 96. Merae. Alæ supra fasciæ maculis luteis,*  
*subtus flavo nebulatæ. Primores ocello unico utrinque.*  
*Posticæ supra ocellis 3 (tertio sæpe cæco); subtus pun-*  
*ctæ alba ocellorum loco.*

Galathea. 99. P. N. alis dentatis albo nigroque variis, subtus pri-  
moribus ocello unico, posticis quinque obsoletis.

*Pet. mus. 33. n. 304. t. 1. f. 3. Raj. inf. 116. n. 9.*

*Wilk. pap. 52. t. 2. b. 1.*

*Habitat in Gramine Germaniæ & australioris Europæ.*

*Statura P. Rapa. Alæ dentatæ supra albo nigroque*  
*varie maculatæ; subtus concolores, sed pallidiores. O-*  
*celli, in prima inferiore tantum, obsoleti: primoribus*  
*versus angulum exteriorum 1; posticis 2 & 3: ho-*  
*rum uno proximus duplicatus. Antennæ apice sub-*  
*tus rufæ.*

Cyrene. 100. P. N. alis angulatis: supra cinerascentibus ocellis sub-  
marginalibus, subtus pallidis ocellis binis.

*Habitat in Indiis.*

*Alas subtus linea transversa repanda dividit; extra*  
*hanc in singulis alis puncta 2 ocellaria & aliquot*  
*simplicia.*

Semele. 101. P. N. alis dentatis fulvo nigroque nebulosis: primo-  
ribus utrinque ocellis duobus; posticis supra unico.

*Fn. svec. 784. Faunus.*

*Pet. gaz. t. 14. f. 9.*

*Rat. inf. 128. n. 6.*

*Rœs. inf. app. 1. t. 34. f. 5, 6.*

*Habitat in Europæ sylvis.*

Leda. 102. P. N. alis angulatis luridis: primoribus supra ocello  
geminato; posticis subtus ocellatis.

*Habitat in Asia.*

*Magnitudo P. Io. Alæ posticæ transverse angulatæ, sexu*  
*diversicolores.*

ALTER Alis - - omnibus supra luridis; Primores versus  
exteriora ocello didymo nigro pupilla alba. Posticæ ad  
marginem posticum ocellis 3 atris pupilla alba. Subtus  
omnes griseo reticulatæ s. nebulosæ: Primores subtus



punctis 3 ocellaribus versus marginem anteriorem. Posticæ ocellis 6 versus marginem anteriorem, quorum 2 minimus, 6 duplici pupilla.

ALTERA supra cum priori eadem, sed posticæ supra regionem pupillarum punctis 3 s. 4 minimis albis. Subtus omnes lurido griseæ punctis 3 s. 4 albis obsolete sub regione pupillæ.

Helie. 103. P. N. alis subdentatis luridis livido subfasciatis, subtus magis nebulosis, omnibus utrinque ocellis oblitteratis.

*Habitat in Asia.*

*Facies P. Leda.* Alæ supra luride, versus marginem anteriorem obsolete pallidius bifasciatae. Subtus luride, nebulosæ, vix manifeste fasciatae, sed postice linea nigricante ferruginea oblique ducta. Ocelli in omnibus utrinque 5, parvi, cæci, obsoleti. Angulus anterior cerulescens.

Jurtina. 104. P. N. alis subdentatis fuscis: primoribus supra litura flava ocello utrinque unico.

*Fn. svec. 786. Coridon.*

*Aldr. inf. t. 246. f. 13. Alb. inf. t. 53.*

*Pet. mus. 34. n. 309. Reaum. inf. 1. t. 11. f. 1.*

*Raj. inf. 124. n. 16. Wilk. pap. 53. t. 2. b. 2.*

*Habitat in Gramine Europæ, Africa.*

Æropa. 105. P. N. alis dentatis fuscis fascia lutea: primoribus subtus basi ocello unico.

*Habitat in Indiis.*

Janira. 106. P. N. alis dentatis fuscis: primoribus subtus luteis ocello utrinque unico; posticis subtus punctis tribus.

*Habitat in Europæ sylvis.*

*Facies P. Jurtinæ absque litura flava supra primores alas, sed puncta 3 fusca sub posticis.*

Cardui. 107. P. N. alis dentatis fulvis albo nigroque variegatis; posticis utrinque ocellis quatuor.

*Fn. svec. 778. Belladonna.*

*Mouff. inf. 169. t. 101. f. 1, 2.*

*Alb. inf. t. 56.*

*Pet. mus. 35. n. 326.*

*Merian. eur. t. 116. t. 15.*

*Raj. inf. 122. n. 13.*

*Reaum. inf. 1. t. 26. f. 11, 12.*



*Gœd. inf. 3. t. A.**Wilk. pap. 56. t. 3. a. 3.**List. gœd. f. 5. 6.**Rœs. inf. 1. pap. 1. t. 10.**Blank. inf. t. 3. f. A-C.**Habitat in Carduo Europæ, Africa.*

Pipleis. 108. P. N. alis crenatis nigris concoloribus; posticis disco fulvis: ocellis septem. *M. L. U.*

*Habitat in Indiis.**Alæ Primores fascia alba ex maculis 7; Posticæ maculis 7, ovalibus, nigris pupilla alba, intra marginem posticum.*

Lampe- 109. P. N. alis crenatis: primoribus fuscis fascia  
tia. flava; posticis supra ocellis sex. *M. L. U.*

*Habitat in Indiis.**Ocelli intra marginem posticum concatenati sunt.*

Iris. 110. P. N. alis subdentatis subtus griseis: fascia utrinque  
alba interrupta; posticis supra uniocellatis.

*Richter. mus. 336. Papilio Iris.**Rœs. inf. 3. t. 42.**Raj. inf. 126. n. 2.**Wilk. pap. 63. t. 1. a. 2.**Habitat in Quercu Germaniæ, Angliæ &c. P. Forskål.**Statura P. Populi. Pedes duo antici angustissimi mutili. Alæ omnes supra cærulescenti-nigræ; subtus cinereo-griseæ. Primores supra maculis albis sparsis in medio & exterius. Subtus griseo cinereo variæ maculis albis, cum ocello occultato intra marginem exterierem. Posticæ supra fascia alba & ocello ferrugineo versus postica: subtus cinereæ fascia alba dentata lateribus ferruginea cum puncto sub ocellis.*

## \* \* NYMPHALES phalerati.

Populi. 111. P. N. alis dentatis fuscis albo fasciatis maculatisque;  
subtus luteis albo fasciatis: maculis cærulescentibus.

*Raj. inf. 127. n. 3.**Uddm. diss. 54. f. 15.**Clerck. act. Stockh. 1753. p. 278. t. 7.**Rœs. inf. app. 1. t. 33. f. 1. 2.**Habitat in Populo tremula.*

Antiopa. 112. P. N. alis angulatis nigris limbo albido.

*Fn. svec. 772. Morio.*

Fonst.



*Fonst. inf. t. 9. & 11. Wilk. pap. 58. t. 2. a. 10.*  
*Raj. inf. 135, 136. Roes. inf. 1. p. 1. t. 1.*  
*De Geer. inf. 1. t. 21. f. 8, 9.*  
*Habitat in Betula, Salice, etiam in America. Kalm.*

poly-  
chloros.

113. P. N. alis angulatis fulvis nigro maculatis: primori-  
 bus supra punctis quatuor nigris. *Fn. suec. 773.*  
*Aldr. inf. 246. f. 7. Merian. eur. 2 t. 2.*  
*Gœd. inf. 1. t. 77. Alb. inf. t. 55.*  
*List. gœd. 5. f. 3. Frisch inf. 6. t. 3.*  
*Pet. mus. 34. n. 315. Reaum. inf. 1. t. 23. f. 2.*  
*Raj. inf. 118. n. 2. Roes. inf. 1. pap. 1. t. 2*  
*Wilk. pap. 56. t. 3. a. 5.*  
*Habitat in Pyro, Ceraso, Salice.*

Urticæ.

114. P. N. alis angulatis fulvis nigro-maculatis: primo-  
 ribus supra punctis tribus nigris. *Fn. suec. 774.*  
*Mouff. inf. 101. f. 5, 6. Bracl. nat. t. 27. f. 2.*  
*Gœd. inf. 1. t. 21. Merian. eur. 1. t. 44.*  
*List. gœd. 3. f. 2. Alb. inf. t. 4. 51.*  
*Blank. inf. 13. t. 1. f. L-Q. Swamm. bibl. t. 35. f. 12.*  
*Raj. inf. 117. n. 1. Reaum. inf. 1. t. 26. f. 6, 7.*  
*Robert. icon. t. 5. Roes. inf. 1. pap. 1. t. 4.*  
*Hoffm. pict. 2. f. 16. Wilk. pap. 56. t. 3. a. 3 fig. inf.*  
*Habitat in Urtica vulgarissimus.*

C. album.

115. P. N. alis angulatis fulvis nigro-maculatis; posticis  
 subtus C albo notatis. *Fn. suec. 775.*  
*Mouff. inf. 103. f. 2. Frisch. inf. 4. t. 4.*  
*Aldr. inf. t. 244. f. 3, 4. Reaum. inf. 1. t. 27. f. 9, 10.*  
*Raj. inf. 118. n. 3. De Geer. inf. 1. t. 20 f. 9, 10.*  
*Rob. icon. t. 23. Roes. inf. 1. pap. 1. t. 5.*  
*Merian. eur. 1. t. 14. f. 159. Wilk. pap. 57. t. 3. a. 6.*  
*Alb. inf. t. 4. f. 5.*  
*Habitat in Grossularia, Humulo, Urtica.*

C. au-  
reum.

116. P. N. alis angulatis fulvis nigro-maculatis; posticis  
 subtus C aureo notatis.  
*Habitat in Asia.*  
*Simillimus Pap. C albo, sed duplo major, subtus magis*  
*luteo-nebulosus & C aureo minori notatus.*

Dirce.

117. P. N. alis angulatis fuscis, primoribus fascia flava:  
 subtus nigro undulatis. *M. L. U.*  
*Habitat in Calidis regionibus.*



Ama- 118. P. N. alis angulatis: supra fuscis albo punctatis: ta-  
 thea. scia rubra: linea nigra undata. *M. L. U.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Habitus Pap. Atalanta.*

Atalan- 119. P. N. alis dentatis nigris albo maculatis: fascia  
 ta. communi purpurea, primoribus utrinque, posticis mar-  
 ginali.

*Fn. swec. 777. Ammiralis.*

*Mouff. inf. 100 f. 3, 4.*

*Aldr. inf. 240 f. 45.*

*Jonst. inf. t. 7. f. 6, 7.*

*Raj. inf. 126. n. 1.*

*Pet. mus. 35. n. 327.*

*Gæd. inf. 1. t. 26.*

*List. gæd. 10. f. 4.*

*Habitat in Urtica.*

*Ocelli in pagina inferiore adeo obsoleti, ut vix ocellorum nomine veniant.*

*Blank. inf. t. 18. f. 2. A-D.*

*Merian. eur. 2. t. 91.*

*Alb. inf. t. 3 f. 4.*

*Reaum. inf. 1. t. 10 f. 8, 9.*

*De Geer. inf. 1. t. 22 f. 5.*

*Rœs. inf. 1. pap. 1. t. 6.*

*Wilk. pap. 55. t. 3. a. 1.*

Venilia. 120. P. N. alis dentatis fuscis: fascia communi arcuata  
 alba marginibus cærulescente. *M. L. U.*  
*Habitat in Calidis regionibus.*

Alimena. 121. P. N. alis dentatis atris: fascia cærulea inter-  
 rupta: singulis punctis septem albidis marginalibus.  
*M. L. U.*  
*Habitat in Indiis.*

Leuco- 122. P. N. alis dentatis supra fuscis subtus luteis: fasciis  
 thoë. tribus macularibus albis nigro notatis.  
*Habitat in Asia.*

*Magnitudo Pap. Urticæ. Alæ utrinque fasciis 3 trans-  
 versis, coarctibus versus angulum exteriorem primorum:  
 Fascia Prima in primoribus, nigro interrupta. Se-  
 cunda per posticas & primores utrinque linea nigra  
 notata. Tertia in posticis ex maculis 7 albis puncto  
 nigro foetis.*

Phætusa. 123. P. N. alis dentatis fulvis: fasciis tribus fuscis: pri-  
 morum longitudinalibus, posticarum transversis.  
*M. L. U.*

*Rœs. inf. 4. p. 24. t. 2. f. 1.*

*Habitat in Indiis.*



Bolina. 124. P. N. alis dentatis nigris: primoribus maculis duabus; posticis solitaria albo-cærulea. *M. L. U.*  
*Habitat in India.*

Clytia. 125. P. N. alis dentatis nigris: margine exteriori primoribus albo maculato, posticis albo luteoque triplici ordine.  
*Habitat in Indiis.*

Neærea. 126. P. N. alis dentatis supra fuscis albo-maculatis, subtus maculis albis linea rubra cinctis.  
*Edw. av. 33. t. 33.*  
*Habitat in Indiis.*

Acesta. 127. P. N. alis subdentatis: primoribus nigris basi fasciæque flavis; posticis flavis: subtus fasciis fuscis. *M. L. U.*  
*Habitat in Indiis.*

similis. 128. P. N. alis subrepandis nigris concoloribus: punctis cærulefcenti-albis basin versus lineatis.  
*Pet. gaz. t. 92. f. 13; an t. 3. f. 4?*  
*Habitat in Asia.*

affimilis. 129. P. N. alis subrepandis nigris concoloribus: punctis cærulefcenti albidis; posticis punctis coccineis.  
*Habitat in Asia.*  
*Simillimus P. simili, sed alæ posticæ intra marginem posticum punctis s. maculis 5, quarum una puncto nigro notata.*

dissimilis. 130. P. N. alis dentatis dilatato-venosis nigris concoloribus: maculis sagittatis albis posticis luctus luteis.  
*Ehret. pict. t. 17.*  
*Habitat in Asia.*

*Alæ omnes nigre, quasi ex venis nigris dilatatis striatæ, interjectis maculis albis sagittatis: anterioribus longioribus, posticis brevioribus: in alis posticis ordo extremus macularum reniformis luteus; ex his ad angulum ani maculæ luteæ geminatæ, etiam supra conspicuæ.*

Panope. 131. P. N. alis dentatis fuscis concoloribus: limbo exteriori albo maculatis: posticis margine luteo maculatis.  
*Habitat in Asia.*



*Alæ primores ad marginem exteriorem maculis obsoletioribus albis sagittatis. Posticæ intra marginem posteriorem ordine triplici macularum sagittiformium, quarum postremæ reniformes luteæ.*

Rumina. 132. P. N. alis dentatis variegatis: supra primoribus punctis sex, posticis quatuor rubris.

*Catesb. car. 2. p. 95. t. 95.*

*Habitat in Europa australi.*

*Alæ Posticæ subtus maculis 8 albis.*

Levana. 133. P. N. alis dentatis variegatis: subtus reticulatis; primoribus supra maculis aliquot albis.

*Rœs. inf. 1. pap. 1. t. 9. f. 5, 6.*

*Habitat in Urtica Europæ australioris. P. Forskål.*

Prorsa. 134. P. N. alis dentatis subfuscis: fascia utrinque alba: primoribus interrupta.

*Rœs. inf. 1. pap. 1. t. 8. f. 6, 7.*

*Habitat in Urtica Germaniæ.*

Lucina. 135. P. N. alis dentatis fuscis testaceo-maculatis, subtus fasciis duabus macularum albidarum.

*Pet. gaz. t. 16. f. 10.*

*Raj. inf. 122. n. 12.*

*Habitat in Europa.*

Materna. 136. P. N. alis dentatis purpurascensibus nigro-maculatis: subtus fasciis tribus flavis.

*Pet. gaz. t. 1. f. 8.*

*Raj. inf. 120. n. 8.*

*Merian. eur. t. 88?*

*Wilk. pap. 58. t. 2. a. 9.*

*Habitat in Corylo, Erica.*

Cinxia. 137. P. N. alis dentatis fulvis nigro-maculatis: subtus fasciis tribus flavis.

*Fn. svec. 783. Comes.*

*Pet. gaz. t. 18. f. 10.*

*Rœs. inf. 4. t. 13.*

*Raj. inf. 121. n. 9.*

*Reaum. inf. 2. t. 9.*

*Wilk. pap. 58. t. 3. a. 8.*

*Habitat in Veronica, Plantagine, Trifolio, Gramine.*

*Mas elinguis; Femina vero lingua spirali. Rolander.*

138. P. N.

Fritillarii vulgo dicti 132 ad 144, quum alæ maculis fere tessellatæ sint; sed 138 ad 144 ob maculas argenteas Nobiles communiter nominati sunt.



- Paphia. 138. P. N. alis dentatis fulvis nigro-maculatis: subtus lineis argenteis transversis.  
*Fn. svec.* 779. Imperator.  
*Pet. mus.* 35. n. 321. *Rœs. inf.* 1. pap. 1. t. 7.  
*Raj. inf.* 119. n. 4. *Wilk. pap.* 57. t. 2. a. 7.  
*Habitat in Urtica.*
- Cytherea. 139. P. N. alis crenatis flavis fascia communi argentea: subtus fascia lanceolata argentea.  
*Habitat in Indiis.*  
*Alæ supra cinereo nebulosæ: primores disco flavo.*
- Aglaja. 140. P. N. alis dentatis fulvis nigro-maculatis: subtus maculis XXI argenteis.  
*Fn. svec.* 780. Rex.  
*Mouff. inf.* 169. t. 101. f. 3. 4. *Raj. inf.* 119. n. 5.  
*Aldr. inf.* 246. f. 8, 9. *Wilk. pap.* 59. t. 2. a. 12.  
*Pet. mus.* 35. n. 320.  
*Habitat in Viola tricolore.*  
*Alæ maculis argenteis: primorum 4 obsoletis, posticarum 21.*
- Lathonia. 141. P. N. alis dentatis fulvis nigro-maculatis: subtus maculis XXXVII argenteis.  
*Fn. svec.* 781. Principissa.  
*Hoffm. pict.* t. 11. f. 11. *Raj. inf.* 120. n. 6.  
*Robert. ic.* t. 12. *Merian. eur.* 2. t. 157. f. super.  
*Pet. mus.* 51. n. 520. *Rœs. inf. app.* 1. t. 10.  
*Habitat in Europa.*  
*Alæ maculis argenteis primorum 7, posticarum 21.*
- Euphrosyne. 142. P. N. alis dentatis fulvis nigro-maculatis: subtus maculis IX argenteis.  
*Fn. svec.* 782. Princeps.  
*Pet. mus.* 35. n. 382.  
*Raj. inf.* 120. n. 7.  
*Habitat in Europa & America septentrionali.*  
*Alæ maculis argenteis: posticarum 9: harum 1 disci, 1 baseos.*
- Niobe. 143. P. N. alis dentatis fulvis nigro-maculatis: subtus maculis XIII argenteis obsoletis.  
*Habitat in Europa.*

H h

Alæ



*Alæ maculis argenteis : posticarum 7 marginalibus, punctata 6 disci.*

Vanillæ. 144. P. N. alis dentatis flavis nigro-maculatis ; subtus maculis XXX argenteis. *M. L. U.*

*Merian. surin. 25. t. 25.*

*Sloan. jam. 2. t. 239. f. 23, 24.*

*Habitat in Epidendro Vanilla Americes.*

*Alæ maculis argenteis primorum 7, posticarum 22.*

\* *PLEBEJI rurales.*

Cupido. 145. P. P. alis posticis sexdentato-caudatis ; subtus albidis maculis argenteis.

*Pet. gaz. t. 10. f. 9.*

*Mus. petrop. 690. n. 351.*

*Merian. surin. t. 10. f. 1.*

*Rœs. inf. 4. p. 27. t. 3. J. 7.*

*Habitat in Gossypio Americes.*

*Speciosissimus ob maculas argenteas saturatissimas & gibbas.*

Betulæ. 146. P. P. alis subcaudatis fuscis ; primoribus macula reniformi fulva, subtus luteis fascia fulva.

*Fn. svec. 792.*

*Wilk. pap. 61. t. 1. a. 2. Reaum. inf. 1. t. 28 f. 1-7.*

*Rœs. inf. 1. pap. 2. t. 6. Alb. inf. t. 5. f. 7.*

*Raj. inf. 130. n. 10.*

*Pet. gaz. t. 11. f. 11.*

*Habitat in Betula, Pruno spinosa.*

Pruni. 147. P. P. alis subcaudatis supra fuscis, subtus fascia marginali fulva utriusque nigro punctata.

*Rœs. inf. 1. pap. 2. t. 7.*

*Pet. gaz. 11. f. 10?*

*Raj. inf. 130. n. 9?*

*Habitat in Pruno domestica.*

Quercus. 148. P. P. alis subcaudatis supra cæruleis, subtus cinereis linea alba, puncto ani gemino fulvo.

*Pet. gaz. t. 11. f. 9.*

*Rœs. inf. 1. pap. 2. t. 9.*

*Raj. inf. 129. n. 8.*

*Wilk. pap. 61. t. 1. a. 1.*

*Alb. inf. t. 52. f. a. 6.*

*Habitat in Quercu.*

Marsyas. 149. P. P. alis bicaudatis : supra cæruleis ; subtus cærulescentibus punctis nigris.

*Habitat in Calidis regionibus.*



- Thamy- 150. P. P. alis unicaudatis: supra cæruleis margine nigro;  
ras.       subtus nigro alboque ocellatis. *M. L. U.*  
*Habitat in Calidiqribus regionibus.*
- Arion. 151. P. P. alis ecaudatis: supra fuscis disco cæruleo ma-  
culis atris; subtus canis punctis ocellaribus.  
*Rœs. inf. 3. suppl. t. 45. f. 3, 4.*  
*Habitat in Europa.*  
*Statura sequentis, sed duplo maior. Ala posticæ subtus*  
*ocellis 10, præter puncta marginalia.*
- Argus. 152. P. P. alis ecaudatis cæruleis; posticis factus limbo  
ferrugineo ocellis cæruleo-argenteis.  
*Fn. svec. 803. 804.*  
*De Geer. inf. t. 4. f. 14, 15. Robert. ic. t. 17.*  
*Wilk. pap. 63. t. 1. a. 1. Pet. gaz. t. 35. f. 1.*  
*Rœs. inf. app. 1. t. 37. f. 3-5. Raj. inf. 131. n. 11, 12.*  
*Merian. eur. t. 153. 174. Fossl. inf. t. 6. f. penult.*  
*Mouff. inf. 106. f. 1.*  
*Habitat in Rhamno Europæ, Africa.*
- Argio- 153. P. P. alis ecaudatis: supra cæruleis margine nigris;  
lus.       subtus cærulescentibus punctis nigris dispersis.  
*Raj. inf. 132. n. 16.*  
*Habitat in Europa.*  
*Præcedenti similis, sed minor; subtus puncta pauciora*  
*dissita absque ocellis nigris.*
- Rubi. 154. P. P. alis dentato-subcaudatis; supra fuscis, subtus  
viridibus.  
*Fn. svec. 805, 806. Wilk. pap. 62. t. 1. a. 2.*  
*Alb. inf. t. 5. f. 8. Pet. gaz. t. 2. f. 11.*  
*Habitat in Rubo aculeato.*
- Philocles. 155. P. P. alis integerrimis supra fuscis: subtus primori-  
bus ocello; posticis lineis transversis undatis. *M. L. U.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Alæ primores supra fascia albo-cærulescente.*
- Timan- 156. P. P. alis integerrimis fusco cærulescentibus, subtus  
tes.       fasciis fuscis ocellisque. *M. L. U.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Ocellus viridi-flavus sub apice primorum; ocelli aliquot*  
*ad marginem posticarum, etiam subtus.*



Athemou. 157. P. P. alis integerrimis subfuscis: disco communi albo: fascia postica dimidiata fulca. *M. L. U.*  
*Habitat in America.*

Caricæ. 158. P. P. alis integerrimis fulvis: disco communi albo, limbo cinereo ocellato. *M. L. U.*  
*Merian. surin. 40. t. 40. f. 1.*  
*Habitat in Carica Americæ.*

Phereclus. 159. P. P. alis integerrimis utrinque atris: primoribus fascia lineari rubra.  
*Habitat in America.*

Lysippus. 160. P. P. alis subangulatis utrinque atris: omnibus fascia lineari rubra. *M. L. U.*  
*Habitat in America.*

Virgaureæ. 161. P. P. alis subangulatis fulvis margine fusco, punctis atris sparsis.

*Fn. svec. 807. 808. Butyracea.*

*Roes. inf. app. 1. t. 37. f. 6, 7. Merian. eur. t. 164. t. 45. f. 5, 6. Raj. inf. 125. n. 20.*

*Habitat in Solidagine Virgaurea Europæ, Ayricæ.*

*Sexus alter alis omnibus supra fulvis immaculatis; subtus flavis: primoribus punctis fuscis; posticis serie punctulorum albidorum.*

*— alter alis supra primoribus fulvis maculis sparsis atris; posticis fuscis fascia postica fulva dentata. Subtus primores maculis sparsis atris margine albo ocellatis; posticæ cinerascens punctis nigris obsolete.*

\* PLEBEJI *orbicola.*

Comma. 162. P. P. alis integerrimis divaricatis fulvis: punctis albis lineolaque nigra. *Fn. svec. 793.*  
*Merian. eur. 15. t. 48.*  
*Habitat in Europa.*

Proteus. 163. P. P. alis caudatis fuscis maculis fenestratis, antennis uncinatis. *M. L. U.*  
*Merian. surin. t. 63. f. 2.*  
*Habitat in Gramine Americæ.*

*Varietates hujus numerosæ sunt in Indiis; tam colore, quam alarum posticarum figura.*



Phidias. 164. P. P. alis rotundatis atris nitentibus margine albis, ore anoque rubris. *M. L. U.*

*Pet. gaz. t. 43. f. 15.*

*Habitat in Asia.*

Bixæ. 165. P. P. alis rotundatis fuscis basi virentibus: posticis subtus fascia lactea.

*Merian. surin. t. 44.*

*Pet. gaz. t. 32. f. 5.*

*Habitat in America.*

Polycle- 166. P. P. alis subcaudatis viridi-fuscis: primoribus ma-  
tus. cula alba; subtus argenteo punctatis.

*Habitat in Indiis.*

*Alæ primores supra fusce, ad basin virides macula alba oblonga in medio; subtus maculis fuscis numerosis quadratis margine nigro argenteoque cinclis. Posticæ fusce, subtus primorum instar maculata, sed absque margine albo.*

Malvæ. 167. P. P. alis denticulatis divaricatis nigris albo maculatis.

*Fn. svec 749. It. æl. 3.*

*Pet. gaz. t. 36. f. 6.*

*Rœf. inf. 1 pap. 2. t. 10.*

*Merian. eur. 1. t. 48.*

*Wilk. pap. 54. t. 2. c. 1.*

*Reaum. inf. 1. t. 11. f. 6. 7.*

*Habitat in Malva, Althæa.*

Tages. 168. P. P. alis denticulatis divaricatis fuscis obsolete albo-punctatis.

*Habitat in Europa.*

*Similis P. Malvæ sed magis fuscus.*

\* BARBARI.

Bates. 169. P. B. alis subcaudatis fuscis: primoribus fascia flavescente albida; omnibus subtus nigro striatis. 3.

*Habitat in Indiis.*

Tiphus. 170. P. B. alis subcaudatis supra nigris: primoribus maculis duabus; posticis disco margine rubro albis. 3.

*Habitat in Indiis.*

*Alæ præterea punctis albis versus margines & primoribus subtus venis rubris.*

Jason. 171. P. B. alis subcaudatis; supra fuscis, fascia posticisque maculis sex viridibus. 2.



*Habitat in Indiis.*

*Alarum fascia lata ab angulo ani posticarum ad medium primorum ducta; macularum ordo ex 14 maculis viridibus ab angulo alæ primoris ad angulum ani extensus.*

Iphiclus 172. P. B. alis angulatis: supra fuscis fascia alba, maculaque ferruginea anguli ani. 3.

*Habitat in Indiis.*

*Macula magna ferruginea intra apicem alæ primoris. Fascia alba ab angulo ani ad medium alæ primoris ducta.*

Hylas. 173. P. B. alis dentatis supra fuscis subtus lutescentibus: fasciis utrinque tribus albis interruptis. 3.

*Habitat in Indiis.*

*Femina in alarum posticarum fascia postica subtus punctis 8 nigris.*

Idmon. 174. P. B. alis dentatis fuscis: primoribus utrinque fascia alba. 3.

*Habitat in Indiis.*

Ancæus. 175. P. B. alis dentatis atris: primoribus fascia cærulea; posticis lutea. 3.

*Habitat in Indiis.*

*Alæ posticæ subtus lineis 3 transversis griseis: puncta 2 lateralia nigra; 2 inter lineas alba.*

Eleus. 176. P. B. alis dentatis fusco-nebulosis concoloribus: fascia primoribus flava, posticis alba. 3.

*Habitat in Indiis.*

Amphion. 177. P. B. alis dentatis fuscis subconcoloribus: primoribus maculis albis ter geminis, posticis sex transversis.

*Habitat in Indiis.*

*Maculæ alæ primoris 2 intra apicem, 2 in medio disci, 2 versus basin; posticæ 6 parallele transversæ.*

Telamon. 178. P. B. alis biangulatis subcaudatis cinereis: fasciis albis maculaque nigra flavaque. 4.

*Habitat in Indiis.*

*Alæ fascia alba ab angulo ani ad medium primorum; fasciæ 2 lineares parallele intra fasciam priorem; catena e maculis flavis minoribus extra præcedentem. Angulus ani flavus nigro notatus.*

179. P. B.



- Eribo- 179. P. B. alis integerrimis flavis : primoribus supra ma-  
tes. culis tribus nigris ; posticis fuotus linea cinerascente. 4.  
*Habitat in Indiis.*  
*Alæ primores maculis 2 a margine anteriore versus di-*  
*scum. 1 ad medium marginis tenuioris. Posticæ ver-*  
*sus angulum posticum margine fuscæ.*
- Eurytus. 180. P. B. alis integerrimis rotundatis concoloribus fuscis  
nigro striatis : fascia alba ; posticis punctis decem atris. 3.  
*Habitat in Indiis.*  
*Alæ posticæ basi ferrugineæ, disco versus basin albo striis*  
*nigris.*
- Ceneus. 181. P. B. alis rotundatis subfuscis : posticis subtus macu-  
lis novem rubris in orbem digestis. 3.  
*Habitat in Indiis.*  
*Alæ basi pallidæ ; maculis aliquot flavis intra apicem.*
- Mopsus. 182. P. B. alis rotundatis oblongis concoloribus lateo ni-  
groque variegatis : singulis subtus punctis octo albis  
submarginalibus. 3.  
*Habitat in Indiis.*  
*Alæ primores ad basin testaceæ, medio flavæ, apice ni-*  
*græ : discus alæ maculis 5 fuscis. Posticæ fascia trans-*  
*versa, nigra, atrinque serrata.*
- Cepheus. 183. P. B. alis rotundatis fulvis : primoribus extimo nigris ;  
posticis punctis XVII nigris. 4.  
*Habitat in Indiis.*  
*Alæ primores extrema medietate nigre, concolores. Po-*  
*sticæ margine nigro introrsum serrato, disco punctis*  
*17 sparsis inæqualibus.*
- Zetes. 184. P. B. alis rotundatis supra primoribus nebulosis pun-  
ctatis ; posticis fulvis punctatis. 3.  
*Habitat in India.*
- Priassus. 185. P. B. alis rotundatis concoloribus nigris ; primoribus  
fasciis duabus fulvis unitis macula tertia minore. 4.  
*Habitat in Indiis.*
- Acastus. 186. P. B. alis rotundatis albis : maculis quinque transver-  
sis apicibusque fuscis ; subtus flavescentibus. 3.



*Habitat in Indiis.*

*Alæ primores supra maculis 5 ovatis transversis obsoletis & unica saturatiore versus basin; subtus pallidæ fascia fusca. Posticæ supra albæ marginae postico nigricantes; subtus flavescentes.*

Neleus. 187. P. B. alis rotundatis concoloribus nigris: primoribus punctis decem albis; posticis disco toto albis. 4.

*Habitat in Indiis.*

Encedon. 188. P. B. alis rotundatis concoloribus flavis: primoribus extrorsum fascia alba nigris, posticis punctis 19 nigris. 4.

*Habitat in Indiis.*

Pinthous. 189. P. B. alis rotundatis integerrimis concoloribus: primoribus fuscis maculis tribus flavis; posticis dimidiato albis. 4.

*Habitat in Indiis.*

*Alæ primores macula parva intra apicem; magna transversa in medio; oblonga ad basin. Posticarum pars dimidia antica alba, posticæ nigra; interjecta area flavescente.*

Nauplius. 190. P. B. alis rotundatis oblongis fuscis: primoribus supra maculis quatuor albidis; posticis fascia albida. 4.

*Habitat in Indiis.*

*Alæ oblongæ primores subtus macula oblonga ad basin.*

Ixilion. 191. P. B. alis integerrimis subconcoloribus fuscis: primoribus luteo-maculatis, posticis luteo-striatis. 3.

*Habitat in Indiis.*

*Alæ primores maculis 3 coadunatis intra apicem; 3 parvis, distinctis in medio, 2 oblongis ad basin. Posticæ fuscae tota superficie striatæ lineis luteis bifidis.*

Idas. 192. P. B. alis nigris concoloribus, punctis 10 flavis ovatis sparsis.

*Habitat in Indiis.*



204. SPHINX. *Antennæ* medio crassiores f. utraque extremitate attenuatæ, subprismaticæ.

*Ala* deflexæ (volatu graviore vespertino f. matutino).

\* LEGITIMÆ *Alis angulatis.*

ocellata. 1. S. alis angulatis: posticis ocellatis.

*Raj. inf.* 148. *Phalæna* major, corpore crasso, alis amplis interioribus macula ophthalmoides.

*Mouff. inf.* 91.

*Fonst. inf. t.* 8. f. 30.

*Gœd. inf.* 3. p. 25. t. 0. *List. gœd.* 68. f. 24.

*Udâm. diss.* 58. f. 11. *Alb. inf.* 8. f. 12.

*Mer. inf.* 2. t. 37. *Rœf. inf.* 1. phal. 1. t. 1.

*Wilk. pap.* 10. t. 5. B. 5. *Raj. inf.* 148. n. 2.

*Habitat in* Spiraæ, Salice, Pomiferis Drupiferisque arboribus.

Populi. 2. S. alis angulatis reversis; posticis basi ferrugineis; anticis puncto albo.

*Fr. suec.* 810. *Phalæna* prismicornis spirilinguis, alis planiusculis erosis griseis, antennis albis.

*Rœf. inf.* 3. suppl. t. 30.

*Wilk. pap.* 11. t. B. 6.

*De Geer. inf.* 1. t. 8. f. 5.

*Alb. inf.* t. 57.

*Habitat in* Populo, Salice rubra.

Tiliae. 3. S. alis angulatis: superioribus griseo fasciatis; posticis testaceis.

*Merian. cur.* 2. t. 24.

*Wilk. pap.* 10. t. 1. B. 4.

*Alb. inf.* t. 10.

*Frisch. inf.* 7. t. 2.

*Rœf. inf.* 1. phal. t. 2.

*Habitat in* Tilia.

Ocypete. 4. S. alis angulatis nebulosis; posticis margine baseos postico albis.

*Habitat in* calidis regionibus.

*Magnitudo* Afili.

H h 5

5. S.

Sphinges matutinae & vespertinae imprimis volare sunt, tardiores, ponderosiores quasi, saepe sono obvolitantes, linguaque exserta haurientes nectar florum, nec in floribus facile quiescentes.



Nerii. 5. S. alis subangulatis viridibus: fasciis variis pallidioribus saturatioribus flavescensque:

*Rœs. inf. 1. phal. 1. t. 16.*

*Frisch. inf. 7. t. 3.*

*Habitat in Nerio.*

\* \* *Legitimæ Alis integris, ano simplici.*

Convolvuli. 6. S. alis integris: posticis albo fasciatis margine postico albo punctatis, abdomine rubro cingulis atris.

*Merian. inf. 39. t. 75. f. 2. t. 25.*

*Gœd. inf. 3. t. 5.*

*Rœs. inf. 1. phal. 1. t. 7.*

*Wilk. pap. 9. t. 1. B. 2.*

*Habitat in Convolvulo.*

*Thorax antice arcubus 2 nigris. Alæ posticæ cinereæ fasciis 3 fuscis.*

Ligustri 7. S. alis integris: posticis incarnatis fasciis nigris, abdomine rubro cingulis nigris.

*Fr. succ. 89. Phalæna prismicornis spirilinguis fusca, alis inferioribus abdomineque fasciis transversis rubris.*

*Mouff. inf. 91. f. 2. f. 182. f. 1.*

*Fonst. inf. t. 19. f. 1. 2.*

*Facch. mus. 1. f. 5. n. 24. t. 1 f. 24.*

*Alb. inf. t. 7. f. 10.*

*Swamm. bibl. t. 29. f. 1, 2, 3. Raj. inf. 144. n. 1.*

*Jung. verm. 108.*

*Gœd. inf. 1. p. 93. t. 24.*

*Test. gœd. 71. f. 25.*

*Reaum. inf. 2. t. 20. f. 1-4.*

*Rœs. inf. app. 1. p. 25. t. 5. Wilk. pap. 10. t. 1. B. 3.*

*De Geer. inf. 1. t. 1. f. 6.*

*Habitat in Ligustro, Syringa, Fraxino, Lonicera, Sambuco.*

Atropos. 8. S. alis integris: posticis luteis fasciis fuscis, abdomine luteo maculato: cingulis nigris.

*Amœn. acad. 3. p. 321. Caput mortuum.*

*Alb. inf. t. 6.*

*Wilk. pap. 9. t. 1. B. 1.*

*Reaum. inf. 2. t. 24. l. 14. f. 2. Hasselqv. it. 417. n. 104. 105.*

*Osbeck. it. 89.*

*Rœs. inf. 3. t. 1, 2.*

*Habitat in Jasmino Europæ; Ægypti duplo major & India.*

9. S.

Indis S. hinc plurimæ, quæ difficilius determinantur & synonymis distinguuntur ut *Merian. surin. t. 14, 38, 39, 45, 46, 55, 57, 61, 62.*



- Caricæ.** 9. S. alis integris: posticis supra luteis, abdomine cinereo: cingulis nigris. *M. L. U.*  
*Merian. surin. 64. f. 1. 2.*  
*Habitat in Carica Americæ.*  
*Thorax lineis atris. Alæ superiores fuscae venis atris undato-fasciatæ.*
- Celerio.** 10. S. alis integris griseis lineola albo nigra; inferioribus basi rubris maculis iæx.  
*Gæd. inf. 3. f. 7.*  
*Frisch. inf. 13. t. 1. f. 2.*  
*List. gæd. f. 26.* *Rœf. inf. 4. t. 8.*  
*Habitat in Vite.*
- Ello.** 11. S. alis integris: posticis rufis margine crassiore nigris, abdomine pallido cingulis atris. *M. L. U.*  
*Habitat in India.*
- Labru-  
scæ.** 12. S. alis subfuscis: posticis subtus puncto albo, abdomine lateribus punctis V albis. *M. L. U.*  
*Merian. sur. t. 34.*  
*Habitat in Vite Americæ.*
- Ficus.** 13. S. alis fusco nebulosis: posticis angulo ani albis. *M. L. U.*  
*Merian. sur. t. 33.*  
*Habitat in Ficu Americæ.*  
*Alæ superiores in medio puncto fusco; inferiores supra fasciis 2 fuscis.*
- Vitis.** 14. S. alis cinereis fusco variis: posticis margine tenuiore sanguineis.  
*Merian. surin. t. 47. f. 1.*  
*Habitat in Vite Americæ.*  
*Alæ inferiores macula nigra in disco.*
- Elpenor.** 15. S. alis integris viridi purpureoque variis: inferioribus basi atris. *Fn. suec. 811.*  
*Mouff. inf. 183.* *Raj. inf. 145. n. 2.*  
*Pet. gaz. t. 40. f. 11. 12. 17.* *Alb. inf. t. 9. f. 13.*  
*Merian. inf. 2. t. 33. f. 73.* *Frisch. inf. 12. t. 1.*  
*Rœf. inf. 1. phal. 1. t. 4.* *De Geer. inf. 1. t. 9. f. 8. 9.*  
*Wilk. pap. 11. t. 1. B. 7.*  
*Habitat in Epilobio, Impatiente, Vite.*



- Porcel- 16. S. alis integris flavicante purpureoque variis; inferiori-  
lus. bus basi fuscis.  
*Rœs. inf. 1. phal. 1. t. 5.*  
*Habitat in Epilobio, Impatiante.*  
*Simillimus priori ut facile idem insectum, sed larva mi-  
nor, nigra, absque cornu.*
- Euphor- 17. S. alis integris fuscis: vitta superioribus flava; inferiori-  
biæ. bus purpurascente.  
*Fn. succ. 1356.* *Frisch. inf. 2. t. II.*  
*Reaum. inf. 1. t. 13. f. 4-7.* *De Geer. inf. 1. t. 8. f. 6-11.*  
*Rœs. inf. 1. phal. 1. t. 3.* *Uddm. diss. 57.*  
*Habitat in Euphorbia, Galio.*
- Alecto. 18. S. alis integris: primoribus supra griseis; posticis rubris  
basi margineque atris. *M. L. U.*  
*Habitat in India.*
- Megæra. 19. S. alis viridibus: posticis fulvis fusco-maculatis.  
*M. L. U.*  
*Habitat in India.*
- Pinastri. 20. S. alis integris canis margine postico albo maculato,  
abdomine fusco annulis albis.  
*Gadd. diss. 28.* *Phalæna fusco cinerea subulicornis, tho-  
race hirsuto griseo, lineis duabus nigris longitudina-  
libus.*  
*Reaum. inf. 1. t. 13. f. 8.*  
*De Geer. inf. 1. t. 10. f. 1, 2, 3.*  
*Rœs. inf. 1. phal. 1. t. 6.*  
*Habitat in Pino.*  
*Alæ superiores in medio lineolis 3 nigris inæqualibus  
notatæ.*
- Tisiphon- 21. S. alis primoribus cinerascens vitta pallida; posticis  
ne. ce supra nigris basi rubris. *M. L. U.*  
*Habitat in India.*  
*Magnitudo Asili; Alæ inferiores lineis 6 obliquis pa-  
rallelis carneis.*
- Thyelia. 22. S. alis ferrugineis vitta nigricante. *M. L. U.*  
*Habitat in India.*  
*Magnitudo Asili. Alæ subtus lineis longitudinalibus su-  
periorum lutescentibus; inferiorum fuscis.*



\* \* \* *Legitimæ Alis integris, ano barbato.*

- Tantalus. 23. S. abdomine barbato: segmento tertio niveo. *M. L. U.*  
*Habitat in calidis regionibus.*
- Tityus. 24. S. abdomine barbato, cingulo nigro. *M. L. U.*  
*Habitat in calidis regionibus.*  
*Alarum margo niger est.*
- Ixion. 25. S. abdomine barbato: lateribus punctis utrinque 4 niveis. *M. L. U.*  
*Habitat in calidis regionibus.*
- stellatarum. 26. S. abdomine barbato lateribus albo nigroque variis, alis posticis ferrugineis.  
*Merian. cur. 2. p. 33. t. 29.*  
*Reaum. inf. 1. t. 12. f. 5, 6.*  
*Rœf. inf. 1. phal. 1. t. 8.*  
*Bradl. natur. t. 26. f. 1. A.*  
*Habitat in Galio, Rubia.*
- bombyli-formis. 27. S. abdomine barbato coccineo, alis hyalinis luteo variis; posticis margine albis.  
*Habitat in Europa.*
- fuciformis. 28. S. abdomine barbato nigro: fascia flavescente, alis hyalinis margine nigro.  
*Braal nat. 26. f. 1. B. Rœf. inf. app. 231. t. 38.*  
*Habitat in Europa.*
- culiciformis. 29. S. abdomine barbato: cingulo fulvo, alis hyalinis margine fasciæque nigris.  
*Fn. suec. 217. Phalæna alis linearibus fuscis, antennis pectinatis: mas.*  
*Habitat in Europa.*
- Salmachus. 30. S. abdomine barbato toto nigro. *M. L. U.*  
*Pet. gaz. 67. t. 42. f. 6. Phalæna bombylius, parvus, corpore nigro, ano croceo.*  
*Habitat in Europa.*  
*Magnitudo Culicis. Ala lunula nigra.*
- Belis. 31. S. abdomine barbato: supra nebuloso, subtus fulvescente; alis posticis basi flavis. *M. L. U.*  
*Habitat in Calidis regionibus.*



\* \* \* \* *Adscitæ habitu & Larva diversæ.*

**Filipendulæ.** 32. S. alis superioribus cyaneis : punctis sex rubris ; inferioribus rubris immaculatis. *Fr. suec.* 814.

*Mouff. inf.* 966. f. 97. f. ult. *Alb. inf. t.* 82. f. C. D.

*Fonst. inf. t.* 7. f. 3.

*Merian. eur. 2. t.* 17. f. 67.

*Pet. mus.* 36. n. 330.

*Reaum. inj. 1. t.* 12. f. 14-17.

*Raj. inf.* 134. n. 2.

2. t. 2. f. 2.

*Gœd. inj.* 2. t. 31.

*Rœf. inf. 1. phal. 2. t.* 57.

*List. gœd. f.* 37.

*Wilk. pap.* 46. t. 1. a. 1.

*Habitat in Spiræa Filipendula.*

**Phegea.** 33. S. viridi-atra, alis punctis fenestratis : superiorum sex, inferiorum duobus, abdomine cingulo luteo.

*Frisch. inf.* 6. p. 33. t. 15. mala.

*Habitat in Germania P. Forstål. Syria Hasselqvist.*

*Magnitudo & statura prioris, sed tota viridi-atra.*

*Antennæ filiformes, apicibus supra albicantes. Alæ*

*maculis s. punctis fenestratis: in superioribus 1, 2, 3;*

*in inferioribus 2: altera minore versus basin uæ.*

*Abdomen in medio Cingulo luteo unius segmenti, quod subtus non coit; ad basin abdominis rudimentam cinguli lutei.*

**Creusa.** 34. S. nigra, alis maculis fenestratis, abdominis basi viridi: segmentorum marginibus rubris. *M. L. U.*

*Habitat in Calidis regionibus.*

**Polymena.** 35. S. nigra, alis maculis luteis: superiorum tribus, inferiorum duobus, abdomine cingulis binis coccineis.

*Habitat in Asia.*

*Caput nigrum (Antennæ deficiebant). Frons alba. Alæ*

*nigræ: superiores maculis 3 luteis: intermedia diuina;*

*inferiores maculis 2 luteis. Abdomen atro-cæruleum:*

*Segmento 1 coccineo; 2, 3 cæruleis; 4, 5, 6 coccineis; 7 atro.*

**Cassandra.** 36. S. nigra, abdomine utrinque maculis quinque cæruleis, ano ore basique remorum abdominisque coccineis.

*Habitat in America.*

*Statura priorum s. S. Filipendule. Os sanguineum. Lingua spiralis. Alæ nigræ. Puncta thoracis ad alas &*

*basis*



*basis omnium femorum coccinea. Abdomen atrum, utrinque maculis 5 cæruleis nitidis. ANO sanguineo.*

pectini-  
cornis.

37. *S. subfusca*, alis violaceis, falcis duabus albis subinterruptis, collari sanguineo.

*Habitat in Asia.*

*Statura S. Filiendula. Antennæ pectinatæ sed non apice, ubi vere filiformes.*

Statices.

38. *S. viridi-cærulea*, alis inferioribus fuscis. *Fn. suec. 838.*

*It. wgoth. 27.*

*Raj. inf. 134. n. 3. Papilio parva alis pendulis.*

*Pet. mus. 35. n. 329. Papilionoides pratensis viridis minor.*

*Habitat in Europa.*

205. PHALÆNA. *Antennæ setacæ a basi ad apicem sensim attenuatæ.*

*Alæ (sedentis) sæpius depressæ (volatu nocturno).*

\* I \* *BOMBYCES elingues alis patulis.*

Atlas.

1. *P. Bombyx elinguis*, alis patentibus falcatis luteo variis macula fenestrata: superioribus sesquialtera.

*Pet gaz. t. 8. f. 7.*

*Act. E. N. C. dec. 2. an. 2. app.*

*Merian. surin. 52. t. 52. Valent. mus. 2. p. 168. t. 54.*

*Knorr. delic. t. C. 4. f. 1.*

*Habitat in Citro Asia, America.*

*Larva nuda, verticillata verrucis pilosis nec folliculos grandes tenaces vix extricandos.*

*Speciosissima Phalænarum Antennis ad singulos articulos radiis 4 s. utrinque 2 divergentibus.*

Hesperus.

2. *P. Bombyx elinguis*, alis patentibus subfalcatis luteo-variis: macula fenestrata solitaria.

*Merian. surin. 65. t. 65.*

*Habitat in Citro America.*

*Larva glabra tota.*

*Simillima præcedenti ut difficile distinguenda, Corpore flavescente, nec fulvo; Coilo cincto linea alta. Alarum fenestris solitariis (absque minori lanceolata in*  
*super-*



superioribus) intrantibus regionem exteriorem alæ,  
 & vix manifesto margine nigro cinctæ: colore demum  
 alarum pallidius flavescente nec ferrugineo. Quomodo  
 hæc a priori orta, dies docebit.

- Cecro- 3. *P. Bombyx elinguis*, alis patulis subfalcatis griseis: ra-  
 pia. scia fulva, superioribus ocello subfenestrato ferrugineo.  
*M. L. U.*  
*Catesb. car. 2. p. 86. t. 86.*  
*Habitat in America septentrionali.*
- Paphia. 4. *P. Bombyx elinguis flava*, alis patulis falcatis concolo-  
 ribus ocello fenestratis. *M. L. U.*  
*Pet. gaz. t. 29. f. 3. Catesb. car. 2. p. 91. t. 91?*  
*Habitat in Guinea.*
- Luna. 5. *P. Bombyx elinguis*, alis patulis caudatis flavo-virenti-  
 bus concoloribus, ocello disci lunato.  
*Catesb. car. 2. p. 84. t. 84. Pet. gaz. t. 14. f. 5.*  
*Habitat in America septentrionali. Kalm.*
- pavonia. 6. *P. Bombyx elinguis*, alis patulis rotundatis griseo nebu-  
 losis subfasciatis: ocello nichitante subfenestrato.

a. Fn.

Phalænae dividendæ, quo facilius inquirentur.

Primariæ Alis incumbenti depressis:

1. - BOMBYCES Antennis Pectinatis:
  - - Elingues absque lingua manifeste spirali.
  - - - læves dorso, nec cristatæ:
  - - - - Alis patulis 1 -- 7.
  - - - - Alis reversis 8 -- 21.
  - - - - Alis deflexis 22 -- 34.
  - - - cristatæ dorso fasciulis exasperato. 35 -- 40.
  - - Spirilingues Lingua involuto spirali:
  - - - læves, Alis patulis 41 -- 44.
  - - - - Alis deflexis 45 -- 52.
  - - - cristatæ dorso 53 -- 58.
2. - NOCTUÆ Antennis setaceis, nec pectinatis.
  - - Elingues 59 -- 63.
  - - Spirilingues; læves dorso 64 -- 85.
  - - - cristatæ dorso 86 -- 125.
3. GEOMETRÆ Alis patentibus horizontalibus quiescentes:
  - Pectinicornes: alis posticis angulatis s. dentatis 127 -- 133.
  - - - - alis posticis rotundatis integris 134 -- 154.
  - Seticornes: alis angulatis 155 -- 161.
  - - - - alis rotundatis 162 -- 201.
4. TORTRICES Alis obtusissimis ut fere retusis, planiusculis 202 -- 225.
5. PYRALIDES Alis conniventibus in figuram deltae demum fasciatis 226 -- 233.
6. TINEÆ Alis convolutis fere in cylindrum, fronte prominula 234 -- 298.
7. ALUCITÆ Alis digitatis fissis ad basim 299 -- 304.



minor. *a.* *Fn. Svec.* 835. *Merian. eur. t.* 13. 23.  
*Mouff. inf.* 20. *Reaum. inf.* 1. t. 50, 49.  
*Fonst. inf. t.* 8. f. 7. *De Geer. inf. 1. t.* 19. f. 7. 8.  
*Raj. inf.* 146. n. 1. *Rœf. inf. 1. phal. 2. t.* 5.  
*Pet. gaz. t.* 33. f. 12. *Wilk. pap. 15. t.* 2. a. 3.  
*Alb. inf. t.* 37.

major. *B. Gœl. inf.* 3. t. 2. *Reaum. inf. 1. t.* 47, 48.  
*List. goël.* *Rœf. inf. 4. t.* 15, 16.  
*Act. Paris. 1692.* *Kurr desc. t. C. 2. f.* 2.  
*Habitat in* Rosa, Rubo, Ulmo, Corylo, Salice.  
*Larva* nuda, et tunicata verrucis pilosis ut *P. Atlantis*;  
*ocellus* marum margine superiore videtur lunula fenestrata vix conspicua.  
*Varietates* *a.* *β.* alio similes, ut vix differant, nisi magnitudine. *An Specie distinguenda?*

Tau. 7. *P. Bombyx elinguis*, alis patulis testaceis: ocello subviolaceo pupilla hastata alba.  
*Act. Stockb. 1749. p.* 130. t. 4. f. 8.  
*Uddm. diff.* 61.  
*Rœf. inf. 4. t.* 7. f. 3, 4.  
*Habitat in* Betula.  
*Ocellus* in singulis alis pupilla *T* albo, sed *op.*  
*diaphano-fenestrata.*

\* \* BOMBYCES *elingues Alis reversis.*

quercifolia. 8. *P. Bombyx elinguis*, alis reversis dentatis ferrugineis  
marginè postico nigris.  
*Alb. inf. 1. t.* 16. *Reaum. inf. 2. t.* 23.  
*Merian. eur. 1. t.* 17. *Rœf. inf. 1. phal. 2. t.* 41.  
*Frisch. inf. 3. t.* 1. f. 3. *Wilk. pap. 27. t.* 3. b. 1.  
*Habitat in* Salice, Pruno spinosa, Pyro, Crambe.  
*Larva* subcaudata, pilosa, ferruginea, collaribus *cæ-*  
*ruleis.*

ilicifolia. 9. *P. Bombyx elinguis*, alis reversis ferratis ferrugineis  
marginè postico albo variegato.  
*De Geer inf. 1. t.* 14. f. 7; 9.  
*Habitat in* Salice.

*Larvæ Phalænarum* sunt læves l. nodosæ, nuda l. hirsutæ, & differunt *Pe-*  
*daum* numero: *Pedes* 16 *Bombycibus*, *Noctuis*; 14 *Tineis* *subcitrinæ*, *fulvæ*;  
12 *Gammæ*; 10 *Deomeris* *plerisque*; omnes enim inserviuntur *Pedibus* *Pectora-*  
*libus* 6 & *Caudalibus* 2, excepta *Vimba*, *Fæca*, *lævissima* *paucisque* *aliis*; *diffe-*  
*rentia* itaque *primaria* *Pedibus* *Abdominalibus* 8, 6, 4, 2, 0.



- Piuni. 10. *P. Bombyx elinguis*, alis reversis luteis : strigis duabus fulvis punctoque albo.  
*Rœf. inf. 1. phal. 2. t. 36.*  
*Habitat in Pruno Germania.*  
*Larva laevis, pilosa, fuscescens humeris caeruleis.*  
*Similima sequenti, sed in Alis superioribus Punctum tantum unicum album, nec alterum minus.*
- potato-  
ria. 11. *P. Bombyx elinguis*, alis reversis flavis : striga fulva repanda punctis duobus albis.  
*Coxa inf. 1. t. 12.* *Merian. eur. 2. p. 27. t. 16.*  
*List. gœd. f. 82.* *Rœf. inf. 1. phal. 2. t. 2.*  
*Raj. inf. 142. n. 3.* *Wilk. pap. 27. t. 3. b. 2.*  
*Alb. inf. t. 17.*  
*Habitat in Gramine Europæ australioris.*  
*Larva caudata, cristata, pilosa, lateribus albo maculatis.*
- Pini. 12. *P. Bombyx elinguis*, alis reversis cruceis : strigis duabus cinereis; puncto albo triangulati.  
*Merian. inf. t. 22.* *Raj. inf. 1. phal. 2. t. 59.*  
*Frisch. inf. 10. t. 10.* *Wilk. pap. 29. t. 3. b. 5.*  
*Uddm. diff. 60.*  
*Habitat in Pino.*  
*Larva subcaudata, pilosa, albo fusco griseoque varia, collaribus caeruleis.*
- Quercus. 13. *P. Bombyx elinguis*, alis reversis ferrugineis : striga flava, punctoque albo.  
*Mouss. inf. 157. f. 2.* *Alb. inf. t. 18. f. 25.*  
*Gœd. inf. 1. t. 7.* *Reaum. inf. 1. t. 35.*  
*List. gœd. f. 88.* *Rœf. inf. 1. phal. 2. t. 35.*  
*Raj. inf. 142. n. 2.* *Wilk. pap. 22. t. 3. a. 11, 12.*  
*Merian. eur. 1. t. 10.* *Uddm. diff. 59.*  
*Habitat in Quercu, Betula, Pruno ipinoia.*  
*Larva laevis, pilosa, grisea, nigro annulata, alboque maculata.*
- Rubi. 14. *P. Bombyx elinguis*, alis reversis cervinis immaculatis : strigis duabus albidis; tubus nullis.  
*Raj. inf. app. t. 49.*  
*Wilk. pap. 25. t. 3. a. 19.*  
*Habitat in Rubo, Salice.*  
*Larva laevis, pilosa, ferruginea, nigro annulata.*



*Alarum fascia posterior desinit in medio alæ, nec, ut in P. annularia, qua multoties major est, excurrit ad apicem.*

lanœstris. 15. *P. Bombyx cinguis, alis reversis ferrugineis: striga alba: superioribus puncto basique albis.*

*Rœs. inf. 1. phal. 2. t. 62.*

*Wilk. pap. 25. t. 3. a. 18.*

*Habitat in Tilia, Pruno spinosa, Salice.*

*Larva pupa, pupa: signata singulo punctis 3 albis inter maculas 2 rubras.*

*Acus Phalœna eadem limatus alb. l. 1.*

Vinula. 16. *P. Bombyx cinguis albida nigro punctata, alis subreversis fusco venosis striatisque.*

*Fn. swec. 819.*

*Merian. eur. 3. t. 39.*

*Mouff. ins. 183. f. 10.*

*Alb. inf. 11. f. 5.*

*Aldr. ins. 208. t. 1-8.*

*Frisch. ins. 6. t. 8.*

*Gœd. inf. 3. t. C.*

*Reann. inf. 2. t. 21.*

*1. t. 65.*

*De Geer inf. 1. t. 23. f. 12.*

*2. t. 37.*

*Raj. inf. 1. phal. 2. t. 13.*

*List. gœd. 6. . .*

*Wilk. pap. 13. t. 1. c. 1.*

*Raj. inf. 153. n. 5.*

*Habitat in Pruno, Salice, Quercu.*

*Larva pupa Thorace gibbo transverse compresso; dorso lineis 2 albis cruciatis; Cauda duplex tentaculis retractilibus.*

versicolora. 17. *P. Bombyx cinguis, alis reversis griseis: strigis nigro-albis, fronte thoracis albo.*

*G. ad satag. 52. Fnal. alis lineis albis & nigris undatis.*

*Rœs. inf. app. 39. f. 3.*

*Wilk. pap. 45. t. 1. a. 1.*

*Habitat in Europa.*

Mori. 18. *P. Bombyx cinguis, alis reversis pallidis: strigis tribus obsoletis.*

*Fn. swec. 832.*

*Merian. eur. 1. t. 1.*

*Mouff. ins. 181.*

*Alb. inf. t. 12. f. 16*

*Aldr. ins. 280.*

*Reann. inf. t. 27. f. 1.*

*Fonst. ins. t. 22.*

*Reann. inf. 2. t. 5. f. 2.*

*Gœd. inf. . . t. 125.*

*Fal. inf. app. 1. t. 7, 8.*

*List. gœd. f. 32.*

*Tineo. cœc. scoc'h. 1745. p. 253.*

*Blank. inf. 62 t. 9.*

*t. 14. f. 1.*



*Habitat in Moro China, hodie culta per Europam.*

*Larva nuda, caudata, more Sphingis.*

*Bombyces telas, Araxearum modo, texunt ad vestem luxuriamque seminarum. Prima eas redordiri rursusque texere invenit in Cæo Mulier Pamphila, Latoi filia (Plin. XI: 22) seu potius Platis filia. Aristot. anim. V: 19.*

Neustria. 19. *P. Bombyx elinguis, alis reversis flavescens: fascia grisea sequialtera; subtus unica.*

*Gœd. inf. 1. t. 10.*

*Alb. inf. 19. f. 27.*

*List. gœd. t. 89.*

*Frisch. inf. 1. t. 2.*

*Blank. inf. 48. t. 3. f. J. M.*

*Reaum. inf. 2. t. 4. f. 1-11.*

*Raj. inf. 213.*

*Rœs. inf. 1. phal. 2. t. 6.*

*Mer. eur. 1. t. 33?*

*Wilk. pap. 21. t. 3. a. 10.*

*Habitat in Arboribus & Herbis, polyphaga.*

*Larva subpilosa, lineis albis rubris caeruleis. Verruca supra anum; hinc diversa a sequenti, cui maxime affinis statura & natura.*

castrensis. 20. *P. Bombyx elinguis, alis reversis griseis: stigmatis duabus pallidis; subtus unica.* *Fn. svec. 831.*

*Frisch. inf. 10. t. 8.*

*Rœs. inf. 4. t. 14.*

*De Geer inf. 1. t. 13. f. 4-6.*

*Habitat in Salicibus, Pilosella, Jacea, Alchemilla, Euphorbia; polyphaga, pascitur sub tela, gregaria, migratque sæpius novo tentorio; ova, more precedentis, in annulos conferta circum arborum ramulos.*

*Larva pilosa, maculata.*

processionea. 21. *P. Bombyx elinguis, alis reversis? canis fusco undulatis maculatisque. †*

*Reaum. inf. 2. t. 11.*

*Habitat in Quercu.*

*Larva pilosa, incedens per parva inæqualia numero, l. c.*

\* \* \* *BOMBYCES elingues, alis depressis, dorso lævi.*

Caja. 22. *P. Bombyx elinguis, alis deflexis fuscis: rivulis albis; inferioribus purpureis nigro-punctatis.*

*Fn. svec. 820.*

*Merian. eur. 1. t. 5. & 160.*

*Mouff. inf. 93. f. suprem.*

*Alb. inf. t. 20. f. C. D.*

*Aldr. inf. 246. f. 11, 12.*

*Frisch. inf. 2. t. 9.*

*Gœd. inf. 1. t. 17.*

*Reaum. inf. 1. t. 36. f. 6, 7.*

*List. gœd. f. 99.*

*De Geer inf. 1. t. 12. f. 8, 9.*

*Blank.*



*Blank. inf. t. 9. f. A. C. Rœf. inf. 1. phal. 2. t. 1.*  
*Raj. inf. 151. n. 3. Wilk. pap. 18. t. 3. a. 1.*  
 152. n. 7.

*Habitat in Lactuca, Oleribusque variis, polyphaga.*  
*Larva hirsuta, ferruginea.*

virgo. 23. *P. Bombyx elinguis, alis deflexis atris: rivulis rubicundis; inferioribus rubris nigro-punctatis. M. L. U.*

*Habitat in Philadelphia.*

*Antennæ vix manifeste barbatae & fere setaceæ in matre, magis adhuc setaceæ in femina.*

villica. 24. *P. Bombyx elinguis, alis deflexis atris: maculis octo albidis, inferioribus fulvis nigro-maculatis*

*Merian. eur. 1. t. 6. Reaum. inf. 1. t. 31. f. 4-6.*

*Alb. inf. t. 21. Wilk. pap. 18. t. 3. a. 2.*

*Frisch. inf. 10. t. 2.*

*Habitat in Ulmo, Urtica, Alfine.*

*Larva hirsuta, ferruginea.*

Plantaginis. 25. *P. Bombyx elinguis, alis deflexis atris: rivulis flavis; inferioribus rubris nigro-maculatis.*

*Fn. suec. 821. Wilk. pap. 24. t. 3. a. 15.*

*It. gotl. 273.*

*Habitat in Plantagine, Hyacintho.*

*Sexus variat: ubi Mas fulvus, ibi Femina seticornis coccinea.*

*Larva hirsuta, nigra, capite rufescente.*

monacha. 26. *P. Bombyx elinguis, alis deflexis albis atro-undatis, abdominis incisuris sanguineis.*

*Wilk. pap. 19. t. 3. a. 4.*

*Habitat in Salice, Quercu, Malo.*

*Larva pilosa, albida, nigro maculata.*

dispar. 27. *P. Bombyx elinguis, alis deflexis: masculis griseo fuscisque nebulosis; femineis albidis lituris nigris.*

*Merian. eur. 1. t. 18. Rœf. inf. 1. phal. 2. t. 3.*

*Frisch. inf. 1. p. 14. t. 3. Wilk. pap. 20. t. 3. a. 7.*

*Reaum. inf. 2. t. 1. f. 11-14.*

*Habitat in Quercu, Tilia, Pomonæ arboribus magis australibus, polyphaga.*

*Larva pilosa, albo lineata: punctis antice cæruleis, postice rubris.*



Mas *Antennis magnis pectinatis; Alis fusco-roseis; dimidio minor.*

Femina *Antennis nigris; Alis albidis: lituris circum nigris cum puncto nigro intermedio ad marginem exteriorem, margine postico nigro-punctato.*

Chryso-28. P. *Bombyx elinguis, alis dexteis albidis, abdominis rhœa. apice barbato lateo.*

*Raj. inf. 156. n. 1: 15. Reaum. inf. 1. phal. 2. t. 22.*

*Merian eur. 1. p. 8. t. 20. Rot. inf. 1. phal. 2. t. 22.*

*Frisch. inf. 3. p. 28. t. 8. Wilk. pap. 25. t. 3. b. 3.*

*Edw. av. 122. t. 122.*

*Habitat in Pomonæ arboribus, Quercu, Alno.*

*Larva nodosa, pilosa, nigra, rubro lineata.*

Salicis. 29. P. *Bombyx elinguis, alis dexteis albis, pedibus nigris albo-annulatis.*

*In swec 822. Ab. inf. t. 84. f. a-d.*

*It. scan. 167. 307. Frisch. inf. 1. t. 4.*

*Geol. inf. 1. t. 3. Reaum. inf. 1. t. 34. f. 4-6.*

*List. goed. f. 87. De Geer inf. 1. t. II. f. 13, 14.*

*Franc. inf. t. 5. f. A-D. Raj. inf. 1. phal. 2. t. 19.*

*Merian. eur. 1. t. 30. Wilk. pap. 21. t. 3. a. 9.*

*Habitat in Salicibus glabris, Populo.*

*Larva pilosa, dorso longitudinaliter albo maculato.*

Cratægi. 30. P. *Bombyx elinguis, alis dexteis cinereis rotundatis: fascia obscuriore, ano barbato.*

*Reaum. inf. 1. t. 44. f. 10.*

*De Geer inf. 1. t. II. f. 20, 21.*

*Habitat in Cratægo.*

striata. 31. P. *Bombyx subelinguis? alis dexteis luteis: superioribusDavis nigro-striatis; inferioribus fascia nigra.*

*Habitat in Germania. Borgo Jacen.*

*Facies Tb. Jacobæ; Ala fovea stris ramosis nigris:*

*Inferiores postice fascia nigra lata. Abacmen interm*

*quinqueferum punctatum. Antennæ angustissime.*

Populi. 32. P. *Bombyx elinguis fusca antice pallida, alis immaculatis fulvescentibus: striga sesquialtera albida repanda.*

*Raj. inf. 2. phal. 2. t. 60. Wilk. pap. 23. t. 3. a. 13.*

*Habitat in Populo, Corylo, Malo, Pyro.*

*Larva pilose, segmentis singulis punctis duorum parium.*



Coryli. 33. P. *Bombyx* elinguis, alis antice griseo nebulosis: postice cæruleiscenti glaucis, thorace variegato, antennis flavis  
*Alb. inf. t. 90.*

*Rœs. inf. 1. phal. 2. t. 58. Wilk. pap. 31. t. 3. c. 5.*  
*Habitat in Corylo.*

*Similis P. Fuscelle imprimis thorace fasciato-maculato; alæ superiores in medio punctum annulare nigrum habent. Larva fascicularis pilosa rubra fasciis dorsalibus 2, caudæ 1, lateralibus thoracis solitariis.*

curtula. 34. P. *Bombyx* elinguis, alis deflexis glaucis: striga alba apicibus macula testacea.

*Frisch. inf. 5. t. 6.*

*Rœs. inf. app. t. 43.*

*4. t. 11. f. 1-6.*

*Habitat in Quercu, Populo, Salice.*

*Thoracis tergum macula oblonga ferruginea testum. An unius speciei sexus vel diversa. Larva turrita.*

\* \* \* \* BOMBYCES elingues, alis depressis, dorso cristato.

pudibunda. 35. P. *Bombyx* elinguis cristata, alis cinerascens: fasciis tribus fusco-griseis

*Fn. svec. 828.*

*Alb. inf. t. 26.*

*Gœd. inf. 3. t. 5.*

*Reaumur. inf. 1. t. 32. f. 4. 12.*

*List. gœd. t. 81.*

*De Geer. inf. 1. t. 16. f. 11, 12.*

*Raj. inf. 187. n. 7.*

*Rœs. inf. 1. phal. 2. t. 38.*

*Merian. europ. 1. t. 47. Wilk. pap. 30. t. 3. c. 2.*

*Habitat in Abundibus Pomæ, Corylo, Quercu.*

*Larva fasciculata, pilosa, nigra segmentis nigris; fasciculo caudæ longiori nigro; dorso 4 albis.*

fascelina. 36. P. *Bombyx* elinguis cristata cinerea, alis superioribus antice fascia atra medio macula alba triangulari.

*Fn. svec. 829.*

*Merian. eur. t. 8.*

*Mouff. inf. 189.*

*Alb. inf. t. 26.*

*Gœd. inf. 1. t. 36.*

*De Geer. inf. 1. t. 15. f. 15.*

*List. gœd. f. 80.*

*Rœs. inf. 1. phal. 2. t. 37.*

*Raj. inf. 186. n. 8.*

*Wilk. pap. 30. t. 3. c. 1.*

*Habitat in Leontodo, Trifolio, Rubo, Populo.*

*Larva fasciculata, pilosa: fasciis dorsalibus 5 albis, capitis anique fuscis.*

antiqua. 37. P. *Bombyx* elinguis, alis planiusculis: superioribus lunula alba anguli postici; femina aptera.



INSECTA LEPIDOPTERA. Phalæna. Bombyx.

*Fn. suec.* 827.

*Gœd. inf.* 2. t. 29, 30.

*List. gœd.* f. 78.

*Swamm. quart.* t. 10.

*bibl.* t. 33. f. 3, 6.

*Rai. inf.* 173. n. 24.

*Merian. eur.* t. 84.

*Habitat in* Pruno, Tilia, Alno.

*Conf. Alb. inf.* t. 90. *Rœs. inf.* 1. phal. 2. t. 40. *Wilk. pap.* 31. f. 3. c. 4. *vix specie satis diversa.*

*Larva fasciculata, pilosa: fascialis dorsalibus 4 albis; antennalibus caudalique obscuris.*

*Alb. inf.* t. 89.

*Reaum. inf.* 1. t. 19. f. 12-17.

*De Geer inf.* 1. t. 17. f. 13, 14.

*Rœs. inf.* 1. phal. 2. t. 39.

*app.* t. 13.

*Wilk. pap.* 30. t. 3. c. 3.

cœruleo-38. *P. Bombyx elinguis cristata*, alis deflexis griseis: maccephala. cula albida duplicato didyma.

*Fn. suec.* 836.

*Gœd. inf.* 1. t. 61.

*List. gœd.* f. 47.

*Raj. inf.* 163. n. 17.

*Mer. eur.* t. 9.

*Habitat in* Pomonæ arboribus, florum pestis.

*Larva nuda, cœrulescens, luteo-lineata, nigro-punctata.*

*Alb. inf.* t. 13. f. 17.

*Frisch. inf.* 10. t. 3. f. 4.

*Reaum. inf.* 1. t. 18. f. 6-9.

*Rœs. inf.* 1. phal. 2. t. 16.

*Wilk. pap.* 6. t. 1. a. 12.

Ziczac. 39. *P. Bombyx sublinguis*, alis deflexis dorso deutatis apicibusque macula grisea subocellari.

*Gœd. inf.* 3. t. E.

*List. gœd.* f. 21.

*Mer. eur.* t. 147.

*Alb. inf.* t. 14. f. 20.

*Frisch. inf.* 3. t. 2.

*Habitat in* Salice.

*Alæ superiores margine dorsali denticulo piloso.*

*Larva nuda, dorso gibberibus 2, cauda rufa.*

*Reaum. inf.* 2. t. 22. f. 9-16.

*De Geer. inf.* 1. t. 6. f. 1-10.

*Rœs. inf.* 1. phal. 2. t. 20.

*Wilk. pap.* 12. t. 1. d. 1.

Coffus. 40. *P. Bombyx elinguis*, alis deflexis nebulosis, thorace fascia postica atra.

*Fn. suec.* 812.

*Mouff. inf.* 156. f. 1.

*Gœd. inf.* 2. t. 33.

*List. gœd.* f. 39.

*Pet. gaz.* t. 51. f. 9.

*Raj. inf.* 750. n. 2.

*Mer. eur.* 3. t. 36.

*Habitat in* Ligno putrescente.

*Alb. inf.* t. 35. f. 56.

*Frisch. inf.* 7. t. 1.

*Reaum. inf.* 1. t. 17. f. 1-5.

*Lyonet. less.* t. 1. f. 17-22.

*Rœs. inf.* 1. phal. 2. t. 18.

*Wilk. pap.* 15. t. 2. a. 2.



Larva subpilosa, rubra, dorso sanguineo, capite nigro.  
 Romæ in hoc luxuria esse cœpit, prægrandesque Ro-  
 boram vermes delicatius sunt in cibo, Cossos vocant,  
 ac ne etiam farina saginati; hi quoque atiles fiunt.  
 Plin. XVII: 24.

\* \* \* \* \* BOMBYCES spirilingues Alis patulis.

fenestra. 41. P. Bombyx spirilinguis, alis patulis concoloribus: su-  
 perioribus flavis; inferioribus fenestratis. M. L. U.  
 Habitat in Indiis.

perspicua. 42. P. Bombyx spirilinguis, alis patulis: superioribus fascia  
 fenestrata brevi. M. L. U.  
 Habitat in Indiis.

odorata. 43. P. Bombyx spirilinguis, alis patentibus crenatis nebu-  
 losis: superioribus ocello unico; inferioribus setqui-  
 altero.  
 Sloan. jam. t. 236. f. 13, 14.  
 Habitat in America.

militaris. 44. P. Bombyx spirilinguis lutea, alis patulis concoloribus  
 apice maculisque violaceis: superioribus extus albo  
 subfasciatis.  
 Rœs. inf. 4. t. 6. f. 3.  
 Habitat in Asia.

\* \* \* \* \* BOMBYCES spirilingues, dorso laevi, alis  
 deflexis.

Purpura-  
 ta. 45. P. Bombyx spirilinguis, alis deflexis: superioribus fla-  
 vis fusco-punctatis; inferioribus rubris nigro-ma-  
 culatis.  
 Rœs. inf. 1. phal. 2. t. 10.  
 Habitat in Ribe.  
 Larva hirsuta, grisea, albo maculata.

Aulica. 46. P. Bombyx spirilinguis, alis deflexis: superioribus gri-  
 seis flavo-punctatis; inferioribus fulvis nigro-macu-  
 latis.  
 Habitat in Europa.

lubrici-  
 peda. 47. P. Bombyx spirilinguis, alis deflexis albidis punctis ni-  
 gris, abdomineque quinquefariam nigro-punctato.



*Fn. swec.* 823.

*Frisch. inf.* 3. t. 5.

*Gœd. inf.* 1. t. 23, 38.

*Reaum. inf.* 2. t. 1. f. 7-9.

*List. gœd.* f. 97.

*De Geer inf.* 1. t. 11. f. 7, 8.

*Raf. inf.* 196. n. 155.

*Raf. inf.* 1. phal. 2. t. 46.

*Morison eur.* 1. t. 46. f. 65.

*Wilk. pap.* 20. t. 3. a. 5.

*Alb. inf.* 24. f. 36.

*B. Gœd. inf.* 1. t. . . .

*Rœf. inf.* 2. phal. 2. t. 47.

*Wilk. pap.* 20. t. 3. a. 6.

*Habitat in* Quercu, Atriplice, Urtica.

Larva pilosa, sulca punctis caruleis, linea dorsali pallida. Varietatem non distinctam esse speciem docuit D. De Geer.

Sannio. 48. *P. Bombyx spirilinguis*, alis de flexis luteis margine lanugineo lunulaque fulca; inferioribus subtus immaculatis.

*Habitat in* Europa.

anastomosis. 49. *P. Bombyx spirilinguis*, alis de flexis griseo-cinerascentibus; inferioribus pallidis fasciis fuscis antibus.

*Gœd. inf.* 1. t. 33.

*Rœf. inf.* 1. phal. 2. t. 26.

*List. gœd.* 23. t. 23.

*Habitat in* S. i. c.

Larva pilosa, fusca, dorso alio punctato, tubere humericali; linea laterali flava rubro punctata.

Gramini. 50. *P. Bombyx spirilinguis*, alis de pressis griseis: linea ramosa lunulaque glaucis. *Fn. swec.* 826, 826.

*Act. Stock.* 1742. p. 40. t. 2.

*Habitat in* Germania, ex parte Alpe. car.

Larva decidua sapientis prata nostra & omne gramen consumit.

Luforia. 51. *P. Bombyx spirilinguis*, alis incumbentibus: superioribus glaucis lunula thoraceque antice ferrugineis.

*Reaum. inf.* 1. t. 14. f. 10.

*Habitat in* Germania. *Wilk.*

Statura & magnitudo *Ph. cribraria*. Thorax cinerascens, antice versus caput ferrugineus. Antennæ parum pestinatæ, corpore dimidio breviores. Alæ incumbentes, glaucæ, temere adspersæ lineolis transversis griseis; in medio linea transversa ferruginea parva, & ante hanc punctura ferruginea. Inferiores alæ pallidæ.



cribraria. 52. P. Bombyx spirilinguis, alis incumben-  
tibus: superioribus nigris, inferioribus nigro punctatis.  
*Habitat in terris meridionalibus.*

\* \* \* \* \* *BOMBYX spirilinguis Deaso cristato, Alis  
deflexis.*

Celsia. 53. P. Bombyx spirilinguis cristata, alis incumben-  
tibus: superioribus nigris, inferioribus nigro punctatis.  
*Fn suec. 816. t. 2. f. 816.  
Habitat in Humulo.*

Libanitis. 54. P. Bombyx spirilinguis cristata, alis incumben-  
tibus: superioribus nigris, inferioribus nigro punctatis.  
*Fn suec. 816. t. 2. f. 816.  
Cod. n. 1. t. 67. Det. g. t. 19. f. 4.  
Alb. inf. t. 52. f. 50.  
List. gæd. f. 30  
Habitat in Griechomate, Rosa, Salice.  
Larva geometrica, nuda, viridis.*

Capucina. 55. P. Bombyx spirilinguis cristata, alis deflexis denticu-  
latis ferrugineis: denticuloque dorsali renexo fascia-  
que ferruginea.  
*Habitat in Europa.*

camelinæ. 56. P. Bombyx spirilinguis cristata, alis deflexis crocis  
maculis: omnibus denticulo dorsali.  
*Ræs. inf. 1. phal. 2. t. 28.  
Habitat in Tilia, Malo. T. Bergman.  
Larva nuda, crescens cornucopia 2 purpureis caudæ,  
punctumque purpureum ad singula stigmata.  
Th sedens erigit a tergo cristas 2, quarum prior ex a-  
larum exteriorum, posterior ex interiorum costis  
s. lobulis conniventibus.*

Oo. 57. P. Bombyx spirilinguis cristata, alis depresso cinera-  
scentibus oö notatis.  
*Ræs. inf. 1. t. 2. t. 63. Willk. pap. 6. t. 1. a. 11.  
Habitat in Quercu.  
Larva nuda, rufa, punctis lineisque albis: dorsali in-  
terrupta.*

helvola. 58. P. Bombyx spirilinguis, alis rufis: fasciis subrusce-  
scentibus: postica latiore, subtus rufescentibus.  
*Habitat in Finlandia. U. Linnae.  
Tentacula saevius rufa. antennae angustissime.*



\* 2 \* NOCTUÆ *elingues*.

Strix. 59. P. *Noctua* *elinguis*, alis patulis concoloribus albidis nigro reticulatis nebulosisque. *M. L. U.*

*Mer. surin.* 20. t. 20.

*Habitat in America meridionali.*

*Larva subpilosa, nigra annulis lineaque laterali.*

Fagi. 60. P. *Noctua* *elinguis*, alis reversis rufo-cinereis : fasciis linearibus duabus luteis flexuosis

*Rab. act. Stockb.* 1749. p. 132. t. 4. f. 10-14.

*Uddm. diff.* 61. *Alb. inf.* t. 58.

*Ros. inf. app.* t. 12.

*Habitat in Corylo, Fago, Betula.*

*Larva pedibus 6: anterioribus elongatis; cauda reflexa corniculis 2 setaceis.*

Bucephala. 61. P. *Noctua* *subelinguis*, alis dentexis cinereis apice macula subocellari flava.

*Gad. inf.* 1. t. 34.

*Frisch inf.* 11. t. 4.

*List. gad.* j. 35.

*De Geer inf.* 1. t. 13. f. 14-19.

*Mer. europ.* t. 142.

*Ros. inf.* 1. phal. 2. t. 14.

*Alb. inf.* 23. f. 33.

*Wilk. pap.* 21. t. 3. a. 8.

*Habitat in Tilia, Alno, Quercu, Salice.*

*Larva pilosa, nigra annulis lineisque luteis.*

Humuli. 62. P. *Noctua* *elinguis* *fulva*, antennis thorace brevioribus, inanis alis niveis.

*Fa. svec.* 917.

*Raj. inf.* 157. n. 3.

*De Geer inf.* 1. t. 7. f. 5, 6.

*Habitat in Lupuli radicibus. It. scan.* 49.

*Mas alis albis. Femina flavis fulvo-striatis.*

Lupulina. 63. P. *Noctua* *elinguis* *lutea*, antennis thorace brevioribus, alis macula arcuque cinerascente.

*De Geer inf.* 1. t. 7. f. 12? *an sexu tantum alia?*

*Habitat in Europa.*

*Præcedentis omnino statura, sed dimidio minor, alioque colore.*

\* \* NOCTUÆ *spirilingues*, dorso læves absque crista.

Lunus. 64. P. *Noctua* *spirilinguis* *lævis*, alis patulis caudatis fusco luteoque undatis, ocellis caudalibus subternis. *M. L. U.*

*Habitat in Indiis.*



crepuscu-65. P. *Noctua spirilinguis lævis*, alis patulis griseis fascia  
laris. maculaque albis; inferioribus ocello fusco. *M. L. U.*  
*Habitat in America.*

occidua. 66. P. *Noctua spirilinguis lævis*, alis patulis nebulosis  
linea pallida, superioribus ocello lunato punctoque.  
*M. L. U.*  
*Habitat in America.*

punctige-67. P. *Noctua spirilinguis lævis*, alis depressis: superiori-  
ra. bus puncto calloso apiceque ocellato; inferioribus al-  
bis. *M. L. U.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Alæ superiores cinerascetes area lunata albida & puncto  
calloso ad marginem interiorem.*

Dominu-68. P. *Noctua spirilinguis lævis*, alis depressis nigris: su-  
la. perioribus cæruleo flavo alboque, inferioribus rubro  
maculatis.  
*Mer. eur. 2. t. 38. Rœs. inf. 3. t. 47.*  
*Alb. inf. t. 22. Wilk. pap. 19. t. 3. a. 3.*  
*Habitat in Cynoglossio, Fraxino, Salice.*  
*Larva pilosa, nigra, trifariam albo punctata.*  
*Abdomen Phalænæ rubram fasciis nigris.*

Matro-69. P. *Noctua spirilinguis lævis*, alis superioribus griseis  
nula. exterius flavo maculatis; inferioribus nigro macu-  
latis. †  
*Rœs. inf. 3. t. 39. f. 1, 2.*  
*Habitat in Germania.*

fuligino-70. P. *Noctua spirilinguis lævis*, alis deflexis fuliginosis  
ia. puncto nigro; inferioribus rubris nigro-maculatis.  
*It. goth. 141. Rœs. inf. 1. phal. 2. t. 43.*  
*Uddin. diff. 76. Wilk. pap. 23. t. 3. a. 14.*  
*Habitat in Sinapi, Rapa, Rumice.*  
*Larva pilosa, ferruginea.*

Fulvia. 71. P. *Noctua spirilinguis lævis*, alis deflexis concoloribus  
fulvis margine nigris. *M. L. U.*  
*Habitat in Indiis.*

Batis. 72. P. *Noctua spirilinguis lævis*, alis depressis: superiori-  
bus fuscis, maculis simul quinque albidis, inferioribus  
albis.



*Mer. eur. 3. t. 21. f. 1. Reaum. inf. 1. t. 7. f. 2.*  
*Habitat in Russ.*

trapezi- 73. P. Noctua feticornis laevis, alis deflexis pallidis ta-  
 na. scis laetima lateriore puncto nigro in medio punctato.

*Mer. europ. t. 11.*

*Habitat in Europa.*

*Alarum fovea irregularis est cum puncto nigro in medio; marginibus supra punctum in granae serie notatus.*

lucerna. 74. P. Noctua feticornis laevis, alis cinereis immaculatis: singulis tribus repandis albidis, collaribus.

*Habitat in Europa.*

*Alae absque macula, complanatae, sericeae; collare erectum cordis instar bifidum.*

pellex. 75. P. Noctua feticornis laevis, alis fuscis lineis tribus maculaque transversa; inferioribus disco albis. M. L. U.

*Habitat in Indiis.*

*Abdomen albam ano rubro. Alae inferiores margine fusco: punctis tribus albis.*

glyphica. 76. P. Noctua feticornis laevis, alis ututis fuscis maculis hieroglyphicis nigris; subus fascia atra.

*Fn. suec. 847.*

*Hoffm. pict. 4. t. 11. f. 3. Reaum. inf. 1. t. 25. f. 14?*  
*Habitat in Verulco.*

*Minima, sub granis magnitudine, Geometra similis; Alae caracteribus anomalis fuscis, luteo marginatis cum puncto nigro.*

pallens. 77. P. Noctua feticornis laevis, alis deflexis pallidis immaculatis: marginibus punicis subus nigro punctatis.

*Habitat in Europa.*

ruffula. 78. P. Noctua feticornis laevis, alis fulvis rubro-venosis; inferioribus nigro-variegatis.

*Habitat in Europa.*

*Simillima P. Bombyci Sannioni, ut facile tantum sexu differre credatur.*

leporina. 79. P. Noctua feticornis laevis, alis deflexis albis: punctis nigris ramosis.



*De Geer. inf. 1. t. 12. f. 10, 11, 17.*

*Habitat in Alno, Salice.*

*Similis Ph. tuberculæ, sed alæ paucioribus punctis adspersæ & corpus alvum, nec flavum, nec Abdomen nigro punctatum.*

Ornatix. 80. P. Noctua feticornis lævis, alis depresso rufis atropunctatis; inferioribus albo nigroque variis. *M. L. U.*

*Habitat in America.*

*Alæ superiores supra flavescentes margine rubro punctis nigris: subtus rubra; inferiores maculis nigris; magnitudo P. Argi.*

Jacobææ. 81. P. Noctua feticornis lævis, alis fuscis: lineis punctisque duobus; inferioribusque totis rubris. *Faun. Suec. 869.*

*It. æl. 120.*

*Roi. inf. 165. n. 26.*

*Mouff. inf. 97. f. antep.*

*Mær. eur. 3. t. 25*

*Rob. ic. 1. t. 20.*

*Alb. inf. t. 34. f. G. II.*

*Gæd. inf. 1. t. 9.*

*Reaum. inf. 1. t. 16. f. 4-7.*

*List. gæd. t. 54.*

*Rœf. inf. 1. p. d. 2. t. 49.*

*Blank. inf. t. 1. f. G. K.*

*Wlk. pap. 20. t. 3. a. 1.*

*Pet. gaz. t. 33. f. 6.*

*Habitat in Jacobææ Senecionis.*

*Larva pilosa, albo luteoque annulata.*

heliconia. 82. P. Noctua feticornis lævis, alis deflexis fuscis concoloribus: superioribus lineâ; inferioribus basi albis *M. L. U.*

*Habitat in Calidis regionibus.*

*Abdomen flavum triangulari fusco-maculatum.*

rubricollis. 83. P. Noctua feticornis lævis nigra, collari purpureo, abdomine flavo. *Fn. Suec. 881.*

*Habitat in Europa.*

quadra. 84. P. Noctua feticornis lævis, alis depresso luteis: superioribus punctis duobus atris.

*Rœf. inf. 1. p. d. 2. t. 17.*

*Wlk. pap. 24. t. 3. a. 17.*

*Habitat in Italia, Quercu.*

*Larva pilosa corpore punctis rubris maculæque nigra; lateribus lineis nigris. Phalæna in multis arboribus pabulanti Tinearum.*



compla- 85. P. *Noctua feticornis* levis, alis depressis: superiori-  
na. bus canescentibus: exteriori margine inferioribusque  
totis flavis. *Fs. suec.* 918.

*Alb. inf. t. 70. f. G. H.*

*Habitat in Quercu.*

\* \* \* NOCTUÆ *spirilingues dorso cristato.*

Paſſa. 86. P. *Noctua spirilinguis cristata*, alis deflexis cinera-  
fensibus; interioribus rubris fasciis duabus nigris.

*Merian. eur. 5. t. 33. f. 139. Kof. in. 1. phal. 2. t. 15.*

*Alb. inf. 80.*

*Wilk. pap. 17. t. 2. b. 1.*

*Reaum. inf. 1. t. 32. f. 6, 7. Uicm. uij. 73. f. 10.*

*β. Wilk. pap. 33. t. 1. a. 1.*

*Habitat in Salice, Quercu.*

*Larva fusca, tuberculosa, subtus ferruginea.*

*Varietas major in Europa existit, cui nisi sextupla  
magnitudine differt, nec Larva dissentit.*

Pronuba. 87. P. *Noctua spirilinguis cristata*, alis incumbentibus gri-  
scis; interioribus luteis: fascia alba

*Fs. suec. 870.*

*Mer. eur. t. 4.*

*Gœd. inf. 1. t. 14.*

*Alb. inf. t. 72. f. C. D.*

*List. gœd. f. 41.*

*Frisch. inf. 10. t. 15. f. 4.*

*Blank. inf. t. 6. f. D. F.*

*Reaum. inf. 1. t. 32. f. 6, 7.*

*Raj. inf. 237. n. 18.*

*Uicm. uij. 73. f. 10.*

*Wilk. pap. 1. t. 1. a. 1.*

*Habitat in Cheirantho, Thlaspi, Senecione, Primula.*

*Larva nuda, testacea, linea dorsali nigra interrupta.*

maura. 88. P. *Noctua spirilinguis cristata*, alis depressis dentatis:  
fasciis duabus nigris; interioribus nigris fascia alba.

*Habitat in Mauritania. E. Brander.*

*Alæ pollice dentata; superiores luride, fasciate.*

*Alæ inferiores & superiores subtus fascia transversa an-  
gusta pallida; præterea margo posticus subtus fa-  
scia albida.*

Fraxini. 89. P. *Noctua spirilinguis cristata*, alis deflexis cinereo  
nebulosis; interioribus supra nigris fascia cærule-  
scente.

*Mer. eur. t. 46.*

*Wilk. pap. 45. t. 1. a. 2.*

*Habitat in Fraxino.*



- Chrysi- 90. P. *Noctua spirilinguis cristata*, alis deflexis: superiori-  
tis. bus orichalceis fascia grisea. *Fn. suec.* 875.  
*Raj. inf.* 182. *Merian. eur.* 1. t. 39.  
*Alb. inf.* t. 71.  
*Habitat in Galeopside, Mentha.*
- Gamma. 91. P. *Noctua spirilinguis cristata*, alis deflexis: superiori-  
bus fuscis  $\lambda$  aereo inscriptis. *Fn. suec.* 873.  
*Gæd. inf.* 2. t. 21. *Alb. inf.* t. 79. f. G. H.  
*List. gæd.* f. 14. *Frisch. inf.* 5. t. 15.  
*Blank. inf.* t. 8. f. N. P. *Reaum. inf.* 2. t. 26, 27. f. 5.  
*Pet. gaz.* t. 64. f. 6. *Roes. inf.* 1. phal. 3. t. 5.  
*Raj. inf.* 163. n. 17. *Wilk. pap.* 34. t. 2. a. 1.  
*Mer. eur.* 82. f. 78.  
*Habitat in Abrotano, Boragine, Lactuca.*  
*Larva geometrica, 12-poda, viridis, subpilosa, nec ideo ad Geometras amandanda.*
- Interro- 92. P. *Noctua spirilinguis cristata*, alis deflexis: superiori-  
gationis. bus cinereis signo? albo inscriptis.  
*Habitat in Europa.*
- Jota 93. P. *Noctua spirilinguis cristata*, alis deflexis: superiori-  
bus ferrugineo griseis  $i$  resupinato aereo inscriptis.  
*Habitat in Germania. P. Forskål.*  
*Magnitudo trium præcedentium. Corpus griseum. Cri-  
sta collaris semiorbicularis; dorsalis thoracis bifida;  
supra-abdominalis infundibuliformis. Alæ superiores  
griseo fuscoque variæ; in medio versus marginem te-  
nuiorem magis luteæ; in centro alæ jota græcum  
s. signum interrogationis aureum, a præcedentis spe-  
ciei diversissimum.*
- Festucæ. 94. P. *Noctua spirilinguis cristata*, alis deflexis: superioribus  
flavo ferrugineoque variis: maculis tribus argenteis.  
*Alb. inf.* t. 84. f. G. II. *Wilk. pap.* 8. t. 1. a. 17.  
*Pet. gaz.* t. 7. f. 7. *Act. Stockh.* 1748. t. 6. f. 3, 4.  
*Habitat in Festuca fluitante.*  
*Larva nuda, viridis.*
- meticu- 95. P. *Noctua spirilinguis cristata*, alis erosis pallidis: su-  
lofa. perioribus basi incarnata triangulo fusco.  
*Fn. suec.* 815.  
*Gæd. inf.* 1. t. 56. *Reaum. inf.* 1. t. 8. f. 25, 26.  
*List. gæd.* f. 44. *I. t.* 14. f. 12, 13.  
*K k Mer.*



- Mer. eur. t. 24.* *De Geer inf. 1. t. 5. f. 14.*  
*Alb. inf. t. 13.* *Wilk. pap. 3. t. 1. a. 3.*  
*Habitat in Cheirantho, Mercuriali, Urtica.*  
*Larva nuda, viridis, lineis lateralibus albis.*
- Pli. 96. P. *Noctua spirilinguis cristata*, alis deflexis canis: superioribus characteribus  $\psi$  nigris. *Fn. suec. 879.*  
*Gæd. inf. 1. t. 22.* *Frisch. inf. 2. t. 2.*  
*List. gæd. f. 92.* *Reaum. inf. 1. t. 42. f. 5, 6.*  
*Raj. inf. 350.* *Rœs. inf. 1. phal. 2. t. 7, 8.*  
*Mer. eur. 3. t. 42.* *Wilk. pap. 28. t. 3. b. 4.*  
*Alb. inf. t. 86.*  
*Habitat in Alno, Corylo, Quercu, Malo.*  
*Larva pilosa, dorso flavo, lateribus nigris rubro-maculatis, thorace supra cornu erecto nigro.*
- Chi. 97. P. *Noctua spirilinguis cristata*, alis deflexis canis: superioribus  $\chi$  nigro notatis.  
*Alb. inf. t. 83. f. C. D.* *Rœs. inf. 1. phal. 2. t. 13.*  
*Habitat in Aquilegia, Delphinio, Soncho.*  
*Larva nuda, viridis, lateribus lineis 2 flavis.*
- Aceris. 98. P. *Noctua spirilinguis cristata*, alis deflexis canis: superioribus lineolis undatis annuloque ovali nigris.  
*Alb. inf. t. 83.* *Reaum. inf. 1. t. 34. f. 11.*  
*Frisch. inf. 1. t. 5.* *Wilk. pap. 32. t. 3. c. 6.*  
*Habitat in Acere, Æsculo, Juglande.*  
*Larva hirsuta, fasciculis tecta flavis rubrisque, dorso albo nigro maculato.*
- aprilina. 99. P. *Noctua spirilinguis cristata*, alis deflexis: superioribus virentibus fascia maculisque atris: postice punctis trigonis.  
*De Geer inf. 1. t. 5. f. 22, 23.*  
*Habitat in Europa.*
- ludifica. 100. P. *Noctua spirilinguis cristata*, alis deflexis: superioribus virentibus, abdomineque flavo nigro punctatis.  
*Habitat in Europa.*  
*Simillima Ph. aprilinæ, at diversa flavedine & thorace maculato.*
- occulta. 101. P. *Noctua spirilinguis cristata*, alis deflexis fusco nebulosis striga inferioribusque brevioribus margine albis.



*Habitat in Europa. Tych. Holm. M. D.*

*Fascia linearis repanda alba, supra superiores ubi inferiores terminantur margine postico utrinque albo: alæ inferiores multo breviores sunt.*

conspicil- 102. P. *Noctua spirilinguis cristata*, alis incumbenti planis: laris. pallide griseis, oculorum operculis orbiculatis.

*Habitat in Europa. T. Bergman*

*Alæ inferiores subtus albidae, pone punctum fascia obsoleta e punctis distinctis, præter illa quæ alas terminant.*

umbrati- 103. P. *Noctua spirilinguis cristata*, alis lanceolatis canis ca. striatis, thoracis valvulis lunatis.

*Reaum. inf. 1. t. 43. f. 9, 11.*

*Rœs. inf. 1. phal. 2. t. 25.*

*Habitat in Soncho.*

*Larva nuda, nigricans, trifariam rubro-punctata.*

exfoleta. 104. P. *Noctua spirilinguis cristata*, alis lanceolatis convolutis exfoletis dorso fuscescentibus, collari compresso.

*Frisch. inf. 5. t. 11. f. 1. Rœs. inf. 1. phal. 2. t. 24.*

*Wilk. pap. 8. t. 1. a. 18.*

*Habitat in Chenopodio Vulvaria, Atriplice, Piso, Campanula.*

*Larva nuda, viridis, punctata, linea laterali albida.*

*Ph. color ligni putrescentis admodum exfoleti.*

Verbasci. 105. P. *Noctua spirilinguis cristata*, alis deflexis obsoletis margine laterali fulcis.

*Raj. inf. 169. n. 125.*

*Reaum. inf. 1. t. 43.*

*Merian. eur. 3. t. 29.*

*Rœs. inf. 1. phal. 2. t. 23.*

*Frisch. inf. 6. t. 9.*

*Wilk. pap. 7. t. 1. a. 15.*

*Alb. inf. t. 13.*

*Habitat in Verbasco, Scrophularia.*

*Larva nuda, cinerea flavaque maculis nigris.*

*Ph. similis Ph. exfoletæ, sed dimidio brevior.*

exclama- 106. P. *Noctua spirilinguis cristata*, alis incumbentibus fu- tionis. scis lineola atra maculaque cordata, interioribus albis.

*Habitat in Europa.*

*Alæ superiores versus basin lineola atra latiuscula bre- vi, quam sequitur in medio macula cordata fusca, apice anteriora spectante. Thorax antice lunula atra bifida.*



- gothica. 107. P. *Noctua spirilinguis cristata*, alis deflexis: superioribus fusciscentibus: arcu nigro linea alba marginato.  
*Habitat in Europa.*  
*Alæ in medio Arcu nigro extrorsum verso, margine undique albo, cum adjecto Puncto nigro ad latus interius.*
- scabriuscula. 108. P. *Noctua spirilinguis cristata*, alis deflexis fuscis: margine dorsali posticoque pallidis.  
*Habitat in Europa.*  
*Cristæ in dorso ipsius abdominis & pone thoracem gibbum.*
- strigilis. 109. P. *Noctua spirilinguis cristata*, alis deflexis nebulosis: denticulis setaceis intra fasciam albam terminalem.  
*Habitat in Europa.*  
*Inter congeneres parva. Alæ griseo-cinereæ tribus annulis ovalibus nigris; fascia alba alas terminans latior, intra quam area fusca inserit 5 vel 6 strias nigras fere ad ejus medium.*
- C nigrum. 110. P. *Noctua spirilinguis cristata*, alis depressis cinereis macula nigra extus obsoleta lineolaque apicis atra.  
*Fn. Jvec. 874.*  
*Habitat in Europa.*  
*Lineola nigra ante apicem ad marginem exteriorem.*
- Brassicæ. 111. P. *Noctua spirilinguis cristata*, alis depressis cinereis nebulosis: unco nigro supra maculam priorem.  
*Rœs. inf. 1. phal. 2. t. 29.*  
*Habitat in Brassica.*  
*Larva fusco-viridis punctis lateralibus rubris.*
- Rumicis. 112. P. *Noctua spirilinguis cristata*, alis deflexis cinereis bimaculatis: litura marginis tenuioris alba.  
*Mer. eur. t. 82.* *Rœs. inf. 1. phal. 2. t. 27.*  
*Alb. inf. t. 32.* *Wilk. pap. 26. t. 3. a. 1.*  
*Habitat in Rumice, Soncho.*  
*Larva pilosa, nigra, punctis rubris albisque mixtis.*
- Oxyacanthæ. 113. P. *Noctua spirilinguis cristata*, alis deflexis bimaculatis margine tenuiore cærulescente. †  
*Alb. inf. t. 14.* *Wilk. pap. 12. t. 1. c. 1.*  
*Rœs. inf. 1. phal. 2. t. 33.*  
*Habitat in Atroplice, Oxyacantha, Pruno spinosa.*  
*Larva inæqualis, albo nigroque varia, cauda gibba.*



oleracea. 114. P. *Noctua spirilinguis cristata*, alis deflexis: superioribus fuscescentibus bimaculatis, striga marginis postica bidentata.

*Fn. svec.* 871.

*Mer. eur.* 1. t. 43?

*Reaum. inf.* 2. t. 39. f. 4?

*Alb. inf.* 27. t. 40?

*Rœs. inf.* 1. phal. 2. t. 32.

*Habitat in Olerum radicibus, quas consumit.*

*Larva livida, nuda, latere linea nigricante, subtus subincarnata.*

Pisi. 115. P. *Noctua spirilinguis cristata*, alis deflexis ferrugineo-cinereis bimaculatis: striga postica pallida.

*Fn. svec.* 878.

*Rœs. inf.* 1. phal. 2. t. 52.

*Wilk. pap.* 4. t. 1. a. 7.

*Habitat in Piso, Genista, legumina consumens; interdum in Cucumere? Grossularia?*

*Larva nuda, ferruginea lineis 4 flavis.*

Atriplicis. 116. P. *Noctua spirilinguis cristata*: alis deflexis nebulosis litura fulva. †

*Rœs. inf.* 1. phal. 2. t. 31.

*Wilk. pap.* 3. t. 1. a. 2.

*Habitat in Atriplice, Rumice.*

*Larva lævis, nuda, rufescens punctis albis.*

præcox. 117. P. *Noctua spirilinguis cristata*, alis deflexis cinereis bimaculatis postice rufo-subfasciatis. †

*Rœs. inf.* 1. phal. 2. t. 51.

*Habitat in Soncho.*

*Larva lævis, nuda, ferruginea linea dorsali alba.*

triplasia. 118. P. *Noctua spirilinguis*, alis deflexis: superioribus arcu duplici contrario maculisque tribus glaucis intermediis.

*Mer. eur.* t. 97.

*De Geer inf.* 1. t. 6. f. 20, 21.

*Rœs. inf.* 1. phal. 2. t. 34.

*Habitat in Soncho, Humulo.*

*Larva nuda, viridis gibberibus 2 dorsi & 1 ani fuscis.*

*Crista thoracis reflexa, alta, pallida. Alæ superiores griseo-cinereæ arcu ferrugineo in ala antica & postica. Maculae tres interjectæ glaucæ, quarum duæ versus marginem lateralem.*



- pyrami- 119. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis fuscis: superioribus  
dea. strigis tribus flavescentibus repandis. †  
*Merian. eur. 2. p. 23. t. 9. Rœs. inf. 1. phal. 2. t. 11.*  
*Reaum. inf. 1. t. 15. f. 1-5.*  
*Habitat in Pruno, Juglande, Quercu.*  
*Larva postice conico-gibba, nuda, viridis linea dorsali*  
*flava, laterali alba.*  
*Abdomen Phalænæ ad latera punctis 3 s. 4 albis nota-*  
*tur, ut in Ph. C nigro.*
- flavico- 120. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis superioribus cine-  
nis. reis: strigis tribus atris, antennis luteis.  
*Habitat in Svecia. T. Bergman.*
- leucome- 121. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis nigricante nebulo-  
las. sis; interioribus niveis postice fascia lata nigra.  
*Habitat in Europa.*  
*Alæ inferiores a medio ad basin lactææ, a medio versus*  
*apicem nigrae, sed apice ipso albicantes.*
- typica. 122. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis deflexis fuscescen-  
tibus: macula reniformi, strigis pallidis reticulatis.  
*Rœs. inf. 2. phal. 2. t. 56. Mer. eur. t. 81?*  
*Habitat in Salice.*  
*Larva viridis, nuda, grisea, lineis lateralibus flavis.*
- lucipara. 123. *P. Noctua spirilinguis cristata*: alis purpurascens: fasciis  
nigra macula postica flava,  
*Habitat in Europa.*
- Delphi- 124. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis deflexis purpura-  
nii. scentibus: fasciis duabus flavescentibus; inferioribus  
obscuris. †  
*Mer. eur. 1. t. 40. Rœs. inf. 1. phal. 2. t. 12.*  
*Wilk. pap. 3. t. 1. a. 4.*  
*Habitat in Delphinio.*  
*Larva nuda, flavescens, nigro-punctata.*
- citrago. 125. *P. Noctua spirilinguis cristata*, alis deflexis luteis:  
superioribus fasciis tribus ferrugineis obliquis.  
*Albin. inf. t. 33. Wilk. inf. 5. t. 1. a. 8.*  
*Habitat in Pado, Salice.*  
*Larva nuda, fusca, lateribus flava.*

126. P.

Superfedere coactus plurimas species cineritarum, nec non minutissimarum, facie,  
etiam Auctorum picturis, notas, sed mihi aptis verbis non indigendas.



Secalis. 126. P. *Noctua spirilinguis cristata*, alis deflexis: superioribus griseo-fuscis striatis: macula reniformi A latino. *Roland. Act. Stockh. 1752. p. 62.*

*Habitat intra culmos Secalis, consumta intra vaginam folii parte culmi, migrat in aliam plantam, unde spicæ albæ.*

\* 3 \* GEOMETRÆ *pectinata*, alis posticis subangulatis.

lactearia. 127. P. *Geometra bipectinicornis*, alis angulatis albis immaculatis, antennis apice setaceis.

*Fr. svec. 865.*

*Habitat in Europa.*

falcataria. 128. P. *Geometra pectinicornis*, alis falcatis glaucis: anticis undis fasciaque griseis puncto fusco.

*De Geer inf. 1. t. 24. f. 7.*

*Habitat in Betula alba, Alno.*

*Mas puncto ferrugineo in medio alæ juxta fasciam, quo femina caret. Larva est coarctata uti Lacertinariae. Bergman.*

Sambucaria. 129. P. *Geometra pectinicornis*, alis caudato-angulatis flavescens lineis duabus; posticis apicibus bipunctatis.

*Gæd. inf. 2. t. 34.*

*Alb. inf. t. 94.*

*List. gæd. f. 10*

*Ræs. inf. 1. phal. 3. t. 6.*

*Pet. gaz. t. 51. f. 6.*

*Wilk. pap. 38. t. 1. b. 2.*

*Raj. inf. 177. n. 9.*

*Habitat in Sambuco.*

*Larva geometra, lævis, pulla.*

lacertinaria. 130. P. *Geometra pectinicornis*, alis erosis lutescentibus postice saturatioribus: lineis duabus punctoque fuscis.

*Alb. inf. 65.*

*De Geer inf. 1. t. 10. f. 7, 8.*

*Reaum. inf. 2. t. 22. f. 4, 6. Wilk. pap. 14. t. 1. e. 3.*

*Habitat in Quercu.*

*Larva cauda simplici, apoda, Vinulæ affinis, nuda, rubra, dorso angulato.*

Alniaria. 131. P. *Geometra pectinicornis*, alis erosis flavis: strigis duabus fuscis. *Fr. svec. 834.*

Geometrarum Larvæ pedibus pectoralibus 6, caudalibus 2, subcaudalibus 2 pleræque instruantur, hinc procedunt fere uti Hirudines; ♂ quiescunt erectæ; harum pectinicornium Larvæ imprimis referunt ita vanulum ultimum cui insident, ut difficile ab eo distinguantur.



*De Geer inf. 1. t. 10. f. 13, 14.*

*Rœf inf. 1. pbal. 3. t. 1?*

*Habitat in Alno.*

Syringaria- 132. P. *Geometra* pectinicornis, alis suberosis: omnibus griseo-flavescentibus, strigis repandis punctisque duobus fuscis. †

*Rœf. inf. 1. pbal. 3. t. 10.*

*Wilk. pap. 39. t. 1. b. 6.*

*Habitat in Syringa, Jasmino.*

*Larva glauco lateoque varia, dorso aculeata, spinaque lutea curva.*

Prunaria. 133. P. *Geometra* pectinicornis, alis subdentatis luteis fusco-pulverulentis: anticis lunula fusca.

*Wilk. pap. 40. t. 1. 6, 8. f. 1, 2. Uddm. diff. 69.*

*Alb. inf. 42. t. 69.*

*Habitat in Pruno spinosa.*

*Larva geometra, ferruginea, dorso antice posticeque spinis 2.*

*Mas alis luteis, Femina flavis.*

\* \* GEOMETRÆ pectinicornes, Alis rotundatis,

Piniaria. 134. P. *Geometra* pectinicornis, alis omnibus fuscis: disco bimaculato-albo: subtus nebuloso-subfasciatis.

*Fn. svec. 839.*

*Uddm. diff. 64.*

*Habitat in Pinu.*

Tiliaria. 135. P. *Geometra* pectinicornis, alis lutescentibus erigatis: subtus nebuloso-fasciatis linea alba interrupta.

*Fn. svec. 818.*

*Reaum. inf. 2. t. 28. f. 6.*

*Habitat in Tilia.*

vulpinaria- 136. P. *Geometra* pectinicornis, alis anticis flavescentibus lunula ferruginea marginibusque rubris; subtus fuscis.

*Fn. svec. 837.*

*Robert. ic. t. 30. f. 1.*

*Raj. inf. 228. n. 75.*

*Habitat in Gramine.*

elinguaria- 137. P. *Geometra* pectinicornis, alis flavis: anticis fascia lata lutea: medio puncto nigro.

*Rœf.*

Geometrarum pectinicornium feminae pleraque antennis simplicibus setaceis sunt, proinde sexus completus acquirendus.



*Roes. inf. 1. phal. 3. t. 9.*

*Habitat in Pyro.*

*Larva geometra, laevis, ramiformis. Ph. Geometra elinguis.*

melanaria. 138. P. *Geometra pectinicornis*, alis nigro-punctatis maculatis: anticis albidis; posterioribus luteis.

*Udd. diff. 65.*

*Habitat in Europa.*

macularia. 139. P. *Geometra pectinicornis*, alis omnibus nigro-maculatis flavis.

*Habitat in Germania.*

*Præcedenti simillima, sed minor & alis etiam superioribus flavis. Antennæ in mea setacæ, sed femina.*

atomaria. 140. P. *Geometra pectinicornis*, alis omnibus lutescentibus: fasciis atomisque fuscis.

*Faun. suec. 840.*

*Frisch. inf. 13. p. 12. t. 5.*

*Alb. inf. 42. f. 69?*

*Habitat in Tilia.*

pulveraria. 141. P. *Geometra pectinicornis*, alis omnibus testaceo-pulverulentis: fascia lata ferruginea.

*Habitat in Europa.*

fasciaria. 142. P. *Geometra pectinicornis*, alis omnibus cinereis: fascia lata ferruginea.

*Habitat in Europa.*

Betularia. 143. P. *Geometra pectinicornis*: alis omnibus albis subfasciatis atomisque nigris, thorace fascia atra. *Faun.*

*suec. 850.*

*Pet. gaz. t. 7. f. 8.*

*Act. Stockh. 1755. p. 214. t. 6. f. 3.*

*Alb. inf. t. 91, 92, 40, 41.*

*Gadd satag. 82.*

*Wilk. pap. 38. t. 1. b. 1.*

*Habitat in Betula, Ulmo, Rosa.*

*Larva geometra pallida, postice maculis 2 atris.*

scopularia. 144. P. *Geometra pectinicornis*, alis canescentibus: fasciis tribus obscurioribus; posticis albidis.

*Habitat in Europa.*

*Magnitudo & statura antecedentis; lunula nigra sub alis inferioribus.*



wauaria. 145. *P. Geometra* pectinicornis, alis cinereis: anticis fasciis quatuor nigris abbreviatis inæqualibus. *Faun. svec.* 845.

*Gœd. inf.* 1. t. 35.

*Merian. eur.* 1. t. 25. f. 151.

*List. gœd.* t. 12.

*Frisch. inf.* 3. t. 3. f. 1.

*Pct. mus.* 3. n. 4.

*Rœs. inf.* 1. phal. 3. t. 4.

*Raj. inf.* 179.

*Wilk. pap.* 24. t. 2. a. 2.

*Alb. inf.* 47. f. 78.

*Habitat in* Grossularia, Rube rubro.

*Larva geometra, viridis, subpilosa.*

tentacul- 146. *P. Geometra* pectinicornis, alis omnibus cinerascen-  
laria. tibus strigis obsoletis, palpis longitudine antennarum.

*Fn. svec.* 841.

*De Geer inf.* 1. t. 5. f. 1.

*Habitat in* Europa.

*Palpi compresso-ciliares uniarticulati longitudine fere antennarum, porrecti apicibus divaricatis.*

purpura- 147. *P. Geometra* pectinicornis, alis luteis margine antica-  
ria. rumque fasciis duabus purpureis.

*Gœd. inf.* 2. t. 12.

*Uddm. diff.* 69.

*List. gœd.* 60.

*Habitat in* Quercu, Pruno spinosa.

*Minima, cum sequenti, facile inter Geometras est.*

profapia- 148. *P. Geometra* pectinicornis, alis lutescentibus: fasciis  
ria. utrinque duabus saturatoribus.

*Uddm. diff.* 66.

*Habitat in* Europa.

punctaria. 149. *P. Geometra* pectinicornis: alis cinereo-grisescen-  
tibus: striga ferruginea ordineque transverso punctorum  
atorum.

*Uddm. diff.* 67.

*Habitat in* Finlandia.

*Ordo punctorum in medio, pone strigam, in utraque pagina omnium alarum, distinctissimus est.*

pufaria. 150. *P. Geometra* pectinicornis, alis omnibus niveis: stri-  
gis tribus obsoletis.

*Habitat in* Europa.

papiliona- 151. *P. Geometra* pectinicornis, alis omnibus viridibus e-  
ria. rectis: striga sesquialtera pallida repanda.

*Fn. svec.* 922.

*Frisch. inf.* 10. t. 17.



*Habitat in Thymo?*

*Conf. Rœs. inf. 1. phal. 3. t. 12. Wilk. pap. 37. t. 1. a. 6. sed nostra duplo major.*

tripun-  
ctaria.

152. *P. Geometra pectinicornis*, alis fufcescentibus: anterioribus fascia interrupta baseosque stria; posterioribus disco albis.

*Pet. gaz. t. 28. f. 8. Edw. av. 35. t. 35.*

*Habitat in Asia.*

*Alarum fascia e maculis 6 s. 7 coadunatis. Abdomen trifariam nigro-punctatum, Ano flavo.*

tricincta-  
ria.

153. *P. Geometra pectinicornis*, alis flavescentibus concoloribus: arcibus tribus fuscis. *M. L. U.*

*Habitat in America.*

*Alarum arcus: 1. a margine anteriore ductus ad anum; 2. a margine antico ad marginem posticum; 3. apicem alæ anterioris includit.*

Jatropha-  
ria.

154. *P. Geometra pectinicornis*, alis nigris concoloribus: anterioribus maculis duabus; posterioribus unica flavis.

*M. L. U.*

*Mer. surin. 38. t. 38. f. 1.*

*Habitat in Jatropha gossypifolia Americes.*

*Alæ anteriores macula ovata transversa & minore, quæ in altero sexu deest, ad basin.*

\* \* \* GEOMETRÆ feticornes alis angulatis.

viridata.

155. *P. Geometra feticornis*, alis angulatis omnibus viridibus: striga pallida.

*Fn. svec. 857.*

*Habitat in Quercu.*

*Similis Rœs. 1. phal. 3. t. 13, sed linea unica & margo concolor.*

putata.

156. *P. Geometra feticornis*, alis angulatis: omnibus albidis: strigis duabus candidis repandis.

*Habitat in Europa.*

notata.

157. *P. Geometra feticornis*, alis angulatis pallidis: fasciis tribus subfuscis: anticarum postica nigricanti-com-maculata.

*Fn. svec. 357.*

*Habitat in Europa.*



*Margo posticus omnium alarum striga fusca terminatur, quæ evidentior ubi ala anterior emarginata; in alarum anticarum medio s. in fascia tertia sunt quatuor puncta æqualiter disposita inter se, quæ sterco-  
ra muscarum referunt.*

amata. 158. P. *Geometra* feticornis, alis subangulatis: omnibus  
lutæis: striga ferruginea repanda punctisque pulveru-  
lentis. †

*Wilk. pap. 37. t. 1. a. 5.*

*Reaum. inf. 2. t. 29. f. 1-4?*

*Habitat in Quercu australiore.*

*Larva geometra viridis cingulis flavis, inferne rubris.*

repanda- 159. P. *Geometra* feticornis, alis cinereis: omnibus fusco-  
ta. undatis; posticis margine repando atro.

*Habitat in Europa.*

dubitata. 160. P. *Geometra* feticornis, alis anticis griseo-glauce-  
scentibus fascia purpurascente; posticis dentatis.

*Habitat in Europa.*

*Statura Geometræ, magnitudo Noctuæ, facies Tineæ.*

emargi- 161. P. *Geometra* feticornis, alis omnibus pallidis emar-  
nata. ginato-angulatis: strigis duabus griseis.

*Habitat in Europa.*

*Alæ flavescenti-pallidæ lineis 2 griseis remotissimis; punctum fuscum in disco; omnes alæ postice fere emarginatæ sunt.*

\* \* \* \* GEOMETRÆ feticornes alis rotundatis.

atrata. 162. P. *Geometra* feticornis atra, alis erectis: anticis api-  
ce albis.

*Fn. svec. 864.*

*Pet. gaz. t. 69. f. 8.*

*Habitat in Europæ pascuis.*

clathrata. 163. P. *Geometra* feticornis, alis omnibus flavescenti-al-  
bis: lineis nigris decussatis.

*Habitat in Europa.*

undulata. 164. P. *Geometra* feticornis, alis omnibus supra strigis  
confertissimis transversis undulatis fuscis.

*Uddm. diss. 71.*

*Habitat in Salice caprea.*



flaveola- 165. P. *Geometra* feticornis, alis nigris concoloribus: di-  
ta. disco communi flavo crenato. *M. L. U.*

*Habitat in* Indiis.

*Corpus flavum.*

æstuata. 166. P. *Geometra* feticornis, alis fuscis concoloribus: ma-  
culis albis oblongis coadunatis. *M. L. U.*

*Habitat in* Indiis.

*Alæ anteriores basi maculis 2, disco 6 coadunatis; po-  
steriores maculis 7 linearibus coadunatis.*

Grossula- 167. P. *Geometra* feticornis, alis albidis maculis rotunda-  
riata. tis nigris: anticis strigis luteis. *Fn. suec. 849.*

*Mouff. inf. 96. n. 10.*

*Merian. eur. 1. t. 29.*

*Fonst. inf. 84. n. 10. t. 6.*

*Alb. inf. t. 43. f. 71.*

*Gæd. inf. 1. t. 36.*

*Frisch. inf. 3. t. 2.*

*List. gæd. f. 9.*

*Rœs. inf. 1. phal. 3. t. 2.*

*Blank. inf. t. 7. f. E. H.*

*Wilk. pap. 42. t. 2. a. 1.*

*Raj. inf. 178. n. 12.*

*Habitat in* Ribe, Grossularia, Amygdalo.

*Abdomen luteum nigro-maculatum.*

*Larva geometra subpilosa, supra fusca, subtus flava.*

luteolata. 168. P. *Geometra* feticornis, alis flavissimis: anterioribus  
maculis costalibus tribus ferrugineis: media subar-  
gentea.

*Wilk. pap. 39. t. 1. b. 4.*

*Uddm. diff. 70.*

*Habitat in* Oxyacantha.

*Larva geometra nuda, fusca: spina dorsali recta.*

Populata. 169. P. *Geometra* feticornis, alis flavo-pallidis: anticis  
subfasciatis: apice subtus fusco contaminatis.

*Habitat in* Populo.

*Alæ primores supra obsolete griseo fasciatæ; postice sub-  
tus flavescens arcu fusco ex punctis cum puncto ni-  
gro centrali.*

bilineata. 170. P. *Geometra* feticornis, alis omnibus luteis testaceo  
undatis: fascia repanda margine fusco alboque.

*Habitat in* Svecia.

Cheno- 171. P. *Geometra* feticornis, alis anticis testaceis; fasciis  
podiatæ. tribus griseis puncto prominulo apicisque lineola supra  
fulca.



*Fn. svec.* 856.*Alb. inf.* t. 47. f. 79.*Habitat in* Chenopodio.

comitata. 172. *P. Geometra* seticornis, alis anticis flavescens : fasciis tribus griseis puncto apicisque lineola utrinque fusca.

*Habitat in* Europa.

dotata. 173. *P. Geometra* seticornis, alis flavescens : anticis subfasciatis : apicis litura subtus fusca.

*Habitat in* Europa.

plagiata. 174. *P. Geometra* seticornis, alis anticis canis : fasciis tribus trilineatis nigricantibus repandis.

*Habitat in* Europa.

miata. 175. *P. Geometra* seticornis, alis virescenti undulatis : fasciis duabus latioribus albis.

*Fn. svec.* 863.*Habitat in* Europa.

Prunata. 176. *P. Geometra* seticornis, alis griseis : anticis fasciis duabus pallidis repandis : postica semiterminali.

*Faun. svec.* 866.*Frisch. inf.* 5. t. 14.*Habitat in* Pruno.

aversata. 177. *P. Geometra* seticornis, alis pallidis : striga bascos fasciaque media punctoque fuscis.

*Uddm. diff.* 72.*Habitat in* Finlandia.*Punctum in pagina inferiori magis saturatum.*

tristata. 178. *P. Geometra* seticornis, alis omnibus nigris albo subundatis : fasciis duabus albis undatis nigro-punctatis.

*Fn. svec.* 862.*Habitat in* Sylvis Europæ.

Alchemillata. 179. *P. Geometra* seticornis, alis canescentibus : anticis undatis : fascia nivea cinereo undata, lineolaque intra apicem.

*De Geer inf.* 1. t. 22. f. 16.*Habitat in* Alchemilla.*Fascia & lineola repanda intra apicem alba sunt, striga cinerea repandaque priori; dimidio minor.*



- hastata. 180. P. *Geometra feticornis*, alis omnibus nigris albo maculatis: fasciis duabus albis immaculatis haurato dentatis.  
*Habitat in Svecia.*  
*Majuscula inter proximas; alis concoloribus absque puncto nigro subtus.*
- albicillata. 181. P. *Geometra feticornis*, alis omnibus nigricantibus: fascia unica latissima immaculata.  
*Habitat in Svecia.*
- marginata. 182. P. *Geometra feticornis*, alis omnibus albis: margine exteriori limbo fusco interrupto.  
*Fn. svec. 860.*  
*Habitat in Corylo.*  
*Quibusdam maculæ 2 s. 3 in singulæ alæ disco.*
- ocellata. 183. P. *Geometra feticornis*, alis albidis: anticis fasciis duabus fulcescentibus maculaque apicis ocellari didyma.  
*Fn. svec. 862.*  
*Habitat in Europa.*
- Janata. 184. P. *Geometra feticornis*, alis anterioribus subtus cinereis; posterioribus supra fascia punctisque tribus albis. *M. L. U.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Alæ Anteriores supra cinereæ lineis 2 transversis saturatioribus; subtus fascia alba. Posteriores supra fascia alba; subtus lineis 2 saturatioribus & macula ad angulum ani. Si Pb. subtus inspiciatur, ut cauda sit capitis loco, refert eandem supra & antice visam; hinc hysteron-preteron vel Janus bifrons audivit.*
- fluctuata. 185. P. *Geometra feticornis*, alis cinerascensibus: anticis fasciis abbreviatis tribus fuscis.  
*Fn. svec. 859.* *Mer. eur. t. 120.*  
*Gœd. inf. 1. t. K.* *Frisch. inf. 7. t. 19.*  
*List. gœd. f. 13.*  
*Habitat in arboribus variis, Tropæolo.*
- Junipera- 186. P. *Geometra feticornis*, alis cinerascensibus: anterioribus fasciis duabus griseis lineolaque apicis fusca.  
*Habitat in Juniperis. D. C. Solander.*



*Fascia alarum posterior versus marginem internam fere interrupta; anterior ad basin, minor; ad apicem alæ supra lineola nigricans longitudinalis.*

inoanata. 187. P. *Geometra feticornis*, alis omnibus canis postice striga alba repanda disco puncto margineque nigropunctatis.

*Habitat in Europa.*

iminuta- 188. P. *Geometra feticornis*, alis albidis concoloribus: striga cinerea puncto margineque nigropunctatis.

*Habitat in Europa.*

*Alæ pone strigam obsolete nebulosæ.*

immorta- 189. P. *Geometra feticornis*, alis omnibus lutescentibus: fasciis obsolete albidis marginisque striga nigricante.

*Habitat in Europa.*

*Alæ concolores, absque puncto, undique atomis fuscis adspersæ.*

remorta- 190. P. *Geometra feticornis*, alis flavescens: strigibus fuscis, puncto margineque postico nigropunctato.

*Habitat in Europa.*

succenta- 191. P. *Geometra feticornis*, alis omnibus canescenti-exalbidis puncto nigro: limbo obscuriore.

*Habitat in Europa. De Geer.*

*Thorax albus ad latera tectus duabus valvulis, alarum rudimentis, basi alarum anteriorum incumbens. Abdomen griseum, sed primum & ultimum segmentum album: stigmata omnia nigra. Alæ oblongæ.*

strigilata. 192. P. *Geometra feticornis*, alis cinereis: postice striga transversa recta pallida.

*Habitat in Europa.*

didyma- 193. P. *Geometra feticornis*, alis albidis obsolete cinereobifasciatis: posteriori macula fusca biloba.

*Habitat in Europa. D. C. Solanæer.*

rectangulata- 194. P. *Geometra feticornis*, alis viridibus fusco-subfasciatis.

*Habitat in Europa. Claud. Alströmer.*

*Alæ subtus fascia rectangula e punctis nigricantibus.*



- Hortula- 195. *P. Geometra feticornis*, alis albis : fusco - fasciato  
 ta. maculatis, thorace anoque flavis *Fn. svec.* 840.  
*Gæd. inf.* 2. t. 13. *Alb. inf.* t. 37 f. 60  
*List. gæd.* t. 61. *Reaum. inf.* 1. t. 40 f. 17, 18.  
*Pet. gaz.* t. 32. f. 8. *De Geer inf.* 1. t. 28. f. 18, 19.  
*Raj. inf.* 222. *Kœf. inf.* 1. phal. 4. t. 14.  
*Habitat in Urtica, hortis pomonæ.*  
*Larva 16-podia, nuda, albida, dorso fusco.*
- Nym- 196. *P. Geometra feticornis*, alis cinereis : omnibus con-  
 phæata. formiter albo maculatis reticulatis.  
*Fn. svec.* 851. *Raj. inf.* 227. n. 87.  
*Habitat in Nymphæa, Lemna.*
- Potamo- 197. *P. Geometra feticornis*, alis cinereis albo maculatis  
 gata. anterioribus obsoletius reticulatis.  
*Fn. svec.* 853. *Reaum. inf.* 2. t. 32. f. 11.  
*Lœf. pruss.* 178.  
*Habitat in Potamogetone natante, subiens metamorphosin*  
*in intra folii segmentum folio adjectum*
- Stratio- 198. *P. Geometra feticornis*, alis pallidis subfasciatis : an-  
 tata. terioribus punctis tribus nigris.  
*Fn. svec.* 854.  
*De Geer inf.* 1. t. 37. f. 16-18.  
*Habitat in Stratiote Aloide sub aquis.*
- Lemna- 199. *P. Geometra feticornis*, alis albis : posticis fascia ter-  
 ta. minali nigra : punctis quatuor albis.  
*Fn. svec.* 852. *Raj. inf.* 205. n. 102.  
*Habitat in Lemna, ex qua collecta nidum struit.*
- cingula- 200. *P. Geometra feticornis*, alis omnibus atris : striga  
 ta. nivea.  
*Fn. svec.* 906.  
*Habitat in Europa.*  
*Statura & magnitudo Tineæ. Antennæ corpore breviores.*
- brumata. 201. *P. Geometra feticornis*, alis griseo - fuscis striga ni-  
 gra postice pallidioribus ; femina aptera.  
*Fn. svec.* 921. *Reaum. inf.* 2. t. 30. f. 8, 9.  
*Raj. inf.* 369. n. 7. f. 181. n. 4. *De Geer inf.* 1. t. 24. f. 11, 19.  
*Habitat in Pomonæ arboribus, quas misere devastat, octo-*  
*bri ova ponens. Amœn. acad.* 3. p. 349.



## \* 4 \* TORTRICES.

prafina- 202. P. *Tortrix* alis superioribus viridibus : strigis duabus  
na. obliquis flavis, margine postico antennis pedibus-  
que fulvis.

*Pet. gaz. t. 7. f. 11.*

*De Geer inf. 1. t. 3. f. 1.*

*Alb. inf. t. 31.*

*Wilk. pap. 6. t. 1. a. 13.*

*Reaum. inf. 1. t. 39. f. 13, 14.*

*Habitat in Alno, Quercu.*

*Larva nuda, luteo-virens punctis albis, ano fulvo.*

viridana. 203. P. *Tortrix* alis rhombeis, superioribus viridibus im-  
maculatis.

*Fn. svéc. 895.*

*Rœf. inf. 1. phal. 4. t. 3.*

*Frisch. inf. 3. t. 8.*

*Wilk. pap. 4. t. 1. a. 5.*

*Reaum. inf. 2. t. 18. f. 6, 7.*

*Habitat in Quercu, Salice hirsuta.*

*Larva nuda, viridis punctis nigris, capite caudaque  
luteis.*

literana. 204. P. *Tortrix* alis rhombeis : superioribus viridibus cha-  
racteribus atris.

*Habitat in Germania.*

*Simillima præcedenti, sed alis saturatius viridibus : cha-  
racteribus plurimis atris.*

hamana. 205. P. *Tortrix* alis superioribus flavis puncto lituraque  
postica hamata ferrugineis.

*Habitat in Europa.*

fuscana 206. P. *Tortrix* alis omnibus fuscis.

*Habitat in Europa.*

oporana. 207. P. *Tortrix* alis superioribus ferrugineis griseo ma-  
culatis reticulatisque.

*Wilk. pap. 17. t. 2. a. 4.*

*Habitat in Malo.*

Rosana. 208. P. *Tortrix* alis superioribus testaceo-reticulatis : fa-  
scia grisea obliqua.

*Fn. svéc. 896.*

*Merian. europ. 1. p. 7. t. 19.*

*Habitat in Rosâ, Berberide.*

209. P.



- Xyloste-209 P. *Tortrix* alis superioribus testaceis: cruce commu-  
ana. ni ferruginea.  
*Habitat in Xylosteo.*
- Avella- 210. P. *Tortrix* alis superioribus testaceis: fasciis ferru-  
na. gineis sequitertiis.  
*Fn. svec. 882.*  
*Alb. inf. 1. t. 95. f. g. h?*  
*Habitat in Corylo, Pyro.*
- Ameria- 211. P. *Tortrix* alis superioribus testaceis: litura com-  
na. muni ferruginea.  
*Reaum. inf. 2. t. 18. f. 6, 7.*  
*Habitat in Salice.*
- Piceana. 212. P. *Tortrix* alis superioribus griseo nigroque vari-  
dorfo ferrugineis.  
*Habitat in Pini foliis, quæ combinat.*  
*Larva nuda, viridis, 16-poda. Rolander.*
- ministra- 213. P. *Tortrix* alis superioribus testaceis: m-  
na. stico rufo, medio litura ferruginea: lineola alba.  
*Habitat in Europa.*
- Lechea- 214. P. *Tortrix* alis superioribus luteis: characteribus  
na. J L, thoraceque argenteis.  
*Habitat in Pado.*
- Brande- 215. P. *Tortrix* alis superioribus testaceo - fuscis inma-  
riana. culatis.  
*Habitat in Europa.*  
*Antecedentibus paulo major, alis obscure cinereis.*
- Forskâ- 216. P. *Tortrix* alis superioribus flavis luteo reticulatis:  
leana. medio litura fuscescente.  
*Habitat in Europa.*  
*Præcedentibus omnibus minor est.*
- Lœflingi- 217. P. *Tortrix* alis superioribus flavis luteo reticulatis:  
ana. strigis tribus ferrugineo - argenteis.  
*Habitat in Europa.*  
*Facies & magnitudo antecedentis.*
- Bergman- 218. P. *Tortrix* alis superioribus luteis flavo punctatis:  
niana. fasciis quatuor argenteis: tertia bifida.



*Habitat in Europa.*

*Parva & præcedenti simillima.*

Holmia- 219. P. *Tortrix* alis superioribus luteo ferrugineis ; macu-  
na. la marginali trigona argentea.

*Fn. svec. 883.*

*Habitat in Pomonæ arboribus.*

*Præcedentibus duabus paulo minor.*

Rolan- 220. P. *Tortrix* alis superioribus pallide testaceis, strigis  
driana. ferrugineis inferne antrorsum versis.

*Habitat in Europa.*

Solan- 221. P. *Tortrix* alis superioribus pallidis : macula com-  
driana. muni dorsali ferruginea.

*De Geer inf. 1. t. 28. f. 29, 30.*

*Habitat in Betula.*

Hastiana. 222. P. *Tortrix* alis superioribus fuscis : fascia antrorsum  
obliqua alba.

*Habitat in Salice. Reinh. Hast.*

*Fascia non tangit marginem interiorem alæ & a summo descendit antrorsum.*

*Hast (Reinh.) fenno, natus ad Insectorum Historiam, at in flore ætatis periit egregius discipulus.*

Wahlbo- 223. P. *Tortrix* alis superioribus cinereis : fasciis duabus  
miana. fusco-nebulosis litura postica obsoleta, palpis obtusis.

*Habitat in Europa.*

*Alæ cinereæ. Fascia anterior cinereo-fusca, postice subtriloba ; Fascia media latior cinereo-fusca ; litura obliqua obsoleta ante apicem ; margo exterior alarum extrorsum marginatus ut in præcedentibus ; ceterum in variis similis P. tertianellæ.*

Lediana. 224. P. *Tortrix* alis fuscis : fasciis duabus rubro-argen-  
teis : posteriore puncto intruso.

*Habitat in Ledo. T. Bergman.*

Heracli- 225. P. *Tortrix* elinguis recurvicornis, alis griseis puncto  
ana. fusco, thorace flavo. *Fn. svec. 916.*

*Reaum. inf. 2. t. 16. f. 1-4. De Geer inf. 1. t. 29. f. 6, 7.*

*Habitat in umbellis plantarum umbelliferarum, imprimis Heraclii, contortis destructisque floribus caules ex alis foliorum penetrans.*



## \* 5 \* PYRALES.

- Farinalis. 226. *P. Pyralis recurvicornis*, alis politis fuscescentibus : strigis repandis albidis area interjecta glauca.  
*Habitat in Farina.*
- glaucina-227. *P. Pyralis recurvicornis*, alis glabris glaucis : strigis duabus flavis arcuatis remotissimis.  
*Habitat in Europa.*
- probosci-228. *P. Pyralis* palpis porrectis approximatis thorace longioribus, alis cinereo-griseis : strigis ferrugineis.  
*Habitat in Europa.*
- rostralis. 229. *P. Pyralis* palpis porrectis thorace longioribus, alis subgriseis : punctis duobus muricatis striga interjecta nigra.  
*Raj. inf. 214. n. 9. Ræf. inf. 1. phal. 4. t. 6.*  
*Reaum. inf. 1. t. 18. f. 16?*  
*Habitat in Carpino, Humulo.*  
*Alæ posterius pallidiores ; in area anteriore linea nigra utraque extremitate terminata puncto eminente. Palpi approximati.*
- forficalis. 230. *P. Pyralis* alis glabris pallidis : lineis ferrugineis retrorsum obliquatis litura anterioris.  
*Fn. svec. 880. Reaum. inf. 1. t. 16. f. 13, 14.*  
*Habitat in Brassica.*  
*Alæ postice ad angulum obtusum discedentes, ut in sequenti.*
- verticalis. 231. *P. Pyralis* alis glabris pallidis subfasciatis : subtus fusco undatis.  
*Fn. svec. 855.*  
*Mer. eur. t. 88. f. infim? Ræf. inf. 1. phal. 4. t. 4.*  
*Reaum. inf. 2. t. 19. f. 1-5. Wilk. pap. 24. t. 3. a. 16.*  
*Habitat in Urtica Tortrix.*
- pinguina-232. *P. Pyralis elinguis recurvicornis*, alis cineratis : costis nigro subfasciata.  
*Fn. svec. 915.*  
*Roland. Act. Stockh. 1755. p. 51. t. 2.*  
*Habitat in Pinguibus, Butyro aliisque frequens, intra domos & culinas, rarius in venicula humano, inter vermes pessima.*



- purpura- 233. *P. Pyralis* alis fusco-purpurascens : omnibus lu-  
lis. teo maculatis.  
*Habitat in Europa.*
- \* 6 \* TINEÆ.
- sociella. 234. *P. Tinea* alis oblongis cinereis : antice albidis : po-  
stice striga pallida.  
*Fn. svec. 905.*  
*Habitat in Europa.*
- colonia- 235. *P. Tinea* alis oblongis cinereis : punctis duobus atris  
la. ante strigam curvam ferratam obsoletam.  
*Fn. svec. 912.*  
*Habitat in Europa.*  
*Palpi duo, prominentes, distantes, ut in antecedenti.*
- pufiella. 136. *P. Tinea* alis superioribus albis : punctis lineaque  
communi longitudinali dentata atra ; inferioribus nigris.  
*Habitat in Germania. P. Forskål.*  
*Statura P. T. Evonymella. Alæ fuscae : sed superiores su-  
pra niveæ, fascia longitudinali atra obtuse dentata,  
præter puncta varia.*
- bella. 237. *P. Tinea* alis flavis : superioribus fasciis sex puncto-  
rum nigrorum.  
*Pet. gaz. 6. t. 3. f. 2. Raj. inf. 211. n. 1.*  
*Catesb. car. 2. p. 96. t. 96.*  
*Habitat in America septentrionali.*  
*Alæ fasciis ex punctis nigris in totidem series transver-  
sas digestis.*  
*Variat punctis alarum superiorum simplicissimis & ocel-  
latis.*
- pulchella. 238. *P. Tinea* alis albis : superioribus nigro sanguineo-  
que punctatis ; inferioribus apice nigris.  
*Pet. gaz. t. 3. f. 3.*  
*Habitat in Europa australi ; in Mauritania. Brander.*  
*Similis Tineæ Evonymella sed cuplo major, pulcher-  
rima. Alæ superiores punctis rubris & nigris sparsis  
mixtis ; margo superiorum posticus nigro punctatus.*
- Evonymella. 239. *P. Tinea* alis superioribus albis : punctis 50 nigris ;  
inferioribus fuscis.  
*Fn. svec. 891. Frisch. inf. 5. t. 16.*



*Mer. inf.* 2. t. 2. *Reaum. inf.* 2. t. 12. f. 12, 13.  
*Alb. inf.* t. 60. f. A-C. *Rœf. inf.* 1. phal. 4. t. 8.  
*Raj. inf.* 196. *Wilk. pap.* 4. t. 1. a. 6.  
*Habitat in Evonymo! Pado, Sorbo &c.*  
*Larvæ vivunt in societate sub tentoriis.*

Padella. 240. P. *Tinea* alis superioribus lividis : punctis 20 nigris ; inferioribus fuscis.

*Frisch. inf.* 5. t. 16. *Rœf. inf.* 1. phal. 4. t. 7.  
*Reaum. inf.* 2. t. 12. f. 5-9. *Wilk. pap.* 4. t. 1. a. 6.  
*Habitat in Arboribus pomonæ.*  
*Simillima P. Evonymellæ, sed supra minus alba fereque plumbea punctis nigris paucioribus. Palpi magis prominentes ut fere bicornis.*  
*Larvæ vivunt in societate sub tentoriis, uti præcedentis.*

irrorella. 241. P. *Tinea* alis luteis : superioribus punctis nigris trifariis.

*Fn. svec.* 920.  
*Habitat in Europa.*

lutarella. 242. P. *Tinea* alis corporeque luteis immaculatis.

*Habitat in Europa.*  
*Magnitudo & statura P. T. Padellæ aut Phryganæ, sed magis angusta.*

meso- 243. P. *Tinea* alis supra albis, subtus luteis, interne nigris.  
 mella. *Habitat in Gramine.*

pascuella. 244. P. *Tinea* alis superioribus pallidis linea maculaque rhombea albissimis.

*Habitat in Pascuis.*

pratella. 245. P. *Tinea* alis superioribus albidis : linea albissima postice ramosa : apice striis obliquis.

*Fn. svec.* 908.  
*Habitat in Pascuis.*

culmel- 246. P. *Tinea* alis superioribus albidis : striis longitudinalibus albissimis terminatis ordine punctorum nigricantium transverso.  
 la.

*Fn. svec.* 907.  
*Reaum. inf.* 1. t. 17. f. 13, 14.  
*Raj. inf.* 229. n. 106.  
*Habitat in Pascuis.*



- nemorella. 247. P. *Tinea* alis albidis incurvatis: superioribus puncto nigro.  
*Habitat in Xylosteo. Clerk.*  
*Similis tribus precedentibus; punctum ad marginem alæ interiorum.*
- scænella. 248. P. *Tinea* alis superioribus fuscis: maculis albissimis: anteriore falcata, posteriore reniformi.  
*Habitat in Europa.*
- unguicella. 249. P. *Tinea* alis cinereis subfasciatis apice recurvato-acuminatis, margine exteriori postico transverse albostriatis.  
*Fn. svec. 890.*  
*Habitat in Europa.*
- Salicella. 250. P. *Tinea* alis cærulescenti-cinereis, latere dorsali albidis punctatis.  
*Rœs. inf. 1. phal. 4. t. 9. Wilk. pap. 5. t. 1. a. 10.*  
*Habitat in Salice, Tortrix.*  
*Parva fusca, punctis albis, 16-poda.*
- Cynostella. 251. P. *Tinea* alis griseis apice albidis: puncto nigro.  
*Reaum. inf. 3. t. 2. f. 6?*  
*De Geer inf. 1. t. 34. f. 4, 5.*  
*Habitat in Rosæ gemmis.*
- vestianella. 252. P. *Tinea* alis cinereis: apicibus adscendentibus plumosis, palpis recurvis.  
*Habitat in Vestimentis, quæ desiruit.*
- tapetzel-la. 253. P. *Tinea* alis nigris postice albidis, capite niveo.  
*Fn. svec. 892.*  
*Reaum. inf. 3. t. 20. f. 2-4.*  
*Habitat in Tapetibus, Pellibus, intra cylindros meatus rodens.*
- pellionella. 254. P. *Tinea* alis canis medio puncto nigro, capite subgriseo. *Fn. svec. 894.*  
*Reaum. inf. 3. t. 6. f. 12-16.*  
*Habitat in Vestimentis pilosis, quas misere devastat, intra cucullum latitans.*
- farcitrel-la. 255. P. *Tinea* alis cinereis, thorace utrinque puncto albo.  
*Fn. svec. 893.*



*Reaum. inf. 3. t. 6. f. 9, 10.*

*Rœs. inf. 1. phal. 4. t. 17.*

*Habitat in Vestimentis, quæ destruit, intra folliculum occultata.*

minutel- 256. *P. Tinea* alis nigricantibus: macula transversa ferruginea.

*It. Scanic. 216.*

*Habitat in Domibus.*

Mello- 257. *P. Tinea* alis canis postice purpurascens striga  
nella. alba, scutello nigro apice caudido.

*Svamm. bibl. 1. t. 26. f. 2.*

*Rœs. inf. app. 242. t. 41.*

*Reaum. inf. 3. t. 19. f. 7-9?*

*Habitat in Apum alvearibus, angiportus favos penetrantes struens.*

*Aliam etiam Speciem ejusdem muneris habet illustris Eques Reaum. inf. 3. t. 19.*

cuculla- 258. *P. Tinea* alis albido-cinereis: antice striga nigra retella. curvata.

*Rœs. inf. 1. phal. 4. t. 11.*

*Habitat in Sorbo intra folliculum conicum confectum.*

granella. 259. *P. Tinea* alis albo nigroque reticulatis, capite albo.

*Leuw. epist. 1692. mart. 7.*

*Rœs. inf. 1. phal. 4. t. 12.*

*Reaum. inf. 3. t. 20. f. 14, 16.*

*Baker. microsc. t. 13. f. 13.*

*De Geer Act. Stockb. 1746. p. 48.*

*Habitat in Frumentorum granariis semina rodens conglomerans, hyeme parietes adscendens.*

Lappella. 260. *P. Tinea* alis pallidis puncto nigro, apice adscendentibus.

*Act. Stockb. 1752. p. 66.*

*Habitat in Arctii capitulis intra Semina.*

*Larva sexpeda uti Proletellæ.*

proletel- 261. *P. Tinea* alis albidis punctis duobus fuscis, lingua  
la. inflexa. †

*Vallisn. nat. 1. p. 372. t. 379.*

*Reaum. inf. 2. t. 25.*

*Habitat in Brassica, Chelidonio; an etiam in Quercu?*



*Parit quædam ad 200000 soboles; dum 12 progenies penant 12 ova singulæ.*

Arbutel- 262. P. *Tinea* alis sanguineis: fasciis argenteis tenuissimis.  
la. *Habitat in Uva urfi.*

tessella. 263. P. *Tinea* alis nigris: fasciis duabus albis remotissimis tessellatis. *Fn. svec. 897.*  
*Habitat in Europa.*

vittella. 264. P. *Tinea* alis cinereis: vitta dorsali communi nigra, margine postico atro-punctato.  
*Habitat in Europa.*  
*Linea obsoletior nigra, in medio alba & brevis in ejus apice.*

Xylostel- 265. P. *Tinea* alis cinereis: vitta dorsali communi alba  
la. dentata.  
*Fn. svec. 909.*  
*Habitat in Lonicera.*  
*Simillima Kuf. inf. 1. phal. 4. t. 10. in Brassica, Lactuca, sed minor.*

trigonel- 266. P. *Tinea* alis fuscescentibus: macula communi dor-  
la. sali duplici alba trigona.  
*Fn. svec. 911.*  
*Habitat in Sylvis.*

rhomboidella. 267. P. *Tinea* alis fuscis: macula rhombea nigra. *Fn. svec. 910.*  
*Habitat in Europæ sylvis.*

tertianel 268. P. *Tinea* alis cinereis: fasciis obscurioribus sesqui-  
la. tertiis.  
*Habitat in Europa.*

mercurel- 269. P. *Tinea* alis albido cinereis subfasciatis medio pun-  
la. cto albo & cincto.  
*Habitat in Europa.*

Pomonella. 270. P. *Tinea* alis nebulosis postice macula rubra aurea.  
*Frisch. inf. 7. t. 10.*  
*Ræf. inf. 1. phal. 4. t. 13.*  
*Reaum. inf. 2. t. 40. f. 9, 10.*  
*Wilk. pap. 5. t. 1. a. 9.*  
*Habitat intra Poma Pyri.*



- Strobi- 271. P. *Tinea* alis fuscis argenteo-undatis; inferioribus  
 lella. fuscis margine albo.  
*Habitat in Strobilis Abietis.*
- Pinella. 272. P. *Tinea* alis flavis: maculis duabus argenteis: an-  
 teriore oblonga, posteriore ovata.  
*Habitat in Pinetis.*
- Turio- 273. P. *Tinea* alis griseo albis nitidulis, thorace luteo.  
 nella. *Habitat intra Pini turiones.*
- dodecel- 274. P. *Tinea* alis griseis pallido fasciatis: punctis trium  
 la. parium fuscis.  
*De Geer inf. 1. t. 22. f. 22, 23.*  
*Habitat intra Pini turiones.*
- Resinel- 275. P. *Tinea* alis fuscis: fasciis cinereo-argenteis.  
 la. *Frisch. inf. 10. t. 10.*  
*De Geer inf. 1. t. 33. f. 12, 13.*  
*Rœf. inf. 1. phal. 4. t. 16.*  
*Habitat intra Resinæ glomerem exsudantem e vulnere ra-  
 mcrum Pini.*
- fuscella. 276. P. *Tinea* alis fusco cinereis: superioribus punctis duo-  
 bus anoque subtus macula nigris.  
*Habitat in domibus.*  
*Litura etiam fusca versus angulum posticum exteriorem-  
 que alæ superioris.*
- Corticel- 277. P. *Tinea* alis griseis margine aurco-punctatis posti-  
 la. ce trilunatis.  
*Habitat intra Corticem Arborum virentium, imprimis  
 pomiferarum.*
- stipella. 278. P. *Tinea* alis nigris: maculis tribus sulphureis.  
*Habitat in Europa. D. C. Solander.*  
*Alæ superiores nigre macula sulphurea ad basim; alia  
 in medio non tangens marginem anteriorem; alia an-  
 te apicem non tangens marginem tenuiorem.*
- gemmel- 279. P. *Tinea* alis nigro albo argenteoque nebulosis, ca-  
 la. pite albo.  
*Habitat intra Quercus folia, subcutanea.*



- bractel- 280. P. *Tinea* alis nigris macula marginali anticeque lu-  
la. teo-aureis.  
*Habitat in Europa.*  
*Alarum basis ad  $\frac{1}{3}$  totius flava; frons flava; antennæ breves.*
- ramella. 281. P. *Tinea* alis cinereo-albidis: arcu fusco.  
*Habitat intra Quercus ramos.*
- porrectel- 282. P. *Tinea* alis albicantibus, antennis porrectis appro-  
la. ximatis longitudine corporis, palpis recurvis.  
*De Geer inf. 1. t. 26. f. 15, 16.*  
*Habitat in Tetradyamiæ plantis variis.*
- Petive- 283. P. *Tinea* alis subgriseis litura dorsali flava, apiceque  
rella. punctis tribus nigris.  
*Habitat in Svecia.*  
*Magnitudo P. subcutanearum. Alæ fusco-griseæ; in medio litura flava, que unitur cum alæ oppositæ macula; margo exterior intra apicem striatus, & apex postice punctis tribus nigris notatus.*
- Swam- 284. P. *Tinea* antennis longissimis, alis flavescentibus pal-  
merda- lidis immaculatis.  
mella. *Habitat in Europa.*
- Reamu- 285. P. *Tinea* antennis longissimis, alis nigris extrorsum  
rella. deauratis. *Fn. Svec. 902.*  
*Habitat in Europa.*
- De Gee- 286. P. *Tinea* antennis longissimis, alis atris fascia ar-  
rella. gentea.  
*De Geer inf. 1. t. 32. f. 13.*  
*Uddm. diff. 78.*  
*Habitat in Svecia, imprimis ad acidulas setrenses.*
- Mouffe- 287. P. *Tinea* antennis corpore brevioribus albo annula-  
tella. tis, alis lividis: atomis oblongis fuscis.  
*Habitat in Europa.*  
*Alæ valde acuminatæ.*
- Listerella. 288. P. *Tinea* antennis longitudine fere corporis nigris  
albo subannulatis, alis fuscis.  
*Habitat in Europa.*



- Frischel- 389. P. *Tinea* antennis longitudine corporis, alis fusco  
la. auratis, antennis concoloribus.  
*Habitat in Europa.*
- Albinel- 290. P. *Tinea* alis fuscis: linea 1 aurea antrorsum arcua-  
la. ta. *Fn. suec. 901.*  
*Habitat in Europa.*
- Gœdar- 291. P. *Tinea* alis auratis: fasciis 2 argenteis: priore an-  
tella. trorsum, posteriore retrorsum arcuata.  
*Habitat in Alnetis, pedibus tantum quatuor insidens;*  
*posticis duobus protensis. T. Bergman.*
- Meria- 292. P. *Tinea* alis nigris: fasciis 3 argenteis transverse di-  
nella. varicatis. *Fn. suec. 900.*  
*Habitat in Europa.*
- Wilkel- 293. P. *Tinea* alis nigris: fasciis 4 argenteis arcuatis:  
la. secunda recta.  
*Fn. suec. 899.*  
*It. gotl. 260.*  
*Habitat in Europa.*
- Lyonne- 294. P. *Tinea* alis flavis: fasciis 4 argenteis: tertia super-  
tella. ne bifida. *Fn. suec. 904.*  
*Habitat in Europa.*
- Bonne- 295. P. *Tinea* alis albis: lineis 2 argenteis; posticisque  
tella. undatis. *Fn. suec. 903.*  
*Habitat in Europa.*
- Schæffe- 296. P. *Tinea* alis nigris disco flavis: striga lineisque  
rella. duabus longitudinalibus punctisque tribus argenteis.  
*It. scanic. 112. Phalæna Fagi.*  
*Habitat in Fagi foliis subcutanea.*
- Rœfella. 297. P. *Tinea* alis nigro-auratis: punctis 9 argenteis  
convexis submarginalibus.  
*Frisch. inf. 3. p. 31. t. 4.*  
*De Geer inf. 1. t. 30. f. 10-12.*  
*Habitat in Mali foliis subcutanea, omnium pulcher-  
rima.*

298. P.

---

Subcutaneæ hæc minutissimæ, speciosissimæ omnium, quæ intra folii substantiam vi-  
vunt, rodunt, sæpius 14-podæ; sed sunt etiam subcutaneæ Muscæ, Tenthredines,  
Curculiones, Chrysomelæ, Dermestides &c.



Rajella. 298. P. *Tinea* alis auratis : punctis 7 argenteis : secunda  
tertiaque connatis.

*De Geer inf. 1. t. 31. f. 11, 12.*

*Habitat in Alni foliis subcutanea.*

Clerkel- 299. P. *Tinea* alis argenteis pollice fusco-auratis caudatis  
la. ocello terminali atro.

*Habitat in Svecia. C. Clerk.*

*Corpus minimum, totum argenteum. Alæ superiores ad  
apicem fusco-aurate, substriate, & caudate cum ocel-  
to rotundæ atro. Antennæ longitudine corporis.*

\* 7 \* ALUCITÆ.

monoda- 300. P. *Alucita* alis patentibus linearibus indivisis.  
ctyla. *Reaum. inf. 1. t. 20. f. 12-16.*

*Habitat in Europa.*

didacty- 301. P. *Alucita* alis patentibus ramosis fuscis : strigis al-  
la. bis : anticis bipartitis, posticis tripartitis.

*Raj. inf. 205. n. 101.*

*Reaum. inf. 1. t. 20. f. 1-4.*

*Habitat in Lonicera Xylosteo.*

tridacty- 302. P. *Alucita* alis patentibus fissis pallidis : lineis albis.  
la. *Habitat in Europa.*

tetrada- 303. P. *Alucita* alis patentibus fissis flavescentibus.  
ctyla. *Habitat in Europa.*

pentada- 304. P. *Alucita* alis patentibus fissis quinquepartitis ni-  
ctyla. veis : digito quinto distincto.

*Reaum. inf. 1. t. 20. f. 1-4.*

*Ræs. inf. 1. phal. 4. t. 5.*

*Habitat in Svecia.*

hexada- 305. P. *Alucita* alis patentibus fissis : singulis sexpartitis.  
ctyla. *Reaum. inf. 1. t. 19. f. 19-21.*

*Frisch. inf. 3. t. 7?*

*Habitat in Europa.*



## IV. NEUROPTERA.

Alæ IV nudæ, venis reticulatæ.

Cauda sæpius aliquo sexus adminiculo instructa, inermis.

207. LIBELLULA. Os maxillosum: maxillis pluribus.

*Antennæ* thorace breviores.

*Alæ* extensæ.

*Cauda* partibus hamofo-fo-  
liaceis.

\* *Alis patentibus acquiescentes.*

4-macu- 1. L. alis posticis basi omnibusque medio antico macula  
lata. nigricante.

*Fn. suec.* 764. L. alis macula marginali duplici.

*Raj. inf.* 49. n. 3.

*Reaum. inf.* 6. t. 35. f. 1, 2.

*Habitat in Europa.*

flaveola. 2. L. alis basi luteis. *Fn. suec.* 765.

*Raj. inf.* 49. n. 4.

*Rœs. inf.* 2. aqu. 2. t. 5. f. 4.

*Habitat in Europa.*

*Hæc inter minores; variat rarius alis absque basi lutea; forte sexu.*

vulgata. 3. L. alis albis, corpore fusco; cauda simplici. *Fann. suec.* 766.

*Raj. inf.* 49. n. 6.

*Rœs. inf.* 2. aqu. 2. t. 8.

*Habitat in Europa.*

rubicun- 4. L. alis tantum posticis basi nigricantibus.  
da.

*Rœs. inf.* 2. aqu. 2. t. 7. f. 4.

*Raj. inf.* 50. n. 8.

*Habi-*



*Habitat in Europa.*

*Sexus alter a tergo thoracis & abdominis maculis rubris; alter luteis.*

depressa. 5. L. alis omnibus basi nigricantibus, thorace lineis duabus flavis, abdomine depresso-lanceolato lateribus flavescente.

*Raj. inf. 140. ♂ 49. n. 4, 5. neu. ... I.*

*Rœs. inf. 2. aqu. t. 6. f. 4.*

*t. 7. f. 3.*

*Habitat in Europa.*

*Hæc interdum abdominis tergo carulescente occurrunt.*

vulgatis- 6. L. thorace strigis octo flavicantibus.  
fina.

*Fn. suec. 767.*

*Swamm. quart. t. 8. f. 6. Rœs. aquat. 2. t. 5. f. 3.*

*Habitat in Europa.*

cancellata. 7. L. alis basi immaculatis, abdomine dorso lateribusque interrupte luteis.

*Habitat in Europa.*

ænea. 8. L. thorace æneo-viridi.

*Fn. suec. 768, 769. L. thorace viridi nitido lineis flavis.*

*Raj. inf. 49. n. 5. ♂ 140.*

*Rœs. inf. 2. aqu. 2. t. 5. f. 2.*

*Habitat in Europa.*

grandis. 9. L. alis glaucescentibus, thoracis lineis quatuor flavis.

*Fn. suec. 770.*

*Mouff. inf. 67. n. 2. 3.*

*Raj. inf. 49. n. 2. ♂ 140. n. 2.*

*Reaum. inf. 6. t. 33. f. 3.*

*Rœs. inf. 2. aqu. 2. t. 4. f. 14.*

*Habitat in Europa.*

juncea. 10. L. alarum membranula accessoria nigricante, thorace lineis sex flavis, abdomine ad basin attenuato.

*Habitat in Europa.*

*Alarum posticarum membranula baseos nigricans in hac specie, at in antecedenti alba.*

11. L.

Libellula Nias, visa scia, ut eam deringinet, caudæ forcipe apprehendit femine col- lum, quo vero illa, vinci volens volente, hæret: caudæ na et tunc se- pellit proci pectus, ubi maris arma latent; sic unitis sexibus obvolvunt pro- pria lege.



- forcipata. 11. L. thorace nigro characteribus variis flavescens.  
*Fn. suec.* 771.  
*Pet. mus.* 84. n. 819.  
*Reaum. inf.* 4. t. 10. f. 4.  
                   6. t. 35. f. 5.  
*Habitat in Europa.*
- fasciata. 12. L. alis planis fuscis: fascia alba lineari.  
*Edw. av.* 174. t. 174.  
*Habitat in India. De Geer.*
- umbrata. 13. L. alis planis albis: fascia fusca.  
*Habitat in America. Rolander.*  
*Alarum fascia in medio; apices alarum obscuriores.*
- dimidiata. 14. L. alis planis a basi ad medium nigris.  
*Habitat in America. Rolander.*  
*Margo alarum etiam fuscus est, ceterum hyalina. Cauda duobus parvis mucronibus.*
- chinensis. 15. L. alis superioribus testaceo-obsoletis; secundariis viridibus apice fuscis.  
*Edw. av.* 112. t. 112.  
*Habitat in China.*
- americana-na. 16. L. alis purpurascens: fascia alba, primoribus apice albis; posticis linea basalis alba.  
*Edw. av.* 174. t. 174.  
*Habitat in America.*  
*Corpus viride. Alae fusco-purpurascens.*
- \* \* *Oculi distantes remotique.*
- Virgo. 17. L. alis erectis coloratis.  
 α. Libellula corpore sericeo nitido, alis luteo-fuscis margine immaculatis. *Fn. suec.* 756.  
*Roes. aqu.* 2. t. 9. f. 7.  
*Raj. inf.* 50. n. 11.  
 β. Libellula corpore sericeo nitido, alis viridi-cæruleis apice fuscis: margine immaculatis. *Fn. suec.* 757.  
*Raj. inf.* 50. n. 10.  
*Hombert. Act. Paris.* 3. p. 145.  
*Reaum. inf.* 6. t. 35. f. 7.



γ. Libellula corpore viridi-cæruleo, alis subfuscis: puncto marginali albo. *Fn. svec. 758.*

*Rœs. aqu. 2. t. 9. f. 6.*

*Raj. inf. 51. n. 12.*

δ. Libellula corpore sericeo nitido, alis inaurato-fuscis: macula nigra. *Fn. svec. 759.*

*Rœs. aqu. 2. t. 9. f. 5.*

*Raj. inf. 50. n. 9. & p. 140. n. 2.*

*Habitat in Europæ fluviiis.*

Puella. 18. L. alis erectis hyalinis.

α. Libellula corpore sericeo, alis puncto marginali fusco. *Fn. svec. 760.*

*Raj. inf. 51. n. 15.*

*Rœs. aqu. 2. t. 10, 11. omnes.*

*Reaum. inf. 6. t. 40. f. omnes.*

β. Libellula corpore incarnato, alis puncto marginali fusco. *Fn. svec. 761.*

*Raj. inf. 51. n. 16. & 52. n. 17.*

*Reaum. inf. 6. t. 3. f. 4. & t. 4. t. 11. f. 6.*

*Rœs. inf. aqu. 2. t. 10, 11.*

γ. Libellula corpore sericeo, alis puncto marginali nigro. *Fn. svec. 762.*

*Raj. inf. 140. n. 1.*

δ. Libellula corpore cæruleo cinereoque alterno, alis puncto marginali nigro. *Fn. svec. 763.*

*Gat. inf. 3. p. 29. f. R. Merian. eur. 78. t. 156.*

*List. gad. 228. f. 103. Raj. inf. 53. n. 18.*

*Reaum. inf. 6. t. 35. t. 6. Frisch. insect. 8. t. 11.*

*Habitat ad prata paludosa, visitans Martis.*

*Varietates conjunxi, quas copula sæpius junctas vidi.*

208. EPHEMERA. Os edentulum absque palpis.

*Alæ erectæ: posticis minimis.*

*Cauda sæpius setosa.*

\* *Cauda trifeta.*

vulgata. 1. E. cauda trifeta, alis nebuloso-maculatis. *Faun. svec. 750.*

*Habitat in Europæ aquis.*

\*\* *Cau-*



\* \* *Cauda bifeta.*

biocula- 2. *E. cauda bifeta*, alis albis reticulatis, abdomine dia-  
ta. phano. *Fn. svec. 751.*  
*Habitat in Europæ aquosis.*

culiciformis. 3. *E. cauda bifeta*, alis albis, corpore fusco. *Fn. svec. 753.*  
*Kœf. inf. 2. aqu. 2. t. 12.*  
*Habitat in Europæ aquosis.*

horaria. 4. *E. cauda bifeta*, alis albis margine crassiore nigrican-  
tibus. *Fn. svec. 754.*  
*Swamm. quart. 87. Ephemera minima.*  
*Habitat in Europæ aquis.*

\* \* \* *Cauda mutica.*

mutica. 5. *E. cauda mutica*, alis albis striatis. *Fn. svec. 752.*  
*Habitat in Europa.*

vespertina. 6. *E. nigra*, alis interioribus albis. *Fn. svec. 755. It. vol. 21.*  
*Habitat in Europa.*

209. PHRYGANEÆ. Os edentulum : Palpis IV.  
*Antennæ thorace longiores.*  
*Alæ incumbentes : inferioribus plicatis.*

Phalænoidea. 1. *P. nigra*, alis albidis : maculis nigris sparsis.  
*Uddm. diff. 53. f. 16. Phryganea nigra*, alis albo-pal-  
lidis : maculis plurimis nigris.  
*Habitat in Europa.*

striata. 2. *P. nigra*, alis testaceis nervosis-striatis. *Fn. svec. 738.*  
*Aldr. inf. 753.*  
*Reaum. inf. 3. t. 13. f. 8, 9?*  
*Habitat in Europa.*

grisea. 3. *P. grisea*, alis superioribus nebulosis : macula margi-  
nali nigra. *Fn. svec. 739.*  
*Reaum. inf. 3. t. 13. f. 8, 9, 11?*  
*Habitat in Europæ aquosis.*

M m 2

4. P.

*Phryganeæ Larvæ latent sub aqua intra tubo cylindricos, mobiles, a se confectos ; volatiles factæ choreas vespertinas in aere instituunt.*



- grandis. 4. P. alis cinereo testaceis : lineolis duabus longitudinalibus nigris : puncto albo. *Fn. suec.* 740.  
*Reaum. inf.* 3. t. 14. f. 4?  
*Rœs. aqu.* 2. t. 17.  
*Habitat in Europa, intra cylindrum ex ramentis longitudinalibus ligneis.*
- rhombica. 5. P. alis flavescentibus deflexo-compressis : macula rhombica laterali alba. *Fn. suec.* 741.  
*Reaum. inf.* 3. t. 14. f. 5.  
*Rœs. inf.* 2. *aqu.* 2. t. 16.  
*Habitat in Europæ aquosis, intra nidum ex ramentis gramineis transversis.*
- bimaculata. 6. P. alis fuscis : macula laterali duplici flava. *Fn. suec.* 742.  
*Habitat in Europæ aquosis.*
- flavilate-ra. 7. P. alis reticulatis, cauda inermi, thoracis lateribus flavis. *Fn. suec.* 743.  
*Habitat in Europa.*
- bicaudata. 8. P. alis venoso-reticulatis, cauda bifeta. *Faun. suec.* 744.  
*Wagn. helv.* 227, 228, 229.  
*Reaum. inf.* 3. t. 13. f. 12.  
*Habitat in Europæ aquosis.*
- nigra. 9. P. alis cæruleo-atris, antennis corpore duplo longioribus. *Fn. suec.* 745.  
*Raj. inf.* 275.  
*Habitat in Europa.*
- longicornis. 10. P. alis superioribus nebulosis, antennis corpore triplo longioribus. *Fn. suec.* 746.  
*Habitat in Europa.*
- filosa. 11. P. alis cylindrico incumbentibus flavescentibus, antennis corpore triplo longioribus.  
*Habitat in Svecia.*
- wæneri. 12. P. cinerea, alis posticis pallidioribus : margine interiore piloso albido. *It. wgoth.* 44.  
*Habitat in Europa, frequens ad Lacum Wænerum Svecie.*



albifrons. 13. *P. nigra*, alis exterioribus maculis linearibus quatuor transversis albis.

*Habitat in Svecia. T. Bergman.*

bilineata. 14. *P. nigricans*, alis superioribus utroque margine lineolis duabus transversis albidis.

*Habitat in Europa.*

nebulosa. 15. *P. nigra*, alis incumbentibus subcinereo - nebulosis, caudæ setis truncatis. *Fn. svec. 748.*

*Habitat in Europa.*

fusca. 16. *P. fusca immaculata. Fn. svec. 749.*

*Habitat in Europa.*

flava. 17. *P. alis flavo-reticulatis, antennis longitudine abdominis.*

*Habitat in Europa.*

210. HEMEROBIUS. *Os dentibus duobus.*

*Alæ deflexæ, nec plicatæ.*

*Antennæ thorace convexo longiores.*

Perla. 1. *H. viridis*, alis hyalinis: vasis viridibus. *Faun. svec.*

731.

*Mouff. inf. 937. Musca chryfops.*

*Gœd. inf. 2. p. 40. t. 14.*

*Alb. inf. t. 64.*

*Merian. eur. 3. p. 49. t. 8.*

*Vallisn. nat. 1. p. 77. t. 2.*

*Pet. mus. 4. n. 6. Perla merdam olens.*

*Raj. inf. 274. Musca quadripennis, corpore luteo viridi.*

*Reaum. inf. 3. t. 33. f. 2. 5. 6. Leo Aphidum.*

*Rœs. inf. 3. p. 127. t. 21. f. 4, 5.*

*Habitat in Europæ plantis, victitans Aphidibus.*

Chryfops. 2. *H. viridi nigroque varius*, alis hyalinis reticulatis. *Fn. svec. 732.*

*Frisch. inf. 4. p. 40. t. 23.*

*Reaum. inf. 3. t. 3. f. 14, 15, 16.*

*Rœs. inf. app. 1. p. 126. t. 21. f. 3.*

*Habitat in Europa.*



3. *H. testaceus*, alis basi mucronatis; margine dorsali postice excisis.  
*Habitat in Europa.*
- Formica-4. *H. hirtus*, alis nebulosis: vasis pilosis, antennis clavatis.  
leo. *Fn. svec. 733. It. æl. 149, 206. Hemerobius formicaleo. Keaum. inf. 4. t. 14. f. 18, 19. & t. 11. f. 8. & 6. t. 32, 33, 34. Ræf. inf. 3. p. 101. t. 17, 18, 19, 20. Pallism. oper. 1. p. 77. t. 2. Habitat in Europa arena, retrogradus in fovea excavata formicis instar, formicis imprimis victitans.*
- Formica-5. *H. lynx*, alis hyalinis immaculatis, antennis clavatis.  
lynx. *Ræf. inf. 3. t. 21. f. 2. Habitat in Africa.*
- testaceus. 6. *H. fufco-testaceus*, alis nigris corpore triplo longioribus.  
*Habitat in America. Rolander. Corpus totum obscure testaceum. Caput atrum, glaberrimum. Antennæ testaceæ ex globis pilosis, six thorace longiores. Abdomen brevissimum. Alæ planæ incumbentes una supra alteram.*
- margina-7. *H. flavus*, alis hyalinis margine fuscis corpore triplo  
lis. longioribus.  
*Habitat in America. Rolander. Similis priori, excepto colore & Antennis paulo longioribus.*
- Humali-8. *H. annulatus*, alis albis punctis fuscis, antennis albo-fuscoque  
nus. annulatis. *Fn. svec. 734. Habitat in Europa.*
- serpunctatus. 9. *H. serpunctatus*, alis albis: maculis fuscis postice punctis sex distinctis, antennis fuscis. *Fn. svec. 735. Habitat in Europa.*
- flavicans. 10. *H. flavicans*, thorace abdomineque flavis. *Fn. svec. 736. Habitat in Europa.*
- lutarius. 11. *H. lutarius*, alis albidis striatis albo maculatis. *Fn. svec. 737. (sub Phryganea). Hojn. pict. t. 12. Ræf. inf. 2. aqu. 2. t. 13.*



*Habitat in Europæ plateis, imprimis vere.*

*Larva Rœselii accedens Ephemeris singulare insectum reddit.*

speciosus. 12. H. fuscus, alis griseis nigro maculatis.

*Rœs. inf. 3. t. 21. f. 1.*

*Habitat in Africa & Europa australi.*

albus. 13. H. albus, oculis viridi-æneis.

*Habitat in Europa.*

*Simillimus H. Perlæ, sed totus albus, ne quidem vasis alarum obscuris.*

cornutus. 14. H. maxillis corniformibus porrectis thorace longioribus.

*Habitat in Pennsylvania. De Geer.*

*Alter sexus cornibus teretibus majoribus laevibus, alter vero brevioribus & introrsum denticulatis.*

Pedicularius. 15. H. virescens, antennis longitudine corporis.

*Habitat in Europa.*

*Hic ita Termiti pulsatorio similis, ut dentis alis vix differat facie; an sexu?*

211. PANORPA. Rostrum corneum, cylindricum:  
palpis . . .

*Antennæ thorace longiores.*

*Cauda maris chelata.*

communis. 1. P. alis æqualibus nigro maculatis.

*Fn. svec. 729. Panorpa.*

*Aldr. inf. 386. f. 8, 9. & 387. f. 5, 6. Musca scorpiura.*

*Frisch. inf. 9. p. 29. t. 14. f. 1. Scorpio Musca.*

*Mouff. inf. 62. f. 3. 4.*

*Reaum. inf. 4. t. 8. f. 9.*

*Habitat in Europa.*

*Mas cauda chelifera; femina inermi.*

germanica. 2. P. alis æqualibus hyalinis apice fuscis.

*Habitat in Germania. P. Forskål.*

*Priori dimidio minor. Cauda magis pallida. Alæ tantum apice fuscae & puncto ad marginem anteriorem.*



Coa.

3. P. alis posticis linearibus longissimis.

*Hasselqv. iter. 423. Ephemera coa.**Act. Stockh. 1747. p. 176. t. 6. f. 1.**Habitat in Coa Metellina & insulis Archipelagi.*212. RAPHIDIA. Os dentibus duobus in Capite de-  
presso corneo.*Alæ deflexæ.**Antennæ longitudine Thoracis an-  
tici elongati cylindrici.**Cauda feminae seta recurva laxa.*ophiopis. 1. RAPHIDIA. *Fn. suec. 730.**Ræsel. inf. app. 1. p. 130. t. 21. f. 6, 7.**Habitat in Europa.**Pupa hujus currit matri simillima, licet aptera.*



## V. HYMENOPTERA.

Alæ quatuor membranaceæ, plerisque.  
Aculeus caudæ, sed nullus in Maribus.

213. CYNIPS. Os maxillis absque proboscide.  
Aculeus spiralis, sæpius reconditus.

Rosæ. 1. C. nigra, abdomine ferrugineo postice nigro, pedibus ferrugineis.

*Faun. svec.* 938. Tenthredo antennis 12-nodiis nigris, abdomine subtus ferrugineo, pedibus flavis, alis immaculatis.

*Blank. inf. t.* 16. f. V-Z.

*Reaum. inf. 3. t.* 46. f. 5-8. & *t.* 47. f. 1-4.

*Habitat in Bedeguar Rosarum hispido.*

Hieracii. 2. C. Hieracii murorum.

*Fn. svec.* 950. *It. scan.* 280.

*Barth. act.* 1671. *t.* 283. *Valent. virid. t.* 328. f. 1.

*Chemn. brunsv. t.* 7. *Heuch. wittenb. 1. t.* 1.

*Habitat in Hieracii murorum galla caulina hirta.*

Glechomæ. 3. C. Glechomæ hederaceæ.

*Fn. svec.* 949. *It. wgoth.* 107.

*Blank. inf.* 186. *Welsch. hecast. t.* 127. f. 1.

*Pancow. herb.* 709. *Reaum. inf. 3. t.* 42. f. 1-5.

*Elshol. march.*

*Habitat in Glechomæ hederaceæ gallis foliorum globosis scabris.*

Quercus baccarū. 4. C. nigra, basi antennarum pedibusque flavescentibus.

*Uddm. diff.* 81. *t.* 1. f. 14.

*Habitat in Gallis foliorum Quercus pellucidis, subglobosis, paginae inferiori insertis, magnitudine Pisi, exiens media æstate.*

Quercus folii. 5. C. nigra, thorace lineato, pedibus griseis, femoribus subtus nigris.

*Fn. svec.* 947.

*Rhed. inf.* 157.

*Frisch. inf. 2. t.* 3. f. 5.

M m 5

*Reaum.*

Cyniphis Larvæ pleræque intra Gallas plantarum, quas causantur, latent.



*Reaum. inf. 3. t. 39. f. 14-17. Leuwenh. nat. 217.*

*Blank. inf. t. 16. f. A-H.*

*Rœs. inf. app. t. 52, 53. f. 10, 11.*

*Habitat in Gallis foliorum Quercus globosis pagina inferiore; avellanæ magnitudine. Amœn. acad. 3. p. 324.*

Quercus 6. *C. nigra*, pedibus albidis, femoribus fuscis.  
petioli.

*Rœs. inf. app. t. 35, 36.*

*Habitat in Quercus petiolo s. ramulo, Galla cava utriusque convexa.*

Quercus 7. *C. grisea*, alis cruce lineari.

peduncu- *Reaum. inf. 3. t. 40. f. 1-6.*

li. *Habitat in Quercus floribus masculis, Gallis granulatis in catenas nodorum. Amœn. acad. 3. p. 324.*

Quercus 8. *C. gemmæ Quercus Roboris.*

gemmæ. *Fr. swec. 948. Tenthredo gallæ imbricatæ.*

*Reaum. inf. 3. t. 43. f. omnes.*

*Habitat in Quercus gemma terminali, in gallam imbricatam tumescente.*

Fagi. 9. *C. Fagi sylvaticæ.*

*Fr. swec. 946. Tenthredo gallæ foliorum Fagi.*

*Frisch. inf. 2. t. 5.*

*Habitat in Fagi sylvaticæ foliis.*

vimina- 10. *C. flava*, thorace nigro.

lis. *Rœs. inf. 2. Vesp. t. 10.*

*Habitat in Salicis viminalis foliis sub costa.*

Salicis 11. *C. atra*, thoracis tergo virescente. *Fr. swec. 941.*

strobili. *Habitat in Salicis glabræ apicibus ramulorum strobiliformibus e foliolis.*

Ameri- 12. *C. nigra*, pedibus pallidis.

næ. *Habitat in Salicis pentandræ Gallis inequalibus, ramos terminantibus.*

Pfenes. 13. *C. Ficus Caricæ. Hasselqv. iter. 424. n. 111, 112.*

*Amœn. acad. 1. p. 41.*

*Habitat in grossis Ficus Caricæ orientalis.*

Syco- 14. *C. Ficus Sycomori. Hasselqv. iter. 426. n. 113.*

mori. *Habitat in Ægypti Ficus Sycomori grossis. Hasselqv.*



*Fuscus aculeo longitudine corporis exserto, sed debili, laxo, ut vix videatur Cynips esse. Corpus laeve glabrum nigrum; thorax longitudine abdominis. Antennæ thorace breviores, subulatae, basi crasso-conicae.*

214. TENTHREDO. Os maxillis absque proboscide.  
*Alæ planæ tumidæ.*  
*Aculeus laminis duabus ferratis vix prominentibus.*

\* *Antennis clavatis.*

- femora- 1. T. antennis clavatis luteis, corpore atro, femoribus  
 ta. posterioribus maximis.  
*Habitat in Europa.*
- lutea. 2. T. antennis clavatis luteis, abdominis segmentis plerisque flavis. *Fn. svec. 923.*  
*Gæd. inf. 1. t. 64. Frisch. inf. 4. t. 25.*  
*List. gæd. f. 77. a. Rœs. vesp. t. 13.*  
*Habitat in Salice, Alno, Betula.*
- Ameri- 3. T. antennis clavatis, pedibus abdomineque subtus ferru-  
 næ. gineis, corpore cinereo.  
*Rœs. inf. 2. vesp. t. 1.*  
*Habitat in Salice.*
- lucorum. 4. T. antennis clavatis nigris, corpore villoso atro. *Faun.*  
*svec. 927.*  
*Habitat in Betula Alno.*
- fasciata. 5. T. antennis clavatis nigris, abdomine glabro atro, alis superioribus fascia fusca.  
*Habitat in Europa.*
- america- 6. T. antennis subclavatis, thorace luteo, abdomine cæ-  
 na. ruleo, alis nigris.  
*Habitat in America. Rolander.*  
*Pedes lutei at Tibiæ posticæ nigrae. Basis alarum carulescens.*

7. T.



- nitens. 7. T. antennis clavatis luteis, abdomine glabro cærule-  
lescente.  
*Habitat in Europa.*  
*In abdominis dorso macula oblonga nigra per 4 segmen-  
ta extensa.*
- \* \* *Antennis pectinatis.*
- Pini. 8. T. antennis pectinatis lanceolatis, thorace subvillosa.  
*Uddm. diff. 90. f. 13.*  
*Habitat in Pini foliis.*  
*Mas niger tibiis femoribusque fulvis. Femina duplo  
major grisea, antennis serratis.*  
*Larva cærulea extremitatibus fulvis.*
- Juniperi. 9. T. antennis pectinatis obtusis, thorace glabro.  
*Uddm. diff. 91. f. 12.*  
*Habitat in Junipero.*  
*Mas tibiæ & femora fulva. Femina antennis ser-  
ratis.*  
*Larva viridis adpersa punctis nigris.*
- \* \* \* *Antennis subclavatis continuis, nec articulatis.*
- ustulata. 10. T. antennis subclavatis continuis, thorace cærulescen-  
te, alis macula fusca.  
*Habitat in Europa.*
- rustica. 11. T. antennis subclavatis, abdomine nigro: cingulis qua-  
tuor flavis.  
*Habitat in Europa.*
- \* \* \* \* *Antennis filiformibus, articulis 7 l. 8 excepta basi.*
- Scrophu- 12. T. antennis septemnodis luteis, abdomine cingulis  
lariæ. quinque flavis: primo remotiore. *Fn. suec. 935.*  
*Reaum. inf. 5. t. 13. f. 12-23.*  
*Blackw. herb. t. 87. f. 10.*  
*Habitat in Scrophularia varia.*  
*Mas femora postica linea flava longitudinali subtus  
notata.*
- pratensis. 13. T. antennis septemnodis, corpore nigro, abdominis  
segmentis quatuor ferrugineis. *Fn. suec. 928.*  
*Frisch. inf. 2. t. 1. f. 21-24.*  
*Habitat in Europa.*



- Cerasi. 14. T. antennis septemnodis, corpore nigro, pedibus luteis.  
*Reaum. inf. 5. t. 12. f. 1-5.*  
*Habitat in Cerasi foliis, quæ involvit ut mutetur.*
- Salicis. 15. T. antennis septemnodis, corpore flavo, vertice capituli thoracisque nigro. *Fn. suec. 927.*  
*Reaum. inf. 5. t. 11. f. 10.*  
*Habitat in Salicibus variis.*
- mesomela. 16. T. antennis septemnodis, abdomine subflavo: dorso nigro arcibus flavescens. *Fn. suec. 936.*  
*Habitat in Europa.*
- rufipes. 17. T. antennis septemnodis, corpore nigro, abdomine cingulis duobus luteis, pedibus rubris.  
*Habitat in Europa.*
- campestris. 18. T. antennis septemnodis, corpore nigro, abdominis cingulo flavo inæquali, pedibusque flavis.  
*Habitat in Europa.*
- atra. 19. T. antennis septemnodis, corpore atro, pedibus rubris.  
*Habitat in Europa.*
- viridis. 20. T. antennis septemnodis, corpore viridi, abdomine supra fusco.  
*Habitat in Europa.*
- Rosæ. 21. T. antennis septemnodis, corpore flavo, costa alarum superiorum longitudinali nigra. *Fn. suec. 929.*  
*Ros. inf. 2. resp. t. 2. Reaum. inf. 5. t. 14. f. 10-12.*  
*Habitat in Rosa.*
- cincta. 22. T. antennis septemnodis, corpore atro, abdomine cingulo albo.  
*Habitat in Rosa.*
- livida. 23. T. antennis septemnodis, corpore atro, abdomine supra infraque livido.  
*Habitat in Europa.*  
*Alter sexus antennis annulo albo & puncto albo utrinque ad basin abdominis; alter vero hac albedine caret.*
- septentrionalis. 24. T. antennis septemnodis, pedibus posticis compressis dilatatis.



*Habitat in Europa. T. Holm, M. D. Dicus.*

*Antennae nigrae. Caput nigrum suturis albis. Abdomen cyathicum, ferrugineum, cum macula alba. Pedes ferruginei. Tibiae costae capite albae, femora autem dupliciter articulo compage & distincte. Tibiae emicordatam, sed verticalem.*

12-punctata. 25. T. antennis septemnodis, corpore atro: . . . . . bis.  
*Habitat in Europa.*

*Corpus totum nigrum. Macula alba utrinque ante alas in thorace. Scutellum albidum. Truncatus . . . . . nis macula utrinque alba. Ultimum segmentum . . . . . minis apice album. Femora secundi paris macula alba. Tibiae annulo flavo. Labia flava.*

\* \* \* \* \* *Antennis setaceis articulis plurimis.*

erythrocephala. 26. T. antennis setaceis, corpore caeruleo, capite rubro.  
*Uddm. diss. 89.*

*Habitat in Pino.*

*Mas totus ater, ore tibiisque anticis luteis.*

Abietis. 27. T. antennis setaceis, corpore nigro, abdominis quatuor segmentis fulvis.

*Habitat in Pino.*

sylvatica. 28. T. antennis setaceis, corpore nigro, pedibus thoracisque characteribus flavis. *Fn. suec. 931.*

*Habitat in Europa.*

nemoralis. 29. T. antennis setaceis, corpore atro, abdominis segmentis lateribus albis.

*Habitat in Europa.*

Cynosbati. 30. T. antennis setaceis, corpore atro, pedibus ferrugineis: posticis albo nigroque annulatis. *Fn. suec. 937.*

*Reaum. ins. 5. t. 15. f. 1-6.*

*Habitat in Rosa.*

reticulata. 31. T. antennis setaceis, alis pallido fuscoque variis, venis elevatis albis reticulatis.

*Habitat in Finlandia. T. Holm.*

*Caput nigrum suturis albis. Collum flavescens, ubi autem surgitur thoraci supra transverse truncatum. Abdomen supra luteum, sed versus caudam nigrum.*

*Alae*



*Alæ fuscae fasciis pallidis, venis albis, crassis, elevatis, notabiliter admodum venosis.*

- Betulæ. 32. T. antennis setaceis, corpore rubro, thorace ano oculisque nigris, alis postice fuscis.  
*Habitat in Betulis. D. C. Solander.*  
*Magnitudo & statura T. erythrocephalæ. Antennæ setacæ rubræ, apice fuscae articulis 24. Caput rubrum sulcis 2 longitudinalibus. Oculi nigri. Puncta 2 conglobata nigra verticis. Thorax niger, antice ruber. Abdomen rubrum postico segmento nigro. Pedes rubri. Alæ glaucæ, versus apices fuscae.*
- saltuum. 33. T. antennis setaceis, corpore nigro, abdomine luteo.  
*Habitat in Svecia.*  
*Addendæ (Larvas vidi, non exclusi.)*
- intercus. 34. T. nigra, pedibus flavis.  
*Habitat in foliis Arctii, Atropæ, subcutaneus.*
- Rumicis. 35. T. Rumicis Lapathi.  
*Reaum. inf. 5. t. 10. f. 13, 14.*  
*Habitat in Rumicibus Lapathis dictis.*
- Ulmi. 36. T. Ulmi campestris.  
*Reaum. inf. 5. t. 10. f. 16.*  
*Habitat in Ulmi campestris foliis.*
- Alni. 37. T. Betulæ Alni.  
*Reaum. inf. 5. t. 11. f. 1, 2.*  
*Habitat in Betulæ Alni foliis.*
- Pruni. 38. T. Pruni.  
*Reaum. inf. 5. t. 12. f. 16.*  
*Habitat in Pruno.*
- Lonicera. 39. T. Lonicerae.  
*Reaum. inf. 5. t. 13. f. 8. 10.*  
*Habitat in Lonicera.*
- Capreae. 40. T. Salicis. *Fr. svec. 933.*  
*List gæd. 125. f. 49. Trisch. inf. 6. t. 4.*  
*Gæd. inf. 1. t. 19. Reaum. inf. 5. t. 11. f. 5, 6.*  
*Alb. inf. 59. f. g. b.*  
*Habitat in Salicibus.*



215. ICHNEUMON. Os maxillis absque proboscide.  
*Aculeus* exsertus vagina cylindrica bivalvi.  
*Abdomen* sæpius petiolatum.  
*Alæ* lanceolatae planæ, in omni sexu.

\* *Abdomine sessili apice mucronato.*

- gigas.* 1. I. abdomine mucronato ferrugineo: segmentis 3, 4, 5, 6 nigris, thorace villoso. *Fn. suec.* 925.  
*Linn. act. Stockh.* 1739. t. 3. f. 7.  
*Reaum. inf.* 6. t. 31. f. 1, 2.  
*De Geer. inf.* 1. t. 36. f. 1, 2.  
*Rœs. inf.* 2. vesp. t. 8. 9.  
*Habitat in Svecia frequens.*  
 Mas abdomine mucronato ferrugineo: segmentis 1, 7, 8 fuscis. Thorace villoso; Pedibus posticis nigris; corpore sextuplo minore.
- Spe-* 2. I. abdomine mucronato atro, thorace villoso litura ante  
*trum.* te alas lutea.  
*Fn. suec.* 926.  
*Amœn. acad.* 3. p. 325.  
*De Geer inf.* 1. t. 36. f. 6.  
*Habitat in Lignis putridis antiquis Pini & Abietis.*
- Juventus.* 3. I. abdomine mucronato atro-cærulescente, thorace unicolore villoso.  
*Fn. suec.* 954.  
*De Geer inf.* 1. t. 36. f. 7.  
*Habitat in Sylvis.*  
*Similis I. spectro, sed caret litura ante alas lutea; aculeoque abdomine longe brevior instruitur.*
- Camelus.* 4. I. abdomine mucronato atro lateribus albo maculato, thorace lævi.  
*Uddm. diff.* 82.  
*Habitat in Ligno putrido.*  
*Antennæ nigræ; præcedentium 1, 2, 3 flavæ.*

\* \* *Sen-*



\* \* *Scutello albido; Antennis fascia albida annulatis.*

- sugillato- 5. I. scutello flavicante, thorace immaculato, abdomine  
rius. atro: segmentis tribus utrinque puncto albo.  
*Habitat in Europa.*  
*Pedes nigri. Abdominis segmenta tria prima utrinque  
unico puncto albo.*
- raptorius. 6. I. scutello flavicante, thorace immaculato, abdominis  
segmento secundo tertioque luteis, reliquis apice albis.  
*Habitat in Europa.*  
*Thorax immaculatus vel callo tantum ad basem alæ.*  
*Femora posteriora 4 nigra.*
- sarcito- 7. I. scutello flavicante, thorace immaculato, abdominis  
rius. segmento tertio posteriori secundoque ferrugineis, tex-  
to flavo.  
*Fn. suec. 976.*  
*Habitat in Europa.*
- extenso- 8. I. scutello flavicante, thorace immaculato, abdominis  
rius. segmento secundo tertioque ferrugineis, ultimis api-  
ce albidis.  
*Fn. suec. 980.*  
*Habitat in Europa.*
- culpato- 9. I. scutello flavicante, thorace maculato, abdominis seg-  
rius. mento secundo tertioque ferrugineis, reliquis nigris.  
*Habitat in Europa.*
- constri- 10. I. scutello flavicante, thorace bidentato submaculato,  
torius. abdominis segmento secundo ferrugineo.  
*Habitat in Europa.*
- saturato- 11. I. scutello flavicante, thorace maculato, abdominis  
rius. nigri segmento ultimo alido.  
*De Geer. inf. 1. t. 23. f. 16.*  
*Habitat in Europa.*
- crispato- 12. I. scutello flavicante, thorace submaculato, abdomine  
rius. toto luteo-ferrugineo: apice subaurescente.  
*Habitat in Europa.*
- Pisforius. 13. I. scutello flavicante, thorace maculato, abdomine  
toto luteo.



*Fn. svec. 966, 968.*

*Habitat in Larva Phalænæ Pisorum.*

\* \* \* *Scutello albido; Antennis nigris totis.*

- luctato- 14. I. scutello flavicante, thorace maculato, abdominis  
rius. segmento secundo tertioque luteis.  
*Habitat in Europa.*
- volutato- 15. I. scutello flavicante, thorace variegato, abdominis seg-  
rius. mentis omnibus dorso flavis.  
*Habitat in Europa.*  
*Pedes rufi.*
- vaginato- 16. I. scutello flavicante, thorace maculato, abdominis  
rius. segmentis margine flavis: primo quintoque unicolore.  
*Habitat in Europa.*  
*Pedes rubri: postici nigro fasciati.*
- persvaso- 17. I. scutello flavicante, thorace maculato, abdomine atro:  
rius. segmentis omnibus utriusque punctis duobus albis.  
*Fn. svec. 964.*  
*De Geer inf. 1. t. 36. f. 8.*  
*Habitat in Europa.*  
*Aculeus corpore longior. Pedes ferruginei. Abdomen ses-  
sile; statura I. manifestatoris.*
- designa- 18. I. scutello flavicante, thorace maculato, abdomine  
torius. atro: segmentis primis quatuor utrinque puncto albo.  
*Fn. svec. 965.*  
*Habitat in Europa.*  
*Pedes postici nigri.*
- edictio- 19. I. scutello flavicante, thorace maculato: punctis utrin-  
rius. que duobus abdomineque toto atro.  
*Habitat in Europa.*
- delirato- 20. I. scutello flavicante, thorace maculato: punctis utrin-  
rius. que tribus abdomineque toto atro.  
*Habitat in Europa.*
- fossorius. 21. I. scutello flavicante, thorace immaculato, abdomine  
toto atro.  
*Habitat in Europa.*

\* \* \* \*



\* \* \* \* Scutello thorace concolore; Antennis fascia annulatis.

ariolator. 22. I. thorace ferrugineo bispinoso, alis fasciis binis fuscis, abdomine fasciis duabus albis.

*Habitat in America. Mus. De Geer.*

*Parvus. Linea alba inter utrumque oculum & Caput. Antennæ nigrae annulo albo. Thorax a tergo pilice dentibus duobus. Alæ primores albæ macula fusca in medio & apice; secundariæ totæ albæ.*

comita- 23. I. ater totus, antennis fascia alba.

tor. *Habitat in Europa. D. C. Solander.*

peregrina- 24. I. niger, pedibus subclavatis abdomineque ferrugineis: tor. segmentis duobus ultimis nigris, ano albido.

*Habitat in Europa.*

*Pediculo duplo major.*

incubitor. 25. I. niger, abdomine ferrugineo; apice nigro macula alba, alis hyalinis, antennis fasciatis.

*Habitat in Europa.*

relucta- 26. I. niger, abdomine medio picco, tibiis anticis clavatis.

tor. *Habitat in Europa.*

*Aculeus longitudine fere corporis, ræber.*

\* \* \* \* Scutello thoraci concolore; Antennis nigris setaceis.

denigra- 27. I. corpore atro, alis nigris lunula hyalina, abdomine tor. testaceo sessili.

*Habitat in Europa. G. T. Holm. M. D.*

desertor. 28. I. corpore luteo; alis fuscis: fasciis duabus albis.

*Habitat in Europa.*

*Sequentes alas hyalinas gerunt.*

corusca- 29. I. corpore artubusque atris, alis fusco hyalinis.

tor. *Habitat in Europa.*

manifestator. 30. I. corpore atro immaculato, abdomine sessili cylindrico, pedibus rufis.

*Fn. Svec. 959.*

*De Geer. ins. 1. t. 36. f. 9.*

*Raj. ins. 256. n. 18. b.*

*Reaumur. ins. 6. t. 29. f. 16.*



*Habitat in locis glareosis; In fasciculo foliorum Salicis foramen dentibus rodebat; antennis insertis recognoscebat latentem larvam. Rolander.*  
*Aculeus corpore saepe duplo longior.*

- compun- 31. I. corpore atro immaculato, abdomine subpetiolato ob-  
 etor. longo, pedibus rufis, aculeo antennis brevior.  
*Habitat in Europa.*
- delusor. 32. I. corpore nigro, abdomine ferrugineo basi apiceque  
 nigro, femorum posteriorum patellis folis nigris.  
*Habitat in Europa.*
- venator. 33. I. corpore atro immaculato, abdominis basi subtus in-  
 carnata, pedibus rufis, aculeo retractili.  
*Habitat in Europa.*
- extensor. 34. I. corpore nigro immaculato, abdomine cylindrico,  
 pedibus rufis, tentaculis fetaceis.  
*Fn. svec. 986.*  
*Habitat in Europa.*
- exarator. 35. I. corpore piceo immaculato, abdomine femoribusque  
 clavatis, tentaculis fetaceis, alis macula nigra albaque.  
*Habitat in Europa.*  
*Parvus angustus longiusculis pedibus, aculeo corpore lon-  
 giore.*
- Turion- 36. I. niger, abdomine cylindrico, macula alarum fusca  
 nellæ. alba infixa, tibiis posterioribus albo annulatis.  
*Habitat in Larvis Phalænæ Turionellæ.*  
*Antennæ longitudine corporis; aculeus abdomine brevior;*  
*Pedes ferruginei; quatuor posteriores tibiæ fuscae an-  
 nulo albo; sed Mas hac nota destituitur.*
- Strobilel- 37. I. niger, aculeo corpore duplo longiore, pedibus palli-  
 læ. dis ferrugineis: posticis nigris.  
*Fn. svec. 971?*  
*Habitat in Larva Phalænæ Strobilellæ.*
- Modera- 38. I. niger, abdomine petiolato compresso, ore tentacu-  
 tor. lato, pedibus pallidis, aculeo corpore subbreviore.  
*Habitat in Larva Ichneumonis Strobilellæ, qua consum-  
 ta folliculum cranio superstiti inædificat. Rolander.*



- Resinel- 39. I. niger, pedibus flavis, abdomine subcylindrico ses-  
læ. fili, antennæ basi luteis.  
*Habitat in Phalænæ resinellæ Larva. Rolander.*  
*Angustus, oblongus, immaculatus. Antennæ corpore lon-  
giores; basis antennarum flava.*
- præroga- 40. I. niger, pedibus flavis, abdomine oblongo obtuso.  
tor. *Habitat in Larva Phalænæ Salicis.*  
*Antennæ vix corporis longitudine, nec basi flava.*
- manda- 41. I. niger, abdominis segmento secundo tertioque fer-  
tor. rugineis: apice supra albo, antennis unicoloribus.  
*Habitat in Europa.*
- titillator. 42. I. niger, abdomine pedibusque quatuor anterioribus fer-  
ruginis.  
*Habitat in Europa.*  
*Petiolus abdominis pedesque postici, exceptis plantis al-  
bis, nigri.*
- enerva- 43. I. niger, abdominis tribus primis segmentis rufis: api-  
tor. ce supra albo, antennis albo fasciatis.  
*Habitat in Europa.*
- gravidator. 44. I. niger, abdominis primo segmento ferrugineo abdo-  
men dimidium obtegente.  
*Habitat in Europa.*
- inculca- 45. I. niger, abdomine falcato toto ferrugineo.  
tor. *Fn. svec. 972. Reaum. inf. 6. t. 30. f. 9.*  
*Habitat in Europa.*
- pugilla- 46. I. niger, abdomine falcato: segmentis secundo tertio  
tor. quartoque rufis, pedibus tenuibus ferrugineis.  
*Fn. svec. 975. Raj. inf. 255. n. 17.*  
*De Geer inf. 1. t. 6. f. 12.*  
*Habitat in Phalænæ Ziczac larva.*
- ruspator. 47. I. niger, abdomine subcylindrico, pedibus ferrugineis,  
femoribus clavatis: posticis dentatis.  
*Habitat in Europa.*
- jaculator. 48. I. niger, abdomine falcato: segmento secundo tertio  
quartoque rufis, tibiis posticis clavatis.  
*Fn. svec. 985. Mouff. inf. t. 121.*



*De Geer. inf. 1. t. 36. f. 10. Reaum. inf. 4. t. 10. f. 14.*  
*Habitat in Apis truncorum, florifomniæ, Sphegisque*  
*figuli larvis. Bergman.*

affecta- 49. I. niger, abdomine falcato: segmento secundo tertio  
 tor. quartoque latere rufis, tibiis posticis clavatis.  
*Habitat in Europa.*  
*Similis antecedenti, at dimidio minor, aculeo brevissimo,*  
*nec corpus æquante.*

Appendi- 50. I. niger, abdomine brevissimo thoraci imposito, pedi-  
 galler. bus posticis longissimis.  
*Reaum. inf. 6. t. 31. f. 13.*  
*Brown. jam. 439. t. 44. f. 6.*  
*Habitat in America. In Hispania. Z. Hallman.*  
*Corpus nigra. Alæ parvæ, hyalinae. Thorax punctis*  
*sparsis excavatis, postice obtusissimus, retusus. Ab-*  
*domen nitidum compressum, lenticulare, minimum,*  
*magnitudine eminis lini, dorso thoracis affixum pe-*  
*tivio. Antennæ filiformes, longissimæ.*

\* \* \* \* \* *Antennis luteis setaceis.*

luteus. 51. I. luteus, thorace striato, abdomine falcato.  
*Fn. suec. 967. Gæd. inf. 2. t. 37.*  
*Raj. inf. 253. n. 6. List. gæd. t. 20. f. C.*  
*Habitat in Europa frequens ad plateas.*

ramidu- 52. I. luteus, abdomine falcato: apice nigro,  
 lus. *Fn. suec. 969.*  
*Raj. inf. 253. n. 7.*  
*Habitat in Europa.*

glaucop- 53. I. luteus, pectore nigro, abdomine falcato: ano nigro.  
 pterus. *Fn. suec. 973.*  
*Habitat in Europa.*

circum- 54. I. niger, abdomine falcato: antice luteo, pedibus po-  
 flexus. sticis nigro geniculatis. *Fn. suec. 974.*  
*Habitat in Europa.*

cinctus. 55. I. ater, antennis pedibusque ferrugineis, alis albis fa-  
 sciis duabus nigris.  
*Fn. suec. 984.*  
*Habitat in Europa.*



\* \* \* \* \* *Mixuti Antennis filiformibus. Abdomine ovato sessili.*

- Musca- 56. I. auratus, pedibus flavis saltatoriis.  
rum. *De Geer inf. 1. t. 32. f. 19, 20.*  
*Habitat in Larvis Muscarum aphidivorarum.*
- Bedegua- 57. I. auratus, thorace viridi, abdomine aureo. *Faun.*  
ris. *svec. 939.*  
*Rœf. inf. app. t. 53. f. F. H.*  
*Blank. inf. 188. n. 12.*  
*Habitat in Gallis Rosæ, Quercus.*  
*Aculeus longitudine corporis.*
- Juniperi. 58. I. auratus viridis, antennis nigris, puncto alarum  
rubro.  
*Fn. svec. 987.*  
*Habitat in Tipulæ juniperi Larva.*
- Pupa- 59. I. auratus cæruleus, abdomine viridi nitido, pedibus  
rum. pallidis.  
*De Geer inf. 1. t. 30. f. 18.*  
*Rœf. inf. 2. vesp. t. 3.*  
*Habitat in Pupis Papilionum.*
- Larva- 60. I. auratus viridis, abdomine nigro: macula dorsali pur-  
rum. purascente, pedibus flavis, antennis septemnodis.  
*De Geer Act. Upsal. mss.*  
*Habitat in Larvis Phalænarum variarum.*
- Cyniphi- 61. I. auratus viridis abdomine fusco: basi cingulo palli-  
dis. do, pedibus flavescens. *Fn. svec. 942.*  
*Habitat in Larvis cyniphidis gallarum Salicis pentandræ*  
*intus concameratarum.*  
*Antennis reliquisque parum differt a præcedenti.*
- Cocco- 62. I. nigro-æneus, abdomine cærulescente, pedibus li-  
rum. vidis.  
*De Geer inf. 1. t. 35. f. 17.*  
*Habitat in Coccis.*
- Secalis. 63. I. niger, capite rufo, oculis viridibus.  
*Habitat in Larvis spicarum Secalis.*



- Subcuta- 64. I. niger, alis hirsutis: macula lunari nigra, antennis  
neus.      . subfiliformibus.  
*De Geer inf. 1. t. 30. f. 21.*  
*Habitat in Larvis subcutaneis.*
- Aphi- 65. I. niger, abdomine basi pedibusque anticis genibusque  
dum,      posticis flavis. *Fn. suec. 953.*  
*It. gotl. 307.*  
*Frisch. inf. 11. t. 19.*  
*Habitat in Aphidibus.*
- Ovulo- 66. I. niger, pedibus rufis, antennis filiformibus longis.  
rum,      *De Geer inf. 1. t. 35. f. 11, 12, 13.*  
*Habitat in ovis Lepidopterorum.*
- globatus. 67. I. niger, pedibus ferrugineis.  
*Fn. suec. 951.*  
*Mérian. eur. t. 22.*  
*Frisch. inf. 6. t. 10.*  
*Raj. inf. 253. n. 13.*  
*Keam. inf. 2. t. 5. f. 5, 6.*  
*Derham theol. 1. 8. c. 6. n. 21.*  
*Invenitur in Sulmis intra Folliculura communem, bombyci-  
num, subrotundum, album.*
- glomera- 68. I. niger, pedibus flavis.  
tus.      *Fn. suec. 952.*  
*Gæd. inf. 1. p. 59. n. 11.*  
*Keam. inf. 2. t. 33. f. 2, 7, 8.*  
*Mérian. europ. t. 48.*  
*De Geer inf. 1. t. 16. f. 6.*  
*Raj. inf. 260, 254. n. 12.*  
*Raf. inf. 2. vesp. t. 3.*  
*Habitat in Larvis Papilionum: exeuntes proprios fol-  
liculos flavos neclunt, intra quos exclusæ pupæ obser-  
vant Papilionis pupam, nuper exuta larva, in quam  
ova immittunt.*
- pectini- 69. I. ater, antennis ramosis.  
cornis.      *De Geer inf. 1. t. 16. f. 6.*  
*De Geer Act. Stockh. 1740. p. 464. t. 1. 4-6.*  
*Habitat in Larvis subcutaneis Quercus.*



216. SPHEX. Os maxillis absque proboscide.  
*Alæ* plano-incumbentes (nec plicatæ),  
 in omni sexu.  
*Aculeus* punctorius reconditus.

\* *Abdomine petiolato: petiolo elongato.*

- argilla-  
cea. 1. S. ferruginea, abdominis petiolo uniarticulato curvato,  
 antennis clavatis, maxillis porrectis.  
*Habitat* Surinami intra globos argillaceos larva. Ro-  
 lander.  
*Maxillæ* prominent edentule, rostrum bivalve ambientes.
- fabulosa. 2. S. nigra hirta, abdominis petiolo biarticulato: segmen-  
 to secundo tertioque ferrugineis.  
*Frisch. inf. 2. t. 1. f. 6, 7.*  
*Habitat* in terra sabulosa Europæ, ubi Canis instar pedi-  
 bus anterioribus cuniculum fodit larvamque Phalænæ  
 vel Araneam seminortuam in eo sepevit, cui ovulum con-  
 credit; quo factò orificium terra claudit.  
*Alæ* abdominæ dimidio breviores. Rostrum retractile bi-  
 valve linguam continens.
- asiatica. 3. S. ferruginea, thorace variegato, abdominis petiolo  
 macula utriusque ad basin flava, thorace variegato.  
 M. L. U.  
*Habitat* in Indiis.
- ægyptia. 4. S. nigra, petiolo abdominis pedumque articulis dimi-  
 diatis flavis.  
*Habitat* in Ægypto. Hasselqvist.
- fervens. 5. S. nigra, abdomine petiolato ferrugineo, alis cærule-  
 scentibus. M. L. U.  
*Habitat* in Indiis.
- inda. 6. S. atra, abdomine petiolato, alis nigro-cærulescentibus  
 margine tenuiore hyalino. M. L. U.  
*Habitat* in Indiis.  
*Facie* cum antecedenti convenit.
- clavipes. 7. S. nigra, abdominis petiolo ferrugineo uniarticulato cla-  
 vato, pedibus clavatis.



*Habitat in Europa.*

*Parva est. Abdomen ferrugineum excepto petiolo. Femora & tibiæ posticæ clavata.*

**Spirifex.** 8. *S. atra*, thorace hirsuto, petiolo uniaarticulato flavo longitudine abdominis.

*Reaum. ins. 6. t. 28. f. 5.*

*Habitat in Europa australi; in cylindris spiralibus terreis sub tectis.*

*Longitudo Crabronis: petiolus cylindricus flavus. Pedes 1, 2, 3, 4 flavi, basi femorum nigri. Pedes 5, 6 flavi, sed apicibus femorum & tibiæ nigris.*

**figulus.** 9. *S. atra*, abdomine subpetiolato: marginibus segmentorum lucidis.

*Habitat Upsaliæ in parietum ligneorum foraminibus ab aliorum insectorum larvis factis relictisque, quæ primo purgas circumroditque, deinde fundum argilla obducit, cui Araneam imponit, eiquè ovulum concredit, quo facto viam argilla claudit. Larva apoda, pallida, larvæque Apum similis, consumta Aranea membranam luteo-fuscam & teneræ pupæ aptissimam net. Una mater per plurimos nidos construit & plerumque non ultra biduum in quovis adornando consumit. T. Bergman.*

*Alæ abdomine breviores. Abdomen petiolatum atrum marginibus segmentorum lucidis, si quis eos a capite oblique intueatur.*

\* \* *Abdomine subsessili.*

**viatica.** 10. *S. nigra*, alis fuscis, abdomine antice ferrugineo: cingulis nigris.

*Fn. suec. 977.*

*Amœn. acad. 3. p. 330.*

*Raj. ins. 254. n. 9. & jun. 22. Vespa miraculosa.*

*Frisch. ins. 2. t. 1. f. 13.*

*Habitat in Europa; fodit cuniculum, occidit larvam Phalænæ, attrahit, sepelit, imposito ovo, obturat.*

**pectini-** 11. *S. nigra* glabra, abdomine anteriore ferrugineo, pedibus primariis ciliatis.

**pes.**

*Habitat in Europa.*

**variegata.** 12. *S. nigra* tota, alis albo maculatis.

**ta.**

*Habitat in Europa.*



- indica. 13. *S. atrā*, pedibus antennisque ferrugineis, alis atro-cærulefcentibus. *M. L. U.*  
*Habitat in Indiis.*
- tropica. 14. *S. nigra*, oculis albis, abdominis segmento secundo latiore ferrugineo. *M. L. U.*  
*Habitat in Indiis.*
- Colon. 15. *S. nigra*, pedibus antennisque rufis, thorace viridi, alis maculis duabus nigris.  
*Habitat in Svecia.*
- gibba. 16. *S. nigra*, abdomine ferrugineo apice fusco, alis primoribus apice nigricantibus.  
*Habitat in Svecia.*
- rufipes. 17. *S. atra*, abdominis segmentis utrinque macula alba, alis apice fuscis, pedibus posticis rubris.  
*Habitat in Europa.*
- arenaria. 18. *S. abdominis fasciis quatuor flavis: primo segmento duobus punctis flavis. Fn. suec. 994.*  
*Habitat in arena ad templum accessorium Fablunense.*
- fossoria. 19. *S. thorace immaculato, ore argenteo, abdomine maculis utrinque 4 albis.*  
*Habitat in Europæ montibus sabulosis.*
- leucostoma. 20. *S. atra glabra, labio argenteo, palmis fuscis.*  
*Habitat in Europa.*
- vaga. 21. *S. thorace bipunctato, abdominis fasciis 3 flavis: primis interruptis, tibiis flavis. Fn. suec. 997.*  
*Habitat in Europa.*
- cærulea. 22. *S. cærulea, alis ferrugineis basi nigris. Mus. De Geer.*  
*Habitat in America meridionali.*  
*Magnitudo Crabronis. Alæ ferrugineæ, basi nigræ, apice albicantes. Antennæ basi nigræ, apice ferrugineæ.*
- ignita. 23. *S. glabra nitida, thorace viridi, abdomine aureo: apice quadridentato.*  
*Fn. suec. 1004.*  
*Frisch. inf. 9. t. 10. f. 1.*  
*Habitat in maris Europæ.*



aurata. 24. *S. glabra nitida*, thorace viridi, abdomine aureo bidentato.

*Habitat in muris Europæ.*

cyanea. 25. *S. glabra nitida*, thorace abdomineque cæruleo: apice tridentato.

*Habitat in muris Europæ.*

217. VESPA. *Os maxillis absque proboscide.*

*Alæ superiores plicatæ, in omni sexu.*

*Aculeus punctorius reconditus.*

Crabro. 1. *V. thorace nigro antice rufo immaculato, abdominis incisuris puncto nigro duplici contiguo.*

*Fn. suec. 988.*

*Aldr. inf. 225.*

*Mouff. inf. 50.*

*Frisch. inf. 9. t. 11. f. 1.*

*Raj. inf. 250.*

*Swam. bibl. t. 26. f. 9.*

*Reaum. inf. 6. t. 18. f. 1.*

*4. t. 10. f. 9.*

*Habitat in Europæ arboribus cavis s. sub earum radicibus. Accipiter Apum.*

vulgaris. 2. *V. thorace lineolis 3 parium differentium flavescens, abdominis incisuris punctis nigris distinctis. Fn. suec. 989.*

*Mouff. inf. 52.*

*Reaum. inf. 6. t. 17. f. 7, 8.*

*Raj. inf. 250.*

*Frisch. inf. 9. t. 12. f. 2.*

*Aldr. inf. 198.*

*Swamm. bibl. t. 26. f. 8.*

*Habitat in Europa sub tectis frequens; prædatur Muscis, furatur mel Apum.*

rufa. 3. *V. thorace lineolis punctisque duobus flavis, abdomine flavo antice ferrugineo.*

*Fn. suec. 998.*

*Reaum. inf. 6. t. 14?*

*Habitat in Europa.*

parietum. 4. *V. nigra, abdomine fasciis quinque flavis: prima remotissima.*

*Fn. suec. 990.*

*Frisch. inf. 9. t. 12. f. 1.*

*Habitat in foraminibus parietum ligneorum.*



**muraria.** 5. *V. nigra*, thorace basi flavescente, abdomine fasciis quatuor flavis: prima remotissima.

*Fn. svec.* 991.

*Frisch. inf.* 9. p. 24. t. 12. f. 8, 9.

*Habitat in muris.*

**cribraria.** 6. *V. nigra*, abdomine fasciis sex flavis: intermediis tribus interruptis, tibiis anticis clypeis cribriformibus.

*Raj. inf.* 255. Vespa ichneumon pedibus anterioribus velut clypeatis.

*Roland. Act. Stockb.* 1751. p. 56. t. 3. f. 1.

*Uddin. diff.* 94. Apis tibiis anticis lamella cribriformi.

*Habitat in Europa.*

**spinipes.** 7. *V. nigra*, tibiis incisurisque abdominis flavis, femoribus intermediis denticulatis.

*Habitat in Svecia. T. Bergman.*

**rupestris.** 8. *V.* abdominis segmento secundo majore maculis duabus ovatis albis, pedibus antennisque ferrugineis.

*Habitat ad Lapidum latera australia, nidum ex sylvatis aggregatis conficiens. Rolander.*

**coarctata.** 9. *V.* abdominis primo articulo infundibuliformi, secundo campanulato maximo.

*Fn. svec.* 1002.

*Frisch. inf.* 9. t. 9.

*Habitat in Europa.*

**arvensis.** 10. *V.* abdominis fasciis quatuor flavis: tertia interrupta.

*Fn. svec.* 992.

*Habitat in Europa.*

**biglumis.** 11. *V.* thoracis scutello bispinoso, abdominis segmentis margine albis: secundo punctis duobus albis.

*Fn. svec.* 1011.

*Habitat in Europa; trahit occisas Muscas se saepe triplo majores.*

**uniglumis.** 12. *V.* thoracis scutello mucronato, abdominis segmentis punctis duobus albis sublateralibus.

*Habitat in Europa.*

13. *V.*



- cornu- 13. V. rostro corneo subulato, abdomine atro: segmento  
ta. secundo majore. *M. L. U.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Thorax latere dentatus. Rostrum bivalve. Alæ nigrae.*  
*Mas cornibus duobus capite duplo longioribus.*
- signata. 14. V. thorace supra nigro lineis quatuor fasciolisque dua-  
bus flavis. *M. L. U.*  
*Habitat in America.*
- canaden- 15. V. thorace squamis duabus, abdominis ferruginei seg-  
fis. mento primo obconico.  
*Habitat in America septentrionali. P. Kalm.*
- emargi- 16. V. scutello emarginato, abdominis nigri petiolo incur-  
nata. vo utrinque unidentato. *M. L. U.*  
*Habitat in America*
- calida. 17. V. nigra, abdominis apice antennisque fulvis. *M. L. U.*  
*Habitat in Indiis.*

218. APIS. Os maxillis atque proboscide inflexa  
vaginis duabus bivalvibus.  
*Alæ planæ, in omni sexu.*  
*Aculeus Feminis & Neutris puncto-  
rius reconditus.*

- longicor- 1. A. antennis filiformibus longitudine corporis hirsuti ful-  
nis. vique.  
*Swamm. bibl. t. 26. f. 6.*  
*Habitat in Europa.*
- tumulo- 2. A. antennis filiformibus longitudine corporis nigri, pe-  
rum. dibus maxillisque flavescens.  
*Fr. svec. 1000. Apis nigra, pedibus maxillisque flavis.*  
*It. gotl. 336.*  
*Habitat in Wisingoæ Tumulis sepulchralibus.*
- clavicor- 3. A. antennis clavatis longitudine corporis nigri, abdo-  
nis. minis fasciis duabus flavis interruptis.  
*Habitat in Europa.*

4. A.

Apes vivunt in Societate gynœcocratica, sacos faciunt cereos, & mel e nectare flo-  
rum hauriunt.



- centun- 4. *A. nigra*, abdomine subtus laeva fulva. *Fn. suec.* 1010.  
cularis. *Raj. inf.* 242. *Apis sylvestris*, corpore longo angusto.  
*Reaum. inf.* 6. t. 10. f. 3, 4.  
*Frisch. inf.* 11. t. 2?  
*Habitat in Europa intra terram plures ni los cylindricos*  
*ex foliis Rosæ formans, tanquam centunculis. Amœn.*  
*acad.* 3. p. 320.
- cineraria. 5. *A. nigra*, thorace hirsuto albicante: fascia nigra.  
*Habitat in Europa.*
- furina- 6. *A. atra*, alis atro-cærulescentibus, abdominis petiolo  
menfis. obovato.  
*Habitat in America. Rolander.*  
*Magna, facie Spægis, sed lingua instructa.*
- retusa. 7. *A. nigra* sabhirta, abdominis basi retusa, tibiis posticis  
extus lanatis.  
*Habitat in Europa.*
- rufa. 8. *A. fusca*, abdomine rufescente, fronte alba.  
*Raj. inf.* 242. *Apis sylvestris* parva, abdomine brevior.  
*Fn. suec.* 1009. *Apis hirsuta*, capite nigro, abdomine  
rufo, fronte alba.  
*Habitat in Europa.*
- bicornis. 9. *A. fronte bicorni*, capite nigro, abdomine hirsuto. *Fn.*  
*suec.* 1008.  
*Habitat in Europa.*  
*An prioris femina? copula connexas vidit P. Forskål.*
- trunco- 10. *A. nigra* glabra, fronte albida pubescente, abdomine  
rum. segmentis margine albidis, tectus navicante.  
*Habitat in Europa.*
- dentata. 11. *A. nitida* viridis, alis nigris, femoribus posticis denta-  
tis. *M. L. U.*  
*Habitat in Indiis.*
- cordata. 12. *A. nitida* viridis, alis hyalinis, abdomine cordato, ti-  
biis posticis dilatatis. *M. L. U.*  
*Habitat in Indiis.*
- helvola. 13. *A. rufa* villosa oblonga subtus albida.  
*Habitat in Europa.*



- fuccin- 14. A. thorace fiavescente subvilloso, abdomine nigro :  
cta. cingulis quatuor albis.  
*Habitat in Terris australibus.*  
*Rostrum subulatum, corneum, bivalve.*
- zonata. 15. A. subpubescens fusca, abdomine cingulis quatuor  
cæruleis. *M. L. U.*  
*Habitat in Indiis.*
- cærule- 16. A. fusca subvillosa, abdomine cærulescente: incisura-  
scens. rum marginibus albicantibus.  
*Habitat in Europa.*

- mellifera. 17. A. pubescens, thorace subgriseo, abdomine fusco,  
pedibus potticis glabris utrinque margine ciliatis.  
*F. svec. 1003.*  
*Mössl. ins. 2. Swamm. bibl. t. 17. f. 1. operaria.*  
*Aldr ins. 20. f. 3. femina.*  
*Fonst. ins. 1. t. 2. f. 4. mas.*  
*Raj. ins. 240.*  
*Reaum. ins. 5. t. 21. 23. t. 22. f. 1. operaria.*  
*f. 2. mas.*  
*f. 4. femina.*

*Habitat in Europæ arboribus cavis, frequentius culta.*

REGINA (Femina) unica, altior, oblongior, aculeata.  
FUCI (Mares) ad 1600, inermes, antennis 11-articu-  
latis. OPERARIÆ (Spadones) ad 2000, antennis  
15-articulatis, ventriculis 2 melis ceræque, aculeate.  
Ense retrorsum serrato venenato latente intra vagi-  
nam cuspidatam.

RESPUBLICA Alvearii gynæocratica est, dum Femina  
imperans semper inclusa, operariorum custodum satel-  
litiæ assidue stipata, antennis obvium Marcem quem-  
cunque salutat, insilientoque comprimit cum illius  
vitæ dispendio; ponit dein ova ad 40000 saepe quot-  
annis in adaptatis favi cellis: primum neutra, dein  
mascula, demum nonnulla feminina; his exclusis gradu  
2:do supra calorem æstatis ordinariæ, adolescent Lar-  
væ sextiduo, neut ad parietes cellæ, operiuntur usque  
dum adultæ evolant, alteroque die mellificant. Mares,  
ignavum pecus, incurii apricantur serenis diebus, gu-  
la dediti. Spadones operarii, neutri, indefessi, mel  
e necitare, ceram e polline florum sedulo legunt  $\frac{1}{2}$  mil-  
liaris spatio, quoties per cœlum licet, reducunt, sacos  
cereos



cereos struunt sexangulari-prismaticos, eosque melle replent, feminam mares pullosque nutriunt, cellas inhabitatas repurgant, immunda auferunt, vigilas & stationes ad portas instituunt, hostes arcent aculei ictu venenato sibi ipsis licet lethali, maresque demum transactis nuptiis expellunt. Hostes imprimis sunt Motacilla, Hirundines, Pavones, Bufones, Mures, Crabrones, Vespa, Pediculi, Apes fares, Mellonella, Fumus &c. Flores melliferi, non omnes, praecipui sunt Echium, Borago, Verbascum, Serpyllum alii; imprimis Erica Graecis, Pagonium Scanis, Tilia Polonis, Rosmarinus Narborensibus, Thymus Atticis, Arbutus Corsicis, Absinthium Sardinis, Aconitum Ponticis &c. hinc pretium varium mellis: Vide Reaumurium, Aubenton.

subterra- 18. A. pubescens, thorace griseo, abdomine fusco, pedibus undique villotis.

*Habitat in Terra sabulosa sicciora, quam foraminibus pluribus parum remotis penetrant & distincte adificiant plures.*

variegata. 19. A. thorace abdomineque albo variegato.

*Habitat in Europa.*

rostrata. 20. A. labio superiore conico inflexo, abdominis fasciis glaucis repandis.

*Fa. spec. 999. Apis pedibus maxillisque flavis apice nigris, incisuris abdominis glabris margine nigris.*

*It. gotl. 336.*

*Habitat in Europæ monticulis arenosis.*

manicata. 21. A. nigra, pedibus anticis hirsutissimis, ano multidentato, abdomine maculis flavis.

*Habitat in Europa.*

4-denta- 22. A. fusca abdominis cingulis quinque albidis, ano quadridentato: intermediis bifidis.

*Swamm. bibl. t. 26. f. 4.*

*Habitat in Europa.*

floriformis. 23. A. nigra, abdomine subcylindrico incurvo apice bidentato, tibiis posticis apice spinosis.

*Habitat in Europa, per noctes floribus inhaerens.*



- conica. 24. *A. fusca*, abdomine conico acutissimo: segmentorum marginibus albis. *Fn. suec.* 1006.  
*Raj. inf.* 252. n. ult.  
*Reaum. inf.* 6. t. 11. f. 2, 3, 4.  
*Habitat in terræ cavitatibus.*
- annulata. 25. *A. nigra*, fronte annulisque pedum nigris.  
*Habitat in Europa.*
- ruficornis. 26. *A. antennis pedibus punctisque duobus thoracis ferrugineis.*  
*Habitat in Europa.*
- ichneumonea. 27. *A. rostro corneo recto, abdomine petiolato, thoracis suturis auro-nitentibus.*  
*Habitat in America. Rolander.*  
*Similis Ichneumoni, A. mellifera major. Linguae vagina recta, nec reflexa, apice bifida. Antennæ nigrae. Thorax nigricans suturis aureis nitentibus. Prothorax nigrum, segmentis tribus primis ferrugineis.*
- cariosa. 28. *A. fusca subvillosa, fronte pedibusque flavis.*  
*Fn. suec.* 1001.  
*Habitat in Europæ ligno carioso.*  
 \* *Bombinatrices hirsutissimæ.*
- violacea. 29. *A. hirsuta atra, alis cærulescentibus.*  
*Pet. gaz. t. 12. f. 5. Bombylius lufitanicus e nigro cærulescens.*  
*Reaum. inf.* 6. t. 5. f. 1, 2.  
*Habitat in Truncis excorticatis Europæ aulicis, quos perforat, longitudinaliter excavat, utque pares vias a fundo incipiens polline herbaram melis mixto replet & unicuique ovum concredit. Nidi distinguuntur 4 l. 5 annulis ligneis. Nymphæ caput deorsum spectat ut in fundo exitum quærat Apis perfecta.*
- terrestris. 30. *A. hirsuta nigra, thoracis cingulo flavo, ano albo.*  
*Fn. suec.* 1012.  
*Meyff. inf.* 53. t. 2. *Bradl. natur. t. 26. f. 1. D.*  
*Gœd. inf.* 2. t. 46. *Raj. inf.* 247. n. 8.  
*List. gœd. f. 105. Frijsh. inf.* 9. t. 13. f. 1.  
*Reaum. inf.* 6. t. 3 f. 1.  
*Habitat in Europæ terra, sub qua profunde nidum ponit.*



- Lapida- 31. *A. hirsuta atra*, ano fulvo. *Fn. suec. 1015.*  
ria.  
*Frisch. inf. 9. p. 25. n. 2.*  
*Reaum. inf. 6. t. 1. f. 1-4.*  
*Habitat in acervis Lapidum.*
- Musco- 32. *A. hirsuta fulva*, abdomine flavo. *Fn. suec. 1017.*  
rum.  
*Frisch. inf. 9. p. 20. n. 3.*  
*Reaum. inf. 6. t. 2. f. 1-3.*  
*Habitat sub Musco terrestri.*
33. *A. hirsuta fulva*, abdominis fascia nigra, ano albo.  
rum.  
*Fn. suec. 1018.*  
*Reaum. inf. 6. t. 4. f. 1.*  
*Habitat sub Muscis.*
- acervo- 34. *A. hirsuta atra.* *Fn. suec. 1013.*  
rum.  
*Habitat sub terra.*
- subterra 35. *A. hirsuta atra*, ano fusco. *Fn. suec. 1014.*  
nea.  
*Habitat sub terra.*
- facina- 36. *A. hirsuta nigra*, abdomine, excepto primo segmento,  
mentis. flavo.  
*Habitat Surinami. Rolander.*
- æstivans. 37. *A. hirsuta nigra*, thorace flavo. *M. L. U.*  
*Habitat in calidis regionibus.*
- tropica. 38. *A. hirsuta nigra*, abdomine postice flavo. *M. L. U.*  
*Habitat in calidis regionibus.*
- alpina. 39. *A. hirsuta*, thorace nigro, abdomine luteo. *Faun.*  
*suec. 1016.*  
*Habitat in Lapponiæ alpibus.*

218. FORMICA. *Squamula erecta thoraci abdomi-  
nique interjecta*  
*Aculeus Feminis & Neutris re-  
conditus.*  
*Alæ Maribus & Feminis; sed*  
*Neutris nullæ.*

- hercule- 1. *F. nigra*, abdomine ovato, femoribus ferrugineis.  
ana.  
*Fn. suec. 1019. Formica magna.*



- It. gotl.* 232. Formica magna, Hippomyrmex.  
*Raj. ins.* 69. Formica maxima.  
*Habitat in Europæ truncis putridis vagabunda; in America septentrionali. Kalm.*
- rufa. 2. F. thorace compresso toto ferrugineo, capite abdomineque nigris.  
*Fn. svec.* 1020. Formica rufa.  
*Raj. ins.* 69. Formica media rubra.  
*Habitat in Europæ acervis acerosis sylvaticis; in America septentrionali. Kalm.*
- fusca. 3. F. cinereo-fusca, tibiis pallidis.  
*Fn. svec.* 1022. Formica fusca.  
*Raj. ins.* 69. Formica media, nigro colore splendens.  
*Habitat in Europæ terra sabulosa.*
- nigra. 4. F. tota nigra nitida, tibiis cinerascens.  
*Fn. svec.* 1023. Formica atra.  
*Raj. ins.* 69. Formica minor e fusco nigricans.  
*Habitat in Europæ terra.*
- obsoleta. 5. F. supra nigra, subtus testaceo rufa, abdomine subgloboso.  
*Habitat in Europæ terra.*
- rubra. 6. F. testacea, oculis punctoque sub abdomine nigris.  
*Fn. svec.* 1022. Formica rubra.  
*Raj. ins.* 69. Formica minima rubra.  
*Habitat in Europæ tuberibus graminosis.*
- Pharaonis. 7. F. rufa, abdomine magis fusco. *M. L. U.*  
*Habitat in Ægypto; minima.*
- Salomonis. 8. F. rubra, abdomine nigro subvillosa. *M. L. U.*  
*Habitat in Ægypto, Arabia, Palæstina.*
- saccharivora. 9. F. nigra, pedibus antennis maxillisque rufis.  
*Brown. jam.* 440. Formica minima saccharivora.  
*Habitat in America intra culmos sacchari nidificans eosque destruens.*  
*Corpus adpersum pilis albidis. Squama petioli crassa integra. Magnitudo F. caspitem.*

10. F.

Formicæ vivunt in societate, indefesse corradiant quisquitiæ & in ocervum Societatis congerunt; at plebecula hæc spadonum sub nuptiis inserit novis nuptis, & periculis puerperis expellit parentes, ceteri liberos pro conservatione familie.



- cæspi-  
tum. 10. F. petiolo nodis duobus alternis: posteriore majore.  
*Habitat in Europæ tuberibus.*
- omnivo-  
ra. 11. F. thorace bidentato, petiolo binodoso, corpore te-  
staceo, abdomine fusco.  
*Brown. jam. 440. Formica domestica omnivora.*  
*Habitat in America meridionali, consumens & dilace-  
rans omnia cibaria.*  
Thorax levis, adpersus punctis vix conspicuis eleva-  
tis. Abdomen fuscum, pilis albis vix manifestis.  
Petiolus nodis duobus teretiusculis. Corpus testaceum,  
*minutissimum.*
- bidens. 12. F. thoracis gibbere bidentato, capite ovato, antennis  
ferrugineis: articulo infimo nigro.  
*Habitat in America meridionali. Rolander.*  
Caput ovatum. Antenne articulo primo longo nigro,  
reliquis brevissimis ferrugineis. Thorax in medio spi-  
nis 2 obtusiusculis, brevissimis, approximatis, s. gibbe-  
re bidentato notatus.
- sexdens. 13. F. thorace sexspinoso, capite didymo, utrinque postice  
mucronato.  
*Habitat in America meridionali. Rolander.*  
Caput pone bilobum s. didymum, utrinque postice ter-  
minatum spina solitaria. Thorax a tergo spinarum  
tribus paribus armatum: quarum 2 priores antroerse et  
prominentes; media 2 minima sunt; posteriores 2 ere-  
ctæ. Petiolus Abdominis articulis duobus nodosus.
- cephalo-  
tes. 14. F. thorace quadrispinoso, capite didymo magno utrin-  
que postice mucronato.  
*Merian. surin. t. 18. f. majores.*  
*Marcgr. bras. 252. Formica magna.*  
*Habitat in America meridionali.*  
Corpus totum ferrugineo-pubescent. Caput crassissimum,  
rotundatum, postice didymum cum spina utrinque bre-  
vi. Thorax antice spinis 2 erectis, distantibus; postice  
spinis 2 erectis, approximatis. Petiolus abdominis  
tuberculis duobus, uno post alterum, notatus.
- atrata. 15. F. thorace quadrispinoso, capite depresso marginato  
utrinque bispinoso.  
*Marcgr. bras. 252. Tapiiai.*



*Habitat in America meridionali. Rolander.*

Caput obtusum, depressum, utroque latere elevato-marginatum, postice utrinque bispinatum, s. duplici aculeo munitum. Maxillæ brevissimæ. Corpus atrum. Thorax spinis 4, omnino ut in precedenti. Petiolus abdominalis tuberculis 2, uno post alterum, loco squamæ.

hæmato- 16. F. squama petiolari conica, capite subdidymo, ma-  
da. xillis porrectis rubris.

*Habitat in America meridionali. Rolander.*

Caput oblongum, depressiusculum, postice bispinatum, utroque punctis. Maxillæ 2, rectæ, parallele, prominenti, exsertæ, rubræ, edentulæ. Thorax inermis. Abdomen nigricans: Petiolo Squama corica acuta. Pedes flavi. Alæ hyalinæ. Corpus nigrum.

foetida. 17. F. gibbere petiolari transverse compresso, abdominis primo segmento contractiore, maxillis porrectis.

*Habitat in America meridionali. Rolander.*

Caput nigrum, supra punctis 3 elevatis, quod non in precedentibus americanis. Maxillæ exsertæ, longiusculæ, rectæ, parallele. Thorax inermis. Abdomen, uti pedes, pilis raris adpersum: articulo primo contractiore. Petiolus unico articulo supra tuberculo globato, antice posticeque compresso & postice transversim striato. Alæ hyalinæ.

219. MUTILLA. Alæ nullæ in omni sexu.

Corpus pubescens. Thorax postice retusus.

Aculeus reconditus punctorius.

occiden- 1. M. coccinea, abdomine cingulo nigro.

talis. Pet. mus. 404. gaz. t. 13. f. 4.

Catesb. car. 3. p. 15. t. 15.

*Habitat in America septentrionali.*

america- 2. M. nigra, abdomine maculis rufis quatuor lineisque tri-  
na. bus, albis.

*Habitat in America australi.*

An-

Genus dubium hac vetuli ob faciem, staturam & aculeum ani punctorium, quamvis  
his destituantur species cujusvis sexus.



*Antennæ subulatae, nigrae. Thorax ater, utrinque macula alba in medio, etiam macula alba utrinque in posteriore parte thoracis. Abdominis primum segmentum magnum, maculis 4 rufis, quarum 2 priores minores; reliqua segmenta maculis 3 magnis albis, unde abdomen postice lineis tribus albis longitudinalibus.*

- indica. 3. *M. nigra, abdomine fascia lutea lineaque alba. Habitat in Indiis.*
- europæa. 4. *M. nigra, abdomine fasciis tribus albis interruptis, thorace antice rufo. Uddm. diss. 98. t. 17. Apis aptera. Habitat in Europa.*
- barbara. 5. *M. nigra, abdomine punctis albis ter tribus, thorace rufo. Habitat in Mauritania. E. Brander. Maculae albae supra abdomen 3, in triplici serie transversa.*
- maura. 6. *M. nigra, abdomine maculis tribus albis. Habitat in Mauritania. E. Brander. Præcedenti minor, tota nigra, sed maculae supra abdomen albae: una parva ad basin; una ad apicem; duæ paulo majores ad latera in medio abdominis.*
- Acarorum. 7. *M. glabra rufa, capite abdomineque postico nigro. Habitat inter Acaros. Hæc differt a reliquis quod glabra nec tomentosa sit, & videtur potius Sphex aptera esse; segmentum 1, 2 abdominis rufa, reliqua nigra.*
- formicaria. 8. *M. glabra rufa, capite abdomineque pubescente nigris. Habitat in Europa. D. C. Soander. Præcedenti duplo major. Abdomen totum nigrum & parum villosum.*



## VI. DIPTERA.

*Alæ duæ.*

*Halteres clavati, solitarii, pone singulam alam, sub squamula propria.*

220. OESTRUS. Os absque proboscide aut rostro exserto.

Bovis. 1. OE. alis maculatis, thorace flavo fascia fusca, abdomine flavo apice nigro. *Fn. suec. 1024. It. Wgot. 202.*

*Raj. inf. 271.*

*Derham theolog. l. 8. c. 6. n. 11.*

*Vallisn. nat. 1. t. 28.*

*Reaum. inf. 4. t. 36-38.*

*Habitat intra Boum dorsum.*

*Hoc illud insectum - cui nomen Asilo*

*Romanum est, Oestrum graeci vertore vocantes,*

*Asper, acerba sonans, quo toto exterrita silvis*

*Diffugiunt armenta.*

Tarandi. 2. OE. alis immaculatis, thorace flavo fascia nigra, abdomine fulvo apice flavo. *Fn. suec. 1029.*

*Flor. lapp. 360. n. 517.*

*Linn. Act. Stockh. 1739. t. 3. f. 5, 6.*

*Act. Upsal. 17. . .*

*Habitat intra Cervi Tarandi dorsum.*

*Hujus causa Lappones quotannis cum grege migrant e Lapponia sylvatica in Alpes lapponicas.*

nasalis. 3. OE. alis immaculatis, thorace ferrugineo, abdomine nigro pilis flavis. *Fn. suec. 1026.*

*Habitat in Equorum fauce, per nares intrans.*

hæmor. 4. OE. alis immaculatis, thorace nigro: scutello pallido,  
rhoidalis. abdomine nigro: basi albo apiceque fulvo.

*Fn. suec. 1028.*

*Frisch. inf. 5. t. 7.*

*Reaum. inf. 4. t. 35. f. 3-5.*

*Habitat in Equorum intestino recto, mire per anum intrans.*

5. OE.

---

*Oestri Larvæ latent intra Mammalium corpus, ubi per totam hyemem nutriuntur.*



- Ovis. 5. OE. alis immaculatis, thorace abdomineque ferrugineo nigro-maculato. *Fn. svec.* 1027.  
*Vallisn. nat.* 1. p. 224. t. 27.  
*Reaum. inf.* 4. t. 35. f. 21-24.  
*Habitat in Ovium sinu frontis.*

221. TIPULA. Os capitis elongati labiis lateralibus instructum Palpisque duobus incurvis tectum, absque proboscide & rostro.

\* *Alis patentibus.*

- pectini-cornis. 1. T. antennis pectinatis, alis macula nigra, thorace flavescente.  
*Habitat in Svecia.*  
*Antennæ pectinatae radiis oppositis, sed in altero sexu intra singularem par radiorum mucro capitatus solitarius, in altero geminus.*
- rivosa. 2. T. alis hyalinis rivulis fuscis maculaque nivea. *Faun. svec.* 1121.  
*Act. Stockh.* 1739. t. 9. f. 8. *Raj. inf.* 72. n. 4.  
*Habitat in Europa.*
- crocata. 3. T. alis macula fusca, abdomine atro fasciis fulvis.  
*Fn. svec.* 1123.  
*Raj. inf.* 72. n. 4.  
*Reaum. inf.* 5. t. 1. f. 14, 15, 16.  
*Habitat in Europa.*
- oleracea. 4. T. alis hyalinis costa marginali fusca. *Fn. svec.* 1124.  
*Gæd. inf.* 2. t. 44. *Braal. nat.* t. 25. f. 3.  
*List. gæd.* f. 139. *Frisch. inf.* 4. t. 12.  
*Leuwenh. nat.* 1693. f. 4. 5.  
 1714. f. 4.  
*Habitat in Europa ad radices plantarum, oleribus & plantis cultis infesta.*
- hortorum. 5. T. alis hyalinis: maculis sparsis albis obsoletis. *Faun. svec.* 1125.  
*Raj. inf.* 72. n. 6. *Alb. inf.* t. 61.  
*Habitat in Europa.*



- variega- 6. T. alis hyalinis: macula pallida obsoleta, corpore ni-  
ta. gro luteoque vario. *Fn. suec.* 1131.  
*Habitat in Europa.*
- contami- 7. T. alis nigro maculatis, corpore nigro. *Fn. suec.* 1134.  
nata. *Habitat in Europa.*
- lunata. 8. T. alis cinerascens: lunula marginali alba. *Faun.*  
*suec.* 1126.  
*Raj. inf.* 73. n. 10. *Reaum. inf.* 5. t. 2. f. 11.  
*Habitat in Europa.*
- pratensis. 9. T. alis subcinereis: vasis fuscis punctoque marginali  
obscuro, fronte fulva. *Fn. suec.* 1128.  
*Frisch. inf.* 4. t. 12.  
*Habitat in Europa.*
- terrestris. 10. T. alis hyalinis puncto marginali fusco, abdominis  
dorso cinereo. *Fn. suec.* 1129.  
*Frisch. inf.* 7. t. 22.  
*Habitat in Europa.*
- cornici- 11. T. alis hyalinis puncto marginali fusco, abdomine fla-  
na. vo lineis tribus fuscis. *Fn. suec.* 1130.  
*Habitat in Europa.*
- nigra. 12. T. alis fuscis, corpore atro. *Fn. suec.* 1132.  
*Habitat in Europa.*
- atrata. 13. T. alis hyalinis puncto marginali corporeque atro,  
ventre pedibusque rufis. *Fn. suec.* 1127.  
*Habitat in Larvis P. Vinulæ? Clerck.*
- macula- 14. T. alis hyalinis maculis duabus fuscis, abdominis me-  
ta. dio maculato-ferrugineo.  
*Habitat in Europa.*
- annulata. 15. T. alis fusco variegatis, femoribus annulo albo. *Fn.*  
*suec.* 1122.  
*Reaum. inf.* 5. t. 4. f. 1, 2.  
*Habitat in Europa.*
- flave- 16. T. alis immaculatis, corpore flavo, dorso fusco. *Fn.*  
scens. *suec.* 1133.  
*Habitat in Europa.*



- regela- 17. T. alis hyalinis nitentibus, corpore cinereo fusco.  
tionis. *Habitat in Europæ terrestribus, primo vere frequens.*
- replicata. 18. T. alis hyalinis maxime tenuiore recurvato, corpore  
fusco, antennis simplicibus. *De Geer Act. Upsal.*  
*Habitat in Europa.*
- \* \* *Alis incumbentibus.*
- plumosa. 19. T. thorace virescente, alis hyalinis puncto nigro. *Fn.*  
*svec. 1135.*  
*It. æland. 40, 41, 86, 160.*  
*Gæd inf. 3. t. X.*  
*List. gæd. f. 140.*  
*Reaum. inf. 5. t. 5. f. 10.*  
*Habitat in Europa, maxime in maritimis.*
- littoralis. 20. T. virescens alis immaculatis, pedibus anticis lon-  
gissimis. *Fn. svec. 1136. 1140.*  
*Reaum. inf. 5. t. 6. f. 12, 13, 14.*  
*Habitat in Europæ maritimis.*
- motatrix. 21. T. pedibus anticis maximis motatoriis, annulo albo.  
*Frisch. inf. 11. t. 13.*  
*Habitat in Europa.*
- vibrato- 22. T. pedibus anticis maximis motatoriis apice albis. *Fn.*  
ria. *svec. 1138.*  
*It. æl. 160.*  
*Habitat in Europa.*
- tremula. 23. T. pedibus anticis longissimis motatoriis nigris annulis  
albis.  
*Habitat Upsaliæ. T. Bergman.*  
*Alæ hyalinæ immaculatæ. Thorax pallidus maculis tri-*  
*bus nigris longitudinalibus. Abdomen flavo-rubrum.*  
*Oculi nigri. Antennæ pilosæ.*
- monilis. 24. T. pedibus albis annulis novem nigris, alis albo cine-  
reoque variis. *Fn. svec. 1139.*  
*Habitat in Europa.*
- macroce- 25. T. corpore virescenti, oculis thoracisque tergo nigris.  
phala. *Fn. svec. 1141.*  
*Habitat in litoribus humidis, agilissima.*



- Marci. 26. *T. nigra glabra, alis nigricantibus, femoribus anticis introrsum sulcatis. Fn. suec. 1143.*  
*Reaum. ins. 5. t. 7. f. 17, 18.*  
*Habitat in fimetis & Terra pragnante primo vere.*
- brevicor- 27. *T. nigra glabra, oculis margine nigricantibus, femo- nis. ribus tibiisque anticis spina terminatis.*  
*Habitat in Europæ umbrosis.*
- putris. 28. *T. fusca, alarum basi cinerea. Fn. suec. 1144.*  
*Frisch. ins. 4. t. 2.*  
*Habitat in Terra pragnante, primo vere.*
- febrilis. 29. *T. atra oblonga hirta, alis nigricantibus. Fn. suec. 1145.*  
*Gœd. ins. 1. t. 6. Pet. gaz. t. 14. f. 4.*  
*List. gœd. f. 108. Reaum. ins. 5. t. 7. f. 7-12?*  
*Habitat in locis suffocatis.*
- florilega. 30. *T. atra holoserica. Fn. suec. 1146.*  
*Habitat in Pomonæ floribus, quos destruit.*
- Hortula- 31. *T. alis albis margine nigro, thorace abdomineque ru- na. bro. Fn. suec. 1147.*  
*Habitat in Asparago & Pomonæ floribus, quorum pestis est.*
- phalænoi- 32. *T. alis deflexis cinereis ovato-lanceolatis ciliatis. Fn. des. suec. 1148.*  
*Leuw. epist. 1692. jan. 24. f. 2, 3. Frisch. ins. 11. t. 11.*  
*Habitat in Parietibus ad sterquiliniam.*
- notata. 33. *T. atra, alis albis, abdomine latere antice macula alba. Fn. suec. 1149.*  
*Habitat in Europa.*
- Juniperi- 34. *T. alis incumbentibus glaucis: margine tenuiore vil- na. lofo. Fn. suec. 1150.*  
*Habitat in Juniperi triglochide, quam caussat.*
- palustris. 35. *T. atra, abdomine rufescente. Fn. suec. 1151.*  
*Habitat in Europæ paludosis.*
- longicor- 36. *T. antennis corpore incarnato longioribus. Fn. suec. nis. 1152.*  
*Habitat in Europa.*



pinnicor- 37. T. antennis bipectinatis, corpore atro, halteribus albis.  
nis. *Habitat in Svecia.*  
*Pulice minor, angusta. Thorax aterrimus.*

222. MUSCA. Os Proboscide carnosa: labiis 2 lateralibus: Palpi nulli.

\* *Filatae Antennis simplicibus absque filo laterali.*

plebeja. 1. M. antennis filatis subulatis, corpore cinereo hirsuto, abdominis incisuris margine albidis.  
*Habitat in Europa.*

illucens. 2. M. antennis filatis clavatis, alis cæruleis, corpore nigro, abdominis segmento secundo lateribus pellucido.  
*Habitat in America australi. Mus. De Geer.*  
*Antennæ longæ nigrae. Abdominis segmentum secundum glaucum, lateribus pellucidum.*

chamæ- 3. M. antennis filatis clavatis, scutello bidentato luteo, leon. abdomine nigro: falcibus lateralibus luteis.  
*Fn. svec. 1083, 1029. Frisch. inf. 5. t. 10.*  
*It. wgoth. 84. Reaum. inf. 4. t. 25.*  
*Gæd. inf. 1. t. 70. Ræf. inf. musc. 2. t. 5.*  
*Swamm. metam. t. 4.*  
*bibl. t. 42. f. 2.*  
*Habitat Larva in Aquis dulcibus.*  
*Musca supra aquam obambulare solet.*

micro- 4. M. antennis filatis clavatis, scutello bidentato nigro, leon. abdomine atro: strigis lateralibus albis.  
*Habitat in Europa.*

hydro- 5. M. antennis filatis clavatis, scutello bidentato nigro, leon. abdomine viridi, medio nigro angulato.  
*Habitat in Europa.*

6. M.

---

Musca distinguntur antennis inermibus l. armatis.

Filatae antennis absque seta aut pluma laterali.

Armatae antennis cum seta aut pluma laterali.

- Tomentosa corpore pubescente, saepe via manifeste.
- - Plumatis antennis pectinatae.
- - Setariis antennis simplici seta.
- Pilosa raris setis, imprimis in thorace conspicuis.
- - Plumatis antennis.
- - Setariis antennis.



- pantherina. 6. M. antennis filatis, corpore atro, abdomine dorso maculis tribus, marginalibus totam circumferentiam albis.  
*Habitat in Svecia.*  
*Similis M. H. ... sed scutellum integrum. Antennae clavatae breves. Corpus nudum. Abdomen depressum, marginatum; incisuris margine medio albis & margine laterali.*
- Morbo. 7. M. antennis filatis subulatis, corpore limbo atro, alis dimidiato-nigris.  
*Fn. svec. 1067.*  
*Reaum. inf. 6. t. 27. f. 13.*  
*Aldr. inf. t. 2. f. 13.*  
*Habitat in Europa.*
- Maura. 8. M. antennis filatis subulatis, corpore limbo at fasciato, alis nigro variis.  
*Habitat in Europa.*
- Flottentotta. 9. M. antennis filatis subulatis, corpore limbo at fasciato, alis costa fuscis.  
*Habitat in Europa.*
- Scolopacea. 10. M. antennis filatis apice setigeris, abdomine trifariam nigro-punctato, alis unicoloris.  
*Fn. svec. 1066.*  
*Reaum. inf. 4. t. 10. f. 5, 6.*  
*Habitat in Europa.*
- Vermileo. 11. M. antennis filatis apice setigeris, abdomine trifariam nigro-punctato, thorace maculato, alis immaculatis.  
*De Geer act. Stockh. 1752. p. 180, 260. t. 5.*  
*Habitat in Gallia arenae moerit.*
- tringaria. 12. M. antennis filatis apice setigeris, abdomine trifariam nigro-punctato, thorace unicolore, alis immaculatis.  
*Habitat in Svecia.*  
*Similis priori, a qua differt thorace cauto, nec arotunculis fuscis longitudinalibus natis.*
- Conoploides. 13. M. antennis clavatis mucronatis basi coadunatis, corpore atro, abdominis cingulis tribus flavis.  
*Reaum. inf. 4. t. 33. f. 12, 13.*  
*Habitat in Europa.*  
*Similium Muscae macrocephale.*



\* \* *Tomentosæ plumatæ.*

bomby- 14. M. antennis plumatis tomentosa nigra, abdomine hir-  
lans. suto postice rufo.  
*Habitat in Europa.*

mystacea. 15. M. antennis plumatis tomentosa nigra, thorace ab-  
dominis apice alarumque basi fulvis. *Faun. suec.*  
1069.  
*Fn. suec. 1071. femina.*  
*Habitat in Europa.*

lappona. 16. M. antennis plumatis subtomentosa nigra, scutello fer-  
rugineo, abdomine cingulis tribus albidis interruptis.  
*Habitat in Svecia. D. C. Solander.*

\* \* \* *Tomentosæ setariæ.*

pendula. 17. M. antennis setariis tomentosa, thorace lineis quatuor,  
abdomine fasciis tribus interruptis flavis. *Faun. suec.*  
1081.  
*Frisch. inf. 4. t. 13. Reaum. inf. 4. t. 31. f. 9-11.*  
*Habitat in aquis stagnantibus; Larva tubo juniperi re-  
spiratorio suspendenda.*

florea. 18. M. antennis setariis tomentosa, thorace fasciis duabus  
inæqualibus nigris, abdomine duabus luteis interruptis.  
*Fn. suec. 1080*  
*Alb. inf. t. 17. f. 1.*  
*Habitat in Europa.*

nemo- 19. M. antennis setariis tomentosa, abdomine segmento  
rum. luteo cingulisque tribus albis, segmento primo lateri-  
bus luteo.  
*Fn. suec. 1078. Mer. eur. t. 2.*  
*Reaum. inf. 3. t. 31. f. 8. Alb. inf. t. 3. f. M. L.*  
*Habitat in Europa.*

arbus- 20. M. antennis setariis tomentosa, thorace griseo, abdo-  
rum. mine subfusco: segmento primo secundoque latere  
ferrugineis.  
*Habitat in Europa, sicillina insejventi.*

tenax. 21. M. antennis setariis, tomentosa, thorace griseo abdo-  
mine subfusco unicolore, tibiis posticis compresso-  
gibbis.



*Fn. svec.* 1072.

*Goed. inf.* 1. t. 2.

*Swamm. bibl.* t. 38. f. 9.

*List. goed.* t. 126.

*Reaum. inf.* 4. t. 20. f. 7.

*Raj. inj.* 272.

*Blank. inf.* t. 10. f. F.

*Habitat in fimetis, cloacis, aquis putrescentibus, vix prelo destruenda larva.*

intricaria. 22. *M.* antennis setariis tomentosa lutescens, abdominis apice albido, genubus albis.

*Habitat in Europa.*

*Similis Muscæ discolori.*

æstracea. 23. *M.* antennis setariis tomentosa nigra, scutello albido, abdominis apice lutescente.

*Fn. svec.* 1070.

*Habitat in Europa.*

fallax. 24. *M.* antennis setariis fusca, fronte flava, abdominis apice tomentoso fulvo, squama halterum lactea.

*Habitat in Europa.*

*Similis externa facie antecedenti.*

lucorum. 25. *M.* antennis setariis subtomentosa, thorace subgriseo, abdomine nigro: segmento primo toto flavo.

*Habitat in Europa.*

lyivarum. 26. *M.* antennis setariis, tomentosa nigra, abdominis ultimo segmento tomentoso flavo.

*Habitat in Europa.*

bicincta. 27. *M.* antennis setariis elongatis nigra, thorace lateribus punctis, abdomineque cingulis duobus flavis.

*Habitat in Europa.*

*Abdomen glabrum ut sequentis; fascia prior interrupta.*

arcuata. 28. *M.* antennis setariis elongatis nigra, thorace lateribus maculis, abdomine cingulis quatuor arcuatis flavis.

*Habitat in Europa.*

*Scutellum flavum macula nigra; Abdomen glabrum.*

*Thorax nudiusculus subtomentosus.*

mutabilis. 29. *M.* antennis setariis elongatis tomentosa, abdomine nigro griseoque mutabili, scutello ferrugineo, thorace immaculato.

*Habitat in Europa.*



- ichneu- 30. M. antennis seta ii. elongatis cylindricis, thorace pe-  
monea. dibusque longioribus ferrugineis, abdomine cinereo.  
*Habitat in Europa, similis Lebeumoni.*
- diophthal- 31. M. antennis setariis nuda, thorace maculis, abdomine  
ma. cingulis sex flavis, femoribus posticis dentatis.  
*Habitat in Europa.*  
*Nigra. Oculi fascia fusca perpendiculari; Pedes ferru-  
ginei. Femora postica subtus denticulo. Scutellum fer-  
rugineum post lunulam flavam. Maculae 14 flavæ tho-  
racis.*
- vespifor- 32. M. antennis setariis nuda, thorace maculis, abdomine  
mis. cingulis sex flavis, pedibus anticis nigris.  
*Habitat in Europa.*  
*Abdominis fasciæ posticæ per paria dorso uniuntur. Pedes  
ferruginei femoribus muticis. Scutellum nigrum.*
- festiva. 33. M. antennis setariis nuda, thorace lineis lateralibus, ab-  
domine cingulis quatuor flavis interruptis.  
*Habitat in Europa.*  
*Pedes flavi.*
- erratica. 34. M. antennis setariis nudiuscula, thorace immaculato  
scutello ferrugineo, abdomine cingulis tribus albidis.  
*Habitat in Europa.*
- glaucia. 35. M. antennis setariis subtomentosa, thorace immaculato,  
scutello glauco, abdomine cingulis tribus albidis in-  
terruptis.  
*Habitat in Europa.*  
*Corpus nigrum; fascia prima abdominis baseos latior est  
& fere pellucida.*
- noctilu- 36. M. antennis setariis subtomentosa atra, abdominis pri-  
ca. mo segmento maculis duabus pellucidis.  
*Habitat in Europa.*
- gibbosa. 37. M. antennis setariis subtomentosa nigra, abdomine sub-  
globoso cingulis quatuor albis, squamis halterum buc-  
catis.  
*Habitat in Svecia.*
- Ribesi. 38. M. antennis setariis nigra nudiuscula, thorace inma-  
culato, abdomine cingulis quatuor flavis: primo in-  
terrupto.



*Fn. svec.* 1089.

*Gœd. inf.* 1. t. 41.

*List. gœd.* t. 133.

*Habitat inter Aphides Ribeos.*

Pyrastris. 39. *M.* antennis setariis nigra nudiuscula, thorace immaculato, abdomine bis tribus lunulis flavis recurvatis.

*Fn. svec.* 1090.

*Gœd. inf.* 1. t. 47. larva.

*Frisch. inf.* 11. t. 22. f. 1. *List. gœd.* t. 134.

*Reaum. inf.* 3. t. 31. f. 9. *Blank. inf.* t. 10. f. P.

*Alb. inf.* t. 66.

*Habitat inter Aphides Pyri.*

transfuga. 40. *M.* antennis setariis nigra, abdomine cylindrico tomentoso lunulis bis tribus albidis recurvis. *Fn. svec.* 1094.

*Habitat in Svecia rarior; olim lecta, nec dein a me in Svecia reperta.*

Menthastris. 41. *M.* antennis setariis nigra nuda, thorace maculato, abdomine cingulis quatuor scutelloque flavis.

*Fn. svec.* 1097.

*Habitat inter Aphides, at Musca in Menthæ floribus mellisuga.*

scripta. 42. *M.* antennis setariis nudiuscula, thorace lineis, scutello abdomineque lineari fasciis flavis.

*Fn. svec.* 1091.

*Reaum. inf.* 4. t. 10. f. 2, 3.

*Rœs. inf.* 2. musc. t. 6.

*Habitat inter Aphides, at Musca in floribus.*

mellina. 43. *M.* antennis setariis nuda, thorace subæneo fuscescente immaculato, abdomine maculis 8 lutescentibus,

*Fn. svec.* 1092, 1093.

*Habitat inter Aphides, quibus victitat.*

*Variat abdominis dorso 4, 3, & 2 paribus macularum ferruginearum: iisque l. tetragonis, l. trigonis, l. rotundis.*

pipiens. 44. *M.* antennis setariis glabra nigra, abdomine utrinque albo maculato, femoribus posticis clavatis dentatis.

*Fn. svec.* 1096.

*Habitat in Europa, volitat frequens ad flores Menthæ aliosque.*

45. *M.*

---

*Aphidivore Muscæ 38-45 sunt, quarum Larvæ foliis impositæ Aphidibus victitant, vi: e loco moventur, & solo rostro, tanquam totum corpus proboscide consistat, aphides inquirunt, legunt. consumunt.*



segnis. 45. M. antennis setariis glabra, thorace f. aeneo, abdomine ferrugineo: apice nigro, femoribus posticis clavatis.

*Habitat in Europa.*

femora- 46. M. antennis setariis glabra atra oblonga, femoribus posticis clavatis, pedibusque anticis rubris.

*Habitat in Europa.*

\* \* \* \* *Pilosa plumata.*

segnis. 47. M. antennis plumatis pilosa flavescens, abdomine pellucido cingulis duobus nigris.

*Habitat in Europa.*

*Summa sequenti, sed Thorax niger villosus-flavus. Abdomen pellucidum, flavum, cingulis duobus nigris & ano nigro. Rostrum utriusque cornuum gibbrum. Alæ absque fascia.*

pellucens. 48. M. antennis plumatis pilosa nigra, abdominis segmento primo albo-pellucido.

*Fn. suec. 1073.*

*Raj. inf. 271.*

*Habitat in Europa.*

meridiana. 49. M. antennis plumatis pilosa nigra, fronte aurata, alis basi luteis. *Fn. suec. 1077.*

*Habitat in Europa.*

Cæsar. 50. M. antennis plumatis pilosa viridi-nitens, pedibus nigris. *Fn. suec. 1098.*

*Raj. inf. 272.*

*Monff. inf. t. 49.*

*Habitat in Cadaveribus.*

cadaverina. 51. M. antennis plumatis pilosa aeneo-nitens: thorace cæruleo, abdomine viridi. *Fn. suec. 1099.*

*Gœd. inf. 1. t. 54.*

*List. gœd. f. 123.*

*Habitat in Cadaveribus.*

Vomitoria. 52. M. antennis plumatis pilosa, thorace nigro, abdomine cæruleo nitente. *Fn. suec. 1102.*

*Gœd. inf. 1. t. 53.*

*Reaum. inf. 4. t. 8. f. 1.*

*List. gœd. f. 122.*

*t. 19. f. 8.*

*Raj. inf. 27.*

*t. 24. f. 13, 15.*

*Lyonet. less. t. 1. f. 23, 27.*

*Habitat in Cadaveribus; etiam Americæ. Kalm.*



- carnaria.** 53. M. antennis plumatis pilosa nigra, thorace lineis pallidioribus, abdomine nitidulo tessellato: major.  
*Fn. suec.* 1105. *Frisch. inf.* 7. t. 14.  
*Aldr. inf.* 348. t. 2. f. 16. *Reaum. inf.* 4. t. 29. f. 4-6.  
*Fonst. inf.* t. 8. O. 2. f. 16. *Raj. inf.* 2. musc. t. 9, 10.  
*Raj. inf.* 270.  
*Habitat in Cadaveribus Europæ, etiam Americæ. Kalm.*
- domesti-** 54. M. antennis plumatis pilosa nigra, thorace lineis 5 ob-  
**ca.** soletis, abdomine nitidulo tessellato: minor.  
*Fn. suec.* 1106. *Joblet. micr.* 1. pp. t. 5.  
*Aldr. inf.* t. 2. f. 23. *Raj. inf.* 270.  
*Habitat in Europæ domibus, etiam Americæ.*  
*Larvæ in fimo Equino: Pupæ parallele cubantes.*
- sepul-** 55. M. antennis plumatis pilosa nigra, abdomine atro ni-  
**chralis.** tidulo: supra glaberrimo.  
*Habitat in Europæ.*  
*Statura Muscæ domesticæ, sed tota atra; alter sexus se-  
ta non pilosa.*
- \* \* \* \* \* *Pilosa setaria.*
- grossa.** 56. M. antennis setariis pilosa nigra, alis basi ferrugineis.  
*Reaum. inf.* 4. t. 26. f. 10.  
*Habitat in Stercore bovino.*  
*Similis M. meridiana, sed major omnibus nostris muscis.*
- rotunda-** 57. M. antennis setariis pilosa, thorace sublineato, abdo-  
**ta.** mine tubrotundo flavo: maculis longitudinalibus fuscis  
confertis.  
*Habitat in Europæ.*  
*Maculæ 5 dorsales, in altero sexu distantes, in altero  
contiguæ.*
- Larva-** 58. M. antennis setariis pilosa nigricans, thorace cinereo,  
**rum.** abdomine pallidius tessellato.  
*De Geer inf.* 1. t. 11. f. 23.  
*Habitat in Larvis Lepidopterorum.*  
*Similis M. domesticæ, sed thorax vix lineatus.*
- Radi-** 59. M. antennis setariis pilosa, abdomine cinereo: linea  
**eum.** dorsali cingulisque quatuor nigris.  
*Habitat in radicibus Raphani. Rolander.*  
*Similis M. domesticæ, sed dimidio minor, angustior.*



- lateralis. 60. M. antennis setariis pilosa nigricans, abdominis lateribus ferrugineis.  
*Habitat in Europa.*
- Cemite- 61. M. antennis setariis pilosa nigra, abdomine supra-  
riorum. glabro.  
*Habitat in Europa.*  
*Similis M. sepulchraii, sed paulo minor.*
- pluvialis. 62. M. antennis setariis pilosa cinerea, thorace maculis quinque nigris, abdomine maculis tridentatis obsoletis.  
*Fn. svec. 1112.*  
*Habitat in Europa.*
- fenestra- 63. M. antennis setariis subpilosa atra, abdomine supra ru-  
lis. goso strigis albis.  
*Habitat in Europa, frequens in fenestris.*
- roralis. 64. M. antennis setariis pilosa aterrima.  
*Habitat in Europa.*
- ferrata. 65. M. antennis setariis pilosa fusca, alarum costa pilis brevissimis ferrata, abdomine pedibusque ferrugineis.  
*Habitat in Europa.*
- cellaris. 66. M. antennis setariis pilosa nigra, alis nervosis, oculis ferrugineis. *Fn. svec. 1111.*  
*Habitat in cellis vinariis aliisque.*
- meteori- 67. M. antennis setariis pilosa nigra, abdomine subcinereo,  
ca. alis basi subflavis, oculis brunneis.  
*It. wgoth. 37.*  
*Habitat in Europa, nebule instar, ingruente imprimis pluvia, ora Equorum obvolvantis. Aman. acad. 3. p. 358.*
- putris. 68. M. antennis setariis subpilosa atra, alarum costa nigra oculis ferrugineis.
- casei. *α. Fn. svec. 1110.*  
*β. Fn. svec. 1109.* *Gæd. inf. 1. t. 73.*  
*Mer. eur. t. 43. f. 83.* *Lisi. gæd. t. 132.*  
*Frisch. inf. 1. t. 7.*  
*Habitat α in Fimeticis, β in Caseo.*  
*Hæ tres species adeo affines, ut difficulter distinguantur.*



- Frit. 69. *M. antennis setariis pilosa nigra, halteribus plantis posticis abdomineque virescenti-pallidis.*  
*Linn. act. Stockh. 1750. p. 128.*  
*Habitat in glumis Hordei, decimum quodque granum Hordeaceum apud nos destruens.*
- Lepræ. 70. *M. antennis setariis atra nitens, antennis pedibusque albis, oculis rufo inauratis.*  
*Habitat in Elephantiali Nigritarum Americae. Rolander.*  
*Corpus pediculo minus. Abdomen subtus & basi album.*  
*Denticulus utrinque ad basin proboscidis.*
- cupraria. 71. *M. antennis setariis glabra ænea, thorace viridi, abdomine cupreo oblongo: halteribus nudis.*  
*Fn. Jvec. 1103.*  
*Reaum. inf. 4. t. 22. f. 7, 8.*  
*Habitat in Europa.*
- polita. 72. *M. antennis setariis glabra ænea, capite viridi, thorace abdomineque caruleis, halteribus nudis.*  
*Habitat in Europa*  
*Variat colore viridi & cæruleo.*
- viduata. 73. *M. antennis setariis glabra unda æneo-nigra, abdomine caruleo: cornu unico, squamis halterum ciliatis.*  
*Habitat in Europa.*
- pubera. 74. *M. antennis setariis pilosa nigra, abdominis ultimo segmento incurvato: pube utrinque reflexa.*  
*Habitat in Europa.*
- Petronella. 75. *M. antennis setariis pilosa glabra livida, fronte rubra, cauda incurvata, pedibus elongatis testaceis.*  
*It. wgoth. 55.*  
*Habitat ad aquas, cursitans musca supra aquas quietas.*
- ungulata. 76. *M. antennis setariis pilosa glabra æneo-viridis, cauda uncinata, pedibus elongatis pallidis.*  
*Fn. Jvec. 1053.*  
*Habitat in Europa.*
- æquinoctialis. 77. *M. antennis setariis glabra nigra, capite testaceo, oculis brunneis, pedibus elongatis.*  
*Habitat in America meridionali. Mus. De Geer.*



- cibaria. 78. *M. antennis setariis lævis, vertice punctis tribus elevatis, abdomine cinereo adunco, pedibus elongatis. Habitat in Culinis & in cibariis antiquis.*
- scybalaria. 79. *M. antennis setariis pilosa rufo-ferruginea hirta, alis puncto obscuriore. Habitat in Stercore. Similis M. stercorarie sed duplo major, & saturatius colorata.*
- stercoraria. 80. *M. antennis setariis pilosa grisea hirta, alis puncto obscuriore. Fn. svec. 1068. Reaum. inf. 4. t. 27. f. 1-3. Habitat in Stercore.*
- simetaria. 81. *M. antennis setariis pilosa livens glabrata, alis puncto obscuriore. Habitat in Eurôpa.*
- parietina. 82. *M. antennis setariis, alis fuscis albo punctatis maculatisque, fronte testacea. Habitat in Europa.*
- umbrarum. 83. *M. antennis setariis, alis fuscis albo maculatis, fronte nivea. Habitat in Europa.*
- grossificationis. 84. *M. antennis setariis, alis nigris apice albis. Fn. svec. 1051. Habitat in Europa, rarius.*
- saluum. 85. *M. antennis setariis, alis albis costa punctoque terminali fuscis, corpore flavo, occipite nigricante. Habitat in Europa.*
- vibrans. 86. *M. antennis setariis pilosa, alis hyalinis apice nigro, capite rubro. Fn. svec. 1052. Habitat in Europa, ubique vibrans alas.*
- cynipsea. 87. *M. antennis setariis, alis apice puncto nigro, abdominis primo articulo obovato. Fn. svec. 1054. Habitat in Europa. Femora antica subtus denticulata sunt.*



- flava. 88. M. antennis setariis flava nuda, oculis viridissimis.  
*Fn. suec. 1114.*  
*Habitat in Europa; vix Pediculo major.*
- æstuans. 89. M. antennis setariis, alis unguiculatis albis puncto  
 centrali nigricante. *Fn. suec. 1055.*  
*Habitat in Europa.*
- Serratu- 90. M. antennis setariis, alis albis, thorace virescente, ab-  
 læ. domine cinereo lineis quatuor punctorum nigrorum.  
*Habitat in Cardui & affinium floribus.*
- Arnicæ. 91. M. antennis setariis, alis unguiculatis griseis nigro ma-  
 culatis.  
*Fn. suec. 1057.* *Aldr. inf. 346. t. 1. f. 5.*  
*Habitat in discis florum radiorum, imprimis Arnices  
 montanæ.*
- Hyoscy- 92. M. antennis setariis, alis unguiculatis albis fusco ma-  
 ami. culatis.  
*Fn. suec. 1058*  
*Habitat in Hyoscyamis, Carduis.*
- germina- 93. M. antennis setariis, alis albis margine maculisque ni-  
 tionis. gris. *Fn. suec. 1059.*  
*Habitat in Foliis arborum, frequens primo vere.*
- Urticæ. 94. M. antennis setariis, alis albis puncto terminali fasciis-  
 que tribus fuscis distinctis.  
*Habitat in Urtica.*
- Cerasi. 95. antennis setariis, alis albis: fasciis fuscis inæqualibus:  
 posticis exterius connexis.  
*Fn. suec. 1061.*  
*Blank. inf. t. 16. f. L.*  
*Red. vivent. 264.*  
*Reaum. inf. 2. t. 38. f. 22, 23.*  
*Habitat in Cerasorum nucleis.*
- Heraclii. 96. M. antennis setariis, alis albis: fasciis fuscis repandis,  
 oculis viridibus.  
*Habitat in foliis Heraclii; subcutanea.*
- Cardui. 97. M. antennis setariis, alis albis: linea geminata fusca S  
 literæ figura, oculis viridibus. *Fn. suec. 1063.*







- fervens. 5. T. oculis viridibus, abdomine antennisque luteis, capite thoraceque fusco.  
*Habitat in America australiore.*
- mexicana- 6. T. oculis . . . , corpore livido, antennis viridibus, alis  
nus. virescentibus punctis anastomofantibus.  
*Habitat in America meridionali. Rolander.*
- Bromius. 7. T. oculis fascia unica purpurascente, corpore cinerascente. *Fn. suec. 1048.*  
*Habitat in Europa.*
- occidentalis. 8. T. oculis fasciis binis fuscis, corpore fusco, abdomine lineis tribus fulvis.  
*Habitat in America meridionali. Læfing.*
- tropicus. 9. T. oculis fasciis ternis fuscis, abdominis lateribus ferrugineis. *Fn. suec. 1047.*  
*Habitat in Europa, Equis instante pluvia molestus.*
- antarcticus. 10. T. oculis fasciis quaternis fuscis, scutello macula nigra, tibiis anticis albis.  
*Habitat in America calidiore. Rolander.*  
*Dorsum abdominis notatum maculis albis.*
- pluvialis. 11. T. oculis fasciis quaternis undatis, alis fusco punctatis.  
*Fn. suec. 1050. Reaum. inf. 4. t. 18. f. 1.*  
*Habitat in Europa.*
- cæcutiens. 12. T. oculis nigro-punctatis, alis maculatis.  
*Fn. suec. 1049.*  
*Habitat in Europa.*

## 224. CULEX. Os aculeis setaceis intra vaginam flexilem.

- pipiens. 1. C. cinereus, abdomine annulis fuscis octo. *Fn. suec. 1116.*  
*Fl. lapp. 363. 364.*  
*Blank. inf. t. 15. f. A-D.*  
*Reaum. inf. 4. t. 43, 44.*  
*Swamm. quart. t. 23.*  
*bibl. t. 31. f. 4-8. t. 32. f. 1-5.*

*Joblot.*



Joblot. *micr.* 1. pp. 2. t. 13. f. A. B. C. D. E. II  
I. L.

β. Kalm. *itin.* 2. p. 268. Musquetoés.

*Habitat in Europæ arctis; communissima in Lapponia; etiam in America obvia. Kalm.*

*Nas antennis plumosus vix pungit aut sagit sanguinem. Larva in Aquis; pupa bicornis reversa; Insectum pipiens, puerens: in talis m. is venerata. sineseres allicit. pullos Gallinarum nutrit Lapponum calamitas felicissima.*

bifurca- 2. C. fuscus, rostro bifurco. *Fa. suec.* 1115.

tus: *Raj. inf.* 74. n. 4.

*Reaum. inf.* 4. t. 40. f. 1, 2.

*Habitat in Europa.*

pulicaris. 3. C. alis hyalinis: maculis tribus obscuris. *Faun. suec.* 1117.

*Fl. lapp.* 365.

*Derb. phys-th.* 1. 1. c. 11. f. 5, 6.

*Habitat in Europa; in America. Kalm.*

*Currit, mordet, relinquit punctum fuscum. Amm. acad.* 3. p. 343.

reptans. 4. C. niger, alis hyalinis, pedibus nigris annulo albo. *Fa. suec.* 1118.

*Habitat in Europa, reptatu molestus tempore vespertino.*

equinus. 5. C. ater, abdomine fusco, fronte alba. *Fa. suec.* 1120.

*Fl. lapp.* 359.

*Habitat circum Equos, quorum sanguinem haurit, inter crines eorum cursitans.*

sterco- 6. C. testaceus, alis reticulatis, linea thoracis, tribusque ad-  
reus. dominis nigricantibus.

*Habitat in stercorebus.*

225. EMPIS. Os Rostro corneo, inflexo, bivalvi, thorace longiore: valvulis horizontalibus.

borealis. 1. E. antennis filatis nigra, alis subrotundis fusco-ferrugineis.

*Fa. suec.* 1038.

*Habitat in Norlandia, choreas aereas circa vespertas instituens.*

2. E.



- penni-  
pes. 2. *E.* antennis filatis nigra, pedibus posticis longis: alteri pennatis.  
*Fn. suec.* 1041.  
*Habitat in Europa.*
- livida. 3. *E.* antennis filatis livida, thorace lineis tribus nigris.  
*Habitat in Europa.*  
*Corpus lividum. Thorax linea dorsali lateralibusque nigris. Abdomen supra magis fuscum. Alæ oblongæ venis fasciis.*

## 226. CONOPS. Os Rostro porrecto, geniculato.

- rostrata. 1. *C.* antennis fetariis nigra, abdomine ovato flavo lævi, rostro conico.  
*Habitat in Germania. P. Forskål. Phil. Mag. Sæptura Muscæ domesticæ. Rostri cornæum, porrectum, curvum, capite longius, versus basim reliquis omnibus multo crassius. Tibiæ flavescens. Alæ pallidæ.*
- calci-  
trans. 2. *C.* antennis subplumatis cinerea glabra ovata. *Fn. suec.* 1042.  
*Habitat ad Bovum pedes, unde eorum continuus calcitrans. Amœn. acad. 3. p. 343. Simillima Muscæ domesticæ, ut vix dignoscatur ab in- exercitatis, nisi solo rostro.*
- irritans. 3. *C.* antennis fetariis cinerea subpilosa ovata.  
*Habitat cum Pecoribus. Simillimus præcedenti, sed dimidiis minor.*
- macroce-  
phala. 4. *C.* antennis clavatis mucronatis luteis, abdomine sub- cylindrico glabro: segmentis quatuor margine flavescens.  
*Fn. suec.* 1030 *Uldm. diff.* 100.  
*Habitat in Europa. Simillima Muscæ conopsoidi, sed antennæ basi distinctæ.*
- flavipes. 5. *C.* antennis clavatis mucronatis nigris, abdomine sub- cylindrico glabro: segmentis tribus margine flavis.  
*Habitat in Europa. Simillima Muscæ conopsoidi, nigra. Puncta 2 lutea ad basim abdominis. Pedes flavii (nec, ut præcedentis, ferruginei) fasciis nigris.*



buccata. 6. C. antennis setariis, abdomine hamoso griseo, facie vesiculari alba, alis nebulosis.

*Habitat in Europa.*

227. ASILUS. Os Rostro corneo, porrecto, recto, bivalvi.

maurus. 1. A. subferrugineus, pectoris lateribus punctis thoracisque dorso lineis tribus nigris.

*Habitat in Mauritania. E. Brander.*

*Magnitudo Asili crabroniformis. Antennae ferruginae.*

*Abdominis segmenta margine fusca.*

barbarus. 2. A. fronte thorace pedibusque ferrugineis, alis flavis apice margineque tenuiore nigris.

*Habitat in Mauritania. E. Brander.*

*Major congeneribus. Squamula alba ad latera thoracis.*

*Frons ciliata. Femora & Tibiae spinis sparsis tenuissimis.*

crabroniformis. 3. A. abdomine tomentoso antice nigro, postice flavo inflexo.

*Fn. suec. 1031.*

*Monff. inf. 46.*

*Raj. inf. 267.*

*Fonst. inf. t. 10. f. 2.*

*Frisch. inf. 3. t. 8.*

*Habitat intra Terram.*

gibbosus. 4. A. hirsutus niger, abdomine postice albo.

*Fn. suec. 1034.*

*It. scanic. 414.*

*Habitat in Europa.*

ater. 5. A. hirsutus totus niger, barba albida.

*Habitat in Germania. Bergh Isacson.*

*Similis precedenti sed brevior, totus hirsutus. Barba sub capite & ungulae albae. Antennae subclavatae.*

gilvus. 6. A. abdomine pubescente nigro: supra rufo.

*Fn. suec. 1036.*

*Habitat in Europa.*

marginitus. 7. A. halteribus abdominisque incituris flavis, femoribus nigris.

*Habitat in Svecia. T. Bergman.*



*Abdomen nigrum, pilis fuscis tomentosum, imprimis ad incisuras. Thorax niger.*

germani- 8. *A. hirtus fuscinerus, femoribus nigris, tibiis rubris, alis*  
cus. *fuscis basi albis.*

*Habitat in Germania. P. Forst. Bergh. Ital. Sen.*  
*Sequenti similis, etiam antennis, sed aeplo major.*

forcipa- 9. *A. hirtus fuscinerus.*  
tus. *Frisch. inf. 3. p. 35. t. 7.*

*Habitat intra Terram.*

*Alaris cauda forcipata; Feminae acuta. Varietas ma-*  
*jor Tibiis ferrugineis.*

Tibuloi- 10. *A. lividus nudus, thoracis lineis dorsalibus tribus*  
des. *nigris.*

*Fn. Svec. 1033.*

*Habitat in Europa.*

celandi- 11. *A. ater nudus, alis nigris, femoribus halteribusque*  
cus. *ferrugineis.*

*Fn. Svec. 1037.*

*It. celand. 155.*

*Habitat in Europa.*

Morio. 12. *A. hirtus niger, alis albo nigroque variis.*

*Habitat in Europa.*

*Simillimus Muscæ Morioni.*

228. BOMBYLIUS. Os Restre porrecto, fetaceo, lon-  
gissimo, bivalvi: valvulis ho-  
rizontalibus intra quas acu-  
lei fetacei.

major. 1. *B. alis semi-nigris. Fn. Svec. 1119.*

*Mouff. inf. 64. f. 5.*

*Aldi. inf. 350. f. 10.*

*Raj. inf. 273.*

*Habitat in Europa.*

medius. 2. *B. alis fusco punctatis.*

*Pet. gaz. t. 36. f. 5.*

*Habitat in Europa.*



- minor. 3. *B. alis immaculatis.* *It. scan.* 164.  
*Pet. gaz. t. 42. f. 9.*  
*Reaum. inf. 4. t. 8. f. 11-13.*  
*Habitat in Europa.*

229. HIPPOBOSCA, Os Rostro bivalvi, cylindri-  
 co, obtuso.  
*Pedes unguibus pluribus.*

- Equina. 1. *H. alis obtusis, thorace albo variegato.*  
*Fn. swec. 1043.* *Mouff. inf. 59.*  
*Frisch. inf. 5. t. 10?*  
*Reaum. inf. 6. t. 48.*  
*Habitat in Europa & America septentrionali, Equis*  
*& Bobus infesta.*
- avicula- 2. *H. alis obtusis, thorace unicolore.*  
 ria. *Habitat in Avibus. D. C. Solander.*  
*Præcedenti dimidio minor.*
- Hirundi- 3. *H. alis subulatis.*  
 nis. *Fn. swec. 1044.*  
*Reaum. inf. 4. t. 11. f. 1-5.*  
*Habitat in Hirundinibus.*
- Ovina. 4. *H. alis nullis. It. wgoth. 59.*  
*Frisch. inf. 5. t. 18.*  
*Habitat inter Ovium lanam.*

## VII. APTE-



## VII. APTERA.

*Alæ nullæ, in omni sexu.*

230. LEPISMA. *Pedes VI, cursorii.*

*Os Palpis II.*

*Cauda setosa: fetis extensis.*

*Corpus squamis imbricatum.*

sacchari- 1. *L. squamosa, cauda triplici.*

na.

*Brown. jam. 425. Setosa subargentea, cauda setosa, fetis hirsutis*

*Adam. microgr. t. 28. f. 147.*

*Habitat in America inter saccharum & utensilia domestica, inde per Europam vulgaris, hinc in Suecia incepit.*

terrestris. 2. *L. nuda, cauda triplici.*

*Habitat in Europa.*

*Simili Podurae sed major, corpore toto albo cylindrico. Antennæ corporis dimidii longitudine, obtusæ ut in Podura.*

231. PODURA. *Pedes VI, cursorii.*

*Oculi II, compositi ex octonis.*

*Cauda bifurca, saltatrix, inflexa.*

viridis. 1. *P. subglobosa viridis. Fn. suec. 1172.*

*Habitat in Europæ plantis.*

atra. 2. *P. subglobosa atra, antennis longitudine corporis apice albis. Fn. suec. 1173.*

*Habitat in Europæ plantis.*

fusca. 3. *P. globosa fusca nitida, antennis longis: articulis plurimis. Fn. suec. 1174.*

*Act. Stockh. 1743. p. 296. t. 7.*

*Habitat in Europæ terrestribus.*

4. P.

Mutilla 220 quæ aptera, hinc o. lineam secundum alas intraret, sed character ordinis Hymenoptera affinitas eam facit.



- plumbea. 4. *P. teres fusco-cærulea nitida.* *Fa. svec. 1175.*  
*Habitat in Europæ arbutis.*
- nivalis. 5. *P. oblonga cinerea signaturis nigris.* *Fa. svec. 1176.*  
*E. N. C. act. 2. ann. 3. oct. 177. Index Invis.*  
*De Geer Act. Ups. 1740. p. 54. t. 2.*  
*Habitat in Europa nemoribus, Lignis.*
- arborea. 6. *P. nigra, pedibus furcaque albis.* *Fa. svec. 1177.*  
*De Geer act. Ups. 1740. p. 49. t. 1.*  
*act. Stockh. 1740. p. 272. t. 1.*  
*Habitat in Europæ sylvis.*
21. 7. *P. cylindrica grisea, cingulo atro antice albo.*  
*Habitat in sylvis Europæ.*
22. 8. *P. nigra aquatica.* *Fa. svec. 1173.*  
*De Geer act. Ups. 1740. p. 57. t. 3.*  
*Stockh. 1740. p. 279. t. 3, 4.*  
*Habitat in Aquosis Europæ.*
23. 9. *P. terrestris alba.* *Fa. svec. 1180.*  
*Habitat in terra prægnante Furca, frequens primo vere.*
- ambu-  
lans. 10. *P. alba, furca extensa.* *Fa. svec. 1170.*  
*Habitat in Europa.*

## 232. TERMES. Pedes VI, cunearii.

Oculi II.

Antennæ fetacæ.

Os maxillis duabus.

- fatale. 1. *T. luteum; alterius maxillis longioribus antennarum.*  
*Habitat in Indis utraque India, in domibus, in arboribus, in sum-*  
*sum, fornices cylindricos progrediendo inædificans, ma-*  
*xillis longis altissime resistens. Nidus e fornice, in-*  
*bus dactyleis in totum præparat. Idem ut antea dicitur*  
*omnia, utriusque Indiæ calamitas summa: domos, na-*  
*ves, cibaria, cuncta, eâ animalibus & hominibus*  
*libas linguas quæque, reliqua sunt in præparatis; de*  
*calce eâ præparandum, de præparatis & peregrinan-*  
*tes plurima.*



*Alteri (Feminae forte) Corpus magnitudine T. pulsatorii. Caput corneum, leve, oblongo subtrigonum, luteum. Antennae vix thorace longiores. Maxillae corneae, leves, nigrae, subulatae, subarcuatae, porrectae, longitudine antennarum. Abdomen oblongum, subcylindricum, albicans.*

*Alterum (sexu tantum diversum, Rolander) simile praecedenti, sed absque maxillis magnis porrectis. Caput suborbiculatum, flavescens. Maxillae brevissimae. Antennae filiformes, corpore dimidio breviores. Abdomen ovatum, albidum.*

pulsatorium. 2. T. abdomine oblongo, ore rubro, oculis luteis.  
*Fr. svec. 1168.*

*Derb. theol. 119.*

*Bradl. nat. t. 27. f. 3.*

*Raj. inf. 8.*

*Aët. angl. n. 270. p. 231. & n. 291. p. 1586 & n. 245. p. 376.*

*Roland. act. Stockh. 1754. p. 152.*

*Habitat in Europa & America, frequens in domibus, in vicinis vestibus, Herbariis, Insectorum museis. Femina horologii instar pulsatoria in ligneis festucis.*

fatidicum. 3. T. abdomine ovato, ore pallido, oculis fuscis.

*Frisch. inf. 11. p. 2. t. 10.*

*Habitat in Europa australiore, nobis primam visum in plantis siccis a Læfvingio transmissis.*

*Simile praecedenti, sed duplo majus.*

233. PEDICULUS. Pedes VI, ambulatorii.

Oculi II.

Os aculeo exterendo.

Antennae longitudine thoracis.

Abdomen depressum, sublobatum.

Humanus. 1. P. humanus. *Fr. svec. 1153.*

*Mouff. inf. 259.*

*Red. exp. t. 18.*

*Swamm. quart. t. 7.*

*bibl. t. 1. f. 3-6.*

*Habitat in capite & vestimentis humanis.*

*Alb. aran. t. 42.*

*Böerh. micr. f. 55.*

*Joblot. micr. 1. pp. 1. t. 1.*

*Baker. micr. t. 13. f. 4.*

2. P.

Pediculi Mammaliani nempe multo plures etiam non observati, minus descripti, multo minus differentia determinati exstant.



- Pubis. 2. *P. pubis.* *Fn. swec. 1154.*  
*Mo. inf. 200.* *Red. exp. t. 19 f. 1.*  
*Raj. inf. 8.* *Pet. gaz. t. 67. f. 9.*  
*Schenk. obs. 676.*  
*Habitat in Hominis immixti pube, rarius & superciliis.*
- ricinoides. 3. *P. abdomine orbiculato linea alba, scutello trilobo, rostro albo.*  
*Habitat in America, pedes oblongatissimi intrant, sanguinem hauriunt, et his sua a pascunt, ulcera caecitica causans. Rolander.*  
*Acaro simile, sed pedes longiores tantum 6. Pediculus longum cylindricum subtus hamulis. Corpus rufescens.*
- lionis. 4. *P. thorace angulato-cruciato, pedibus unguatis, corporis longioribus.*  
*Friseh. inf. 7. t. 7.*  
*Habitat in Vespertilione murino.*  
*Simile est Functare, Acaro aut Phalacro simile, in piano non procedere valet.*
- Suis. 5. *P. Suis scrofæ.*  
*Habitat in Suibus β.*
- Porcelli. 6. *P. Muris Porcelli.*  
*Habitat in Mure Porcello.*
- Cameli. 7. *P. Cameli. †*  
*Red. exp. t. 22.*  
*Habitat in Camelo Dromedario, Pactriano.*
- Cervi. 8. *P. Cervi.*  
*Friseh. inf. 12. p. 15. t. 5.* *Red. exp. t. 5.*  
*Habitat in Ceruo Elapho, Dama, Capreolo.*
- Ovis. 9. *P. Ovis Arietis.*  
*Red. exp. t. 22. f. 1?*  
*Habitat in Ovibus.*
- Bovis. 10. *P. Bovis Tauri, abdomine lineis transversis octo ferrugineis. Fn. swec. 1155.*  
*Habitat in Bobus.*
- Vituli. 11. *P. Bovis Tauri, abdomine pluribus. Fn. swec. 1156.*  
*Habitat in Bobus cum precedenti.*



- Equi. 12. P. Equi Caballi.  
*Habitat in Equis.*
- Afini. 13. P. Equi Afini. †  
*Red. exp. t. 22. f. 1.*  
*Habitat in Afinis.*
- Tinnunculi. 14. P. Falconis Tinnunculi. *Fn. swec. 1157.*  
*Red. exp. t. 13.*  
*Frisch. inf. 11. p. 24. t. 24.*  
*Habitat in Falconibus Tinnunculis, Milvis.*  
*Conferantur aliæ species in Falconibus. Red. exp. t. 1.*
- Corvi. 15. P. Corvi Coracis. *Fn. swec. 1158.*  
*Red. exp. t. 16. f. 2.*  
*Habitat in Corvis.*
- infausti. 16. P. Corvi infausti.  
*Fn. swec. 1159. Pediculus Picæ lapponicæ.*  
*Habitat in Corvo infausto.*
- Picæ. 17. P. Corvi Picæ. †  
*Red. exp. t. 5.*  
*Habitat in Corvo Pica.*
- Cygni. 18. P. Anatis Cygni. †  
*Red. exper. t. 8.*  
*Habitat in Cygno.*  
*Conferatur Red. exp. t. 9. f. 3.*
- Anseris. 19. P. Anatis Anseris.  
*Red. exper. t. 10.*  
*Habitat in Anseribus feris & mansuetis.*
- moschata. 20. P. Anatis moschata. †  
*Red. exper. t. 9. f. 1.*  
*Habitat in Anate moschata.*
- Querquedula. 21. P. Anatis Querquedulæ. †  
*Red. exper. t. 12.*  
*Habitat in Querquedulis.*
- Sternæ. 22. P. Sternæ Hirundinis. *Fn. swec. 1162.*  
*Red. exper. t. 9. f. 2.*  
*Habitat in Sternis, Laris.*



- Plataleæ. 23. P. Plataleæ Leucorodiæ. †  
*Red. exper. t. 4.*  
*Habitat in Leucorodiis.*
- Ardeæ. 24. P. Ardeæ cinereæ. †  
*Red. exper. t. 6.*  
*Habitat in Ardeis.*
- Gruis. 25. P. Ardeæ Gruis. *Fn. suec. 1162.* †  
*Red. exper. t. 3.*  
*Habitat in Gruibus.*
- Ciconiæ. 26. P. Ardeæ Ciconiæ.  
*Frisch. inf. 8. p. 9. t. 6.*  
*Habitat in Ciconiis.*
- Chara- 27. P. Charadrii Pluvialis. †  
 drii. *Red. exper. t. 9.*  
*Habitat in Pluvialibus.*
- Fulicæ. 28. P. Fulicæ atræ. †  
*Red. exper. t. 4.*  
*Habitat in Fulicis.*
- Recurvi- 29. P. Recurvirostræ Avosettæ. *It. æl. 90. Faun. suec.*  
 rostræ. 1163.  
*Habitat in Recurvirostris.*
- Hæmato- 30. P. Hæmatopi Ostralegi. *Fn. suec. 1164.*  
 pi. *Habitat in Hæmatopis.*
- Pavonis. 31. P. Pavonis cristati. †  
*Frisch. inf. 12. t. 3. f. 6.* *Red. exper. t. 15.*  
*Habitat in Pavonibus.*
- Melea- 32. P. Meleagridis Gallo-pavonis. *Fn. suec. 1160.*  
 gridis. *Frisch. inf. 8. t. 4.* *Red. exper. t. 22?*  
*Habitat in Gallo-pavonibus.*
- Gallinæ. 33. P. Phasiani Galli thorace capiteque utrinque mucronato.  
*Fn. suec. 1166.*  
*Habitat in Gallinis domesticis.*  
*Expellitur Pipere.*

(†) Signo Cruce ubique notatum animalia velis nec nota, nec in museis observata  
 visa, ut Naturæ congluti ad ea attentius examinanda incitentur.



Caponis. 34. P. Inasiani Capli alter. *Fn. svec.* 1165.  
*Frisch inf.* 11 t. 24. *Red. exper. t.* 10. f. 1.  
*Habitat in Gallinis domesticis.*

Tetrao- 35. P. Tetraonis Tetricis.  
 nis. *Red. exper. t.* 14. *Pulex pavonis?*  
*Habitat in Tetraonibus.*

Lagopi. 36. P. Tetraonis Lagopi. *Fn. svec.* 1167.  
*Habitat in Lagopis.*

Colum- 37. P. Columbæ Oenatis. †  
 bæ. *Red. exper. t.* 2. f. 1.  
*Habitat in Columbibus.*

Pari. 38. P. Parisi majoris, *cauda quadrifeta.* †  
*Frisch inf.* 8. p. 9. t. 1. f. 5.  
*Habitat in Paris.*

Apis. 39. P. Apis. †  
*Frisch. inf.* 8. t. 16.  
*Habitat in Apibus ad squamulam halterum.*

234. PULEX. *Pedes VI, saltatorii.*  
*Oculi II.*  
*Os rostro inflexo.*  
*Abdomen compressum.*

irritans. 1. P. proboscide corpore brevior.  
*Fn. svec.* 1171. *Pulex.* *Fabul. micr.* 1. pp. 1. t. 3;  
*Red. inf.* 7. *Frisch. inf.* 11. p. 8.  
*Alb. arum.* t. 41. *Vallisn. oper.* 1. t. 25. f. 1.  
*Boiss. micr.* f. 56. *Leuwenh. epist.* 26. f. 1-20.  
*Ann. angl.* p. 204. f. 12. *Roes. inf.* 2. musc. t. 2, 3, 4.  
*Ficor. microgr.* *Baker. micr.* t. 13. f. 6.  
*Habitat ubique in Europa, Leporibus imprimis molesta;*  
*in America. Kalm.*

*Larva apota, cauda bifurca, net. Pupa pedata, immo-*  
*bilis. Mas sub femina jungitur, affinis coleoptratis.*

pene- 2 P. proboscide corporis longitudine.  
 trans. *Marcgr. bras.* 249. *Tunga.*  
*Sloan. jam.* 2. p. 191. *introd.* 125.



*Catesb. car. 3. p. 10. t. 10. f. 3.* Pulex cutem penetrans.

*Habitat in America: Pedes hominum intrans, ova deponens, unde cacoëthes, sepe mors.*

*Corpus fusco rufescens, compressum. Abdomen subtus albidum. Famelicus saltat, precedenti simillimus. Rolander.*

235. ACARUS. *Pedes VIII.*

*Oculi II, ad latera capitis.*

*Tentacula duo, articulata, pediformia.*

elephantinus. 1. *A. orbicularis depressus: macula baseos ovata.*  
*Habitat in India.*

*Magnitudo seminis Lupini albi, depressus, lividus margine crasso, subtus utrinque 3 sulcis. Macula baseos nigra, ovata, trifida.*

ægyptius. 2. *A. obovatus fuscus margine albo. M. L. U.*  
*Habitat in Oriente.*

Reduvius. 3. *A. obovatus planus macula baseos obovata.*

*Fn. svec. 1192. It. œland. 62. 126.*

*Raj. inf. 9.*

*Habitat in Bobus, Canibus, sylvis.*

americanus. 4. *A. obovatus rubicundus, scutello geniculisque pedum albidis.*

*Kalm. act. Stockh. 1754.*

*Habitat in America.*

sanguifugus. 5. *A. abdomine postice crenato, scutello ovato subfulvo, rostro tripartito.*

*Habitat in America. Rolander.*

*Pedes antici ad exortum scinis brevibus. Sanguinem in tibiis obambulantium haurit vix extrahendus.*

Ricinus. 6. *A. globofo-ovatus macula baseos rotunda, antennis clavatis.*

*Fn. svec. 1193.*

*Aldr. inf. 579.*

*Habitat in Bobus, Canibus.*

*Raj. inf. 10.*

*Frisch. inf. 5. t. 19.*



- Canceroides. 7. A. antennis cheliformibus, abdomine ovato depresso.  
*Fn. suec. 1187. It. æl. 84.*  
*Seb. mus. 1. t. 70. f. 11.*  
*Frisch. inf. 8. t. 1.* *Rœs. suppl. t. 64.*  
*Clerck. d. m. t. 6. f. 10: 1, 2.*  
*Habitat in Europæ umbrosis suffocatis.*
8. A. antennis cheliformibus, abdomine cylindrico, capite appendiculato.  
*Habitat in America. Rolander.*  
*Synonyma A. Canceroidi, sed chela ovata, Corpus flavo-rufo, d. m. t. 6. f. 10: 1, 2. & Abacamen cylindricum. Morsu venenatus. An uterque Phalangium?*
- crustaceis. 9. A. antennis sec. adariis cheliformibus. *Fn. suec. 1189.*  
*Habitat in Europa.*
- passeribus. 10. A. antennis tertius crassissimis.  
*Fn. suec. 1190.*  
*De linn. in Stockh. 1740. p. 351. t. 1. f. 2.*  
*Red. viv. t. 2. f. 4.*  
*Habitat in Passeribus variis.*
- monte-rius. 11. A. pedibus primis longissimis motatoriis. *Faun. suec. 1188.*  
*Habitat in Umbrosis.*
- Aphidiorides. 12. A. pedibus primis longioribus cursoriis, abdomine postice bicorni. *Fn. suec. 1191.*  
*Habitat in Europa.*
- coleopteratus. 13. A. ater, lateribus nigro-subcoleopteratis. *Fn. suec. 1211.*  
*Habitat in Europa.*
- telarius. 14. A. hyalino-fulvus.  
*Fn. suec. 1212. 1196.*  
*Facit in Europæ plantis, minus ventis expositis, caldario inclasis, tela densa filis parallelis, quibus plantas suffocat; in Tiliæ foliis areris autumnis frequens.*
- Sito. 15. A. lateribus sublobatis, pedibus quatuor pestificis longissimis, femoribus capiteque ferrugineis, abdomine fetoso.  
*Farinæ. Scabiei.*  
*Blank. inf. t. 14. f. A. B. Schenck. obs. 676.*



*Leuw. epist.* 77. t. 379. f. 9, 10. *Allen. comp.* XI: 8.  
*Rivin. prurit.* 18. f. D-L. *Act. angl.* n. 283.  
*L. N. C. dec.* 2. ann. 10. p. 34. *Rev. par.* 18. j. A. B.  
*Act. lips.* 1682. p. 319.

*Habitat in Farina* Europæ, Americæ.

*Inter Sympt. Farinæ, Scabiei, Dysentericæ, Hemorrhoidæ*  
*non reperi alias differentias, quam a loco peritæ. Amoen.*  
*acad.* 3. p. 333.

exulcerans. 16. A. pedibus longissimis fetaceis: anticis duobus brevibus.  
*Habitat in Scabie ferina.*

geniculatus. 17. A. niger, femorum geniculis subglobosis. *Funn. succ.*  
 1210.  
*Habitat . .*

aquaticus. 18. A. abdomine depresso tomentoso pollice obtuso, aqua-  
 ticus. *Fn. suec.* 1199.  
*Frisch. inf.* 8. t. 3.  
*Roes. suppl.* 1. t. 25.  
*Habitat in Europæ aquis dulcibus.*

holosericeus. 19. A. abdomine depresso tomentoso pollice retuso, ter-  
 restris. *Fn. suec.* 1200.  
*It. el.* 84.  
*List. aran.* f. 38.  
*Raj. inf.* 41. n. 38.  
*Blank. inf.* 2. 14. f. 7.  
*Habitat in Europæ & Americæ siccis.*  
*Simillimus præcedenti.*

baccarum. 20. A. abdomine distento rubro: lateribus obscurioribus.  
*Fn. suec.* 1201.  
*Habitat in Baccis Ribis aliisque frequenter cursans.*

Muscarum. 21. A. abdomine rufo, pedibus posticis longissimis filiformibus.  
*Fn. suec.* 1209.  
*Habitat in Muscis.*

Batatas. 22. A. sanguineus scabriusculus, pedibus anterioribus longi-  
 tudine corporis. *R. Lander.*  
*Habitat in Batatas Surinami.*



- gymno- 23. A. abdomine rubro, lateribus punctis binis coccineis.  
pterorū. *Fn. svec. 1208.*  
*Habitat in Apibus aliisque.*
- coleo- 24. A. rufus, ano albicante. *Fn. svec. 1198.*  
ptatorū. *Blank. inf. t. 14. f. H.* *Frisch. inf. 4. t. 10.*  
*Reaum. inf. 6. t. 4. f. 13, 14.*  
*Kœs. inf. 4. p. 20. t. 1. f. 10-15.*  
*Habitat in Scarabæis.*
- rupestris. 25. A. fuscus : linea dorsali bicolore. *Fn. svec. 1202.*  
*Habitat in Europa.*
- longicor- 26. A. ruber, antennis rostro longioribus. *Fn. svec. 1205.*  
nis. *Habitat in Europa.*
- littoralis. 27. A. fusco-rufus, pedibus sanguineis. *Fn. svec. 1206.*  
*It. œland. 90.*  
*Habitat in Europæ littoribus.*
- Fungo- 28. A. fusco rufescens, abdomine subglobofo glabro. *Fn.*  
rum. *svec. 1207.*  
*Habitat in Fungis.*
- scaber. 29. A. cinereus depressus : lateribus scabris. *Faun. svec.*  
*1197.*  
*Habitat in Europa.*
- Salicinus. 30. A. ruber : linea dorsali duplici fusca : antice bifurca.  
*Fn. svec. 1204.*  
*Habitat in Salicibus frequens.*
- croceus. 31. A. fulvus : thoracis lateribus puncto rufo. *Fn. svec. 1204.*  
*Habitat in Europa.*

236. PHALANGIUM, *Pedes VIII.*

*Oculi* verticis duo contigui,  
duo laterales.

*Frons* antennis pediformibus.

*Abdomen* rotundatum, mu-  
ticum.

- Opilio. 1. P. abdomine ovato : subtus albo.  
*Fn. svec. 1186.*



*Mouff. inf.* 234. f. 4.*Aldr. inf.* 608. f. 4.*Gœd. inf.* 2. t. 49.*List. gœd.* f. 143.*angl. t.* 1. f. 35.*Habitat in* Europa, America.*Raj. inf.* 39. n. 35.*Bradl. nat.* t. 24. f. 2.*Clerck. aran.* t. 6. f. 10: 3.cauda-  
tum.2. *P. chelis ramotis, abdomine mucronato. M. L. U.**Seb. mus.* 1. t. 70. f. 7, 8.*Habitat in* India.renifor-  
me.3. *P. antennis corpore longioribus, thorace reniformi.**M. L. U.**Brown. jan.* 409. t. 41. f. 3. *Tarantula fusca major, pedibus anterioribus crassioribus aculeatis & unguiculatis fere cheliformibus, proximis longissimis & tenuissimis.**Habitat in* America.237. ARANEA. *Pedes VIII.**Oculi VIII.**Os unguibus f. retinaculis duobus.**Palpi duo articulati; masculis genitalia.**Anus papillis textoriis.*diadema. 1. *A. abdomine subgloboso rubro-fusco cruce albo-punctata. Fn. svec.* 1214.*Mouff. inf.* 233. f. 1.*Aldr. inf.* 608. f. 9.*Fonst. inf.* t. 18. f. 17, 19, 20.*Raj. inf.* 18. n. 2.*List. aran.* f. 2.*Frisch. inf.* 7. t. 4.*Clerck. aran.* 25. t. 1. f. 4, 3.*Habitat in* Betulis.reticula-  
ta.2. *A. abdomine globoso reticulato supra purpurascente fusco-nebuloso. Fn. svec.* 1221.*Habitat in* Hortis.3. *A.*

---

*Aranæe fila ducunt, pleræque telas fiunt, insectis poscuntur rapinaque vivunt;*  
*Penes in palpis gerunt,*



- cucurbitina. 3. A. abdomine subgloboso flavo punctis quibusdam nigris.  
*Fn. suec.* 1224.  
*Raj. inf.* 20. n. 8. *List. aran. f.* 5.  
*Clerck. aran.* 44. t. 2. f. 4.  
*Habitat in Arboribus foliatis.*
- calycina. 4. A. abdomine globoso pallido flavescente. *Fn. suec.* 1228.  
*Habitat in Calycibus florum, a corolla decidua vacuis.*
- bipunctata. 5. A. abdomine globoso atro: punctis duobus excavatis.  
*Fn. suec.* 1232.  
*Habitat in fenestris. Rete disperso.*
- arundinea. 6. A. abdomine subgloboso albo: maculis dilute fuscis.  
*Fn. suec.* 1243.  
*Habitat in Arundinum paniculis.*
- angulata. 7. A. abdomine ovato antice lateribus angulato-acuto.  
*Fn. suec.* 1213.  
*It. gotl.* 216.  
*Clerck. aran.* 22. t. 1. f. 1.  
*Habitat in Arboribus. Rete perpendiculari.*
- domestica. 8. A. abdomine ovato fusco: maculis nigris quinque subcontiguas anterioribus majoribus. *Fn. suec.* 1215.  
*Raj. inf.* 27. n. 17.  
*List. aran.* 59. f. 17.  
*Clerck. aran.* 76. t. 2. f. 9.  
*Habitat in fenestris, frequens.*
- lineata. 9. A. abdomine ovato albido: lineis tribus longitudinalibus punctorum nigricantium. *Fn. suec.* 1220.  
*Habitat in Nemoribus.*
- riparia. 10. A. abdomine ovato nigro-æneo subulato bicorni. *Fn. suec.* 1222.  
*It. æl.* 145.  
*Habitat in littoribus sabulosis. Rete horizontali.*
- labyrinthica. 11. A. abdomine ovato fusco: linea exalbida pinnata, ano bifurco. *Fn. suec.* 1223. *It. æl.* 251.  
*Raj. inf.* 27. n. 18.  
*List. aran.* 60. f. 18.  
*Clerck. aran.* 77. t. 2. f. 8.  
*Habitat super Terram, Tela horizontali cum puteo cylindrico.*



redimita. 12. A. abdomine oblongo - ovato flavo : annulo ovali dorsali rubro. *Fn. suec.* 1227.

*Raj. inf.* 24. f. 12.

*List. aran.* 51. f. 12.

*Frisch. inf.* 10. t. 4.

*Clerck. aran.* t. 3. f. 9.

*Habitat in Hortis.*

corollata. 13. A. abdomine ovato nigro : annulo dorsali ovali albo.  
*Fn. suec.* 1229. *It. æl.* 126

*Clerck. aran.* 124. t. 5. f. 18 ?

*Habitat in Plantis.*

fumigata. 14. A. abdomine ovato fusco : basi punctis duobus albis.  
*Fn. suec.* 1231. *Clerck. aran.* 104. t. 5. f. 6.

*Habitat in campis.*

montana. 15. A. abdomine ovato albo maculis cinereis. *Fn. suec.*  
1242.

*List. aran.* 36. f. 6 ?

*Habitat in Arboribus.*

notata. 16. A. abdomine ovato fusco : lineis albis transversis arcuatis.

*Habitat in Europa.*

rufipes. 17. A. abdomine fusco, pedibus rufis. *Fn. suec.* 1230.

*Habitat frequentius in Urticis.*

nocturna. 18. A. abdomine nigro : punctis duobus albis, basique lunula alba. *Fn. suec.* 1235.

*Habitat in Europa.*

extensa. 19. A. abdomine longo argenteo virescente, pedibus longitudinaliter extensis. *Fn. suec.* 1216.

*Raj. inf.* 19. n. 2.

*List. aran.* f. 3.

*Habitat in uliginosis, pedibus ad ramos arde & longitudinaliter extensis.*

ambriata. 20. A. abdomine oblongo nigro : linea utrinque laterali alba, pedibus fuscis. *Fn. suec.* 1226.

*Clerck.*

Species Araneorum variant ætate sæpe & loco; difficillime se falsè in variis alternantur; plures itaque videndæ apud Litterum. Album, ætatis vero apud oculatissimum Clerck de Araneis Svecicis, Holm. 1757. quant. qui ultra 60 habet,



- Clerck. aran. 102. t. 5. f. 9.*  
*Habitat in Aquis. super cupis carreas.*
- sexpunctata. 21. A. abdomine oblongo: punctorum excavatorum paribus tribus. *Fn. suec. 1233.*  
*Habitat in Sylvis acerosis.*
- flavissima. 22. A. abdomine oblongo flavissimo lævi. *M. L. U.*  
*Habitat in Ægypto. Hasselqvist.*  
*Thorax fulvus. Pedes glabri.*
- quadripunctata. 23. A. abdomine oblongo nigro: punctis quatuor excavatis. *Fn. suec. 1234. It. æl. 34.*  
*Habitat in fenestris.*
- holosericea. 24. A. abdomine ovato-oblongo holosericeo: basi fuscus punctis duobus flavis. *Fn. suec. 1241.*  
*Raj. inf. 31. n. 23.*  
*List. aran. 71. f. 23.*  
*Habitat in Europa, intra folia convoluta plantarum.*
- fenoculata. 25. A. oculis tantum senis.  
*List. aran. 74. f. 24.*  
*Raj. inf. 32. n. 24.*  
*Habitat in Europa.*
- avicularia. 26. A. thorace orbiculato convexo centro transverse excavato. *Amœn. acad. 1. p. 323.*  
*Marcgr. bras. 248.*  
*Laet. amer. t. 570. Olear. mus. t. 17. f. 3.*  
*Worm. mus. t. 244. Merian. sur. t. 18.*  
*Clus. posth. 47.*  
*Habitat in America, insidiatur Aviculis, Insectis.*  
*Morsu dno serpentino miratur.*
- ocellata. 27. A. ~~tarantula~~ ocellis tribus geminatis.  
*Habitat in China. De Geer.*  
*Corpus pallidum magnitudine Tarantule. Abdomen nubile, annulo nigro. Thoracis discus macula gemina magna nigra. Oculorum regio nigra. Mucosæ ocellis geminis albidis: in singulo femore tres, in tibiis pauciores.*
- Tarantula. 28. A. Tarantula dicta.  
*Bagliv. Tarantula (monographia).*



*Bradl. natur. t. 24. f. 10.*

*Olear. mus. 21. t. 12. f. 4.*

*Habitat in Italia; imprimis in Apulia, Barbaria, Oriente.*

*Rabida sub canicula morfu excitat famosum Tarantismum Musica medendum.*

*Species hujus plures sistunt Authores! quæ accuratius inquirendæ & distinguendæ, cum colore diversæ forte etiam specie differant.*

scenica. 29. A. faliens nigra: lineis semicircularibus albis transversis. *Fn. svec. 1237.*

*Raj. ins. 37. n. 31.*

*List. aran. f. 31.*

*Bradl. nat. t. 24. f. 5.*

*Clerck. aran. 117. t. 5. f. 13.*

*Habitat in parietibus.*

truncorum. 30. A. faliens nigra: dorso punctis albis. *Fn. svec. 1236.*  
*Habitat in parietibus, truncis.*

rupestris. 31. A. faliens, abdominis macula nigra margine rubra medio alba. *Fn. svec. 1238.*

*Habitat in parietibus, lignis.*

aquatica. 32. A. livida, abdomine ovato; linea transversa punctisque duobus excavatis. *Fn. svec. 1240.*

*Clerck. aran. 143. t. 6. f. 8.*

*Habitat in Aquis Europæ anticibus, urinatoria.*

saccata. 33. A. abdomine ovato ferrugineo rufo.

*List. aran. 82. f. 28.*

*Frisch. ins. 8. t. 2.*

*Habitat in terra, circumferens ubique secum saccum suum ovorum.*

virescens. 34. A. abdomine oblongo flavo-viridi: lineis lateralibus albis. *Fn. svec. 1225.*

*Fonst. ins. t. 18. f. 42.*

*Habitat in Hortis.*

palustris. 35. A. abdomine oblongo nebuloso: lineis lateralibus albis. *Fn. svec. 1219.*

*Habitat in paludibus cæspitosis exsiccatis.*

viatica. 36. A. abdomine subrotundo plano obtuso, pedibus quatuor potticis brevissimis. *Fn. svec. 1218.*

*Raj.*



- Rai. inf.* 35. t. 29. *List. aran.* f. 29.  
*Frisch. inf.* 7. t. 5.  
*Clerck. aran.* 128. t. 6. f. 5.  
*Habitat in arboribus, lignis, ovis incubans.*
- levipes. 37. A. abdomine rhombico deorsum  
 ter extensis variegatis. *Frisch. inf.* 10. t. 24.  
*List. aran.* f. 13. *Habitat in tunicis, parietibus.*
- canceri- 38. A. abdomine semiovicinato: anterioribus  
 formis. *Stoll. jam.* 2. p. 197. t. 2. f. 4. *Habitat in  
 mis campestris reticulum spinale nectens.*  
*Brown. jam.* 419. t. 44. f. 5. Aranea nigra canceriformis  
*Habitat in America.*
- spinosa. 39. A. spinis dorsibus octonis: posterioribus  
 bus, abdomine subtus conico.  
*Habitat in America.*

238. SCORPIO. *Pedes VIII.*

*Oculi VIII.* horum 3 ad latera utrum-  
 que thoracis; 2 in tergo

*Frons* chelifera.

*Palpi II*, cheliformes.

*Cauda* elongata, articulata, ter-  
 nata mucrone arcuato.

*Pectines* duo subtus inter pe-  
 & abdomen.

- maurus. 1. S. pectinibus 8-dentatis, manibus subcordatis  
*Habitat in Africa.*

- afer. 2. S. pectinibus 13-dentatis, manibus  
*Swamm. bibl.* t. 3. f. 3. *Seb. mus.* 1. t. 7.  
*quart.* t. 6.  
*Habitat in India.*

- americus. 3. S. pectinibus 14-dentatis, manibus subcordatis  
 filiformibus.  
*Habitat in America.*



europæus. 4. S. pectinibus 18-dentatis, manibus unguulatis.

*Mouff. inf.* 204.

*Aldrov. inf.* 577.

*Raj. inf.* 9.

*Habitat in Europa maxime australi.*

*Cauda sub aculeo mucronata est.*

australis. 5. S. pectinibus 32-dentatis, manibus lævibus.

*Habitat in Africa, forte etiam America.*

239. CANCER. *Pedes* utrinque VIII: præter Manus 2 chelatas,

*Oculi* II, distantes, pedunculati, elongati, mobiles.

*Palpi* II magni, cheliferi.

*Cauda* articulata, inermis.

\* a \* BRACHYURI Thorace lævi lateribus integerrimo.

Carfor. 1. C. brachyurus, thorace lævi integerrimo: lateribus postice marginato, antennis filiformibus, cauda reflexa. †

*Hajselqv. iter.* 433. n. 128. Cancer anomalus.

*Habitat in Mari Mediterraneo, Indico, sole occiduo e mari exiens in littora sabulosa, velocissimeque discurrens.*

raninus. 2. C. brachyurus, thorace lævi integerrimo oblongo obovato: antice truncato-dentato.

*Rumph. mus.* 13. t. 7. f. F. T. U.

*Habitat in M. Indico.*

mutus. 3. C. brachyurus, thorace lævi integerrimo: margine antico transverso brunneo.

*Habitat in M. Mediterraneo?*

*Testa lævis, antice truncata, margine brunneo, postice complanato-truncata, lateribus integra. Chelæ læves, Carpis unidentatis, Brachiis subtus denticulatis.*

minutus. 4. C. brachyurus, thorace lævi integerrimo subquadrato: margine acutiusculo. *Mus. Ad. Fr.* 1. p. 85.

*It. wgoth.* 137. t. 3. f. 1.

*Kalm. iter.* 2. p. 143.

*Sloan. jam.* 2. t. 245. f. 1.

*Osbeck. iter.* 307.



*Habitat in Pelagi Fucis natante, supra aquam saepius cursitans.*

- ruico- 5. *C. brachyurus*, thorace lævi integerrimo: antice retu-  
la. so, pedum articulis ultimis penultimisque undique spinosis.  
*Sloan. jam. 1. t. 2. Catesb. car. 2. p. 32. t. 32.*  
*Fewill. peruv. 3. p. 237. Brown. jam. 423.*  
*Habitat in America, sylvas vastissimis agminibus quotan- nis deserens littora maris petiturus.*
- vocans. 6. *C. brachyurus*, thorace lævi integerrimo subtus hinc.  
*Rumph. mus. 10. t. 14. f. E.*  
*Catesb. car. 2. t. 25. Cancer arenarius.*  
*Habitat in Indiis.*
- craniola- 7. *C. brachyurus*, thorace lævi integerrimo ovato glaberri-  
ris. mo, manibus ancipitibus lævibus.  
*Rumph. mus. t. 10. f. A. B. Pet. amb. t. 9. f. 3.*  
*Habitat in Asia.*
- philar- 8. *C. brachyurus*, thorace lævi integerrimo convexo: po-  
gius. stice quindecim-dentato. *M. L. U.*  
*Habitat in Asia.*
- \* b \* *Brachyuri thorace lævi lateribus inciso.*
- rhomboi- 9. *C. brachyurus*, thorace lævi lateribus antice unispinosis,  
des. fronte truncata.  
*Barrel. rar. t. 1287. f. 1.*  
*t. 1286. f. 1, 2.*  
*Habitat in M. Mediterraneo.*
- macula- 10. *C. brachyurus*, thorace lævi maculis fanguineis rotun-  
tus. dis: lateribus unidentatis.  
*Rumph. mus. t. 10. f. 1. Pet. amb. t. 1. f. 8.*  
*Habitat in Asia.*
- pelagicus. 11. *C. brachyurus*, thorace lævi utrinque unispinoso, fron-  
te cæto-dentata, manibus multangulo-prismaticis.  
*Osborn. iter. 507. C. manuum articulis omnibus dentatis: extimo heptagono.*  
*Rumph. mus. t. 7. f. R. Brown. jam. 421. t. 41. f. 2.*  
*Habitat in Pelagi universi orbis Fucis natante.*



Nucleus. 12. *C. brachyurus*, thorace lævi globoso: antice utrinque unidentato, postice rostrisque bidentato.

*Habitat in M. Mediterraneo ad littora Barbarie. E. Brander.*

*Statura C. craniolaris, magnitudo glandis, color flavus. Thorax pone rostrum utrinque dente unico, & ad postica thoracis margo obsolete bidentatus, at supra pedes posticos dens validior conicus. Cauda glaberrima. Femora antica punctis eminentibus adspersa. Ungues acuti.*

laetatus. 13. *C. brachyurus*, thorace lævi utrinque ferrato-quadrilobo, manibus ovatis lævibus. *M. L. U.*

*Habitat in Indiis.*

Mænas. 14. *C. brachyurus*, thorace lævi utrinque quinquedentato, manibus ovatis, carpis dentatis, pedibus posticis subulatis.

*Rumpf. mus. t. 6. f. 0.*

*It. wgoth. 173.*

*Rumph. mus. t. 6. f. 0.*

*Pet. amb. t. 1. f. 5.*

*Habitat in Oceano Europæo, Asiatico.*

Depura- 15. *C. brachyurus*, thorace lævi utrinque subquinquedentator.  
tor.

*Planc. conch. 34. t. 3. f. 7.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Frons inter oculos dentibus tribus. Digitus fixus chelarum valde compressus.*

feriatus. 16. *C. brachyurus*, thorace lævi utrinque quinquedentato, manibus multangulis ovatis, carpis unidentatis.

*Rumph. mus. t. 6. f. P.*

*Pet. amb. t. 1. f. 6.*

*Habitat in M. Indico.*

granula- 17. *C. brachyurus*, thorace lævi crenulato angulis dilatato-  
tus. quinquedentatis, postice truncato, manibus truncato-cristatis.

*Catesb. car. 2. p. 36. t. 36. C. chelis crassissimis.*

*Habitat in America. Mus. De Geer.*

*Testa convexa, subtuberculata margine postico laterali dilatato-quinquedentato, reliquo crenulato. Rostrum bilobum, obtusum. Chelæ truncatæ, cristatæ, ad basin spina armata.*

Pagurus. 18. *C. brachyurus*, thorace utrinque obtuse novem-plicato, manibus apice atris.

*Tafelkräft.*

*Fis.*



*Fr. suec.* 1244.

*It. wgoth.* 173.

*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 85.

*Bradl. nat.* t. 3. f. 4.

*Rumph. mus.* t. 11. f. 4.

*Habitat in Oceano Europæo, Asiatico.*

*Bell. aquat.* 368.

*Rond. pisc.* 560.

*Gesn. aquat.* 155.

*Aldr. exsangu.* 186.

*Jonst. exsangu.* t. 5. f. 2.

\* c \* *Brachyuri thorace hirto.*

Chabrus. 19. *C. brachyurus*, thorace hirto suborbiculato mutico, manibus ovatis muricatis.

*Habitat in Oceano Indico.*

Araneus. 20. *C. brachyurus*, thorace hirsuto ovato tuberculato, rostro bifido, manibus ovatis.

*Hölus, Hasselqvist*  
*mel.*

*Fr. suec.* 1246.

*Iter. scanic.* 312.

*Habitat in Oceano Europæo.*

*Jonst. exsangu.* t. 5. f. 13.

Cuphæus. 21. *C. brachyurus*, thorace villoso ovato antice obtuso, postice tridentato.

*Rumph. mus.* t. 10. f. D.?

*Habitat in Asia.*

musco- 22. *C. brachyurus*, thorace villoso utrinque tridentato, rostro bidentato: lateribus unidentato.

fus.

*Habitat in M. Mediterraneo. E. Brander.*

*Magnitudo glandis. Testa obovata, villis mollissimis incurvis hirsuta, ad utrumque latus spinis 3 subulatis. Rostrum spinis 2 subulatis parallelis cum dente compresso ad utrumque latus rostri. Ungues pedum subulati, curvi, introrsum dentati. Chelæ laeves, unearres, carpo utrinque dente obtuso retrorsum spectante.*

persona- 23. *C. brachyurus*, thorace hirto inæquali utrinque quin-  
tus. quedentato, rostro quadridentato.

*Planc.*

Pinnotheres. *C. macrourus?* testa membranacea punctis lateralibus ternis, manibus acuminatis: digitis incurvis. †

*Rumph. mus.* p. 25.

*Jonst. exsangu.* t. 20. f. 3.

*Habitat in Mari Mediterraneo & Asiatico intra Testas Pinnae, Sphondyli.*

*Hic nobis non visus, ab autoptis attente describendus.*

*Concha pteens, luminibus orbium pandens corpus, exposita Serpæ octopodia, ideo me non sine custode est, qui Pinnothylax (Aristot. II: 24 & I: 15.) Pinnotheres (Plin. IX: 42, 31.) neque enim vita Conchæ fortasse servari posset nisi opera Canceri (Bell. aqu. 401. Hasselqv. iter. 450).*



*Planck. conch. 36. t. 5. f. 1.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Testa magnitudine pomi, rubra, uti totum corpus hirta. Rostrum bidentatum cum dente ad utrumque latus brevior. Seta utrinque ad basin caudæ. Pedes duo postici quasi supra reliquos collocati.*

\* d \* *Brachyuri thorace supra spinoso.*

Maja. 24. *C. brachyurus, thorace aculeato, manibus ventricosis lævibus.*

*Maja*

*Fa. suec. 1245.*

*Matth. Diosc. 229. Maja.*

*Scania*

*Iter. scanic. 327.*

*Fonst. exsang. t. 5. f. 5.*

*Habitat in Oceano Europæo.*

longimana- 25. *C. brachyurus, thorace aculeato, manibus corpore nus. longioribus: digito patulo; pollice curvato.*

*Rumph. mus. t. 8. f. 2.*

*Pet. amb. t. 2. f. 15.*

*Habitat in Oceano Asiatico.*

horridus. 26. *C. brachyurus, thorace obtuse aculeato, manibus ovatis, cauda cariosa.*

*Rumph. mus. t. 9. f. 1.*

*Pet. amb. t. 1. f. 7.*

*Habitat in Oceano Asiatico.*

cristatus. 27. *C. brachyurus, thorace aculeato: rostro bifido cristato, manibus teretibus.*

*Rumph. mus. t. 8. f. 1.*

*Pet. amb. t. 5. f. 11.*

*Habitat in Oceano Asiatico.*

supercilio- 28. *C. brachyurus, thorace aculeato: spinis ocularibus ramulosus. trifidis, manibus teretibus. M. L. U.*

*Habitat in Oceano Indico.*

cornutus. 29. *C. brachyurus, thorace aculeato: rostro spinis corniformibus barbatis, manibus teretibus. M. L. U.*

*Habitat in Oceano Indico.*

longipes. 30. *C. brachyurus, thorace aculeato, manibus ovatis scabris, pedibus posterioribus longissimis.*

*Rumph. mus. t. 8. f. 4.*

*Habitat in Oceano Indico.*

spinifer. 31. *C. brachyurus, thorace postice uni-aculeato, inæquali, pedibus secundi paris longissimis.*



*Rumph. mus. t. 8. f. 3?*

*Habitat in Asia.*

\* e \* *Brachyuri thorace inæquali.*

cruentatus. 32. *C. brachyurus*, thorace tuberculoso sanguineo, rostro lineari truncato.

*Habitat in M. Mediterraneo. E. Brander.*

*Testa statura & magnitudine C. Aranei, supra nimodum nodosa tuberculis inæqualibus: apice maculis albis.*

*Rostrum lineare, truncatum, cum aene utrinque ad ejus basin. Chelæ lineares ad carpos utrinque aente retrospectante obtuso. Pedes acuti.*

hepaticus. 33. *C. brachyurus*, thorace verrucoso gibbo semiorbiculato: margine ferrato.

*Habitat in Indiis.*

Calappa. 34. *C. brachyurus*, thorace strigis subimbricato gibbo trilobo.

*Rumph. mus. t. 11. f. 2, 2.*

*Habitat in Asia.*

Grapsus. 35. *C. brachyurus*, thorace strigis lateralibus, fronte retusa.

*Amoen. acad. 4. t. . f.*

*Catesb. car. 2. t. 36. f. 1. Pagurus maculatus.*

*Habitat in America, Insula Adscensionis.*

æneus. 36. *C. brachyurus*, thorace rugosissimo obtuso utrinque quadrilobo.

*Habitat in India.*

punctatus. 37. *C. brachyurus*, thorace obovato punctato: postice tridentato.

*Rumph. mus. t. 10. f. C. Brown. jam. t. 42. f. 3.*

*Habitat in Asia, America.*

dorsipes. 38. *C. brachyurus*, thorace rugoso ovali: antice ferrato ciliato, pedibus posticis dorsalibus.

*Rumph. mus. t. 10. f. 3. Pet. amb. t. 6. f. 2.*

*Habitat in India.*

Symmysta. 39. *C. subbrachyurus*, thorace subcylindrico ciliato-ferrato, chelis cordatis, antennis ciliato-pilosis.

*Habitat in Asia.*



\* f \* *MACROURI parasitici, cauda setacea aphylla.*

Bernhardus. 40. *C. macrourus parasiticus, chelis cordatis lævibus: sinistra majore.*

*Matth. diosec. 230.*

*Aldr. exsangu. 218.*

*Rond. pisc. 1. p. 553.*

*Fonst. exsangu. t. 7. f. 6-12.*

*Bellon. aquat. 362.*

*Swammerd. bibl. t. 11. f. 1, 2.*

*Gesn. aquat. 161.*

*Habitat in Oceano Europæo, intra varias testas Concharum.*

*Chelæ margine anteriore versus basin barbatae.*

Diogenes. 41. *C. macrourus parasiticus, chelis muricatis: dextra majore.*

*Brown. jam. 424. Astacus maximus, cauda subnuda molli, chelis subverrucosis tuberculatis: dextra majore.*

*Rumph. mus. t. 5. f. K. L.*

*Catesb. car. 2. t. 34.*

*Habitat in Oceano Asiatico, Americano, intra testas varias Concharum.*

\* g \* *Macrouri thorace lævi.*

Gammaeus. 42. *C. macrourus, thorace lævi, rostro lateribus dentato: basi supra dente duplici.*

*Fr. suec. 1248.*

*Hummer Sw.*

*It. westrogoth. 174.*

*Gesn. aquat. 91.*

*Mus. Ad. Fr. 87.*

*Aldr. exsangu. 112.*

*Matth. diosec. 227.*

*Fonst. exsangu. t. 71.*

*Rond. pisc. 1. p. 538.*

*Habitat in Oceano imprimis Norvegico: in America septentrionali. Kalm.*

Astacus. 43. *C. macrourus, thorace lævi, rostro lateribus dentato: basi utrinque dente unico.*

*Fr. suec. 1249.*

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 87.*

*Gesn. aquat. 104.*

*Roes. ins. app. 1. t. 54, 55.*

*Aldr. exsangu. 129.*

*Matth. diosec. 228.*

*Fonst. exsangu. t. 4. f. 1.*

*Rond. pisc. 2. p. 210.*

*Bellon. aquat. 355.*

*Habitat in Europæ lacubus, fluviis.*

Carcinus. 44. *C. macrourus, thorace lævi, manibus teretiusculis: brachiis hispido-aculeatis.*

*Sloan. jam. 2. p. 271. t. 245. f. 2. Astacus fluviatilis major, chelis aculeatis.*

*Habitat in Americæ fluviis.*



- perna- 45. *C. macrourus*, thorace lævi cylindrico, rostro enfi-  
ceus. formi: margine superiore ferrato.  
*Mus. Ad. Fr. 1. p. 87.*  
*Habitat in Calidioribus regionibus.*
- Squilla. 46. *C. macrourus*, thorace lævi, rostro supra ferrato sub-  
tus tridentato, manuum digitis æqualibus. *Fr. svec.*  
1252.  
*Matth. diosc. 229.* *Rond. pisc. 549.*  
*Klein. dub. 35. f. A.*  
*Habitat in M. Balthico, Oceano Europæo.*
- Crangon. 47. *C. macrourus*, thorace lævi, rostro integerrimo, ma-  
nuum pollice longiore. *Fr. svec. 1251.*  
*Habitat in M. Balthico.*
- \* h \* *Macrouri thorace inæquali.*
- Carabus. 48. *C. macrourus*, thorace strigis imbricatis oblongiuscu-  
lo antice ciliato, rostro bidentato mobili.  
*Habitat in M. Mediterraneo. E. Brander.*  
*Testa magnitudine extrema pollicis, supra laevis sed ru-  
gis quasi imbricatis, margine antice denticulis ciliata.  
Rostrum dentibus 2 parvis mobilibus detressis. An-  
tennae corpore longiores riles ciliata. Crele latissi-  
ma cordate antice pilis ciliata. Pedes unguibus fal-  
catis. Cauda articuli 3 utrinque jolatis: extremo  
articulo ovato parvo, ut utrinque paribus 2 parvis  
& sicutus setis auquat longissimis.*
- Cancha- 49. *C. macrourus*, thorace rugoso ovali, manibus com-  
rus. pressis margine spinosis. *M. L. U.*  
*Habitat in Indiis.*
- \* i \* *Macrouri thorace aculeato.*
- pilosus. 50. *C. macrourus*, thorace chelisque angulatis hispidis.  
*Mus. Ad. Fr. 87.*  
*Habitat in Indiis.*
- norvegi- 51. *C. macrourus*, thorace antrorsum aculeato, manibus  
cus. pristinaticis: angulis spinosis. *Fr. svec. 1247.*  
*It. scanic. 307.*  
*Mus. Ad. Fr. 1. p. 88.*  
*Aldr. exsangu. 113. Atlasus mediæ magnitudinis prior.*  
*Habitat in Mari Norvegico.*



\* k \* *Macrouri*, manibus adaetylis, thorace oblongo.

Homa- 52. *C. macrourus*, thorace antrorsum aculeato, manibus  
rus. adaetylis.

*Rumph. mus. t. 1. f. A.* *Pet. amb. t. 6. f. 1.*

*Habitat in Mari Asiatico.*

Arctus. 53. *C. macrourus*, thorace subaculeato hirto, manibus  
adaetylis.

• *Marcgr. bras. 186. Poliquiquyix.*

*Jonst. exsangu. t. 4. f. 3, 4, 8, 12.*

*Barrel. rar. t. 1288. f. 2.*

*Rumph. mus. t. 2. f. C. D.*

*Brown. jam. t. 41. f. 1.*

*Habitat in M. Europæ, Asiæ, Africae, Americæ.*

\* l \* *Macrouri* manibus adaetylis, testa thoracis brevissima,  
nec thoracem totum tegente.

Mantis. 54. *C. macrourus* articularis, manibus adaetylis compres-  
sis falcatis ferrato-dentatis. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 86.*

*Rumph. mus. t. 3. f. E. C. Arenarius.*

*Marcgr. bras. 186. t. 187. Tamaru-guacu.*

*Habitat in M. Asiatico, Indico, Mediterraneo.*

*Thoracis testa membranacea. Pedes utriusque 3. Pol-  
lex ferrato-dentatus, terminalis. Dactyli sub abdomi-  
ne trium parium. Antennæ trifidæ: lamina ovata ad  
oculos.*

Scylla- 55. *C. macrourus* articularis, manibus adaetylis ventrico-  
rus. fis rectis angulatis introrsum tridentatis. *Mus. Ad. Fr.*

*1. p. 86. C. mirabilis.*

*Rumph. mus. t. 3. f. F. G.*

*Habitat in M. Asiatico.*

*Statura precedentis. Thoracis testa latere postico emar-  
ginata. Mucronum par pone pedes.*

Pulex. 56. *C. macrourus* articularis, manibus adaetylis, cauda at-  
tenuata spinis bifidis. *It. œl. 42, 96.*

*Fn. svec. 1253.*

*Frisch. ins. 7. t. 18.*

*It. gotland. 260.*

*Raj. ins. 44. Pediculus fluviatilis.*

*Habitat ad Maris littora.*

R r 5

57. C.

Species 54-59 ob thoracem Lorica destitutum & singularem structuram corporis adeo a  
rel. quibus Cancris recedunt, ut facile genus distinctum constituerent.



Locusta. 57. *C. macrourus articularis*, manibus adaetylis, cauda attenuata spinis bifidis.

*Fn. svec.* 1254.

*It. gotl.* 260.

*Res. inf.* 3. t. 62.

*Klein. miss.* 5. t. 6. f. A. B. C.

*Habitat in Europæ maritimis.*

Salinus. 58. *C. macrourus articularis*, manibus adaetylis, pedibus patentibus, cauda subulata.

*Matii diar. britann.* 1756.

*Habitat in Angliæ Salinis Limingtonianis. D. Schifferus.*  
Corpus pediculo majus, oblongum. Oculi distantes, laterales, pedunculati. Antennæ setaceæ, corpore breviores. Cauda filiformi-subulata, exserta, longitudo corporis. Pedes utrinque 10 patentes & quasi pinnatim digesti.

stagnalis. 59. *C. macrourus articularis*, manibus adaetylis, pedibus patentibus, cauda cylindrica bifida.

*Fn. svec.* 1357.

*Schæff. monogr.* . . . Apus.

*Habitat in Europæ aquis dulcibus, in fissuris rupium retentis.*

240. MONOCULUS. *Pedes natatorii.*

*Corpus crusta tectum.*

*Oculi approximati, testæ innati.*

Polyphemus. 1. *M. testa plana convexa sutura laevata, postice dentata, cauda subulata longissima.*

*Clus. exot.* t. 6. c. 4.

*Jonst. exsurg.* t. 7. f. 1, 2.

*Olear. mus.* 28. f. 1, 2.

*Worm. mus.* 241. t. 249.

*Bont. jav.* l. 5. c. 31.

*Rumph. mus.* 21. t. 12.

*Schæff. monogr.* 1756. t. 7.

*Knorr. delc.* t. F. 1.

*Habitat in India.*

foliaceus. 2. *M. testa foliacea plana.*

*Læfl. act. Ups.* 1750. p. 42. t.

*Frisch. inf.* 6. p. 27. t. 12.

*Habitat in Aquis dulcibus, stagnantibus Europæ.*



- Apus. 3. M. testa subcompressa antice retusa postice truncata, cauda bifeta. *Fn. suec.* 1181.  
*Frisch. inf.* 16. t. 1.  
*Act. angl.* 40. p. 150. t. 1. f. 2.  
*Schæff. monogr.* 1756. t. 1-6.  
*Habitat in Europæ fossis, piscinis.*
- Pulex. 4. M. antennis dichotomis, cauda inflexa. *Fn. suec.* 1182.  
*Swamm. quart.* 66. t. 1.  
*bibl. t.* 31. f. 1, 2, 3.  
*Schæff. monogr.* 1755. t. 1. f. 1-8.  
*Joblot. micr.* 1. pp. 2. t. 13. f. P. Q. R.  
*Habitat ubique in aquis dulcibus, tanta saepe in copia, ut appareat sanguinea. Amœn. acad.* 3. p. 320.
- Pediculus. 5. M. antennis dichotomis, cauda reflexa. *Fn. suec.* 1183.  
*Habitat in Europæ aquis dulcibus.*
- quadri-cornis. 6. M. antennis quaternis, cauda recta bifida. *Fn. suec.* 1184.  
*Baker. micr.* t. 9. f. 1, 2.  
*Blank. inf.* 149. t. 13. f. B.  
*Joblot. micr.* 1. pp. 2. t. 14. f. C. D.  
*De Geer act. Stockb.* 1747. t. 6. f. 2.  
*Act. angl. abbrev.* 2. p. 258. t. 20. f. 5. 6.  
*Rœs. inf.* 3. t. 98. f. 1, 2, 4.  
*Habitat in Aquis Europæ.*  
*Ovaria tanquam uvæ binæ petiolatæ adherent.*
- concha-ceus. 7. M. antennis capillaribus multiplicibus, testa bivalvi.  
*Fn. suec.* 1185.  
*Habitat in aquis dulcibus.*
- lenticularis. 8. M. testa compressa lentiformi.  
*Habitat in Finlandia. Uddman.*  
*Latitudo extimi articuli digiti.*
- Telemus. 9. M. testa subglobosa postice tridentata, antice labio simo.  
*Habitat Algeriæ. E. Brander.*  
*Testam solum vidi generis etiamnum dubii, figura fere seminis Ciceris; hæc subglobosa, pellucida, postice tridentata: dente intermedio acutiore; latus Testæ inferiorius minus gibbum; antice fissâ est horizontaliter testa ultra medium; pars inferior antice longior in labium concavum, adscendens, obtusum; superior alsque labio, antice gibba, transverse striata.*



241. ONISCUS. *Pedes XIV.**Antennæ setaceæ.**Corpus ovale.*

- Afilus. 1. O. abdomine foliis duobus obtecto, cauda semiovali.  
*Mus. Ad. Fr. 1. p. 88.*  
*Bell. aquat. 413. Afilus f. œstrum.*  
*Rond. pisc. 576. Pediculus marinus.*  
*Habitat in Oceano.*
- œstrum. 2. O. abdomine foliis sex obtecto, cauda retusa. *Mus.*  
*Reg. 89.*  
*Muregr. bras. 155. f. 3, 4. Animalculum crustaceum.*  
*Habitat in Oceano.*
- Pfora. 3. O. abdomine subtus nudo, cauda semiovali acuta.  
*Habitat in mari Norvegico. D. C. Solander.*  
*Magnitudo præcelestium. Thorax segmentis 7 æquali-*  
*bus. Caudæ segmentis quinque angustioribus, præter*  
*ultimum quod semiovale sed acutum. Antennæ  $\frac{1}{2}$  totius*  
*longitudinis. Pedes XIV, quorum 6 primi antrosum*  
*versi angulo incurvo & affixi corpori articulo arcua-*  
*to. Abdomen nudum. Cauda obtecta foliolis angustis*  
*non evidentibus.*  
*Ovarium externe contra scabiem Specificum Norvegis. So-*  
*lander.*
- Physo-  
des. 4. O. abdomine subtus nudo, cauda ovata.  
*Habitat in Pelago.*  
*Corpus præter caput & caudam ultimam, ex 7 segmentis*  
*trunci, & 5 caudæ. Antennæ utrinque 2, breves.*  
*Caudæ folium terminale omnino ovatum; ad latera u-*  
*trinqve subtus auctum duobus petiolis diphyllis: foliolis*  
*lanceolatis, obtusis, caudæ brevioribus: Caudæ articuli*  
*subtus obtecti numerosis vesiculis longitudine caudæ.*
- Ento-  
mon. 5. O. abdomine subtus nudo, cauda subulata. *Faun. suec.*  
*1255.*  
*Raj. inf. 43. Afellus marinus cornubiensis alius.*  
*Klein. dub. 38. f. 1, 2. Entomon pyramidale.*  
*Habitat in M. Balthico.*
- Ceti. 6. O. ovalis: segmentis, excepto secundo, in medio in-  
 terruptis. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 89.*



*Martens. spitzb. 85. t. Q. f. D. Pediculus ceti.*  
*Seb. thes. 1. t. 90. f. 5. Pediculus ceti.*  
*Habitat in Balænis.*

marinus. 7. *O. femicylindricus*, cauda ovato-oblonga integra. *It. wgoth. 190.*

*Habitat in Oceano Norvegico.*

scopulo- 8. *O. luteus* strigis fuscis. *It. wgoth. 190.*  
 rum. *Habitat in Oceano Norvegico.*

aquati- 9. *O. cauda rotundata*, stilis bifurcis. *Fn. svec. 1258.*  
 cus. *Raj. inf. 43.*

*Frisch. inf. 10. t. 5.*

*Habitat in Aquis peris.*

*Confer: Entomon hieroglyphicum. Klein. dub. f. 5, sed maximum.*

Afellus. 10. *O. ovalis*, cauda obtusa bifida. *Fn. svec. 1257.*

*Matth. diosc. 257.*

*Raj. inf. 41. n. 1.*

*Aldr. inf. 632.*

*Mouff. inf. 202.*

*Habitat in Domibus, Muris, Hybernaculis, lignis putridis.*

Armadil- 11. *O. ovalis*, cauda obtusa integra. *Fn. svec. 1256.*  
 lo. *It. gotl. 298.*

*Raj. inf. 42. A. lividus.*

*Habitat in Europa sub lapidibus.*

*Pedes plures quam quatuordecim; Segmenta corporis 10, præter caput & caudam.*

242. SCOLOPENDRA. *Pedes* numerosi, totidem utrinque quot corporis segmenta.

*Antennæ* setaceæ.

*Palpi* duo, articulati.

*Corpus* depressum.

Lagara. 1. *S. pedibus* utrinque XII, corpore ovali, cauda penicillo albo. *Fn. svec. 1264.*



- Act. gall. miss.* 1. p. 532. t. 17. f. 4-10.  
*Habitat in Svecia sub muscis.*
- colleo- 2. S. pedibus utrinque XIV, thorace coleoptrato.  
 ptrata. *Habitat in Hispania. D. Z. Hallman.*  
*Antennae flavae, longitudine corporis. Corpus figura S.*  
*forficata, sed longius segmentis singulis tectis clypeolo*  
*semiorbiculato postice emarginato. Elytron simplex,*  
*tanquam ex duobus coadunatum, postice emargina-*  
*tum, incipiens ad 4:um segmentum corporis, tegens*  
*unum tantum alterumve segmentum. Alae sub elytro*  
*angustae simplices. Pedes 14 paribus, longitudine fer-*  
*me corporis spinosi: Tarsi flavis angustissimis.*
- forficata. 3. S. pedibus utrinque XV. *Fn. svec. 1263.*  
*Raj. inf. 45.*  
*Mouff. inf. 199.*  
*Aldr. inf. 635.*  
*Habitat in Europa; in America septentrionali. Kalm.*
- gigantea. 4. S. pedibus utrinque XVII.  
*Brown. jam. 426. t. 42. f. 4. S. maxima pedibus 36.*  
*Habitat in America.*  
*Sequenti multo major, sed simillima.*
- morfi- 5. S. pedibus utrinque XX. *Amoen. acad. 1. p. 325, 506.*  
 taus. *Mal. Ad. Fr. 1. p. 89. Seb. mus. 1. t. 81. f. 3, 4.*  
*Olear. mus. t. 12. f. 5. 2. t. 25. f. 3, 4.*  
*Per. gaz. t. 13. f. 3. Frisch. inf. 11. t. 2. f. 7.*  
*Leuwenh. epist. 102. Catesb. car. 3. p. 2. t. 2.*  
*Bradl. nat. t. 25. f. 4.*  
*Habitat in Indiis.*  
*Oculi utrinque quaterni. Articuli corporis 22, antenna-*  
*rum 20.*
- electrica. 6. S. pedibus utrinque LXX. *Fn. svec. 1261.*  
*Aldr. inf. 636. f. 8.*  
*Frisch. inf. 11. t. 8. f. 1. Raj. inf. 45.*  
*Habitat in Europæ terra.*  
*Lucet in tenebris manifeste.*
- phospho- 7. S. pedibus utrinque LXXVI.  
 rea. *Habitat in Asia, noctu instar Lampyridis ignita ex al-*  
*to cælo decidua in navem, in mari indico & atbio-*  
*pico, 100 miliaribus a continente. An alata uti 2?*



*Caput ovatum, flavescens, excavatum lineis 2 ♂ una transversali. Corpus crassitie pennae pagellae, fili-forme, digito longius, purpurascens, lineis annulis flavis parallelis, constans segmentis 72. Antennae articulis 14, subulatae, ferrugineae.*

occiden- 8. S. pedibus utrinque CXXIII.  
talis. *Habitat in America.*

*Corpus semipeale, ferrugineum, convexiusculum. Antennae articulis 14.*

marina. 9. S. pedibus utrinque . . . corpore pallido : linea dorsali rufa. *It. wgoth. 191.*  
*Habitat in Oceano Atlantico.*

243. JULUS. *Pedes numerosi, duplo utrinque plures, quam corporis segmenta.*

*Antennae moniliformes.*

*Palpi duo, articulati.*

*Corpus semicylindricum.*

ovalis. 1. J. pedibus utrinque XX. *Chin. lagerstr. 36. f. 4.*  
*Habitat in Asia.*

*Segmenta corporis oblongo-ovalis 10, praeter thoracis ♂ caudae.*

crassus. 2. J. pedibus utrinque XCVI. *Chin. lagerstr. 35.*  
*Habitat in Asia.*

terrestris. 3. J. pedibus utrinque C. *Fn. swec. 1260.*

*Niouff. inf. 30.*

*Raj. inf. 46. n. 4.*

*Aldr. inf. 636. f. 4.*

*Frisch. inf. 11. t. 8. f. 3.*

*Fenst. inf. t. 23.*

*Habitat in Europa sub terra.*

indus. 4. J. pedibus utrinque CXV. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 90.*

*Amoen. acad. 1. p. 324. Scolopendra pedibus 96.*

*Seb. mus. 1. t. 81. f. 5.*

*Habitat in Indiis.*



- fabulo- 5. J. pedibus utrinque CXX. *Fn. suec.* 1262.  
 sus. *It. gotl.* 280.  
*Raj. inf.* 47.  
*Habitat in Europæ sabulosis.*
- fuscus. 6. J. pedibus utrinque CXXIV. *Chin. lagerst.* 34.  
*Seb. mus.* 2. t. 24. f. 4, 5.  
*Habitat in Indiis.*  
*Segmenta corporis 62, præter thoracis & caudæ.*
- maximus. 7. J. pedibus utrinque CXXXIV.  
*Marcgr. bras.* 255. Vermis terrestris.  
*Habitat in America.*  
*Segmenta corporis 67, præter thoracis & caudæ.*

---

Animadverti immensum opus DEI,  
 non posse hominem assequi  
 quamvis laboriose quærat.  
*Eccles.*

---







rium, æque attente legit summa sapientia, ac care emit erudita luxuria, a quisquiliis (c), ad Ammirales, Scalesve, Margaritis (d) suis pretiosiores, quas Artificum politura vitiando nobilitat, ut pulchrius pateat in Tritonis COCHLEIS vividis ad *Umbilicum*, *Apertura* cum *Labro* exteriori interioreve, saepe dentato ad *Columellam*, circa quam *Spiræ Anfractūs* læves, sulcati, striati, angulati, nodosi, aculeati, spinosi, frondosi usque in *Micro-nem* apicis; & ut intueatur in Veneris CONCHIS vividis lectis, testarum nativa paria, determinatam figuram, valvulas (sinistram & dextram) æquales l. inæquales, æquilateres l. inæquilateres; inferius dentatos *Cardines* inter *Nates* umbonum, posterius *Ani* impressuram, anterius *Vulvæ* rimam, *Labiis Nymphisque* conniventem, *Hymene* obtectam, exterius *Marginis* ambitum. Meretur imprimis inquirere in fossilium hodie deperditorum protypa, imprimis *Anomiarum*, abyssi cimelia, cum alia sint *Terrestria*, *Lacustria*, *Littorea*, *Maritima*, *Pelagia* alia.

**LITHOPHYTA** Mollusca, animalcula composita testarum, Testisque innixa. *Corallia* hæc prisce plantas æris contactu lapidescentes judicabant, sed recentioribus etiam ex suo semine Lapides germinare, imprimis ob calcaream horum indolem visa, usque dum *Marsiglii* diligentia extra-xerat e mari *Corallia* vegetantia floribus hexandris hexapetalis, a contactu æris se contrahentibus, inque aqua denuo expandendis; at eadem tempestate *Peysonellus* *Corallia* ex animalculis fabricari, ultra seculum post eandem apud sapientiores indos ratam sententiam (e), primum vidit vix audiendus, nisi *Trembleus* Hydras omniam admiratione detexisset, & ad littora curiosos allicuisset, quo via per *Ellisi* *Sertularias* ad *Corallia* aperta fuit.

ZOO-

(c) Speculatie-gods vulgo.

(d) Margaritarum dos in Canlone, Magnitudine, Ode, Lævre Fandere. Pim. IX: 35. Pretiosissima Cleopatra Anomio exposita. Ibid.

(e) Rumph. mus. 152. ad tab. 16 F.



ZOOPHYTA composita Animalcula, in bivio Animalium Vegetabiliumque constituta, *radicata* pleraque *caestosa*, multiplicata *vita ramis*, *geminis caudis*, metamorphosique *florum* animantium, sponte sese moventiam, in *capsulas seminiferas* transeuntiam; ac si Plantæ essent Zoophyta, sensu motuque destituta; & Zoophyta veræ plantæ, sed systemate nervo, sensus motusque organo, instructæ; *equidem his inesse sensum, quæ nec animalium, nec fruticum, sed tertiam ex utroque natura habent. Plin.*

AUCTORES Vermium pretiosi: INTESTINORUM vix ulli; MOLLUSCORUM pauci; TESTACEORUM primarii: sobrius *Bonannus*, ditissimus *Listerus*, solidissimus *Rumphius*, curiosissimus *Petiverus*, absolutissimus *Gualtierus*, nitidissimus *Argenville*, omniumque pulcherrimus *Kratzensteinii Regensius* (f), nec non *Columna*, *Barrelierus*, *Plancus*, *Kleinus*, alii. LITHOPHYTORUM Comes *Marsiglius*, oculatus *Donatus*. ZOOPHYTORUM lynceus *Ellisus*.

---

Mihi contuenti sese persuasit rerum Natura, nihil incredibile existimare de ea.

*Plin. XI: 3.*

---

(f) Regensius operis auctore Cl. Kratzensteinio vixi multas tabulas Nil primas, dum hæc edo, nec quidquam pulchrius.



## GENERUM Characteres.

## I. INTESTINA Animalia simplicia, nuda, artubus destituta.

244. GORDIUS *Corpus* filiforme, æquale, læve.  
 245. FURIA *Corpus* filiforme, æquale aculeis distichis reflexis.  
 246. LUMBRICUS *Corpus* teres, annulatum.  
 247. ASCARIS *Corpus* teres, æquale, utrinque attenuatum.  
 248. FASCIOIA *Corpus* planiusculam: apertura terminali ventralique.  
 249. HIRUDO *Corpus* ore caudaque orbiculo dilatabili.  
 250. MIRAIA *Corpus* carinatum, ore maxilloso tentaculato.  
 251. TEREDO *Corpus* teres, ore tentaculato maxillisque hemisphæricis.

## II. MOLLUSCA. Animalia simplicia, nuda, artubus instructa.

252. LIMAX *Corpus* repens, antice Tentaculis 4, foramineque laterali.  
 253. DORIS *Corpus* repens, antice Tentaculis 8.  
 254. TETHYS *Corpus* bilabiatum, apice foraminibus 2, Tentaculis 2.  
 255. NEREIS *Corpus* repens, lineare; Tentaculis distiche pedatum.  
 256. ATRIODITA *Corpus* repens, ovale, tentaculis distiche pedatum.  
 257. LERNÆA *Corpus* affixum ore, appendiculatum, brachiatum Tentaculis 2.  
 258. PRIAPUS *Corpus* affixum basi, ore terminali.  
 259. SCILLA *Corpus* natans, compressum, pedatum, tentaculis 6.  
 260. HOLOTHURIA *Corpus* natans, apice Tentaculis pendulis.  
 261. TRITON *Corpus* pedatum, Tentaculis XVI: posticis 6 cheliformibus.  
 262. SEDIA *Corpus* natans, carnosum, ore supra cincto brachiis 6.  
 263. MEDUSA *Corpus* natans, gelatinosum, ore subtus centrali.  
 264. ASTERIAS *Corpus* vagum, coriaceum, Tentaculis muricatum, ore subtus 5-valvi.  
 265. ECHINUS *Corpus* vagum, crustaceum, aculeatum, ore subtus 5-valvi.

## III. TE-



## III. TESTACEA Mollusca simplicia, domo calcarea obteeta.

\* *Multivalvia.*

266. CHITON *Testis* pluribus, dorsalibus, ordine longitudinali.  
 267. LEPAS *Testa* multivalvi, inequalvi, tenui.

\* \* *Bivalvia CONCHÆ.*

268. PHOLAS *Testa Cardine* recurvato.  
 269. MYES *T. Cardinis* Dente crasso, vacuo.  
 270. SOLEN *T. Card.* Dente acuminato, vacuo.  
 271. TELLINA *T. Card.* Dentibus: lateralibus alterius vacuis.  
 272. CARDIUM *T. Card.* Dentibus lateralibus reuosis penetrantibus.  
 273. DONAX *T. Card.* Dentibus: laterali remoto vacuo.  
 274. VENUS *T. Card.* Dentibus approximatis, divaricatis.  
 275. SPONDYLUS *T. Card.* Dentibus 2 foraminulo intermedio.  
 276. CHAMA *T. Card.* dentibus 2, obliquis, obtusis.  
 277. ARCA *T. Card.* Dentibus numerosis, penetrantibus.  
 278. OSTREA *T. Cardine* edentulo, scrobiculo ovato.  
 279. ANOMIA *T. Card.* edentulo, lineari, marginali.  
 280. MYTILUS *T. Card.* edentulo, subulato, distincto.  
 281. PINNA *T. Card.* edentulo, coalito.

\* \* \* *Univalvia Spiralia COCHLEÆ.*

282. ARGONAUTA *Testa uniloculari* Animali Sepia.  
 283. NAUTILUS *T. Polythalamia* foramine communicante.  
 284. CONUS *T. Apertura* effusa, lineari, edentula.  
 285. CYPRÆA *T. Apertura* effusa, utrinque dentata.  
 286. BULLA *T. Apertura* subeffusa, obliquata.  
 287. VOLUTA *T. Apertura* effusa, columella plicata.  
 288. BUCCINUM *T. Apertura* canaliculo dextro.  
 289. STROMBUS *T. Apertura* canaliculo sinistro.  
 290. MUREX *T. Apertura* canaliculo recto.  
 291. TROCHUS *T. Apertura* coarctata, subtetragona.  
 292. TURBO *T. Apertura* coarctata, orbiculari.  
 293. HELIX *T. Apertura* coarctata, lunari.  
 294. NERITA *T. Apertura* coarctata semiorbiculari.  
 295. HALIOTIS *T. Aperturæ* labro dilatato pertulso.

\* \* \* \* *Univalvia absque spira regulari.*

296. PATELLA *Testa* conico-patente.  
 297. DENTALIUM *T. libera* subulata utrinque aperta.  
 298. SERPULA *T. adnata*, tabulosa, inferne clausa.



IV. LITHOPHYTA Mollusca composita, basin solidam ædificantia.

299. TUBIPORA *Corallium* tubis cylindricis.  
 300. MILLEPORA *Corallium* tubis obconicis teretibus.  
 301. MADREPORA *Corallium* tubis stellatis.

V. ZOOPHYTA Plantæ vegetantes floribus animatis.

302. ISIS *Stirps* radicata, lapidea, nuda, geniculis corneis.  
 303. GORGONIA *Stirps* radicata, cornea, crustata, continua.  
 304. ALCYONIUM *Stirps* stuposa, corticata, continua.  
 305. TUBULARIA *Stirps* fistulosa, tunicata, subgeniculata.  
 306. ESGHARA *Stirps* papyracea, nuda, porosa.  
 307. CORALLINA *Stirps* fibrosa, crustata, articulata: articulis multifloris.  
 308. SERTULARIA *Stirps* fibrosa, nuda, articulata: articulis unifloris.  
 309. HYDRA *Stirps* subradicata, gelatinosa, apice florifera.  
 310. PENNATULA *Stirps* libera, pennata, basi ore instructa.  
 311. TÆNIA *Stirps* libera, moniliformis, articulata.  
 312. VOLVOX *Stirps* libera, globosa, sobole nidulante.



## I. INTESTINA.

*Animalia simplicia absque artubus, nuda, libera.*

244. GORDIUS. *Corpus* filiforme, æquale, læve.

aquati- 1. G. pallidus, capite caudaque nigris. *Fn. suec.* 1265.  
cus. *It. gottl.* 282. Gordius.

*Gesn. aquat.* 463. Vitulus aquaticus.

*Aldr. insect.* 720. t. 765. Seta f. Vitulus aquaticus.

*Fonst. inf.* t. 25. Meerwijn.

*Habitat in Argilla & Aquis.*

argilla- 2. G. flavescens, extremitatibus concoloribus.  
ceus. *Habitat intra Argillam.*

*Major, nec caput ita distinctum, & cauda acutior.*

medinen- 3. G. totus pallidus. †  
fis.

*Sloan. jam.* 2. p. 190. t. 233. f. 1. Vena medini.

*Kæmpf. amœn.* 524. Dracunculus persarum.

*Velsch. Vena medinentis monographia.*

*Habitat in Indiis, corpus humanum tranans.*

*An a prioribus vere distinctus?*

245. FURIA. *Corpus* filiforme, continuum, æquale,  
utrinque ciliatum: aculeis reflexis  
corpori appressis.

inferna- 1. FURIA. D. C. Solander. *Act. Ups.* mss.  
lis. *Amœn. acad.* 3. p. 322.

*Habitat in Botniæ Sveciæ septentrionalis paludosis.*

*Pessima omnium, ex æthere decidua in corpora anima-*

*lium, ea momento citius penetrat, intra horæ quadran-*  
*tem dolore atrocissimo occidit.*

246. LUMBRICUS. *Corpus* teres, annulatum, lon-  
gitudinaliter exasperatum, po-  
ro laterali.

terrestris. 1. L. trifariam retrorsum aculeatus.

*Fn. suec.* 1271. Lumbricus lævis.



*Raj. inf.* 2. Lumbricus terrestris minor.

*Alar. inf.* 693. Lumbricus terrestris.

*Red. exp. quart. t.* 15. f. 1.

*Sloan. jam.* 2. p. 189. Lumbricus terrestris minor rubicundus.

*β. Raj. inf.* 1. Lumbricus major.

*γ. Raj. inf.* 2. Lumbricus intestinorum teres.

*Vallisn. nat.* 1. t. 3. Lumbricus humanus.

*Habitat in Humo; ascendit noctu.*

Corpus annulis circiter centum constans, annuloque majore cartilagineo cinctum, trisariam retrorsum aculeatum; quarto latere inermi.

Majorem *β.* a minore *α.* vix diversum crederem, et intestinalem *γ.* eandem esse e numero annulorum & aculeis observavi.

marinus. 2. *L. papillis dorsalibus geminatis barbatis. It. wgot.* 189. t. 3. f. 6. *It. scan.* 315.

*Bell. aqu.* 444. Lumbricus marinus.

*Habitat in fundo Maris sub arena.*

247. ASCARIS. Corpus teres, filiforme, continuum, utraque extremitate attenuatum.

vermicu- 1. *A. pollicaris. Fn. svec.* 1269.

laris.

*Habitat in Paludibus, in Radicibus plantarum putrescentibus, in Intestinis Puerorum & Equi.*

lumbri- 2. *A. spithamea.*

coides.

*Habitat in Intestinis Humanis.*

*Spithama & ultra, cum Lumbricis confunditur.*

248. FASCIOLA. Corpus planiusculum, poro terminali ventralique.

hepatica. 1. *F. ovata. It. gottl.* 182. 250. *Fn. svec.* 1274.

*Amœn. acad.* 2. p. 86. *Limax ovatus lividus* margine acuto.

*Roes. app.* 1. p. 199. t. 32. f. 5.

*Schaff. menogr.* 1753. f. 1-17.



*Habitat in aquis dulcibus ad radices lapidum, inque Hepate Pecorum. Diff. de Oviis.*

*Magnitudo seminis Peponis. Corpus ovatum, antrosum acuminatum cum poro; in medio macula oblonga albida, a qua versus utramque extremitatem linea pallida extenditur; in latere inferiore, ubi corpus contractatur versus os, alter porus est.*

intestina- 2. *F. linearis longa. Amœn. acad 2. p. 71. Syst. nat. 6. lis. p. 70. t. 6. f. 1. Act. Stockh. 1747. t. 5. f. 6.*

*Plater. prax 993. Ligula intestinorum.*

*Habitat in Intestinis Picium.*

249. HIRUDO. Corpus oblongum, ore caudaque in orbiculum expandendis se promovens.

sanguifuga. 1. *H. depressa fusca: margine laterali flavo. Faun. svec. 1272.*

*Bergm. act. Stockh. 1757. n. 4. f. 3, 4.*

*Raj. inf. 3. Hirudo maxime vulgaris.*

*Habitat in Aquis dulcibus.*

medicinalis. 2. *H. depressa fusca: lineis flavis dorsalibus sex: intermediis immaculatis, subtus cinerea nigro maculata.*

*Bergm. act. Stockh. 1757. n. 4. f. 1, 2.*

*Raj. inf. 3. Hirudo medicinalis.*

*Habitat in Aquis dulcibus.*

*Vene sector, imprimis Hæmorrhoidum.*

oculata. 3. *H. depressa fusca: punctis octo nigris supra os. Bergman act. Stockh. 1756. p. 199. & 1757. n. 4. f. 5-8.*

*Faun svec. 1273. Hirudo depressa nigra, abdomine subcinereo.*

*Fn. svec. 725. Coccus aquaticus.*

*Habitat in Aquis dulcibus.*

*Ovum planiusculum, ovatum, compositum, est Coccus aquaticus. Fn. svec. 725.*

stagnalis. 4. *H. depressa nigra, abdomine subcinereo. Bergm. act. Stockh. 1757. n. 4. f. 9-11. Hirudo bioculata.*



*Habitat in Aquis dulcibus.*

*Alumne dulcis aquæ pelluntur sale in piscinis & corpore; intus hæmoptysin causantur.*

complanata. 5. H. depressa ovato - oblonga : interaneis fuscis pinnatis pellucetibus.

*Bergm. Act. Stockh. 1757. n. 4. f. 12-14. H. sexoculata.*

*Habitat in Aquis dulcibus.*

*Interanea pulchre pinnata pellucet.*

indica. 6. H. depressa fusca, striis transversis submuricatis centum.

*Habitat in Indiæ marinis.*

*Corpus valde depressum: striis annularibus expansis elevatis. Os admodum dilatatum.*

geometra. 7. H. teres, extremitatibus dilatatis. *Fn. svec. 1275. Frisch. inf. 6. p. 25. t. 11. Hirudo ore caudaque ampla.*

*Rœs. app. t. 32. f. 1-4.*

*Habitat in Aquis dulcibus.*

muricata. 8. H. teres, corpore verrucoso.

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 93. t. 8. f. 3. Hirudo muricata.*

*Habitat in Mari Atlantico.*

250. MYXINE. *Corpus teres, subtus carinatum pinna adiposa.*

*Oculi nulli.*

*Os terminale, cirrosum: Maxillæ duæ transversæ ex Dentibus plurimis, acutis, in fauce. Dens superior solitarius, acutus.*

glutino- 1. MYXINE. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 91. t. 8. f. 4.*

sa. *Will. icht. 107. Raj. pisc. 36. Lampetra cæca, oculis carens.*

*Habitat in Oceano.*

*Intrat & devorat Pisces; aquam in gluten mutat.*



251. TEREDO. *Corpus* filiforme.

*Maxillæ* oris 2 hemisphæricæ.

*Præputium* intra maxillas rotundum, ciliatum.

*Sipho* intra præputium.

*Tentacula* ad os plerumque 8.

lapida. 1. T. intra lapides.

*Wabler act. Stockh. 1754. p. 144. t. 3. f. A-F.*

*Habitat ad Italiæ littora.*

*Corpus filiforme. Tentacula 8 circiter circum caput, 4 ad os.*

2. intra lignum testa flexuosa. *Faun. suec. 1329.*

*Willis. nat. 2. t. 4.*

*Reiki Tered. t. 1.*

*Blanc conch. 17. n. 2.*

*Habitat intra Naves & palos marinos, Calamitas Navium, ex indiis propagata.*

*Animal filiforme, molluscum, apodum. Maxillæ 2 calcareæ, hemisphæricæ, excisæ antice, subtus angulo recto & obtuso. Intra bos, Præputium rotundum labio superiore aducto, intra quod Sipho peltatus; obducit labyrinthos suos Testacea tunica, sed non a ligno distincta, ideoque ad nuda intestina potius quam ad testacea pertinere visa est.*

*Monographia: Selli historia Teredinis. Traject. 1733. 4:to.*



## II. MOLLUSCA.

*Animalia simplicia, nuda, artibus instructa, libera.*

252. LIMAX. *Corpus oblongum, subtus disco plano se promovens.*

*Foramen ad latus, per quod genitalia & excrementa emittuntur.*

*Tentacula supra os quatuor.*

- ater.** 1. *L. ater. Faun. suec. 1276.*  
*List. angl. 131. Limax ater.*  
*Gesn. anat. 254. Cochlea nuda 3 tota nigra.*  
*Aldr. inf. 702. Limax tota nigra.*  
*Habitat in nemoribus & Lucis umbrosis.*
- rufus.** 2. *L. subrufus. Fa. suec. 1277.*  
*Aldr. inf. 702. Limax magna, colore rufo.*  
*List. angl. app. 6. p. 1. Limax 4 subrufus montanus.*  
*Habitat ad Montium radices.*
- maximus.** 3. *L. cinereus maculatus. It. æl. 61. Fa. suec. 1278.*  
*List. angl. app. 1. f. 2. Limax cinereus maximus striatus & maculatus.*  
*Habitat in sylvis frondosis umbrosis.*
- agrestis.** 4. *L. cinereus immaculatus. Fa. suec. 1279.*  
*List. angl. 130. Limax cinereus parvus immaculatus pratensis.*  
*Blank. inf. 151. t. 13. f. X.*  
*Habitat in Agris, Hortis, Pratis.*  
*Autumno Secale recensiter satum depascitur.*
- flavus.** 5. *L. flavus maculatus. Faun. suec. 1280.*  
*List. exercit. anat. 1. t. 1. Limax succini colore, albidis maculis insignitus.*  
*Habitat inter Plantas.*



253. DORIS. *Corpus* oblongum, subtus planum,  
*Tentacula* ad os circiter octo.

verruco- 1. DORIS corpore supra tuberculato.

sa. *Rumph. mus.* 38. *Limax* marina verrucosa.

*Seb. mus.* 2. t. 61. f. 5. *Mitella* verrucosa.

*Habitat in Oceano.*

*Corpus* oblongum, semicylindricum, convexum, extre-  
mitatibus rotundatis, supra verrucosum. *Margo* late-  
ralis deflexus.

*Pes* ut in *Lirace*, ovalis, oblongus marginæ plano. *Os*  
*tentaculis* brevissimis, circiter octo.

254. TETHYS. *Corpus* oblongum, bilabiatum: cor-  
pusculo medio cartilagineo ob-  
longo.

*Tentacula* duo, cuneiformia.

*Foramina* duo, spirantia.

limacina. 1. T. auriculis quatuor.

*Habitat in Oceano Australi.*

*Corpus* oblongum, antice quasi 4 auriculis acutis instra-  
ctum.

leporina. 2. T. corpore rubro, margine membranaceo, auriculis  
duabus.

*Rond. pisc.* 1. p. 520. *Lepus* marinus.

*Bell. aquat.* 437. *Lepus* marinus.

*Gejn. aquat.* 475. *Lepus* marinus.

*Alar. exsangu.* 78. *Lepus* marinus 1.

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Conf. Column. aqu.* t. 26. f. 2, 3.



255. NEREIS. *Corpus* oblongum, lineare, segmentis annularibus.

*Tentacula* lateralia, ad singula segmentum utrinque solitaria

*Os* terminale: unguibus duobus, arcuatis, oppositis.

lacustris. 1. *N. linearis*, lingua exserta.

*Trembl. polyp. t. 6. f. 1.*

*Rœs. inf. suppl. polyp. t. 79. f. 1. & t. 78. f. 16. 17.*

*Habitat in Aquis dulcibus.*

cærulea. 2. *N. glabra cærulescens*.

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 93. Nereis tentaculorum 184 paribus.*

*Chinens. Lagerstr. 38. Nereis cærulea.*

*Seb. mus. 1. p. 132. t. 82. f. 3.*

*Brown. jam. 395. t. 39. f. 1. Nereis tentaculis capitibus binis tripartitis, corporis pluribus penicilliformibus, duplici serie ad latera positis.*

*Habitat in Oceano.*

gigantea. 3. *N. tentaculorum fasciculis triplici ordine.*

*Seb. mus. 1. t. 81. f. 7. Millepoda marina amboinensis.*

*Habitat in M. Indico.*

pelagica. 4. *N. segmentis annularibus XL, subtus sulcata.*

*Habitat in Pelago.*

*Os unguium pari ad apicem. Supra Caput 2 tubercula prominula. Inter tubercula cirri 2, & ab utroque latere cirri 4. Corpus filiforme, subtus sulco longitudinali. Segmenta 44 circiter, cum totidem paribus pediformibus e tentaculis & setis compositis.*

noctiluca. 5. *N. segmentis XXIII annularibus.*

*Amœn. acad. 3. p. 203. t. 3. Noctiluca marina.*

*Grißl. vened. quart. Scolopendre marie luisante.*

*Vianelli monogr. Luccioletta dell' aqua marina.*

*Habitat in omni facile mari, aquas ignitas quasi redens ipsa præ parvitate nudis oculis inconspicua.*



256. APHRODITA. *Corpus* ovale, utrinque pedibus pluribus fasciculo fetaceo.  
*Tentacula* oris 2, bipartita.

squamata. 1. *A. oblonga*, dorso squamato lævi.  
*Habitat in Pelago.*

*Corpus oblongiusculum, tectum squamis 12, ovatis, latere exteriore affixis. Pedes 24 parium, unguiculati, brevissimi. Tentacula 2, brevissima, bipartita. Os foramine involutum. Cauda setis aliquot brevibus terminata.*

aculeata. 2. *A. ovalis hirsuta aculeata.*

*Faun. suec. 1284. Amœn. acad. 1. p. 326. Mus. Ad. Fr. 1. p. 93. Aphrodita nitens.*

*Barthol. act. 3. p. 88. t. 88. Vermis aureus.*

*Barrel. rar. 131. t. 1284.*

*Swamm. bibl. t. 10. f. 8. 14.*

*B. Seb. mus. 1. t. 90. f. 1.*

*Habitat in Oceano.*

257. LERNÆA. *Corpus* oblongum, teretiusculum.  
*Ovaria* bina tanquam caudæ.  
*Tentacula*, quasi 2 brachia.

cyprina- 1. *L. corpore* obclavato, thorace cylindrico bifurco, brachia.  
cea. *chiis apice lunatis.*

*Faun. suec. 1282. t. 2. f. . . Lernæa tentaculis quatuor: duobus apice lunatis.*

*Habitat in Cyprinis Caralliiis, frequens in piscinis.*

asellina. 2. *L. corpore* lunato, thorace cordato.

*It. wgeth. 171. t. 3. f. 4. Lerneæ cauda duplici tereti.*

*Habitat in branchiis Gadi, adeoque in mari.*

salmo- 3. *L. corpore* obovato, thorace obcordato, brachiis duobus linearibus confertis.  
nea.

*Brander piscat. cumoens. 25. t. 1. f. 1.*

*Act. Stockh. 1751. p. 185. t. 6. f. 1-5. Pediculus salmonis.*

*Habitat in branchiis salmonum, ergo etiam marina.*



Thorax obcordatus, apice desinens in os bilabiatum, acutiusculum: labio superiore emarginato; inferiore bifido. Ad basin thoracis Brachia 2 fujormia longitudinae corporis, apice coeuntia & affixa præde. Apici adominis adherent Ovaria duo, cylindrica, granulata, longitudine totius animalis.

258. PRIAPUS. Corpus oblongum, teres, basi affixum.

Os terminale dentibus incurvis: rostro cylindrico radiato.

equinus. 1. P. semiovalis læviusculus.

Mus. Ad. Fr. 1. p. 93. Tethys semiovatus. \*

Habitat in oceano Europæo.

humanus. 2. P. cylindricus striis annularibus, glande striis longitudinalibus elevatis. Chin. Lagerstr. 30. n. 42. \*

Habitat in Mari Indico.

259. SCYLLÆA. Corpus compressum, oblongum, dorso canaliculato; Brachiis subtus trium parium obtusis.

Os foramine edentulo terminali.

pelagica. 1. SCYLLÆA.

Mus. Ad. Fr. 1. p. 56. Lepus pelagicus.

Osb. iter. 306. Zoopterygius.

Seb. mus. 1. t. 74. f. 7.

Habitat in Pelagi Fuco natante.

Corpus oblongum, compressum, molluscum. Os apice tenuiore perforato, edentulo. Dorsum longitudinaliter canaliculatum fossala crenata, qua Fuco affigitur quiescens. Infusica corporis pars obtusa, latior. Brachia 3 parium: primum sub ore, minus, rotundius; secundum sub medio corporis, foliaceum, oblongum, repandum, obtusius, intus papillis adpersum; tertium versus posteriora, simile primo pari.



260. HOLOTHURIA. *Corpus* gibbum, nudum, ovale, natans.

*Tentacula* saepius ad alteram extremitatem, inæqualia numero & figura.

Physalis. 1. H. cirris difformibus.

*Rumph. mus.* 49. Holothuria.

*Sloak. jam.* 1. p. 7. t. 4. f. 5. Urtica marina soluta purpurea oblonga, cirris longissimis.

*Chin. lagerstr.* 40. f. 6.

*Brown. jam.* 386. Anthusa cirra subrebellis venosa.

*Osborn. iter.* 284. t. 12. f. 1. Physalis pelagica.

*Habitat in Pelago.*

*Corpus* ovatum, subtrigonum, hyalinum. *Dorsum* acutum, obscure viride, unde nervi excurrunt plurimi, antice rufescens. *Rostrum* spirale, saepe, ac apicem crassiore. *Tentacula* sub apice crassiore plurima, inæqualia: horum breviora teretia, crassiora; media capillaria, apice latro-globosa, reliqua majoria, longiora: quorum intermedium crassius & duplo longius.

Thalia. 2. H. crista compressa lineis lateralibus integris. †

*Brown. jam.* 384. t. 43. f. 3. Thalia oblonga, crista perpendiculari compressa quadrata, lineis lateralibus integris.

*Habitat in Pelago Americano.*

caudata. 3. H. caudata, crista depressa: lineis lateralibus interruptis. †

*Brown. jam.* 384. t. 43. f. 4. Thalia oblonga caudata, crista depressa rotundata: lineis lateralibus interruptis.

*Habitat in Pelago.*

denudata. 4. H. destituta crista caudaque. †

*Brown. jam.* 384. Thalia oblonga, lineis interruptis cauda & crista destitutis.

*Pis. bras.* 296. Moucicu.

*Habitat in Pelago Americano.*



261. TRITON. *Corpus* oblongum.

*Os* lingua involuta, spirali.

*Tentacula* XVI: utrinque 6: posticis cheliferis.

*littoreus*. 1. TRITON.

*Habitat in foraminibus Rupium submarinarum.*

262. SEPIA. *Brachia* sex interius adspersa cotyledonibus (præter 2 *Tentacula* longiora quibusdam).

*Os* inter brachia, terminale.

*Oculi* ? infra tentacula versus corpus.

*Corpus* vagina excipiens pectus.

Octopoda- 1. S. corpore ecaudato, tentaculis nullis. *Mus. Ad. Fr. dia.*

1. p. 94. \*

*Hasselqv. act. ups.* 1750. p. 33. Octopodia.

*Bell. aqu.* 330. t. 331.

*Rond. pisc.* 513. Polypus octopus.

*Fonst. exsangu.* 5. t. 1. f. 1. Polypus.

*Habitat in Mari Mediterraneo.*

*In cibo apponi debet rubens ex suo condimento, quod coctione addito nitro in rubrum vertitur. Lister. Aperto tantus effulsit splendor, ut remota tempore vesperino candela, totum palatium ardere videretur. Barthol. act.* 5. obs. 109.

officina- 2. S. corpore ecaudato marginato, tentaculis duobus. *Mus. lis.*

*Ad. Fr.* 1. p. 93.

*Faun. svec.* 1281. *Amœn. acad.* 1. p. 325. \* Sepia.

*Gesn. aqu.* 851.

*Aldr. exsangu.* 44.

*Bell. aquat.* 336.

*Rond. aqu.* 1. p. 498.

*Olear. mus.* 97.

*Habitat in Oceano.*

*Continet os officinale & atramentum quo se occultat; eo literæ pinguntur. Congros ejus brachia rodere, sed renasci, sicut Lavertis caudam, haud falsum. Plin. IX: 29.*



- media. 3. S. corpore depresso caudato-ancipiti.  
*Rond. pisc. 508. Loligo parva.*  
*Habitat in Pelago.*  
*Similis Sepie officinali, sed latera membrana cæca, que*  
*membrana affigitur tantum lateribus ad dimidium,*  
*nec longitudinalis est.*
- Loligo. 4. S. corpore subcylindrico subulato, cauda ancipiti-rhombica.  
*Neesbim. microsc. 1. t. 12. Olear. mus 44. t. 26. f. 2.*  
*Bell. aqu. 339. Rond. pisc. 506. Loligo.*  
*Osbeck. iter. 66. Sepia Loligo.*  
*Habitat in Pelago.*  
*Aqua insuscata effuso atramento absconditur & cauda*  
*extra aquam exsilt.*
- Sepiola. 5. S. corpore postice alis duabus subrotundis. †  
*Rond. pisc. 519. Font. aquat. t. 1. f. 8. Sepiola.*  
*Habitat in M. Mediterráneo.*  
*Parva, ad postica corporis utrinque alam s. auriculam*  
*rotundatam habet.*

263. MEDUSA. Corpus gelatinosum, orbiculatum,  
 depressum.  
 Os subtus, centrale.

- Porpita. 1. M. orbicularis supra plana; subtus convexiuscula fulcata villosa.  
*Chin. lagerstr. 43. f. 7, 8.*  
*Mus. Teyin. 96. Medusa parva figura porpitæ.*  
*Act. angl. 301. p. 2051. Animalcula ex Yvica maris*  
*Mediterranei.*  
*Habitat in India.*
- cruciata. 2. M. orbicularis, cruce alba.  
*Habitat in Oceano Europæo.*
- æquorea. 3. M. orbicularis planiuscula, margine inflexo villoso tentaculato. *Læf. †*  
*Habitat in Pelago.*

T t 2

4. M.

Medusa vestu vigatur; vis peritura mordax; contrahit se vigus a. p. æternitate pisciculo frontem suam pangit, compl. d. d. decorat; ord. et in vado. h. excrementa per summa reddi. *Plin. IX: 45.*



- aurita. 4. *M. orbicularis* subtus quatuor cavitatibus.  
*Fn. svec. 1287. It. xl. 160. It. wgot. 172. t. 3. f. 2.*  
*Kalm. it. 2 p. 109.*  
*Habitat in Mari Balthico, Oceano.*
- capillata. 5. *M. orbicularis* convexa, margine sedecies emarginato;  
 subtus pilosa.  
*Faun. svec. 1286. It. wgot. 172. t. 3. f. 3.*  
*Habitat in Oceano septentrionali.*
- pilcaris. 6. *M. orbicularis*: disco capitato, limbo foraminibus octo;  
 subtus forniculato - pilosa.  
*Habitat in Pelago.*
- marfupia- 7. *M. semiovata*, margine tentaculis quatuor.  
 lis. *Plant. rar. 41. t. 4. f. 5. Urtica soluta marfupium*  
*referens.*  
*Habitat in M. Mediterraneo.*
- pelagica. 8. *M. hemisphærico - concava*, margine crenato - incurva-  
 to, tentaculis octo. *Læfl. †*  
*Habitat in Oceano Americano.*  
*Corpus sub disco quadrilobatum.*
- brachia- 9. *M. orbicularis* margine brachiis novem: apicibus novem,  
 ta. extimo tentaculis novem. †  
*Habitat in Pelago.*
- Beroe. 10. *M. ovata angulata*, costis octo ciliatis.  
*Brown. jam. 384. t. 43. f. 2.*  
*Habitat in Mari Americano.*
- Verella. 11. *M. ovalis* concentricè striata, margine ciliato, supra  
 velo membranaceo.  
*Col. ecphr. 20. t. 22. Urtica marina soluta.*  
*Habitat in Pelago. Læfling. In Mari Mediterraneo.*  
*Brander.*  
*Ovalis centro prominulo, lineis concentricis, margine ci-*  
*liato; supra linea oblique transversali; supra etiam*  
*membrana, dorsalem jecans lineam inferiorem, rigida-*  
*la, latitudine corporis.*



264. ASTERIAS. *Corpus depresso: crusta subco-*  
*riacea, tentaculis muricata.*  
*Os centrale, quinquevalve.*

\* *Integra.*

Luna. 1. *A. integra semiorbicularis lunata.*

*Habitat in India.*

*Corpus absque radiis, magnitudine imperialis, lunatum, compressum, punctis eminentibus undique adpersum.*

\* \* *Stellatæ.*

rubens. 2. *A. stellata radiis lanceolatis gibbis undique aculeata.*

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 95.*

*Faun. svec. 1285. It. H'got. 172. Asterias radiis quinque latiusculis asperis.*

*Plot. oxf. 85. n. 16. t. 2. f. 2, 3. Pet. mus. 6. n. 20. Asteria.*

*Barr. rar. 130. t. 1288. Stella marina læte rubens spinosa.*

*Olear. mus. 55. t. 28. f. 4.*

*Link. stell. t. 4. f. 5; t. 9. f. 16; t. 10. f. 16; t. 14. f. 23, 25; t. 15. f. 18, 26; t. 34. t. 58; t. 40. f. 70; t. 30. f. 50; t. 36. f. 62. Stella marina.*

*β. Column. aqu. 5. t. 6. Stella marina Cometa.*

*Habitat in Oceano frequens.*

glacialis. 3. *A. stellata radiis heptagonis: angulis aculeatis.*

*Link. stell. t. 7. f. 9; t. 32. f. 52; t. 35. f. 60; t. 36. f. 61; t. 38. f. 69. Stella marina.*

*Habitat in Oceano septentrionali.*

reticulata. 4. *A. stellata radiis reticulato-aculeatis.*

*Mus. Tess. 114. t. 19. f. 1. Asterias radiata, centro dorsali nodis 5 circumvallato.*

*Rumph. mus. t. 15. f. D.*

*Link. stell. t. 41. f. 72; t. 23. f. 36. Stella marina.*

*Sloan jam. 2. p. 272. Stella marina maxima reticulata.*

*Habitat in M. Indico.*

nodosa. 5. *A. stellata radiis convexis longitudinaliter elevatis muricatis.*

*Mus. Tessin. 114. t. 9. f. 3.*



*Grew. mus.* 123. t. 8. *Stella marina coronalis.*

*Link. stell.* t. 3. f. 3; t. 7. f. 8; t. 26. f. 41; t. 25. f. 40. *Stella marina.*

*Rumph. mus.* 39. t. 15. f. A. *Stella marina quarta.*  
*Habitat in M. Indico.*

arancia- 6. A. Stellata disco tentaculis hispidis muricato, margine  
ca. articulado, varie aculeato.

*Mus. Tess.* 114. t. 9. f. 3.

*Barr. ic.* 1281.

*Link. stell.* t. 4. f. 11; t. 5. f. 6; t. 8. f. 12; t. 23. f. 38; t. 27. f. 44; t. 36. f. 63.

*Habitat in M. Mediterraneo.*

equifus. 7. A. Stellata disco radiis punctis pertuso, tubercu-  
lis, margine lucidato latus simplici serie tenta-  
culato.

*Barr. icon.* 1285.

*Link. stell.* t. 6. f. 13; t. 12. f. 21; t. 13. f. 22; t. 23. f. 37; t. 24. f. 39; t. 27. f. 45; t. 33. f. 53.

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Hæc etiam juxta disco gaudet, non prior.*

lævigata. 8. A. Stellata radiis semicylindricis obtuse octagonis mu-  
ticis.

*Rumph. mus.* t. 15. f. E.

*Grew. mus.* t. 8. f. 1, 2.

*Link. stell.* t. 28. f. 57. *Stella marina lævior.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

Radii subcylindrici juxta an rimam in serie dentati.

\* \* \* *Radiata.*

spinosa. 9. A. radiata radiis quinque, corpore orbiculato quinque-  
lobo.

*Rumph. mus.* 40. t. 15. f. B. C.

*Det. amb.* t. 3. f. C. *Stella marina V. scolopendroides.*

*Barr. ic.* 131. t. 1295. *Stella marina ophioceras*  
f. ophiurus.

*Siöan. jam.* 2. p. 272. t. 244. f. 8, 9. *Stella marina*  
*minor echinata purpurea.*

*Martens. spizsä.* t. P. f. D.

*Link. stell.* t. 2. f. 4; t. 11. f. 17; t. 22. f. 35. *Stella*  
*marina.*

*Habitat in Oceano.*



**pectinata-** 10. *A. radiata* radiis duplicatis : superioribus pinnatis, inferioribus filiformibus.  
*Barr. rar. t. 1282. f. 1.* Stella marina decacnemos fimbriata.  
*Column. phytob. 109. t. 29.* Stella marina altera.  
*Pet. gaz. t. 4. f. 6.* Stella chinensis perelegans dupliciter radiata.  
*Link. stell. t. 37. f. 64, 66.* Stella marina.  
*Habitat in M. Indico.*

**multiradiata.** 11. *A. radiata* radiis palmato-multiplicatis pinnatis : inferioribus filiformibus.  
*Link. stell. t. 21. f. 33, t. 22. f. 34.* Stella marina.  
*Habitat in M. Indico.*  
*Valde affinis A. pectinatae, si non sola varietas.*

**Caput medusæ.** 12. *A. radiata* radiis dichotomis.  
*Mus. Ad. Fr. 1. p. 95.*  
*Rumph. mus. 41. t. 16.* Caput Medusæ.  
*Martens. spitzb. t. P. f. E.*  
*Link. stell. t. 18. f. 29; t. 19. f. 30, 31; t. 20. f. 32; t. 29. f. 48; t. 30. f. 49.*  
*Habitat in omni Oceano, imprimis Pelagico.*

265. **ECHINUS.** Corpus subrotundum, crusta ossea rectum, spinis mobilibus læpius aculeatum.

Os quinquevalve subtus.

\* *Regulares ano verticali.*

**esculentus.** 1. *E. hemisphærico-globosus*; ambulacris denis; areis obsolete verrucosis.  
*Faun. svec. 1289.* Echinus subglobosus, vertice plano.  
*List. angl. 169. t. 3. f. 13.* Echinus marinus aculeorum vestigiis nonnihil eminentibus.  
*Rumph. mus. 31. t. 13. f. B.* Echinus esculentus.  
*Klein. echinod. 16. t. 9.* Cidaris miliaris.  
*Habitat in Oceano Europæo & Indico.*  
*Testa punctis callosis obsolete; apertura subrotunda, nec 10 fissuris. Spinæ violacæ apice albæ.*

T t 4

2. E.

Ideam sculpturæ Echinorum distincte formaturis, comparationem ejusdem instituat cum Horto in Areas sive Pulvillos diviso, Ambulacris distincto.



- Globulus. 2. E. hemisphærico-subglobosus; ambulacris denis; areis latero muricatis, medio porosis.  
*Habitat in O. Indico.*
- sphæroides. 3. E. hemisphærico-gibbosus; ambulacris denis, undique muricatis, medio porosis.  
*Habitat in O. Indico.*
- Gratilla. 4. E. hemisphærico-gibbosus; ambulacris denis triplicatis; areis decussatim muricatis.  
*Habitat in O. Indico.*
- Lixula. 5. E. hemisphæricus: ambulacris denis: paribus approximatis; areis transverse punctatis muricatis.  
*Habitat in O. Indico.*
- saxatilis. 6. E. hemisphærico-depressus: ambulacris denis: paribus approximatis: areis longitudinaliter verrucosis.  
*Rumph. mus. 31. t. 14. f. A. Echinus saxatilis.*  
*Blanc. echinod. 17. t. 2. f. A. B.*  
*Habitat in M. Mediterraneo.*
- Diadema. 7. E. hemisphærico-depressus: ambulacris quinque longitudinaliter verrucosis; areis lanceolatis.  
*Rumph. mus. t. 14. f. B.*  
*Pet. amb. t. 8. f. 5. Echinus s. Diadema turcarum.*  
*Habitat in M. Indico.*
- Cidaris. 8. E. hemisphærico-depressus; ambulacris quinque repandis linearibus; areis alternatim bifariis.  
*Rumph. mus. 33. t. 13. f. 3. Echinometra digitata 2 rotunda.*  
*Pet. amb. t. 7. f. 2.*  
*Bonnar. mus. f. 17.*  
*Gvalt. test. t. 108. f. D. E.*  
*Argenv. conch. t. 28. f. F.*  
*Klein. echinod. 19. t. 7. Cidaris mamillata mauri.*  
*Habitat in Oceano.*
- mamillatus. 9. E. hemisphærico-ovalis: ambulacris denis flexuosis; areis muricatis verrucosis: angustioribus abbreviatis.  
*Rumph. mus. 32. t. 13. f. 1. Echinometra digitata 1 oblonga.*  
*Gvalt. test. t. 108. f. C.*  
*Argenv. conch. t. 28. f. E.*



*Klein. echinod. 19. t. 6, Cidaris mamillata pauli.*

*Habitat . .*

**Lucun-** 10. E. hemisphærico-ovalis; ambulacris denis flexuosis,  
**ter.** areis mucatis: angustioribus longitudinalibus.

*Gvalt. test. t. 107. f. C.*

*Habitat in O. Indico.*

**atratus.** 11. E. hemisphærico-ovalis depressiusculus: spinis truncatis  
brevissimis obtusissimis: marginalibus clavatis depressis.

*Habitat in India; e Museo Tessiniano.*

*Spinæ brevissimæ, obtusissimæ subcontigue tegunt testam;  
sed marginales elongatæ, læves, depressæ.*

\* \* *Irregulares: apertura ani subtus uti os.*

**spatagus.** 12. E. ovatus gibbus: ambulacris quaternis depressis.

*Fn. fec. 1290. Echinus subcompressus, vertice prominulo.*

*Rondel. exsangu. 580. gall. 416.*

*Bonan. recr. 1. t. 16. Echinus spatagus.*

*List. app. 28. Echinus minor angulosus ab utraque par-  
te compressus.*

*Rumph. mus. t. 14. f. 1.*

*Sloan. jam. 2. p. 268. t. 242. f. 3, 4, 5. Echinus no-  
stra spatagus.*

*Gvalt. test. t. 109. f. A.*

*Habitat in Oceano omni.*

**lacuno-** 13. E. ovatus gibbus; ambulacris quinis depressis.

**sus.**

*Rumph. mus. t. 14. f. 2.*

*Gvalt. test. t. 109. f. C.*

*Breyn. echin. 61. t. 5. f. 1. 2.*

*Habitat in O. Indico.*

**rosaceus.** 14. E. planiusculus ovato-subglobosus: ambulacris quinis  
ovalibus, superficie punctata.

*Rumph. mus. 36. t. 14. f. E. Echinus planus Zœreca-  
len dictus.*

*Pet. amboin. t. 1. f. 10.*

*Bonan. recr. 1. t. 33.*

*Gvalt. test. t. 110. f. A. C.*

*Klein. echinod. t. 17. f. 1.*

*t. 18. f. 1.*

*t. 19. f. A. B.*

*Habitat in O. Asiatico.*



reticula- 15. E. planiusculus ovatus integer: ambulacris quinis ova-  
tus.  
tus.      Fusus, superficie reticulata.

*Shaw. jam. 2. p. . t. 212. f. 7-10.*

*Gvalt. test. t. 110. f. D.*

*Habitat in O. Americano.*

Placenta, 16. E. planus orbiculatus: ambulacris quinis bipartitis, a-  
no marginali.

*Rumph. mus. t. 14. f. G.*

*Pet. amb. t. 11. f. 5.*

*Gvalt. test. t. 110. f. G.*

*Breyn. echin. 64. t. 7. f. 7, 8.*

*Klein. echinod. t. 20. f. A. B.*

*Habitat in Oceano meridionali.*

Cathartes 17. E. planus suborbiculatus: ambulacris quinis ovalibus,  
164      ano subremoto.

α. Foraminibus nullis pervius, lobatus.

*Gvalt. test. t. 110. f. F. F.*

*Klein. echinod. t. 22. f. E. F.*

β. Foraminibus duobus pervius, lobatus.

*Gvalt. test. t. 110. f. H. H.*

*Breyn. echin. 64. t. 7. f. 5. 6.*

*Klein. echin. t. 22. f. A. B.*

γ. Foraminibus quinque pervius, indivisus.

*Pet. mus. 19. f. 125.*

*Gvalt. test. t. 110. f. E. E.*

*Klein. echin. t. 21. f. C. D.*

δ. Foraminibus nullis pervius, indivisus.

*Gvalt. test. t. 110. f. B.*

*Breyn. echin. 64. t. 7. f. 1. 2.*

*Habitat in M. Indico.*



## III. TESTACEA.

*Animalia Mollusca, simplicia, domo calcarea propria obteſta.*

266. CHITON. *Animal Doris.*

*Testæ plures, longitudinaliter digeſtæ, dorſo incumbentes.*

hiſpidus. 1. C. teſta ſexvalvi ſtriata.

*Habitat . .*

tubercu- 2. C. teſta ſeptemvalvi, corpore tuberculato.

latus. *Muſ. Ad. Fr. 1, p. 96. Chiton oſcabrion.*

*Pet. gaz. t. 1. f. 3. Oſcabrion.*

*Sloan. jam. 2. p. 233. Patella oblonga articulata.*

*Habitat in America.*

aculea- 3. C. teſta octovalvi ſtriata, corpore ſubaculeato.

tus. *Rumph. muſ. t. 10. f. 4. Limax marina.*

*Habitat in Aſia.*

puncta- 4. C. teſta octovalvi lævi, corpore excavato-punctato.

tus. *Chin. Lagerſtr. 46. Chiton corpore punctato, teſtis octo.*

*Osbeck. iter. 62.*

*E. N. C. 1727. p. 63. t. 1. f. 1, 2. Calva ſerpentis diadema.*

*Habitat in Aſia, Europa, America.*

267. LEPAS. *Animal Triton.*

*Teſta multivalvis, inæquivalvis.*

Balanus. 5. L. teſta conica ſulcata, operculis acuminatis.

*Fn. ſvec. 1349.*

*Leuwenb. epiſt. 82. p. 472. t. 465.*

*Liſt. angl. 196. t. 2. f. 41.*

*conch. t. 444. f. 287.*

*Argenv. conch. t. 30. f. D.*

*Klein. oſtr. t. 12. f. 94, 95.*

*Habitat ad littora oceani Europæi.*



- Tintinnabulum.** 6. L. testa conica, rugosa obtusa.  
*Lang. test.* 4. Balanus tintinnabuliformis lævis.  
*Rumph. mus.* t. 41. f. A.  
*Gvalt. test.* t. 106. f. H.  
*Argenv. conch.* t. 30. f. A.  
*Habitat . . .*  
*Valde affinis precedenti, sed pollice crassior.*
- Testudinaria.** 7. L. testa plano-convexa, radiis sex excavatis striatis.  
*Bonan. kirch.* 1. f. 36.  
*Rumph. mus.* t. 40. f. K. Verruca testudinaria.  
*Gvalt. test.* t. 106. f. M.  
*Pet. gaz.* t. 9. f. 9.  
*amb.* t. 1. f. XI.  
*Planc. conch.* t. 5. f. 2. 2.  
*Klein. ostr.* t. 12. f. 99.  
*Habitat in Pelago, sæpe in Testudinibus.*
- Mitella.** 8. L. testa compresso-erecta sessili difformiter striata.  
*Lang. t. 4.* Balanus tulipiformis striatus.  
*Rumph. mus.* t. 47. f. M.  
*Argenv. conch.* t. 30. f. E.  
*Pet. gaz.* t. 6. f. 10. Balanus chinensis striatus.  
*Klein. ostr.* t. 12. f. 100.  
*Habitat . . .*
- anatifera.** 9. L. testa compressa quinquevalvi lævi, intestino infidente.  
*Fz. locc.* 1370. Lepas testa compressa basi membrana cylindrica.  
*Aldr. orn. c.* 20. f. 548. Concha anatifera.  
*Bonan. recr.* 2. f. 2. Tellina pedata.  
*Stalpart. obs.* 2. p. 458. t. 15.  
*Barth. cent.* 6. p. 271.  
*Worm. mus.* 256.  
*Marcgr. bras.* 188.  
*Grew. mus.* 148.  
*Hoffm. ins.* 2. t. 6.  
*Sib. mus.* 170. n. 2.  
*List. exerc.* t. 7. f. 4, 5.  
*conch.* t. 440. f. 283.  
*Gvalt. test.* t. 106. f. A-D.

Argenv.



*Argenv. conch. t. 30. f. F. G.*

*Planc. conch. t. 5. f. 4.*

*Column. phytob. 110. t. 30.*

*Baub. pin. 513. Arbor ex cujus ligni putredine vermes.*

*1. 2. 3.*

*Needb. micr. t. 7. f. 1. 2. & t. 6.*

*Osborn. iter. 82. Lepas anatifera c. Tritone.*

*Habitat in Pelago.*

*Duplex varietas: lævis quæ frequentior; striata quæ sæpius fossilis observatur.*

268. PHOLAS. *Animal . . .*

*Testa bivalvis, divaricata, cum minoribus sæpe accessoriis.*

*Cardo recurvatus, connexus cartilagine.*

Dacty- 10. Ph. testa oblonga reticulato-striata,

lus.

*Rond. test. 23.*

*Bell. aqu. 414.*

*List. angl. app. t. 2. f. 3.*

*Bonap. recr. 2. t. 25, 26, 27.*

*Gualt. test. 105. f. A. B. D.*

*Planc. conch. 35. n. 3.*

*Habitat intra Europæ australioris scopulos.*

costatus. 11. Ph. testa ovata costis elevatis striata.

*Gualt. test. t. 105. f. G.*

*Habitat intra scopulos Europæ australis.*

striatus. 12. Ph. testa ovata multistriata striata.

*Gualt. test. t. 105. f. F.*

*Habitat intra scopulos maritimos Europæ australis.*

candidus. 13. Ph. testa oblonga unilobata striata maculata.

*List. angl. 193. t. 5. f. 39.*

*app. t. 2. f. 4, 6.*

*Habitat in Europæ & Americæ scopulis marinis.*

14. Ph.

Pholades tebebant, in tenebris, in d'itant, sub aqua, in calceas, re d'm coraceas, intra quas latent pho phorei. Beauv. acr. par. 1772. p. 126. His natura in tenebris remoto lumine, alio fulgore claree, & quanto magis humorem habeant, ludere in ore maritimum, lucere in manus, atque etiam in solo & veste decidentibus guttis. Plin. IX: 61.



pufillus. 14. Ph. testa oblonga rotundata arcuato-striata. †

*Brown. jam. 417. t. 40. f. 11.*

*Habitat in America.*

*Valvule accipitur a tergo testæ singulares; an distincti generis.*

269. MYA. *Animal* exferens proboscidem apice biperforato.

*Testa* bivalvis, hians.

*Cardo* dente solido, crasso, patulo; nec inserto testæ oppositæ.

crispata. 15. M. testa ovali hinc obtusiore crispato striata, cardinis dente curvo.

*List. angl. t. 5. f. 38.*

*app. t. 2. f. 7.*

*Habitat in O. septentrionali.*

truncata. 16. M. testa ovata postice truncata, cardinis dente antrosum porrecto obtusissimo.

*It. wgoth. 199. n. 3. t. 5. f. 3.*

*List. angl. 191. t. 5. f. 36.*

*Gualt. test. t. 91. f. D.*

*Habitat in O. Europæo.*

arenaria. 17. M. testa ovata postice rotundata, cardinis dente antrosum porrecto rotundato denticuloque laterali.

*It. wgoth. 187.*

*Habitat in O. Europæ septentrionalis sub arena, foraminibus duobus detegenda.*

*Cardinis dens in altera tantum testæ prominens cum denticulo parallelo versus vulvam.*

lutraria. 18. M. testa oblongo-ovata, cardinis dente depresso parallelo rotundato denticuloque erecto emarginato.

*List. angl. t. 4. f. 19.*

*Bonan. recr. 2. t. 19.*

*Rumph. mus. t. 45. f. N?*

*Habi-*



*Habitat in O. Europæo ad ostia fluviorum.*

*Cardo utriusque testæ (in ventre jacentis) non attolitur, sed horizontalis est (quo a præcedente differt) cum accessorio dente sursum rigente plicato.*

apic  
patul  
margari-  
tifera.

19. M. testæ ovata, cardinis dente primario crenulato; laterali longitudinali: alterius duplicato.

*Bonan. recr. 2. t. 41.*

*List. angl. app. t. 1. f. 4.*

*Habitat in Europæ fluviiis.*

margari-  
tifera.

20. M. testæ ovata antice coarctata, cardinis dente primario conico, natibus decorticatis.

*Fn. svec. 1331.*

*List. conch. t. 149. f. 4.*

*angl. app. 15. t. 1. f. 1.*

*Klein. ostr. t. 10. f. 47.*

*Habitat in totius orbis arctici cataractis.*

*Testa ovali-oblonga, ponderosa, antice retruso compressa, extus rudis nigricans, latere angustiore s. superiore subvillosa, Natibus valde excorticatis, per succitatem fragilis etiam per se. Intus Testa albida cicatricibus duabus pro insertione musculorum. Cardinis Dens conicus, obtusus, porrectus, lateralis nullus; sed in minoribus longitudinalis crenulatus; an vero minor specie diversa?*

Perna

21. M. testæ oblonga dilatata basi angustiore compressa.

*Argenv. conch. t. 25. f. N.*

*Habitat in Fretto Magellanico.*

Vulfella

22. M. testæ linguiformi, cardine terminali depresso semi-orbiculato.

*Mus. Tessin. t. 6. f. 3.*

*Rumph. mus. t. 46. f. A.*

*Gualt. test. t. 90. f. H.*

*Habitat in Indiis.*



270. SOLEN. *Animal* cylindricum: antice Tentaculis 2 cylindricis; postice glande oblonga clavata præputio cincta.

*Testa* bivalvis, oblonga, utroque latere hians.

*Cardo* Dens subulatus, non infertus testæ oppositæ; margo lateralis obsoletior.

Vagina. 23. S. testa lineari recta: extremitate altera marginata, cardinibus unidentatis.

*Rumph. mus. t. 45. f. M.*

*Gualt. test. t. 95. f. D.*

*Argenv. conch. t. 27. f. K.*

*Klein. ostr. t. 11. f. 65.*

*Habitat in M. Europæo, Indico.*

Siliqua. 24. S. testa lineari recta, cardine altero bidentato.

*Rand. test. 43.*

*Bell. aqu. t. 414. f. 2.*

*List. angl. t. 5. f. 37.*

*Bonn. recr. 2. t. 57.*

*Gualt. test. t. 95. f. C.*

*Argenv. conch. t. 27. f. M.*

*Planc. conch. t. 3. f. 6.*

*Habitat in O. Europæo.*

*Hæc, præcedens & insequens nimis affines sunt:*

Ensis. 25. S. testa lineari subarcuata, cardine altero bidentato.

*List. angl. app. t. 2. f. 9.*

*Argenv. conch. t. 27. f. L?*

*Habitat in M. Mediterraneo, Anglico.*

*Testa utraque extremitate rotundata est & præcedenti minor ac magis arcuata.*

Legumen. 26. S. testa lineari-ovali recta, cardinibus bidentatis: alterius bifido.

*Planc. conch. t. 3. f. 5.*

*Gualt. test. t. 91. f. A.*

*Habitat in M. Mediterraneo. Fr. Logie, algirus, patria Conchiliis dives.*

*Præcedentibus brevior & cardine versus medium testæ, nec ad extremitatem, ut in præcedentibus.*



- Cultel-  
lus.** 27. S. testa ovali-oblonga subarcuata.  
*Rumph. mus. t. 45. f. F.*  
*Gualt. test. t. 90. f. E.*  
*Habitat in Amboinæ littoribus arenosis.*  
*Cardinis dentes ut in primis triens, sed callus margi-  
nalis ut in specie prima.*
- radiatus.** 28. S. testa ovali recta lævi, costa transversali adnata de-  
pressa.  
*Rumph. mus. t. 45. f. E.*  
*Gualt. test. t. 91. f. B.*  
*A. genu. conch. t. 25. f. P.*  
*Habitat in O. Asiatico.*  
*Testa violacea radiis quatuor albis.*
- strigila-  
tus.** 29. S. testa ovali oblique striata.  
*Bonap. recr. 2. t. 77.*  
*Gualt. test. t. 91. f. C.*  
*Habitat in M. Mediterraneo.*  
*Testa incarnata radius densus albis. Dens cardinis re-  
curvatus exsertus; margoque cardinis prominuus.*
- anatinus.** 30. S. testa ovata membranacea inflata pilosa, cardinis  
costa falcata.  
*Rumph. mus. t. 45. f. O. Rostrum anatis.*  
*Habitat in O. Asiatici juxta arenam.*  
*Testa pellucida alba & jere membranacea.*
- bullatus.** 31. S. testa subrotunda inflata substriata antice crenato-  
hiante. *M. L. U.*  
*Rumph. mus. t. 44. f. N.*  
*Habitat . . .*  
*Dens cardinis unicus; marginales remoti compressi.*
- inæqui-  
valvis.** 32. S. testa oblongo-rostrata: valvula altera plana.  
*Habitat in M. Mediterraneo.*  
*Testa longitudine pollicis transversa, lactea, lævis, pel-  
lucida. Sutura dorsalis recta excurvens in rostrum  
obtusum patulum. A sutibus ad rostri inferiora an-  
gulus obliquus ut in Telluris. Valvula altera plana;  
altera leviter convexa. Cardio dentibus duobus absque  
lateralibus.*



271. TELLINA. *Animal Tethys.*

*Testa* bivalvis, antice hinc ad alterum latus flexa.

*Cardo*: Dentes tres; Laterales plani, alterius testæ.

\* *Ovatæ, crassiusculæ.*

Gargadia. 33. T. testa subrotunda compressa antice rugosa, rima dentata.

*Rumph. mus. t. 43. f. N. Remies gargadica.*

*Habitat in O. Asiatico.*

Lingua felis. 34. T. testa subovata scabra: squamulis lunatis quincuncialibus.

*Rumph. mus. t. 45. f. G.*

*Gualt. test. t. 76. f. B.*

*Klein. ostr. t. 11. f. 62.*

*Habitat in O. Asiatico.*

*Differt a T. scobinata, quod sesquilateralior quam longa.*

virgata. 35. T. testa ovata: striis transversis recurvatis, dentibus lateralibus prominulis.

*Rumph. mus. t. 45. f. H. Tellina virgata.*

*Argenv. conch. t. 25. f. A. T. falsis roseis.*

*Habitat in O. Indico.*

gari. 36. T. testa ovali: striis transversis recurvatis; dentibus lateralibus obsoletis.

*Rumph. mus. t. 45. f. D. Tellina gari.*

*Argenv. conch. t. 25. f. I.*

*Habitat in O. Indico.*

fragilis. 37. T. testa ovata alba gibba: striis transversis recurvatis, dentibus flavescens.

*Habitat in O. Europæo.*

*Testa magnitudine extimi pollicis, gibba, striis subscabris.*

\* \* Ova-

Tellinarum teste antice inflexæ, ut altera testa plicam convexam, altera vero concavam ostendat; in suborbiculari autem vix plica manifesta, sed striæ in eodem loco divergentes genus ostendunt.



\* \* Ovatae; compressae.

- albida. 38. T. testa ovali laevi, nymphis prominentibus. *M. L. U.*  
*Habitat in Oceano Europæo.*  
*Cardo absque dentibus marginalibus. Sutura ante &*  
*post cardinem notata lineis transversis rufis.*
- foliacea. 39. T. testa ovali; pube scabra, rima ferrata.  
*Rumph. mus. t. 45. f. K. Folium.*  
*Argenv. conch. t. 25. f. E.*  
*Klein. ostr. t. 11. f. 64.*  
*Habitat in O. Indico.*
- planata. 40. T. testa ovata compressa transversim substriata: margi-  
 nibus acutis, pube sabromentosa.  
*Gualt. test. t. 89. f. G.*  
*Klein. ostr. Regent. t. 3. f. 28.*  
*Habitat in O. Europæo, Mediterraneo.*  
*Testa maxime p. i. pellicula, incarnata, minus flexa,*  
*marginè acutissimo.*
- laevigata. 41. T. ovata laevigata, dentibus lateralibus marginatis, pu-  
 be striato-scabra, nymphis inflexis.  
*Rumph. mus. t. 45. f. L. Petasunculus.*  
*Habitat in O. Europæo & Indico.*
- radiata. 42. T. testa oblonga longitudinaliter substriata, futura ani-  
 canaliculata. *M. L. U.*  
*Habitat in Oceano Europæo.*  
*Testa alba raris incarnatis. Rima Nymphis bianctibus*  
*nec prominulis.*
- rostrata. 43. T. testa oblonga: antice angulato-rostrata.  
*Rumph. mus. t. 45. f. L. Petasunculus.*  
*Gualt. test. t. 89. f. T.*  
*Argenv. conch. t. 25. f. O.*  
*Habitat in O. Europæo & Indico.*
- trifascia-  
 ta. 44. T. testa ovata laeviuscula sanguineo-triradiata, pube  
 rugosa.  
*Habitat in O. Europæo.*  
*Testa magnitudine unguis, pallida: radiis 3 sanguineis*  
*a cardine ortis, antice magis obtusa; vulva ovata.*
- incarnata. 45. T. ovata compresso-planiuscula, natibus submucro-  
 natis.



*List. angl. app. 32. t. 1. f. 8.*

*Gualt. test. t. 88. f. M.*

*Habitat in O. Europæo, Mediterraneo.*

*Testa magnitudine ex. uni pollicis, simillima T. planate sed incarnata radio uno alterove pallido. Cardo extus prominens.*

donacina. 46. T. testa ovata compresso-planiuscula læviuscula: antice obtusissima.

*Gualt. test. t. 88. f. N.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Testa simillima T. incarnata, sed minor, purpurascens radiis plurimis rubris. Regio vulvæ obtusissima & fere truncata, uti in Donace.*

balauftina. 47. T. testa dilatato-orbiculata læviuscula, valvula altera dentibus lateralibus.

*Habitat in M. Mediterraneo. J. T. Fagrus.*

*Testa magnitudine seminis Lupini albi, fere orbicularis, sed paulo magis dilatata, albida radiis obsolete rufis.*

\* \* \* Suborbiculatæ.

Remies. 48. T. testa suborbiculata compressa rugosa.

*Rumph. mus. t. 43. f. I. Remies.*

*Gualt. test. t. 76. f. F.*

*Habitat in O. Europæo & Indico.*

scobinata. 49. T. testa lenticulari scabra: squamis lunatis quincuncialibus.

*Rumph. mus. t. 43. f. E. Chama scobinata?*

*Gualt. test. t. 76. f. E.*

*Habitat in O. Asiatico.*

*Ani fossula oblonga, nec labia canaliculata.*

lactea. 50. T. testa lentiformi gibba alba pellucida lævi.

*Gualt. test. t. 71. f. D.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Testa semine Lupini albi major, parum transversim obsolete striata.*

earnaria. 51. T. testa suborbiculata lævi utrinque incarnata oblique striata: striis hinc reflexis.

*List. angl. 175. t. 4. f. 25.*

*Gualt. test. t. 77. f. I.*



*Habitat in Oceani brevibus.*

*Testa magnitudine seminis Lupini albi, nonnihil compressa.*

bimaculata. 52. T. testa triangulo-subrotunda latiore lævi albida: intus maculis duabus tanguineis oblongis.

*Habitat in O. Europæ.*

*Testa vix extimi pollicis magnitudine, extus alba sed maculæ interiores parum pellucunt, lævis nisi striis aliquot obsolete circumdata esset. Flexura testæ in hac non manifesta.*

balthica. 53. T. testa subrotunda lævi extus incarnata.

*Fn. svec. 1335.*

*It. œland. 43.*

*Habitat in M. Balthico.*

*Testa seminis Lupini albi magnitudine, molliuscula, fragilissima; intus alba, extus incarnata, e triangulo rotundata.*

pisiformis. 54. T. testa subglobosa lævi intus incarnata oblique substriata: striis antice angulo acuto reflexis.

*Gualt test. t. 7. f. C.*

*Habitat ad O. Europæi ostia fluviorum.*

*Testa magnitudine Pisi, alba, fundo purpureo, striata Striis vix oculo nudo manifestis, obliquis sed anterieus reflexis ad angulum acutum. Cardinis Dens unicus præter laterales prominulos. Rarius tota alba reperitur.*

divaricata. 55. T. testa subglobosa alba bifariam oblique striata.

*Habitat in M. Mediterraneo. F. Logie.*

*Testa magnitudine Pisi, subcompressa-globosa, gibba. Striæ tenuissimæ, bifariam ad utrumque laus ductæ.*

digitaria. 56. T. testa subglobosa pallida cincta striis obliquis uniformibus.

*Habitat in M. Mediterraneo. Logie.*

*Testa magnitudine Pisi, albida, interdum maculis undatis rufis. Striæ transversæ, sed pulchre obliquæ, jectim desinentes ad marginem exteriorem, uti striæ in apice digitorum, unde apparet spirakiter striata.*



cornua. 57. *T. globosa* glabra cornei coloris: fulco transversali.  
*Fn. suec.* 1336.

*List. angl. app.* 22. t. 1. f. 5.

*Habitat in Europæ paludibus, stagnis.*

*Testa magnitudine Pisi, rudis cornu coloris,*

272. **CARDIUM.** *Animal* Tethys.

*Testa* bivalvis, subæquilatera, æquivalvis.

*Cardo* Dentibus duobus; lateralibus remotis infertis.

costatum. 58. *C. testa* gibba æquivalvi: costis elevatis carinatis concavis membranaceis.

*Column. purp.* 26. t. 27.

*Rumph. mus.* t. 48. f. 6.

*Gualt. test.* t. 72. f. D.

*Argenv. conch.* t. 26. f. A.

*Habitat . .*

Cardiffa. 59. *C. testa* cordata: valvulis compressis dentato-carinatis, natibus approximatis.

*Column. aqu.* 16.

*Rumph. mus.* t. 42. f. E. Cardiffa.

*Gualt. test.* t. 84 f. B. C. D.

*Arg. xv. conch.* t. 26. f. I. Cor veneris.

*Klein. ostr.* t. 10. f. 39.

*Habitat in O. Asiatico.*

*Variat Testa lateribus utrinque planis aut altero concavo.*

hemifar. 60. *C. testa* cordata subquadrilatera: valvulis carinatis, natibus distantibus.

*Rumph. mus.* t. 44. f. H.

*Habitat in O. Asiatico.*

medium. 61. *C. testa* subcordata subangulata: valvulis angulatis fulcatis lævibus. *M. L. U.*

*Habitat in O. Indico.*

*Testa simillima priori, sed exalbido purpurascente varia, sulcis lævibus absque aculeis, angulisque obsolete.*

62. C.

Cardium unum Cardium denticulatum lateribus remotis infertis, qui foraminulo s. forobiculo oppositè valvulae inter, dum testa claudunt, quod non obtinet in Tellinis.



- murica- 62. C. testa subcordata: fulcis convexis linea exaratis: ex-  
 tum, terius aculeato-ciliatis.  
*Bonan. recr. 2. t. 96, 97.*  
*Gualt. test. t. 72. f. A.*  
*Argenv. conch. t. 26. f. B.*  
*Habitat in O. Europæo australi.*  
*Maxime affinis sequenti & forte varietas.*
- echina- 63. C. testa subcordata, fulcis exaratis linea ciliata aculeis  
 tum, inflexis plurimis.  
*En. svec. 1339.*  
*List. angl. t. 5. f. 33.*  
*conch. t. 324. f. 161.*  
*Bonan. recr. 2. t. 90.*  
*Gesn. aquat. 131, 132.*  
*Gualt. test. t. 72. f. B.*  
*Klein. ostr. t. 10. f. 40.*  
*Habitat in O. septentrionali.*
- ciliare. 64. C. testa subcordata: fulcis elevatis triquetris: extimis  
 aculeato-ciliatis.  
*Gualt. test. t. 72. f. C.*  
*Habitat in M. Mediterraneo.*  
*Simillima duobus precedentibus, sed minor & nivea.*  
*Sulci triquetri, latere scilicet altero adnato.*
- tubercu- 65. C. testa subcordata: fulcis obtusis nodosis transversim  
 latum, striatis.  
*Rumph. mus. t. 48. f. 11.*  
*Argenv. conch. t. 26. f. L.*  
*Habitat . .*
- Isocardia. 66. C. testa cordata: fulcis squamis fornicatis imbricatis.  
*Rumph. mus. t. 48. f. 9.*  
*Argenv. conch. t. 26. f. M.*  
*Kratzenst. Regensf. 20. t. 5. f. 56.*  
*Habitat . .*
- Fragum. 67. C. testa subcordata subangulata: fulcis notatis lanulis  
 elevatis.  
*Rumph. mus. t. 44. f. G. Fragum album.*  
*Gualt. test. t. 71. f. N.*  
*Habitat in O. Asiatico, Americano.*



Unedo. 68. C. testa subcordata: fulcis lunulis coloratis.

*Kempf. mus. t. 44. f. F.*

*Argen. conch. t. 26. f. N.*

*Kriegerst. Regensf. 12. t. 3. f. 25.*

*Habitat . . .*

*Valvæ labium alterum alteri incumbit, quod vix in præcedenti, cui maxime affinis, sed sæpe decuplo major.*

murica- 69. C. testa subcordata fulcata lateribus muricata.

tum.

*Habitat ad sinum Campechiensem.*

*Testa præcedentibus similis, margine undique serrata, extus flavescens; intus umbonibus purpurascens.*

magnum. 70. C. testa oblonga: fulcis angulatis latere ferratis.

*Habitat ad Jamaicam.*

flavum. 71. C. testa subovata fulcata: latere anteriore scabro, posteriore dentato. M. L. U.

*Habitat . . .*

*Testa subovata, fava, latere anteriore alba. Sulci crenati raris in latere posteriore; margo non rubens.*

læviga- 72. C. testa obovata: striis obsoletis longitudinalibus.

tum.

*Habitat . . .*

*Testa simillima præcedenti, sed striæ loco sulcorum.*

ferratum. 73. C. testa obovata lævi striis obsoletis, margine interiore ferrato.

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Testa flava, versus cardinem gibba, margine exteriori crenulato, anteriore ferrato. Nates regulares.*

triste. 74. C. testa ovata lævi, rima anoque obsolete striatis.

M. L. U.

*Habitat . . .*

*Testa triangularis, ovata colore tristi; Rima ano simillima, oblique obsolete striata.*

coralli- 75. C. testa triangulo-rotundata alba pellucida, antice posticeque obtusissima fasciis lacteis.

num.

*Bonap. recr. 2. t. 53.*

*Rend. test. 1. p. 32. t. 33.*

*Gualt. test. 71. f. B.*

*Planc. conch. t. 3. f. 4.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*



solidum. 76. C. testa triangulari rotundata opaca læviuscula, cardinibus foveola pyriformi.

*Bonan. recr. 3. t. 51.*

*Rond. test. 1. c. 7.*

*List. angl. 174. t. 4. f. 24.*

*Habitat in O. Anglico.*

*Testa crassa alba s. flava, notabilis cavitate in cardine more Uprearum, sed & dentes minimos habet.*

edule. 77. C. testa antiquata: sulcis XXVI obsolete recurvato-imbricatis.

*Fn. suec. 1340.*

*List. angl. 189. t. 5. f. 34.*

*Gualt. test. 71. f. F.*

*Habitat in O. Europæo.*

rusticum. 78. C. testa antiquata: sulcis XX remotis interstitiis rugosis.

*Rond. test. 1. p. 21. c. 19.*

*Rumph. mus. t. 78. f. K.*

*Gualt. test. t. 71. f. M.*

*Habitat in M. Mediterraneo & Europæ australioris.*

*Testa aliis ferruginea fasciis lividis; alius minor nivea fasciis ferrugineis.*

pectinata-  
tum. 79. C. testa subcordata pectinata.

*Gualt. test. t. 75. f. A.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Testa striæ distantes sursum scabræ; cavitas sub umbonibus flava. Anus ovatus impressus marginibus prominulis.*

stultorum. 80. C. testa subrotunda æquilatera lævi, cardinis dente primore fornicato, lateralibus alterius duplicatis.

*Gualt. test. t. 71. f. C.*

*Habitat in O. Europæo.*

*Testa lævis, fragilis, pallida radiis obsolete albis. Cardinis dentes laterales fere membranacci longitudinales; in altera testa utrinque solitarii; in altera duplicati; dens vero cardinis primarius membranaceus, complicatus.*

U u 5

81. C.

Antiquata testa nobis quæ longitudinaliter sulcata, sed transversis appositionibus antotinis quasi intercepta.

Pectinata mihi quæ longitudinaliter sulcata l. striata, at vero antice striis l. sulcis ad angulum acutum divergentibus.

Longitudinalis testa a natibus ad margivem.

Transversalis vero a natibus ad nates arcu margini parallelo.



- virgi-  
neum. 81. *C. testa triangulo-rotundata æquilatera, rugis transver-  
fis membranacco-recurvatis, cardinibus cæruleis.*  
*Habitat in M. Mediterraneo.*  
*Testa pulchella, fasciata lineis retrorsum imbricatis, re-  
motis, epidermide glauca obtecta. Cavitas alba sed  
cardines cærulei: dentibus lateralibus longitudinali-  
bus, linearibus.*
- huma-  
num. 82. *C. testa subrotunda lævi, natibus recurvis, rima  
hiante.*  
*Bonan. recr. 2. t. 88.*  
*Kuepb. mus. t. 48. f. 10.*  
*Gualt. test. t. 71. f. E.*  
*Arceuth. conch. t. 26. f. K.*  
*Habitat in M. Mediterraneo varius.*  
*Testa ovata, lævis, subrotunda, exalbido-lutescens.*  
*Dentes cærulei, quam in reliquis, cornu arietis in-  
stir, unguis curvata. Rima hians Nymphis nudis.*  
*Anus bimarginis, rostrice gibbus. Dentes cardinis utri-  
que duo, compressi.*

273. DONAX. *Animal Tethys.*

*Testa bivalvis, margine antico obtu-  
fissimo.*

*Cardo Dentibus duobus; marginali-  
que solitario, subremoto, sub ano.*

- pube-  
scens. 83. *D. testa antice spinis ciliata. M. L. U.*  
*Habitat in O. Indico.*  
*Testa argute decussatim striata: antice plana laterum  
angulo carinato, versus apicem spinis e striis enatis  
membranaceis ciliato. Rima hians ovata: nymphis nu-  
dis. Anus ovato-oblongus.*
- rugosa. 84. *D. testa antice rugosa, marginibus crenatis.*  
*Gualt. test. t. 89. f. D.*  
*Habitat in O. meridionali.*
- Truncu-  
lus. 85. *D. testa antice lævi, intus violacea marginibus cre-  
natis.*  
*List. argl. 190 t. 5. f. 35.*  
*Bonan. recr. 2. t. 47.*



*Gualt. test. t. 88. f. o.*

*Argenv. conch. t. 25. f. L.*

*Habitat in Oceano Europæo.*

- denticu- 86. D. testa antice obtusissima, labiis transverse rugosis,  
lata. margine denticulato, nymphis dentiformibus.  
*Habitat in M. Mediterraneo. F. Legie.*  
*Testa cuneiformis, levis, longitudinaliter punctato stria-  
ta, alvici, purpurascens - subsalsata. Vulva suorotun-  
da, minima; antice obtusissima, area media transver-  
se rugosa, laterali recta; margo denticulatus. Intus  
albicans.*
- cuneata. 87. D. testa cuneiformi, marginibus integerrimis. *Mus.*  
*L. U.*  
*Habitat . . .*  
*Testa parva, ovata, compressa, violacea s. vario colore.*
- scripta. 88. D. testa ovata compressa lævi scripta lineis purpureis  
undatis, rima acuta, marginibus crenulatis.  
*Rumph. mus. t. 43. f. L. M. Literata Xylanensis.*  
*Gualt. test. t. 88. f. Q.*  
*List. conch. t. 379. f. 222.*  
*Bonan. recr. 2. t. 43.*  
*Klein. ostr. t. 11. f. 59.*  
*Habitat in M. Mediterraneo.*
- murica- 89. D. testa ovata: striis muricatis, margine denticulato.  
ta. *M. L. U.*  
*Habitat in O. Indico.*  
*Testa gibba rufescens; margo anterior denticulatus. Ri-  
ma hians, terminata antice utrinque dente compresso.  
Anus nullus.*
- Irus. 90. D. testa ovali: rugis membranaceis erectis striatis cincta.  
*Gualt. test. t. 95. f. A.*  
*Habitat in M. Mediterraneo. Brander.*  
*Testa magnitudine Phaseoli, ovalis, alba, antice obtu-  
sissima, rugosa: rugis arcuatis, membranaceis, relexo-  
erectis, striatis, fere crispis, exterioribus sensim an-  
terius majoribus. Cardo utrinque dentibus duobus mi-  
nimis: altero bifido.*



274. VENUS. *Animal* Tethys.

*Testa* bivalvis, labiis margine antico incumbentibus.

*Cardo* dentibus 3: omnibus approximatis: lateralibus apice divergentibus.

*Vulva & Anus* distincta.

\* *Pubentes.*

Dione. 91. V. testa subcordata transverse sulcata, pube spinosa.

*List. conch. t. 307. f. 146.*

*Rumph. mus. t. 48. f. 4.*

*Olear. mus. 29. f. 4.*

*Pet. gaz. t. 31. f. 9.*

*Gualt. test. t. 76. f. D.*

*Argenv. conch. t. 24. f. I.*

*Habitat in O. Americæ.*

*Venerem filiam Dionis s. e Concha maris natam finxere Poeta; hujus Typus præcipue determinabit Concharum partium metaphoricam denominationem.*

**TESTA** bivalvis, semicordata, rotundata, subincarnata, postice antæque magis gibba, ventris lateribus undique exaratis Striis transversis, distantibus, parallelis, marginatis, subrecurvatis, æqualibus: exterioribus obtusioribus: posterius Alternis altioribus acutioribusque, Alternisque abbreviatis minoribus. **INTUS** lævis, alba, sub umbonibus fornicata. **CARDO** sinistræ tridentatus: Dentibus approximatis, scrobiculo distinctis. Denticulo intermedio compresso, angustiore; lateralibus divergentibus, crassiusculis, obtusis. **Dextræ** cardo Denticulis duobus, approximatis, compressis inter scrobiculos duos. **MARGO** ambitus obtusissimus, integerrimus: **NATES** recurvate, obtusiusculæ, apice glabræ. **ANUS** impressus, ovatus, lævis, incarnatus. **Antice** Pubes ciliaris, utrinque e natibus ad summum montis veneris, cingens vulvam Spiæis e striis alternis tertiusve teste ortis, subulatis, depressis, adscendentibus, antorsum arcuatis, subtus canaliculatis, superioribus sensim longioribus: longissimis longitudine ipsius rimæ. **VULVÆ** regio incarnata, obliquæ striata, sursum a rima ad palam. Labia læviora incarnata, inclusa fascia pallida,



*lida, armata, a natibus ad medium rimæ, Aculeis utrinque quinque brevissimis; margo vivæ supra rimam connivet sulco longitudinali, intra quem sinistra margo gibbosior se insinuat. Pima lanceolata, hians labris prominulis, clausa hymene. NYMPHÆ cartilagineæ, retractiores, longitudine rimæ.*

Marica. 92. V. testa subcordata decussatim striata, pube lamellosa.  
*M. L. U.*  
*Habitat in O. Americæ.*

Dysera. 93. V. testa subcordata: sulcis transversis remotis reflexis, margine crenulato.

*Argenv. conch. t. 24. f. K.*  
*β. Rumph. mus. t. 48. f. 5.*  
*Gualt. test. t. 85. f. A.*  
*Kratzenst. Regenf. t. 7. f. II.*  
*γ. List. conch. t. 277. f. 114.*  
*Klein. ostr. 10. t. 48, 49.*  
*δ. Argenv. conch. t. 24. f. Q.*  
*Habitat in O. Americæ.*

\* \* *Impuberes subcordatae.*

verruco- 94. V. testa subcordata: sulcis membranaceis striatis re-  
fa. flexis antice imprimis verrucosis, margine crenulato.

*Gualt. test. t. 83. f. G.*  
*Habitat in Europa australi.*  
*Statura & maculis ad præcedentem accedit, ut forte varietas levigata.*

Casina. 95. V. testa subcordata: sulcis transversis recurvis acutis, margine postico crenulato pone anum canaliculato.  
*Habitat in O. Europæo, frequenter etiam fossilis.*

Gallina. 96. V. testasubcordata radiata: striis transversis obtusis, cardinis dente postico minimo, margine crenulato.  
*Habitat in M. Mediterraneo.*  
*Testa colore varians, sæpe glaberrima licet striata; striæ apparent crenulatae quamvis non sint.*

petulca. 97. V. testa subcordata subfulcata, margine crenulato, rima subovata hiantè, nymphis acutis. *M. L. U.*  
*Habitat in O. Europæ australioris.*



*Testa magnitudine Avellanae, albo fuscoque nebulosa.*  
*Anus oblongus.*

Erycina. 98. V. testa cordata transversim parallele fulcata, fulcis obtusissimis, vulva glabra, ano ovato.

*Habitat in Europa. J. Theod. Fabricius.*

*Simillima Cioni, sed fulcis numerosis profundioribus.*

mercedia-99. V. testa cordata solida transverse substriata laevi, margine crenulato, intus violacea, ano ovato.

*List. angl. 229. t. 8. f. 33.*

*Habitat in Pennsylvania. P. Kalm: e qua Sylvestrium Nammi parantur. In montibus Sueciae jugalis.*

*Testa praere reliquis crassior est & ponderosa. Limbus tantum testae interne violaceus est.*

Chione. 100. V. testa cordata transverse subrugosa laevi, cardinis dente primario posteriori lanceolato.

*List. angl. 173. t. 4. f. 22?*

*Rumph. mus. t. 42. f. G.*

*Gualt. test. t. 86. f. A.*

*Argenv. conch. t. 24. f. C.*

*Habitat in O. Asiatico, forte etiam in Europaeo.*

*Testa magnitudine fere ovi gallinacei, alba aut subferruginea; margo integerrimus est.*

maculata. 101. V. testa cordata laevi; maculis exoletis sparsis.

*Gualt. test. t. 86. f. I.*

*Argenv. conch. t. 24. f. H.*

*Kratzenst. Regensf. t. 8. f. 16.*

*Habitat in O. Americano.*

Meretrix. 102. V. testa cordata glabra, vulva fusca gibba, nymphis hiantibus.

*Argenv. conch. t. 24. f. F.*

*Habitat in O. Indico.*

Scortum. 103. V. testa triangulo-cordata glabra, vulva plana hiante.

*Gualt. test. t. 85. f. F.*

*Argenv. conch. t. 24. f. L.*

*Habitat in America.*

laeta. 104. V. testa subcordata tumida glaberrima albo radiata, labiis subviolaceis.

*Gualt. test. t. 88. f. V.*



*Habitat in M. Mediterraneo & Indico.*

*Testa flavescens, nitidissima, radiis aliquot latis albis depicta. Labia obscuriora. Anus ovatus.*

castren- 105. V. triangulo-rotundata gibba glaberrima characteribus  
lis. angularibus inscripta.

*List. conch. t. 262. f. 98.*

*Bonan. recr. 2. t. 376.*

*Rumph. mus. t. 42. f. K. Chama optica.*

*Gualt. test. t. 82. f. H.*

*Kratzenst. Regenf. 2. t. 1. f. 3.*

*Habitat in O. utriusque Indiæ.*

Phryne. 106. V. testa subcordata lævi antice posticeque transverse striata, ano obcordato venis violaceis. *M. L. U.*  
*Habitat in O. australiore.*

Meroë. 107. V. testa subrotunda transverse striata, futura postica hiante. *M. L. U.*

*Habitat in O. australiore.*

*Testa alba venis leucophæis. Nates remotæ. Sutura hians pone anum oblongum, obsoletum.*

deflorata. 108. V. testa ovali longitudinaliter rugosa antice violacea, nymphis atis.

*Habitat in O. Europæo.*

*Testa latitudine ovi, a cardine ad peripheriam rugosa, albida. Latus anterior, præsertim interne, violaceum.*

fimbriata. 109. V. testa transverse ovali gibba longitudinaliter striata transverse sulcata, margine crenulato.

*List. conch. t. 336 f. 172.*

*Rumph. mus. t. 43. f. F.*

*Gualt. test. t. 75. f. C.*

*Argenv. conch. t. 24. f. G.*

*Klein. ostr. t. 10. f. 52.*

*Habitat in O. Indico.*

reticula- 110. V. testa subcordata: stris elevatis decussatis, ano cordato, margine integro.

*Rumph. mus. t. 43. f. H.*

*Argenv. conch. t. 26. f. F.*

*Habitat in O. Indico.*



squamo- 111. V. testa subcordata reticulato-striata retrorsum squa-  
fa. mofa.

*Rumph. mus. t. 44. f. M.*

*Habitat in O. Indico.*

\* \* \* *Impuberes, orbiculatæ.*

tigerina. 112. V. testa suborbiculata: striis crenatis decussatis, ano  
ovato.

*Rumph. mus. t. 43. f. G.*

*Habitat in O. Indico.*

prostrata. 113. V. testa orbiculata transverse striata, labiis scabro-  
membranaceis. *M. L. U.*

*Habitat in O. Indico.*

*Testa subscabra, exolete testacea radiis albis. Nates re-  
flexæ. Lima oblonga, patula. Anus crenatus.*

pensylva- 114. V. testa lentiformi glabro-rugosa alba, antice sulco  
nica. longitudinali.

*Argenv. conch. t. 24. f. N.*

*Habitat in America septentrionali.*

incrusta- 115. V. testa lentiformi glaberrima lævissima punctis ex-  
ta. cavata. *M. L. U.*

*Habitat in O. Indico.*

*Testa intus crusta crassa albida. Ani vestigium forami-  
ne rotundo sub natibus.*

punctata. 116. V. testa lentiformi longitudinaliter sulcata, intus pun-  
ctata.

*Rumph. mus. t. 43. f. G.*

*Habitat in O. Indico.*

*Testa intus obducta crusta crassa albida, sed pu-  
Anus ut in precedente.*

exoleta. 117. V. testa lentiformi transversim striata pallida obsole-  
te radiata, ano cordato.

*Habitat ad Garnsey.*

*Testa intus crusta crassa albida. Anus ferrugineus; val-  
de affinis precedentibus tribus.*

orbicula- 118. V. testa lentiformi compressa longitudinaliter profun-  
ris. dius transversim tenuissime striata, ano cordato mi-  
nimo.

*Habitat intra Tropicos.*



Ziczac. 119. V. testa lentiformi: striis transversis membranaceis erectis. *M. L. U.*

*Habitat in O. Indico.*

*Testa griseo-Ziczac ad rimam & anum latius fissi. Nates apice recurva. Anus impressus, cordatus, rufus.*

pectinata, 120. V. testa sublentiformi sulcis longitudinalibus rugosis: pube antrorsum ramosa.

*Rumph. mus. t. 42. f. D.*

*Gualt. test. t. 72. f. F. E.*

*Argenv. conch. t. 24. f. P.*

*Habitat in Indiis.*

scripta. 121. V. testa lentiformi compressa striata postice angulo recto angulata.

*Rumph. mus. t. 43. f. C. Chama literata rotunda.*

*Gualt. test. t. 77. f. C.*

*Argenv. conch. t. 24. f. M.*

*Habitat in Indiis.*

*Impressio ani lanceolata.*

edentula. 122. V. testa lentiformi subgloboso-lenticulata rugosa edentula, ano ovato. *M. L. U.*

*Habitat in Indiis.*

*Testa subglobosa, diaphana, alba. Anus ovato-acutus, valde excavatus angulo acuto.*

Lupinus. 123. V. testa lentiformi transversim substriata ano ovato, nymphis nullis.

*Habitat . .*

*Testa alba striis circularibus tenuissimis, intus callo albo notata; variat maculis griseis.*

\* \* \* \* *Impuberes ovaes, supra rimam subangulata.*

literata. 124. V. testa ovata antice angulata striis transversis.

*Bonan. recr. 2. f. 67.*

*Rumph. mus. t. 43. f. B. Chama literata oblonga.*

*Gualt. test. t. 86. f. E. F.*

*Argenv. conch. t. 24. f. A.*

*Kratzenst. Regensf. 16. t. 4. f. 39.*

*Habitat in Europa australi & India.*

*Color saepe cinerascens, sed plurimum varians; saepiusque characteribus notatus; variat etiam rugis antice longitudinalibus, in majoribus imprimis & indicis.*



rotunda- 125. V. testa ovata antice subangulata: striis transversis, car-  
ta. dinis dente intermedio bifido. *M. L. U.*

*Habitat in O. Indico.*

*Testæ Anus ovato-lanceolatus, fuscus, retusus. Dentes  
cardinis utrinque tres: medio bifido.*

decussa- 126. V. testa ovata antice angulata decussatim striata.  
ta. *M. L. U.*

*Habitat in O. Indico.*

*Testæ Anus minimus, retusus, macula nulla impressa. Co-  
lor intus albidus, sæpius cum tinctura crocea.*

275. SPONDYLUS. *Animal Tethys.*

*Testa subaurita, rigida, spi-  
nosa.*

*Cardo dentibus 2 recurvis, cum  
foraminulo intermedio.*

Gædero- 127. S. testa subaurita spinosa.

pus.

*Bocc. observ. 1674. p. . . t. 304. Concha histricina.*

*Rond. pisc. 1. t. 40.*

*Rumph. mus. t. 47. f. E.*

*Bonann. recr. 2. t. 21, 23.*

*Gualt. test 100, 101. f. A, B. t. 99. f. E, F, G.*

*Argenv. conch. t. 23. f. L.*

*Klein. ostr. t. 9. f. 37.*

*Kratz. Regensf. 16. t. 4. f. 48.*

*Habitat in M. Mediterraneo, arcte adhærens scopulis.*

*Natum altera longior, hinc plana, ac si arte secta aut  
abrasa fuisset.*

regius. 128. S. testa inaurita spinosa.

*Rumph. mus. 156. n. 8.*

*Argenv. conch. t. 23. f. G.*

*Habitat in India.*

*Simillima præcedenti, sed major spinis & sulcis validio-  
ribus; forte insignis tantum varietas.*

276. CHA-



276. CHAMA. *Animal Tethys.**Testa bivalvis, grossior.**Cardo Callo gibbo, oblique inserto  
fossulæ obliquæ.**Vulva clausa absque nymphis.*Lazarus. 129. C. testa imbricata lamellis laceris, nate oblique sub-  
spirali.*Rumph. mus. t. 48. f. 3.**Argenv. conch. t. 23. f. F. I.**Brown. jam. t. 40. f. 9.**Habitat in M. Mediterraneo, Americano.*

Gigas. 130. C. testa plicata squamosa, ano hiante crenato.

*Olear. mus. t. 29. f. 6.**Bonan. recr. 2. f. 83.**Rumph. mus. t. 42. f. A. B. Chama squamata.**Gualt. test. t. 92. f. A-G.**t. 93. f. B.**Argen. conch. t. 26. f. E.**Kratzenst. Regenf. t. 10. f. 48.**Habitat in M. Asiatico.**Testæ pondere librarum 532 in M. L. U., adeoque  
omnium testaceorum maximum.*

Hippo- 131. C. testa plicata muricata, ano retuso clauso dentato.

*Bonan. recr. 2. f. 81, 82.**Rumph. mus. t. 42. f. C. Chama aspera obtusa.**Gualt. test. t. 93. f. A.**Argenv. conch. t. 26. f. H. Folium brassicæ.**Kratzenst. Regenf. t. 10. f. 49.**Habitat in M. Asiatico.*antiqua- 132. C. testa subcordata fulcis longitudinalibus striisque  
ta. transversis.*Gualt. test. t. 71. f. L.**Habitat . .*semiorbi- 133. C. testa semiorbiculata compressa rudi decussate stria-  
culata. M. L. U.*Habitat . .**Testa longitudinaliter striata, imbricata squamis annoti-  
nis. Lobus ani albidus margine postico crenato.*



- calycu- 134. *C.* testa oblonga sulcis imbricatis, antice retusa.  
lata. *Gualt. test. t. 90. f. F.*  
*Habitat in M. Mediterraneo.*  
*Testa magnitudine extimi articuli digiti; alba, oblonga, sulcis longitudinalibus imbricatis, squamulis formicatis. Natus obtuse gibbe, antice testa presentatis fusca. Rimae minima. Venter antice compresso-gibbus; supra rotundatus. Dorsum compressum, retusum. Apus orbiculatus, minimus; pone anam angulus obtusus, scellus valde prominulus exit.*
- cordata. 135. *C.* testa cordata transversim striata, hinc elongata compressa. *M. L. U.*  
*Habitat . . .*  
*Testa testacea inferne (non versus marginem exteriorem) sulcis transversis distinctis, obtusis. Angulus inter rimum & marginem exteriorem elongatus obscurior.*
- oblonga. 136. *C.* testa oblonga antice angulata, dentibus anticis acutis. *M. L. U.*  
*Habitat . . .*  
*Testa subtilissime decussatim striata, alba, intus lactea; anterieus angulo utrinque excurrente.*
- gryphoi- 137. *C.* testa orbiculata muricata: valvula altera planiore-  
des. re, altera nate productiore subspinali.  
*Bonn. recr. 2. t. 22.*  
*Gualt. test. t. 101. f. C-I.*  
*Brown. jam. 412. t. 40. f. 9. sed maior.*  
*Habitat in M. Mediterraneo Africam adueniente. Brander.*  
*Valvulae albae, orbiculatae, punctis muricatae, altera adherente alii corpori. Natus obsolete recurvatae, in spiram contorta, intus auriformes.*
- bicornis. 138. *C.* testae valvulis conicis: natibus corniformibus obliquis tubulosis valvula longioribus.  
*Column. purp. c. 19.*  
*List. conch. t. 214. f. 49.*  
*Flin. ostr. 274. t. 12. f. 87, 88.*  
*Habitat in M. Mediterraneo.*  
*Singulae valvulae referunt Patellam cucullatam obliquam, hinc praecedenti multum affinis.*



277. ARCA. *Animal Tethys?**Testa* bivalvis, æquivalvis.*Cardo* Dentibus numerosis, acutis, alternis, infertis.\* *Margine integerrimo; Natibus recurvatis.*

tortuosa. 139. A. testa parallelipeda striata, valvula oblique carinata, natibus recurvis, margine integerrimo.

*Bonan. kirch. 2. t. 128.**Rumph. mus. t. 47. f. K. Ostreum tortuosum.**Gualt. test. t. 95. f. B.**Klein. ostr. t. 8. f. 16.**Habitat in . .*\* \* *Margine integro; Natibus inflexis.*

Noæ. 140. A. testa oblonga striata apice emarginata, natibus incurvis remotissimis, margine integerrimo hiante.

*List. conch. 3. B. f. 6. c. 1. t. 5. Musculus mathioli.**Bonan. recr. 2. t. 32. Concha rhomboides.**Rumph. mus. t. 44. f. P. Arca Noæ.**Gualt. test. t. 87. f. H. I.**Argenv. conch. t. 26. f. G.**Kratzenst. Regensf. t. 12. f. 73.**Habitat in M. rubro, Mediterraneo, Indico.*

barbata. 141. A. testa oblonga striata apicibus barbata, natibus incurvis approximatis, margine integerrimo clauso.

*Mus. Tessin. 116. t. 6. f. 1.**Bonan. recr. 2. t. 79.**Gualt. test. 91. f. F.**Argenv. conch. t. 25. f. M.**Habitat in M. Mediterraneo.**Testa apice rotundata, integra; strie ex punctis callosis concatenatis: alternis striis majoribus. Barba ex siriis versus apicem imprimis tenuiorem rigens.*

Pella. 142. A. testa ovata pellucida oblique striata, vulva prominente distincta, natibus incurvis, margine integerrimo.

*Habitat in M. Mediterraneo. F. Logie.*



*Testa magnitudine seminis Helianthi annui, alba, pel-  
lucida, oblique striata, nitidissima. Vulva valde pro-  
mineas, ut testa fere rostrata, distincta utriusque fos-  
sula, transverse striata.*

\* \* \* Margine crenato; Natibus recurvatis.

lactea. 143. A. testa subrhomboidea obsolete decussatim striata  
diaphana, natibus recurvis, margine crenulato.

*Habitat in M. Mediterraneo. Brander, Logie.*

*Testa magnitudine Fabæ equinæ.*

antiquata. 144. A. testa oblique cordata multifulcata fulcis muticis,  
natibus recurvis, margine crenato.

*Bonan. recr. 2. t. 74.*

*Rumph. mus. t. 44. f. I.*

*Sloan. jam. t. 241. f. 14, 15, 16.*

*Gualt. test. t. 87. f. C.*

*Habitat in O. Americano.*

fenilis. 245. A. testa oblique cordata octofulcata lævi, natibus  
recurvis, margine plicato.

*List. conch. 3. B. f. 2. c. 1. t. 4.*

*Gualt. test. t. 87. f. D.*

*Klein. ostr. t. 10. f. 45.*

*Habitat ad Jamaicam.*

granosa. 146. A. testa subcordata fulcis muricatis, natibus recurvis,  
margine crenato.

*Column. purp. 21. t. 20. f. 3.*

*Bonan. recr. 2. t. 73.*

*Gualt. test. t. 87. f. E.*

*Argenv. conch. t. 26. f. C.*

*Habitat in O. Europæ meridionalis.*

decussata. 147. A. testa lenticulari decussatim substriata, natibus recur-  
vis, margine crenato, rima clausa. *M. L. U.*

*Habitat in Indiis.*

pallens. 148. A. testa lenticulari subobliqua decussatim striata, na-  
tibus recurvis, margine crenato, rima angustissima  
*M. L. U.*

*Habitat in Indiis.*

*Testæ color pallidus. Rima lævis.*



\* \* \* \* Margine *crenato*; Natibus *inflexis*.

- undata. 149. A. testa lenticulari inaurita, læviuscula, natibus inflexis, margine plicato.  
*Bonan. recr. 2. t. 61.*  
*Habitat ad Jamaicam.*  
*Testa picta uti A. Pectunculus, sed crassior, vix rugosa, minime sulcata, basi rotundata, margine plicata.*
- Pectunculus. 150. A. testa lenticulari subaurita sulcata sulcis subimbri-  
 catis, natibus inflexis, margine plicato.  
*List. conch. 3. B. f. 2. c. 2. t. 1. f. 1, 2.*  
*Gualt. test. t. 72. f. H.*  
*Argenv. conch. t. 27. f. B?*  
*Habitat in O. Americano.*
- Glycymeris. 151. A. testa suborbiculata gibba substriata, natibus incurvis, margine crenato.  
*Rumph. mus. t. 47. f. 1.*  
*List. conch. 3. B. f. 2. c. 3. t. 2. Chama glycymeris.*  
*Gualt. test. t. 72. f. G. f. t. 82. f. C. D.*  
*Habitat ad insulam Garnsey.*
- nummularia. 152. A. testa subrotunda lævi subaurita transversim striata, natibus incurvis, margine crenulato.  
*Habitat in M. Mediterraneo.*  
*Testa magnitudine unguis, undato-rufa, non perfecte lenticularis, vix manifeste transversim striata, auribus vix manifestis.*
- Nucleus. 153. A. testa oblique ovata læviuscula, natibus incurvis, margine crenulato, cardine arcuato ciliari.  
*Habitat in Europa.*  
*Testa magnitudine avellanæ. Inter Nates Rima triangularis, erecta.*



278. OSTREA. *Animal Tethys.**Testa bivalvis, inæquivalvis, subaurita.**Cardo edentulus testula cava ovata,**striisque lateralibus transversis.**Vulva Anusve nullus.*\* *Pectines auriculati, æquales.*

maxima. 154. O. testa radiis rotundatis longitudinaliter striatis.

*List. conch. t. 161. f. 1.**angl. t. 5. f. 29. Pecten maximus.**Gualt. test. t. 98. f. A. B.**Fn. Rec. 1343.**Habitat in Oceano Europæo.*

Jacobæa. 155. O. testa radiis 14 angulatis longitudinaliter striatis.

*M. L. U.**Gualt. test. t. 99. f. B.**Kratzenst. Regensf. S. t. 2. f. 19.**Bonan. recr. 2. t. 3. 4.**Habitat in M. Mediterraneo.*Ziczac. 156. O. testa radiis 18 explanatis. *M. L. U.**Habitat in O. australiore.**Testa valvula plana radiis obsolete, sed intus versus marginem plicis duplo plusvis conspicuis.*striatula. 157. O. testa radiis 16 obliteratedis transverse membranaceo striatis, margine integerrimo. *M. L. U.**Habitat in O. Indico.**Valvula convexior paulo magis gibba, quam planior; color intus flavescens radiorum interstitiis albis.*minuta. 158. O. testa radiis 20 convexis. *M. L. U.**Habitat in O. Indico.**Testa gibbosiore, admodum convexa, parvula. T. planior profunde plicata, plano-convexa.*

Pleuro- 159. O. testa radiis 12 duplicatis, extus lævi.

*neetes. Bonan. recr. 2. f. 354.**Rumph.*


---

Ostræ tantum non omnes, invariis Pectines, ad cardinem interne sulcis transversis numerosis parallelis in utraque testa oppositis quidem, que probe distinguenda ab Arcis polyplegigynis, cujus dentes numerosi alternatim intrant alterius janus.



*Rumph. mus. t. 45. f. A. B.* Amulium.

*Gualt. test. t. 73. f. B.*

*Argenv. conch. t. 27. f. G.* Umbella s. Solea.

*Klein. ostr. t. 9. f. 30.*

*Habitat in Indiis.*

oblitera- 160. O. testa radiis 24 duplicatis, extus lævi.

ta. *Gualt. test. t. 73. f. G.*

*Habitat in O. australiore.*

Radula. 161. O. testa radiis 12 convexis: striis decussatis crenatis, auriculis æqualibus.

*Rumph. mus. t. 44. f. D.* Radula.

*Klein. ostr. t. 9. f. 34.*

*Habitat in O. Indico.*

Plica. 162. O. testa radiis 6 convexis læviusculis, decussato-striata.

*Rumph. mus. t. 44. f. O.* Pallium maculatum.

*Argenv. conch. t. 27. f. C.*

*Habitat in O. Indico.*

\* \* *Pectines auricula altera intus ciliato-spinosa.*

Pallium. 163. O. testa radiis 12 convexis, striata scabra squamis imbricata.

*Rumph. mus. t. 44. f. B. C.* Pecten secundus.

*Gualt. test. t. 74. f. F.*

*Argenv. conch. t. 27. f. I.*

*Kratzenst. Regensf. 26. t. 6. f. 59.*

*Habitat in O. australiore & Indico.*

nodosa. 164. O. testa radiis 9 nodoso-vesicularibus.

*Bonan. recr. 2. f. 18.*

*Rumph. mus. t. 48. f. 8.*

*Gualt. test. t. 99. f. C. D.*

*Argenv. conch. t. 27. f. F.*

*Habitat in O. Africano & Indico.*

Pes felis. 165. O. testa radiis 7 striatis scabris, auricula altera minuta.

*Habitat in O. Africano.*

*Testa parva, pellucida, novem radiis sensim undata.*



- pellucens. 166. O. testa radiis 9, lævi: fornice squamis cochleari-hemisphæricis.  
*Argenv. conch. t. 27. f. H. Pecten semiauritus.*  
*Habitat in O. australiore.*
- sanguinea. 167. O. testa radiis 22 scabris, semiaurita.  
*Gvalt. test. t. 74. f. N.*  
*Habitat in O. australiore.*
- varia. 168. O. testa radiis 30 scabris compressis uniaurita.  
*Habitat in O. australiore.*  
*Simillima priori, sed numero radiorum differens. Color maxime variat.*
- Pufio. 169. O. testa radiis 40 filiformibus uniaurita.  
*Habitat in O. australiore.*  
*Testa magnitudine nucis coryli, utrinque æqualiter convexa. Auricula fere unica.*
- glabra. 170. O. testa radiis 10 lævibus planiusculis, internis striis elevatis duplicatis. *M. L. U.*  
*Gvalt. test. t. 73. f. H.*  
*Kratzenst. Regenf. t. 1. f. 10.*  
*‡ t. 2. f. 16.*  
*Habitat in M. Mediterraneo.*  
*Testa æquivalvis subrotunda glabra, absque striis extus, obsolete plicata, incarnata extus. Auriculæ æquales.*
- opercularis. 171. O. testa radiis 20 subrotundis, decussata striato-scabra, operculo convexiore. *M. L. U.*  
*Habitat in O. meridionali.*  
*Testa opercularis, magis quam altera convexa.*
- gibba. 172. O. testa radiis 20 glabris, gibba. *M. L. U.*  
*Brown. jam. t. 40. f. 10.*  
*Habitat in M. Americano.*  
*Valvula utraque convexa ‡ sanguinea.*
- \* \* \* Pectines valvulis altero latere magis gibbis.
- flavicans. 173. O. testa gibba radiis 8 striatis, margine altero rotundato. *M. L. U.*  
*Habitat in O. australiore.*  
*Testa quasi obliqua. Auricula altera brevissima; color albus fusco rubroque varius; intus albus radiis flavis.*



fasciata. 174. O. testa gibba radiis 20, auriculis æqualibus exoletis.  
*Gualt. test. t. 74. f. E.*  
*Habitat in O. australiore.*

Lima. 175. O. testa gibba radiis 22 imbricatis squamis, altero  
 margine rotundato, auriculis oblitteratis. *M. L. U.*  
*Argenv. conch. t. 27. f. E.*  
*Habitat in O. meridionali.*  
*Testa alba oblonga æquivalvis. Auriculæ obsoletæ.*

\* \* \* \* Rudes, vulgo Ostrea dictæ.

Ifognomum. 176. O. testa lobo laterali acutangulo, margine exteriori  
 transverie sulcato.  
*Rumph. mus. t. 47. f. I.*  
*Klein. ostr. t. 8. f. 15.*  
*Habitat . .*

Malleus. 177. O. testa triloba: lobis transversis.  
*Bonae. kirch. 2. f. 180.*  
*Rumph. mus. t. 47. f. H. Ostreum divisum.*  
*Gualt. test. t. 96. f. D. E.*  
*Argenv. conch. t. 22. f. A.*  
*List. conch. 3. B. f. 1. t. 1. f. 1.*  
*Klein. ostr. t. 8. f. 14.*  
*Habitat in O. Asiatico, pretiosus.*

Folium. 178. O. testa ovata lateribus obtuse plicata parasitica.  
*Rumph. mus. t. 47. f. A. Ostreum cratium.*  
*Argenv. conch. t. 22. f. F.*  
*Klein. ostr. t. 8. f. 22.*  
*Habitat ad Jamaicam.*  
*Valvula altera medio longitudinali adhæret Gorgoniis. Car-*  
*do lacuna est, unde diversa a Mytilis parasiticis.*

orbicula- 179. O. testa orbiculata plana, margine integro crenato.  
 ris. *Gualt. test. t. 104. f. G.*  
*Habitat . .*  
*Testa magnitudine extimi articuli pollicis, compresso-pla-*  
*na, margine obtusissimo crenato.*

edulis. 180. O. testa semiorbiculata membranis imbricatis undula-  
 tis: valvula altera plana integerrima.  
*Rond. aqu. 2. p. 37.*  
*Gualt. test. t. 102. f. B. Ostreum vulgare.*



*List. angl.* 176. Ostreum vulgare maximum.  
*pl.* 111. 20. Ostrea major sulcata, inæqualiter  
 utrinque ad cardinem denticulata.  
*Klein. ostr. t.* 8. f. 21.  
*Bonan. recr.* 108. t. 70. Ostrea.  
*Habitat in Oceano Europæo.*  
*Frequentes in coenis Asotorum vivæ epulæ.*

femiau- 181. O. testa ovata femiaurita lævi, basi obliqua.  
 rita. *Gvalt. test. t.* 84. f. H.  
*Habitat in O. meridionali.*

Ephippiū. 182. O. testa orbiculata compresso-membranacea, cardi-  
 ne sulcis transversis pluribus.  
*Rumph. mus.* 47. f. B.  
*Habitat in M. Asiatico.*  
*Testa centre: ut vix cavitas appareat, extus rudis  
 fusca, distinctissima ab Anomia Ephippio & Piacenta.*

## 279. ANOMIA. Animal . . .

*Testa* inæquivalvis: valvula altera  
 planiuscula, altera basi magis  
 gibba; harum altera saepe basi  
 perforata.

*Cardo* edentulus cicatricula lineari  
 prominente introriam; valvulæ  
 vero planioris in ipso margine.

*Radii* duo omni pro basi animalis.

craniola- 183. A. testa orbiculata: valvula gibbosiore conico-con-  
 ris. vexa, planiore basi foraminibus tribus.

*Fa. suec.* 1227. t. 2. f. 1227. Concha testa planiore or-  
 biculata cranium humanum referente.

*Stohel Dig. epist. Lund.* 1732. f. 1, 2. Nummulus  
 brattensburgensis.

*Act. Upsal.* 2. p. 560. t. 152. f. 4. idem.

*Bruchm. cert.* 2. epist. 38. p. 390. t. 17. f. 10. Man-  
 lekard.

*Habitat in Scania ad Ifvó & Ealsbergam, non dum  
 viva reperta.*



- pectinata- 184. A. testa oblonga ramofo-fulcata: gibbosiore postice  
ta. poris duobus.  
*Habitat* . . fossilis.
- Ephip- 185. A. testa suborbiculata rugoso-plicata: planiore per-  
pium. forata.  
*Bonan. recr. 2. t. 56.*  
*Argenv. conch. t. 22. f. C.*  
*Habitat in M. Mediterraneo & America.*  
*Testa alba, magnitudine teste, intus argentea nitidissi-  
ma; utraque valvula sepe plicis quinque longitudina-  
libus, nec ad cardinem concurrentibus. Planior testa  
magno foramine.*
- Cepa. 186. A. testa obovata inæquali violacea: superiore convexa,  
inferiore perforata.  
*Habitat in M. Mediterraneo.*  
*Magnitudo Nucis Juglandis, sed altera testa plana.*
- electrica. 187. A. testa subrotunda flava lævi: altera convexo gibbosa.  
*Rumph. mus. t. 47. f. L. Ostreum electricum?*  
*Habitat in M. Mediterraneo.*
- Squamu- 188. A. testa orbiculata integerrima plana in margine alte-  
la. ro gibba lævi.  
*It. W'got. 171. Patella.*  
*Habitat in Oceano Svecico super Cancros, Fucos,*
- scobina- 189. A. testa subrotunda lævi intus scabra, nate per-  
ta. forata.  
*Gvalt. test. t. 96. f. A.*  
*Habitat in Pelago.*
- aurita. 190. A. testa obovata striata subaurita, nate perforata.  
*Gvalt. test. t. 96. f. B.*  
*Habitat . .*
- retusa. 191. A. testa obovata striata retusa: convalle longitudina-  
li, nate perforata.  
*Habitat in pelago Norvegico supra Alcyonia. D. Pennant.*
- Gryphus. 192. A. testa oblonga lævi: altera plana laterali obsoleta:  
nate incurvata; altera brevi planiuscula.  
*Mus. Tessin. 92. t. 5. f. 9.*  
*Olear. mus. 67. t. 33. f. 3.*



*List. angl.* 238. t. 4. f. 45.

*Column. aqv.* 54. t. 52.

*Bonan. recr.* 2. t. 31.

*Habitat . . fossilis.*

Pecten. 193. A. testa semi-orbiculata depressa multistriata: valvula altera plana.

*List. angl.* 243. t. 9. f. 49.

*Habitat . . fossilis.*

*Testa inferne s. margine cardinis linea recta s. transversa.*

striatula. 194. A. testa subrotundo-dilatata utrinque gibba striata, valvis æqualibus.

*Habitat . . fossilis.*

*Testa rotundata, sed duplo latior quam longa, postice gibbifior, antice margine tenui.*

reticula- 195. A. testa cordata decussatim striata: valvula brevioris.  
ris. gibbifior.

*Mus. Tessin.* 88. t. 5. f. 5.

*Habitat . . fossilis.*

*Testæ latera prominula compressa. Natis planioris valvule parum prominens.*

Plicatella. 196. A. testa dilatato-lunata plicata: fulcis longitudinaliter striatis media latiore.

*Habitat . . fossilis.*

*Testæ latera submucronata sunt; Plicæ longitudinales, striæ vero in Plicarum cavitatibus, plicis parallelæ s. longitudinales. Natis superior admodum prominens.*

crispa. 197. A. testa dilatato-triangulari plicata fulcis rugosis: media latiore.

*Mus. Tessin. p. . . t. 5. f. 7.*

*Habitat . . fossilis.*

*Testa fere lunata, sed natis superior prominens. Sulci 5 s. 6 rugis arcuatis transversis. Latera testæ submucronata.*

lacunosa. 198. A. testa subrotunda multifulcata: valvulis apice plicatis; altera brevior lacunosa, apice quadridentata.

*Mus. Tessin. . . t. 5. f. 6.*

*List. angl.* 249. t. 9. f. 57.



*Crew. mus. t. 19. f. 6.*

*Habitat . . fossilis.*

fareta. 199. A. testa subrotunda multifulcata, valvulis convexis apice octodentatis.

*Habitat . . fossilis.*

Caput serpentis. 200. A. testa ovata lævi gibba: valvula altera apice longiore.

*Column. purp. 22. f. 2.*

*Habitat . . fossilis.*

*Natum altera postice gibba perforata.*

Terebracula. 201. A. testa obovata lævi convexa: valvula altera triplicata, altera biplicata.

*Column. purp. 22. f. 1.*

*List. angl. 240. t. 8. f. 46.*

*Klein. ostr. t. 11. f. 74.*

*Habitat . . fossilis.*

*Natis alterius testæ prominens pertusa est; extus plicæ duæ.*

angulata. 202. A. testa basi laterum compressa, antice plicata: medio tridentato.

*Mus. Tess. 96. t. 5. f. 4.*

*Habitat . . fossilis.*

*Testa lævis, sed antice plicata; numerus plicarum variat; dignoscitur quod latera versus basin multum compressa.*

Hysterita. 203. A. testa dilatata lævi convexa striata subtriloba, antice depressa, in margine acuto.

*Mus. Tess. 90. t. 5. f. 1, 2, 2.*

*Column. purp. 22. f. 3? Trilobos.*

*Wolff. haff. 29. t. 3. f. 3, 4, 5.*

*Worm. mus. t. 83.*

*Habitat . . fossilis.*

biloba. 204. A. testa biloba æquali striata.

*Habitat . . a D. Pennant. Fossilis.*

Placenta. 205. A. testa orbiculata plana pellucida, cardinum callis linearibus binis testæ interne adnatis.

*List. conch. 3. B. f. 2. c. 2. t. 1.*

*Gvalt. test. t. 104. f. B.*

*Habitat in Pelago.*



280. MYTILUS. *Animal Tethys.*

*Testa* bivalvis, rudis, sæpius affixa Byffo.

*Cardo* edentulus, distinctus, linea subulata excavata longitudinali.

\* Parasitici, unguibus affixi.

Crista  
gani.

206. M. testa plicata spinosa, labro utroque scabro.  
*Rumph. mus. t. 47. f. D. Ostreum plicatum minus.*

*Gualt. test. t. 104. f. C. D. E.*

*Argenv. conch. t. 23. f. D.*

*Habitat in O. Indici Gorgoniis.*

*Labra interiora marginum testarum punctis eminentibus scabra.*

Hyotis. 207. M. testa plicata imbricata squamis compressis patulis, labro utroque lævi.

*Rumph. mus. t. 47. f. C. Ostreum plicatum majus.*

*Argenv. conch. t. 23. f. H.*

*Habitat in Pelagi Gorgoniis.*

Frons. 208. M. testa plicata læviuscula, labro altero scabro.

*Argenv. conch. t. 22. f. D. Ostreum sylvestre.*

*Habitat in Pelagi indici Gorgoniis.*

*Cardo absque lacuna, unde diversus ab Ostrea Folio.*

\* \* Plani s. compressi ut plani appareant & subauriti.

margari- 209. M. testa compresso-plana suborbiculata basi transver-  
tiferus. sa imbricata tunicis.

*Bonnat recr. 2. t. 1.*

*List. conch. t. 223. f. 57.*

*Rumph. mus. t. 47. f. F. Matrix perlarum.*

*Gualt. test. t. 84. f. E. F. G.*

*Argenv. conch. t. 23. f. A. Gallina guttata.*

*Habitat in utriusque Indiæ oceano.*

Unguis. 210. M. testa subrotunda longitudinaliter striata pellucida subaurita.

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Magnitudo unguis humani.*



## \* \* \* Fragiles.

- lithopha- 211. M. testa cylindrica utrinque extremitatibus rotundatis,  
 -gus. *List. angl.* 235. t. 8. f. 37.  
*Bonan. recr.* 2. t. 23.  
*Rumph. mus.* t. 46. f. F. Pholas.  
*Gualt. test.* t. 90. f. D.  
*Argenv. conch.* t. 30. f. L.  
*Habitat in O. Indico, Europæo, Mediterraneo, pene-*  
*trans & excedens Alarumora, Corulia &c.*  
*Testa indica mollior & fere coriacea; Europæa vero ma-*  
*gis fragilis.*
- bilocula- 212. M. testa cærulea striata, umbonibus fornicatis disse-  
 -ris. pimento albo. *M. L. U.*  
*Habitat in O. Indico.*
- exustus. 213. M. testa striata: ventre angulato, margine crenato.  
*Habitat ad Jamaicam.*
- barbatus. 214. M. testa læviuscula ferruginea apice barbata.  
*Gualt. test.* t. 91. f. H.  
*Habitat in M. Mediterraneo.*
- edulis. 215. M. testa læviuscula violacea, valvulis obliquis postice  
 acuminatis.  
*Fn. suec.* 1333. *It. æl.* 43. *It. wgoth.* 170.  
*List. angl.* 182. f. 23. *Rond. aquat.* 2. p. 48.  
*conch.* 3. t. 362. f. 20. *Gesn. aquat.* 277.  
*Bonan. recr.* 2. t. 30. *Bell. aquat.* 397.  
*Gualt. test.* t. 91. f. E.  
*Aldr. exsangu.* 512.  
*Habitat in O. Europæo, Indico & M. Balthico.*  
*Plebejis satit, frequentius devoratus nocet; inter tropicos*  
*Maximus, infra arcticum Minimums, uti reliqua testacea.*  
*Habet more Pinne Byssum exserendam.*
- ungula- 216. M. testa lævi subcurvata violacea, margine anteriore  
 -tus. inflexo, cardine terminali obtusiusculo.  
*Gualt. test.* t. 91. f. E. duplex.  
*Kratzenst. Regensf.* 16. t. 4. f. 47.  
*Habitat in Europa australi.*  
*Valvulae valde convexæ & juxta se positæ unguas pe-*  
*corum referunt. An prioris varietas?*



- Modio- 217. M. testa lævi margine dorsali dilatato, natibus gibbis,  
lus. cardine sublaterali.  
*Rumph. mus. t. 46. f. B.*  
*Argen. conch. t. 25. f. C.*  
*Bradt. natur. t. 3. f. 1.*  
*Habitat in M. Mediterraneo.*
- 'cygneus. 218. M. testa ovata antice compressiuscula fragilissima, car-  
dine laterali.  
*List. angl. app. 29. t. 1. f. 3. Musculus latus maximus.*  
*conch. t. 193. f. 8.*  
*Klein. ostr. t. 9. f. 26.*  
*Habitat in Europa ad ostia fluviorum.*
- anatinus. 219. M. testa ovali compressiuscula fragilissima margine  
membranaceo, natibus decorticatis.  
*Fn. svec. 1332.*  
*List. angl. app. 30. t. 1. f. 2.*  
*conch. t. 154. f. 9.*  
*Habitat in Europæ aquis dulcibus.*  
*Similis Myæ Pictorum, sed fragilior & cardine dis-*  
*tinctissimus, Anatum cibus.*
- viridis. 220. M. testa lævi ovata membranacea pellucida, cardine  
terminali. *M. L. U.*  
*Habitat in O. Meridionali.*
- ruber. 221. M. testa rugosa, valvulis obliquis postice dilatatis,  
margine cardinali apicem æquante.  
*Argen. conch. t. 25. f. Q?*  
*Habitat in O. australiore.*
- Hirundo. 222. M. testa lævi valvulis bilobis, lobo cardinali longio-  
re tenuioreque.  
*List. conch. 3. B. f. 1. t. 1. f. 2.*  
*Bonan. recr. 2. t. 58.*  
*Rumph. mus. t. 46. f. G. Avicula.*  
*Gvalt. test. t. 94. f. A. B.*  
*Argen. conch. t. 22. f. B.*  
*Klein. ostr. 8. t. 13.*  
*Habitat in O. meridionali, Mediterraneo.*  
*Testa basi contracta, alterius valvule magis.*



281. PINNA. *Animal* Limax.

*Testa* tubbivalvis, fragilis, erecta, e-  
mittens barbam Bythinam

*Cardo* edentulus, coalitis in unam  
valvulis.

rudis. 223. P. testa fulcata: squamis fornicatis per series digestis.

*Rumph. mus. t. 46. f. L.* Pinna lata.

*Argenv. conch. t. 25. f. F.* Perna.

*Habitat in O. Meridionali, Mediterraneo.*

*Testa rudior cornei coloris, longitudinaliter grosse sulcata s. rugosa 5 ad 8 sulcis, nec alba tenuissimis numerosissimisque striis P. nobilis.*

nobilis. 224. P. testa striata: squamis canaliculato tubalosis subimbricatis.

*Bonap. recr. 2. f. 24.*

*Argenv. conch. t. 25. f. B.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Varietates potius quam distinctæ species sunt sex priores hujus generis.*

muricata. 225. P. testa striata: squamis concavis ovatis acutis.

*List. conch. t. 370. f. 215.* Pinna tenuis striata muricata.

*Rumph. mus t. 46. f. M.* Pinna lata altera.

*Gvalt. test. t. 79. f. D.*

*Hasselqv. itin. 447. n. 137.* Concha Pinna.

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Hostis Sepia octopodia. custos Cancer Pinnotheres: Amœn. acad. 2. p. 48. Hasselqv. itin. 449, 572.*

rotunda- 226. P. testa, squamis obsolete, margine rotundata.

ta. *Gvalt. test. t. 79. f. C.*

*Habitat in O. meridionali.*

saccata. 227. P. testa lævi saccata erectiuscula subfastigiata.

*Rumph. mus. t. 46. f. N.* Pinna alba.

*Gvalt. test. t. 79. f. F.*

*Habitat in M. Mediterraneo, Indico.*



digitifor- 228 P. testa lævi tubulosa digitiformi incurva, margine  
mis. summo membranacea. *M. L. U.*  
*Habitat in O. Indico.*

lobata. 229. P. testa nuda lobata. *M. L. U.*  
*Habitat in O. Indico.*

*Testa membranacea, dum valvulae explicantur obcordata: lobis lateralibus rotundatis latioribus; a cardine ad lobos nervus; a nervo lineae laterales ductae.*

pennacea. 230. P. testa pellucida patula pennam referente. *M. L. U.*  
*Habitat . . .*

*Constat hæc unica valvula aperta ex canali obtuso utrinque latius marginata præterquam basi. Dubia mihi obstructurum, pelluciditatem, flexibilitatem &c; asservata in Museo Ser. Reginae LUDOVICÆ UDALRICÆ, illustrissimique Senatoris Com. Tessin.*

## 282. ARGONAUTA. *Animal Sepia.*

*Testa univalvis, spiralis, involuta, membranacea, unilocularis,*

Argo. 231. A. carina subdentata.

*Bellon. aqu. t. 380. Nautilus.*

*Bonun. recr. 1. f. 13. Nautilus f. Naupilius.*

*List. conch. 4. Naut. t. 3. 4.*

*Rumph. mus. t. 18. f. A. B. 1. 4. Nautilus tenuis.*

*Grait. test. t. 11. 12. f. A. B. C. Cymbium.*

*Argenv. conch. t. 8. f. A. B. C.*

*Klein. ostr. t. 1. f. 3. Nautilus fulcatus.*

*Tessin. epist. 1. n. 28. Cymbium.*

*Habitat in Pelago, M. Indico, Mediterraneo. \**

*Majorem inter & Minorem ex multis Speciminibus limites non attingo.*

*Navigat emissa aqua exonerata sentina supinus in summa æquorum, membranam miræ tenuitatis extendit, brachia duo retorquens, cæteris subremigans, velificat; demum hausta se mergens aqua. Plin. IX: 29.*

232. A.

*Domunculan. alteram, quæ admodum Cuneo in mare f. Bartholæus, intrasse Sepiam, cum non connexa sit testæ, per adeo munitæ, quæ crederet, nisi hoc testes nos obstringerent: qui propriè eam viderunt Argonautam ætæreanæ in?*



Cymbiū. 232. *A. carina rugosa mutica.*

*Gvalt. test. t. 12. f. D.*

*Habitat in M. Mediterraneo, minutus.*

*Magnitudo vix minima areolæ oculo armato lustranda.*

283. NAUTILUS. *Animal Sepia ? Rumph.*

*Testa univalvis, isthmis perforatis concamerata, polythalamia.*

\* *Spirales rotundati.*

Pompi- 233. *N. testæ apertura cordata, anfractibus contiguis ob-*  
lius. *tulis lævibus.*

*Bellon. aqu. t. 382. Nautilus alter.*

*Fonst. aquat. t. 10. f. 1, 2, 7.*

*List. conch. 4. Nautil. t. 1. f. 1, 2, 3.*

*Rumph. mus. t. 17. f. A. B. C.*

*Bonan. recr. 1. f. 1, 2.*

*Gvalt. test. t. 17, 18.*

*Argenv. conch. t. 8. f. E. F.*

*Pet. amb. t. 3. f. 7.*

*gaz. t. 99. f. D.*

*Breyn. polyth. 14.*

*Klein. ostr. t. 1. f. 1, 2.*

*Habitat in India.*

*Testa pulchre pictura decorticata elaborata, præparata, ad pocula aquæ potatorum orientalium.*

Crista. 234. *N. testæ apertura orbiculata, anfractibus contiguis,*  
*articulis annulatis dorso ipinosi. †*

*Rœf. insect. 3. p. 599. t. 97. f. 7.*

*Habitat in Germaniæ paludibus; minutus.*

Calcar. 235. *N. testæ apertura lineari, anfractibus contiguis, ge-*  
*niculis elevatis.*

*Planc. conch. 12. t. 1. f. 3, 4.*

*Gvalt. test. t. 19. f. C. B.*

*Habitat in M. Adriatico, minutus.*

crispus. 236. *N. testæ apertura semicordata, anfractibus contiguis,*  
*geniculis crenatis.*

*Planc. conch. 10. t. 1. f. 2.*

*Gvalt. test. t. 19. f. A. D.*

*Habitat in M. Mediterraneo, minutus.*



Beccarii. 237. N. testæ apertura obovata, anfractibus contiguis torulosis, geniculis insculptis.

*Planco. conch. 8. t. 1. f. 1.*

*Gvalt. test. t. 19. f. H. H. I.*

*Habitat in M. Adriatico, Mediterraneo. D. D. Kæbler; minutus.*

umbilica-238. N. testæ apertura compresso-lineari, anfractibus contiguis compressis, umbilico concavo.

*Column. phytob. 2. t. 38. f. E.*

*Habitat Liburni. D. D. Kæbler; minutus.*

*Testa testis transversis siccum affepimenta oblique articulata est, præsertim carina propius.*

Spirula. 239. N. testæ apertura orbiculari, anfractibus disjunctis cylindricis.

*Linna. arch. 1. f. 39.*

*Lut. conch. 4. Mant. t. 1. f. interior.*

*Argente. conch. t. 29. f. K.*

*Gvalt. test. t. 19. f. E.*

*Kumpb. mus. t. 20. f. 1.*

*Brew. polyt. 21. f. 2.*

*Klein. ostr. t. 1. f. 6.*

*Habitat in America.*

\* \* *Elongati erectiusculi.*

Semi-Li-240 N. testa recta, apice incurvato - spirali, anfractibus tuus. contiguis. †

*Column. phytob. 2. t. 38. f. D. Semi-Lituus.*

*Habitat Liburni; minutus.*

obliquus. 241. N. testa recto-subarcuata, articulis oblique striatis. †

*Gvalt. test. t. 19. f. N.*

*Habitat in M. Adriatico, Mediterraneo. Minutus.*

Raphani-242. N. testa recta subcylindrica, articulis torosis: striis strum. elevatis duodenis, siphone centrali regulari.

*Habitat in M. Mediterraneo. Cl. C. Adieni.*

*Testa longitudine unguis, adeoque & inter minimos maximus. Differt a N. Raphano numero striarum, magnitudine, siphone regulari, quodque versus apicem vix attenuatus.*



- Raphanus. 243. N. testa recta attenuata, articulis torosis: striis elevatis sedenis, siphone sublaterali obliquo.  
*Planc. conch. t. 1. f. 6.*  
*Gvalt. test. t. 19. f. L.*  
*Habitat in M. Adriatico, Mediterraneo, minutus.*
- Granum. 244. N. testa recta ovato-oblonga, articulis torosis: striis elevatis octonis interruptis, siphone obliquo.  
*Habitat in M. Mediterraneo. M. Kabler M. D. Minutus.*  
*Differt a N. 243. quod fere ovata nec longiuscula; striis tantum 8, iisque ad articulorum genicula contractis admodum & fere interruptis, unde testa reticulata apparet; ideoque vix varietatem dicerem; quamvis Siphone conveniat.*
- Radicula. 245. N. testa recta oblongo-ovata, articulis torosis glabris. †  
*Planc. conch. 14. t. 1. f. 5.*  
*Habitat in M. Adriatico. Minutus.*
- fascia. 246. N. testa recta, articulis striatis, geniculis lævibus elevatis.  
*Gvalt. test. t. 19. f. O.*  
*Habitat in M. Adriatico. Minutus.*
- Sipunculus. 247. N. testa recta lævi, articulis cylindricis remotis, geniculis attenuatis cylindricis. †  
*Gvalt. test. t. 19. f. R. S.*  
*Habitat in freto Siculo, minutus.*
- Legumen. 248. N. testa recta compressa articulata hinc marginata, siphone laterali.  
*Planc. conch. 8. t. 1. f. 7.*  
*Gvalt. test. t. 19. f. P.*  
*Habitat in M. Adriatico; minutus.*
- Orthocera. 249. N. testa recta: anfractibus carinato-striatis.  
*It. æl. 140.*  
*Mus. Tessin. 86. Nautilus rectus.*  
*Scheuch. helv. 7. f. 8. Diluv. 938. Alveolus.*  
*Gmelin. act. petrop. vol. 3. p. 246.*  
*Gron. lap. 71.*  
*Habitat in alto Pelago? Fossilis.*



*Testa frequentissima petrificata in montibus nostris calcareis, inter omnia fossilia nobis nota sæpe longissima, non dum visa immutata,*

284. CONUS, *Animal* Limax.

*Testa univalvis, convoluta, turbinata. Apertura effusa, longitudinalis, linearis, edentula, basi integra. Columella lævis.*

\* *Truncati s. Spira fere truncata.*

marmo- 250. C. testa conica fusca, maculis ovatis albis, spiræ an-  
reus. fractibus canaliculatis.

*Bonan. recr. 3. f. 123.*

*Rumph. mus. t. 32. f. N. 1.*

*Gvalt. test. t. 22. f. D.*

*Argenv. conch. t. 15. f. O.*

*Pet gaz t. 47. f. 11.*

*Kratzenst. Regensf. 20. t. 5. f. 53.*

*Habitat in Asia.*

*Testa sæpe coronata atra maculis trigono-ovatis albis.*

imperia- 251. C. testa albida: fasciis lividis cingulisque linearibus al-  
bo fuscoque articulatis.

*Rumph. mus. t. 34. f. H. I.*

*Gvalt. test. t. 22. f. A.*

*Argenv. conch. t. 15. f. F.*

*Kratzenst. Regensf. 12. t. 3. f. 35.*

*Habitat*

*Testa sæpius coronata, albida maculis confluentibus cæcis.*

litteratus. 252. C. testa conica alba, punctis fuscis.

*Bonan. recr. 3. t. 363.*

*Rumph. mus. t. 31. f. D. V. musicalis.*

*Gvalt. test. t. 22. f. F.*

*t. 21. f. O. G.*

*Argenv. conch. t. 15. f. I. Q.*

*Kratzenst. Regensf. 12. t. 3. f. 29. & t. 4. f. 46.*

*Habitat in O. Asiatico.*

*Testa nivea fasciis obsolete flavis, maculisque sparsis purpurascens.*



- Virgo. 253. C. testa conica basi cærulescente.  
*Rumph. mus. t. 31. f. E.*  
*Kratzenst. Regensf. t. 8. f. 19.*  
*Habitat . . .*  
*Similis litteratis colore lacteo aut rubro maculata, basi*  
*semper violacea margine acuto Spira exquisita est.*
- Capita- 254. C. testa conica glabra basi fusca, spira convexiuscula.  
 neus, *β. Gvalt. test. t. 20. f. I.*  
*γ. Rumph. mus. t. 33. f. X.*  
*Gvalt. test. t. 22. f. M.*  
*Bonan. recr. 3. t. 139.*  
*Argenv. conch. t. 15. f. K.*  
*Pet. gaz. t. 27. f. 11.*  
*Kratzenst. Regensf. t. 7. f. 7.*  
*δ. Rumph. mus. t. 33. f. Y.*  
*Kratz. Regensf. 26. t. 6. f. 65.*  
*Gvalt. test. t. 20. f. G.*  
*ε. Bonan. recr. 3. t. 361.*  
*Habitat in Asia.*  
*Testa castia fasciis 2 s. 3 albis fusco-maculatis.*
- Miles. 255. C. testa conica rudi basi fusca, spira convexa.  
*Rumph. mus. t. 33. f. W.*  
*Habitat in India.*  
*Testa ignobilis pallido testacea fasciis fusco-ferrugineis.*  
 \* \* *Pyriformes basi rotundata, sub-cylindrica quam spira*  
*sesquilongiore.*
- Princeps. 256. C. testa flava: lineis fusco-purpureis longitudinalibus  
 ramosis. *M. L. U.*  
*Habitat . . .*  
*Lineæ latæ purpureo-fuscae longitudinales subramosæ.*
- Ammira-257. C. testa basi punctato scabra.  
 lis.
- Summus. *β. C. testa incarnata fasciis albis: media cingalis tribus*  
*nigris articulatis.*  
*Rumph. mus. t. 34. f. B.*  
*Argenv. conch. t. 15. f. N.*  
*Pet. gaz. t. 28. f. 4.*

Y y 5

γ. C.

Ammiratum 257 & 275 varietates nitidas, Turbinis scalaris & Ostreae Mallei 177  
 æmulas nobilitavit doctæ ignorantia, pretiavit quam patiuntur opes stulticia,  
 emittavit barbara luxuria.



- ordina-  $\gamma$ . *C. testa testacea maculis albis acutis: fasciis tribus al-*  
rius. *bis subreticulatis, media cingulo articulado.*  
*Rumph. mus. t. 34. f. C.*
- occiden-  $\delta$ . *C. testa testacea albo maculata: fasciis quatuor flavis*  
talis. *reticulatis cingulo articulado.*  
*Rumph. mus. t. 34. f. D.*  
*Habitat in O. Americæ meridionalis.*
- Senator. 258. *C. testa conica lævi glabra, spiræ anfractibus obtusis*  
*scriptis.*  
*Habitat . .*
- nobilis. 259. *C. testa subcylindrica lævi glabra.*  
*Argenv. conch. t. 15. f. M. Tigris lutea.*  
*Habitat . .*
- gemma- 260. *C. testa cingulis linearibus albo fuscoque articulatis.*  
nus. *Rumph. mus. t. 34. f. G.*  
*Bonan. recr. 3. t. 337.*  
*Habitat . .*
- glaucus. 261. *C. testa basi emarginata striata, spiræ inermis anfracti-*  
*bis contiguis.*  
*Rumph. mus. t. 33. f. G. G.*  
*Habitat in Asia.*
- Mona- 262. *C. testa gibba fusco cærulescente nebulata acuta, ba-*  
chus. *si striata.*  
*Bonan. recr. 3. t. 126.*  
*Rumph. mus. t. 33. f. C. C.*  
*Kratzenst. Regensf. t. 12. f. 68.*  
*Habitat . .*
- Minimus. 263. *C. testa cinerascete punctis oblongis cincta.*  
*Argenv. conch. t. 15. f. A.*  
*Habitat . .*
- Rusticus. 264. *C. testa ovata, basi rugoso muricatoque scabra, spira*  
*conico convexa.*  
*Rumph. mus. t. 32. f. R.*  
*Gvalt. test. t. 25. f. R.*  
*Argenv. conch. t. 15. f. D.*

*Habi-*

Coronate teste vocantur quoniam anfractus superne tantum notantur tuberculis s. mu-  
cionibus; inter testas coronatas & calvas nulla datur differentia specialis.



*Habitat in Africa.*

*Testa livida fascia albido-nebulosa.*

- Merca- 265. C. testa ovata alba, fasciis reticulatis flavis.  
tor. *Argenv. conch. t. 15. f. P.*  
*Habitat . . .*
- betulinus. 266. C. testa basi subemarginata rugosa, spira planiuscula mucronata.  
*Gvalt. test. t. 21. f. B.*  
*Habitat . . .*
- figulinus. 267. C. testa basi emarginata rugosa, spira acuminata: anfractibus planiusculis.  
*Rumph. mus. t. 31. f. V.*  
*Kratzenst. Regensf. t. 10. f. 47.*  
*Habitat . . .*
- ebraeus. 268. C. testa ovata alba: fasciis nigris ex maculis transversis.  
*Bonan. recr. 3. t. 122.*  
*Rumph. mus. t. 33. f. B B.*  
*Gvalt. test. t. 25. f. T. Q.*  
*Argenv. conch. t. 15. f. G.*  
*Pet. gaz. 99. f. 12.*  
*Habitat in India.*
- Stercus 269. C. testa basi emarginata striata, spiræ anfractibus canaliculatis.  
musca-  
rum. *Rumph. mus. t. 33. f. Z. A. A V. arenata.*  
*Gvalt. test. t. 25. f. N. O. P.*  
*Argenv. conch. t. 15. f. S.*  
*Pet. gaz. t. 75. f. 1.*  
*Kratzenst. Regensf. t. 7. f. 2.*  
*Habitat in Asia.*
- varius. 270. C. testa elongata muricata, spira coronata acuta.  
*Argenv. conch. t. 15. f. R.*  
*Habitat . . .*
- spinofus. 271. C. testa lineolis rubris cincta coronata subplicataque spinis argutis, spira aculeata.  
*Gvalt. test. t. 55. f. E.*  
*Habitat . . e Museo Tessiniano.*

*Sta-*



*Statura Volutæ vespertilionis, sed basis minime emarginata, & columella non plicata; Lineolæ purpurascentes parallelæ numerosæ cingunt testam albidam, superne angulatam & spinis argutissimis validis coronatam.*

\* \* \* *Elongati basi rotundata, cylindro duplo longiore quam spira.*

clavus. 272. C. testa striis convexis lævibus, basi cærulescente.  
*Habitat . .*

Nussatel- 273. C. testa subcylindrica rubra inermi striis tuberculatis  
la. *scabra.*

*Rumph. mus. t. 33. f. EE.*

*List. conch. 4. f. 10. c. 6. t. 3. f. 2.*

*Gvalt. test. t. 25. f. L.*

*Argenv. conch. t. 16. f. P.*

*Habitat ad Nussatello Insulam Asiae.*

*Testa pallida reliquis longior sive punctis fulvis scabris.*

granula- 274. C. testa scabra inermi: striis sulcatis lævibus.  
tus.

*Rumph. mus. t. 32. f. T. Voluta granulata.*

*Gvalt. test. t. 25. f. H.*

*Habitat in O. Africano.*

*Testa magis rubra magisque sulcata quam in reliquis fascia alba una alterave & puncta purpurea ad strias.*

Aurisia- 275. C. testa incarnata lævi fasciis albidis, anfractuum  
cus. *summis canaliculatis.*

*Rumph. mus. t. 34. f. A.*

*Argenv. conch. t. 15. f. II.*

*Pet. amb. t. 7. f. 7.*

*Habitat . .*

*Anniralis hic s. Cedo nulli differt testa magna lævi, anfractibus supra canaliculatis.*

Magus. 276. C. testa subcylindrica: fasciis longitudinalibus albo-punctatis.

*Rumph. mus. t. 32. f. Q.*

*Gvalt. test. t. 20. f. F.*

*Habitat . .*

striatus. 277. C. testa ovato-oblonga gibba nebulosa: striis tenuissimis parallelis fuscis.

*Rumph. mus. t. 31. f. F.*



*Gvalt. test. t. 26. f. D.*  
*Argenv. conch. t. 16. f. C.*  
*Pet. gaz. t. 98. f. 9.*  
*Kratzenst. Regensf. t. 8. f. 16.*  
*Habitat versus littora Hitæ.*

**Textile.** 278. C. testa venis reticulatis luteis, maculis luteis fuscisque.

*Rumph. mus. t. 32. f. O. P.*  
*Gvalt. test. t. 25. f. X. AA.*  
*Bonan. recr. 3. t. 135.*  
*Argenv. conch. t. 16. f. D. I.*  
*Kratzenst. Regensf. 26. t. 6. f. 62.*  
*Habitat ad Bandam Asiæ.*

**auhicus.** 279. C. testa venis reticulatis fasciisque longitudinalibus, fuscis interruptis.

*Bonan. recr. 3. t. 133.*  
*Rumph. mus. t. 33. f. 4.*  
*Gvalt. test. t. 25. f. Z. V.*  
*Argenv. conch. t. 16. f. G.*  
*Kratzenst. Regensf. t. 8. f. 25.*  
*Habitat in Asia.*  
*Varietas forte præcedentis.*

\* \* \* \* Laxi ventricosi, in dorsum coniecti super mensam trinitantes.

**Spectrū.** 280. C. testa cærulescente flavo-nebulosa punctis striisque albo-luteis.

*Rumph. mus. t. 32. f. S. Voluta spectrorum.*  
*Gvalt. test. t. 25. f. S.*  
*Habitat in Asia.*

**bullatus.** 281. C. testa flava albo-nebulosa.

*Gvalt. test. t. 26. f. C.*  
*Habitat . .*

**Tulipa.** 282. C. testa oblonga gibba lævi, apertura dehiscente.

*Rumph. mus. t. 34. f. K. L.*  
*Argenv. conch. t. 16. f. B.*  
*Kratzenst. Regensf. 8. t. 2. f. 20.*  
*Habitat . .*

*Simillimus Geographo, sed minime coronatus; cæterum testa laxè convoluta.*



Geogra- 283. C. testa oblonga gibba coronata, apertura dehiscente.  
pnus.

*Bonap. recr. 3. t. 319.*

*Rumph. mus. t. 31. f. G. Nubecula.*

*Gualt. test. t. 26. f. E.*

*Argenv. conch. t. 16. f. A.*

*Klein. obr. t. 5. f. 90. Nubecula Tulipa gailorum.*

*List. conch. 4. f. 10. c. 7. t. 3. f. 2.*

*Habitat in Indiis.*

Terebel- 284. C. testa cylindrica, spira subulata.  
lum.

*Bonap. recr. 3. t. 57.*

*List. conch. 4. f. 10. c. 6. t. 1.*

*Rumph. mus. t. 30. f. S.*

*Pet. amb. t. 13. f. 24.*

*Argenv. conch. t. 14. f. G.*

*Habitat in Asia.*

285. CYPRÆA. *Animal* Limax.

*Testa* univalvis, involuta, subovata, obtusa, lævis.

*Apertura* utrinque effusa, linearis, utrinque dentata, longitudinalis.

\* Subturbinatæ.

Mappa. 285. C. testa subturbinata characteribus inscripta, macula longitudinali ramosa.

*Rumph. mus. t. 38. f. B. Porcellana montosa.*

*Argenv. conch. t. 21. f. B.*

*Pet. gaz. t. 96. f. 6.*

*amb. t. 16. f. 2.*

*Habitat in O. Africæ.*

*Differt a sequenti lateribus levibus pallidis immaculatis.*

arabica. 286. C. testa subturbinata characteribus inscripta, macula longitudinali simplici.

*Rumph. mus. t. 38. f. M. Porcellana literata f. arabica.*

*Barrel. rar. t. 1325. f. 20.*

*Gualt. test. t. 16. f. V.*

*List. conch. 4. f. 9. c. 2. t. 1. f. 1.*

*Habitat in India orientali, ad Fretum Sunda.*

*Differt a precedenti lateribus incrassatis fusco-maculatis.*



- Argus.** 287. C. testa subturbinata subcylindrica adîperfa oceli.  
subtus maculis quatuor fuscis.  
*Bonan. recr. 2. f. 263.*  
*Barr. rar. t. 1325. f. 25.*  
*Rumph. mus. t. 38. f. D. Argus.*  
*Gualt. test. t. 16. f. T.*  
*Argenv. conch. t. 21. f. D. Argus magnus.*  
*List. conch. 4. f. 9. c. 6. t. 9.*  
*Pet. gaz. t. 97. f. 6.*  
*Kratzenst. Regensf. 20. t. 5. f. 57.*  
*Habitat in O. Africae.*  
*Subtus macule utrinque duæ magnæ fuscæ.*
- testudina-** 288. C. testa obtusa subcylindrica, extremitatibus depressis.  
**ria.** *List. conch. 4. f. 9. c. 5. t. 6.*  
*Rumph. mus. t. 38. f. 6. T. testudinaria.*  
*Pet. amb. t. 8. f. 7.*  
**β.** *List. conch. 4. f. 10. c. 8. t. 1. Larva est.*  
*Habitat . . .*  
*Hæc in suo genere maxima & reliquis longior; variat*  
*cum & absque spira antice manifesta.*
- stercora-** 289. C. testa subturbinata gibba livido testaccoque macu  
**ria.** lata, utrinque marginata, subtus plana.  
*Gualt. test. t. 15. f. S. T.*  
*Habitat . . .*  
*Testa subovata gibba subturbinata undato-glauca maculis*  
*griseis fuscisque temere adsternis; antice juxta spiram*  
*macula fusca; postice depresso marginata deflexa; sub-*  
*tus plana; Labro interiore postice valde retruso; aper-*  
*tura antice valde gibba.*
- Carneo-** 290. C. testa subturbinata pallida, fasciis incarnatis, ore  
**la.** violaceo.  
*Rumph. mus. t. 38. f. K. Carneola.*  
*Pet. gaz. t. 80. f. 8.*  
*Habitat in Asia.*  
*Testa tenuis oblonga, apertura sæpe subviolacea.*
- Zebra.** 291. C. testa turbinata cinerea fasciis fuscis.  
*Habitat . . .*  
*Statura Carneolæ sed duplo major; spira majore eviden-*  
*tiore quam in reliquis. Denticuli aperturae fusci.*



- Talpa. 292. *C. testa subturbinata subcylindrica testacea fasciis pallidis, subtus incrassata fusca.*  
*Rumph. mus. t. 38. f. I. Talpa.*  
*Gvalt. test. t. 16. f. N.*  
*Argenv. conch. t. 21. f. H. Talpa.*  
*Pet. amb. t. 16. f. 1.*  
*List. conch. 4. f. 9. c. 4. t. 3. f. 2.*  
*Barrel. rar. t. 1325. f. 19.*  
*Kratzenst. Regens. t. 10. f. 37.*  
*Habitat in Asia.*
- amethy- 293. *C. testa subturbinata lateralibus gibbis corticatis, dor-*  
 stea. *so violaceo.*  
*Bonan. recr. 3. t. 255.*  
*Rumph. mus. t. 39. f. Q. Achatina.*  
*Pet. gaz. t. 32. f. 10.*  
*List. conch. 4. f. 9. c. 3. t. 4. f. 3.*  
*Habitat in Madagascar.*
- lurida. 294. *C. testa subturbinata lurida subfasciata, extremitatibus*  
*luteis nigro-bimaculatis.*  
*Gvalt. test. t. 13. f. I.*  
*Habitat in M. Mediterraneo.*
- Vanelli. 295. *C. testa subturbinata maculata punctis lutescentibus,*  
*extremis fusco maculatis, fauce rufa.*  
*Pet. gaz. t. 95. f. 9.*  
*Habitat . . .*  
*Apertura inter dentes rufa.*
- Lota. 296. *C. testa subturbinata alba, denticulis subulatis.*  
*Habitat . . .*
- fragilis. 297. *C. testa turbinata ovata glauca testacea undata subfa-*  
*sciata:*  
*Gvalt. test. t. 16. f. Q.*  
*Habitat in M. Mediterraneo.*  
*Testa structura C. arabicæ, sed pista undis longitudina-*  
*libus griseis & fasciis pallidis cinctâ, cæterum reliquis*  
*magis tenuis est.*
- \* \* Obtusæ absque spira manifesta.
- Caput 298. *C. testa obtusa triquetro-gibba, postice obtusiu-*  
 serpentis. *scula.*  
*Bonan. recr. 3. t. 258.*



*Rumph. mus. t. 38. f. F.* Caput serpentis minus.

*Pet. gaz. t. 76. f. 9.*

*amb. t. 12. f. 7.*

*List. conch. 4. f. 9. c. 6. t. 7.* Concha veneris maculis quasi reticulatis.

*Gvalt. test. t. 15. f. O.*

*Habitat in Mauritio.*

mauritiana- 299. C. testa obtusa triquetro-gibba, postice depresso acuta; subtus nigra.

*Rumph. mus. t. 38. f. E.* Caput serpentis majus.

*Pet. gaz. t. 96. f. 8.*

*List. conch. 4. f. 9. c. 6. t. 8.*

*Habitat in Mauritio.*

*Hæc magna subtus fusca; prior parva subtus albida.*

Vitellus. 300. C. testa obtusa livida maculis albis.

*List. conch. 4. f. 9. c. 4. t. 8. f. 2.*

*Bonan. recr. 3. f. 254.*

*Rumph. mus. 115. t. 38. f. P. falita.*

*Habitat ad Sundam Asiae.*

Mus. 301. C. testa obtusa retusa gibba cinerea: fascia longitudinali fusca, denticulis nigricantibus.

*Rumph. mus. t. 39. f. S.*

*List. conch. 4. f. 9. c. 1. t. 2.*

*Argenz. conch. t. 21. f. E?*

*Habitat ad Carthagenam.*

Tigris. 302. C. testa obtusa ovata, postice obtusa, antice rotundata.

*Bonan. recr. 3. f. 264, 231, 232.*

*Rumph. mus. t. 38. f. A.* Porcellana guttata.

*Gvalt. test. t. 14. f. I. H. L.*

*List. conch. 4. f. 9. c. 5. t. 1.*

*Pet. gaz. t. 96. f. 7.*

*Barr. rar. t. 1325. f. 23. & t. 1326. f. 4.*

*Habitat in Madagascar.*

*Variat colore: albida & purpurascens.*

Lynx. 303. C. testa oblongo-ovata punctis fuscis lineaque flavescente, postice acutiucula, ore rufo.

*Gvalt. test. t. 14. f. C.*

*List. conch. 4. f. 9. c. 4. t. 9. f. 1.*

*Pet. gaz. t. 80. f. 9.*



*Habitat ad Madagascar.*

*Præcedenti similis nitidaque, sed parva.*

Isabella. 304. C. testa obtusa cylindrica, extremitatibus luteis.

*Rumph. mus. t. 39. f. G. Isabella.*

*Argenv. conch. t. 21. f. P.*

*Pet. amb. 16. f. 16.*

*List. conch. 4. f. 9. c. 2. t. 2. f. 2.*

*Habitat in Mauritio, Madagascar.*

\* \* \* Umbilicatæ.

Onyx. 305. C. testa umbilicata, subtus fusca, supra albida.

*Rumph. mus. t. 38. f. G.*

*Gvalt. test. t. 15. f. N.*

*Habitat in Asia.*

*Testa magnitudine pollicis, subtus atrata; supra lutea, albido-flava, similis cæterum Capiti Serpentis; an mutata?*

succincta. 306. C. testa umbilicata, labio interiore utraque extremitate rotundato.

*Habitat . .*

Ziczac. 307. C. testa umbilicata, subtus lutea punctis fuscis, extremitatibus maculis duabus fuscis.

*Bonan. recr. 3. t. 242.*

*List. conch. 4. f. 9. c. 3. t. 1. f. 1. Concha ven. undatim depicta.*

*Habitat . .*

Hirundo. 308. C. testa umbilicata supra cærulescente, extremitatibus maculis duabus fuscis.

*Pet. gaz. t. 30. f. 3.*

*Habitat . .*

Asellus. 309. C. testa umbilicata alba: fasciis tribus fuscis.

*Bonan. recr. 3. f. 236.*

*Barrel. rar. t. 1326. f. 27.*

*Rumph. mus. t. 39. f. M. Asellus.*

*Argenv. conch. t. 21. f. T.*

*Gvalt. test. 15. f. M.*

*Pet. gaz. t. 97. f. 11.*

*amb. t. 16. f. 18.*

*List. conch. 4. f. 9. c. 6. t. 3. f. 2.*

*Habitat in Maldivis.*



cribraria. 310. C. testa umbilicata lutea: punctis rotundis albis.

*Argenv. conch. t. 21. f. X.*

*Pet. gaz. t. 80. f. K; an t. 8. f. 3?*

*List. conch. 4. f. 9. c. 6. t. 3. f. 2.*

*Kratzenjl. Regensf. t. 12. f. 74.*

*Habitat . .*

errones. 311. C. testa umbilicata: macula testacea æquali.

*Habitat . .*

\* \* \* \* Marginatæ.

Moneta. 312. C. testa marginato-nodosa albida.

*Bonan. recr. 3. f. 233.*

*Barrel. rar. t. 1326. f. 26.*

*List. conch. 4. f. 9. c. 8. t. 1. f. 3, 4. Moneta nigritarum.*

*Rumph. mus. t. 39. f. C. Thoracium vulgare f. Cauricum.*

*Gvalt. test. t. 14. f. 4, 5.*

*Argenv. conch. t. 21. f. K.*

*Pet. amb. t. 16. f. 14.*

*gaz. t. 97. f. 8. Concha veneris africana f. Moneta nigritarum.*

*Habitat ad Africam, in M. Mediterraneo.*

*Hæc Moneta Nigritarum. Amœn. acad. 3. p. 239.*

Caurica. 313. C. testa margine gibbo inæquali albido fusco-punctato, dorso nebulato-testaceo.

*Habitat . .*

Annulus. 314. C. testa marginata, dorso annulo flavo circumdato.

*Rumph. mus. t. 39. f. D. Thoracium quadratum.*

*Gvalt. test. t. 14. f. 1, 2.*

*Pet. gaz. t. 11. f. 6, 8.*

*Habitat ad Amboinam frequens.*

erosa. 315. C. testa deroso-marginata flava albo-punctata, lateribus macula subfusca.

*Rumph. mus. t. 39. f. A. Thoracium oculatum.*

*Gvalt. test. t. 15. f. X.*

*List. conch. 4. f. 9. c. 6. t. 2. f. 1.*

*Habitat in Mauritio & insula Adicensionis.*

*Labium exterius transverse profunde sulcatum, macula ferruginea in utroque latere.*



- helvola. 316. C. testa marginata triquetro-gibba albo punctata, postice erosa, subtus flava immaculata.  
*Habitat . . .*
- spurca. 317. C. testa submarginata lutescente luteo irrorata, lateribus fusco punctata.  
*Habitat in M. Mediterraneo.*  
*Testa ovata, laevis, lutescens punctis pallidioribus aut saturatioribus confertim aspersa; margo supra crenulatus colore fusco; labium interius postice reflexo apice, quod huic proprium. Testa internum occurrit livida immaculata diaphana, non dum dentes adpta, sed tamen magnitudine justa, unde apparet has senectam exuere. p. 728.*
- stolidia. 318. C. testa marginata cinerea testaceo quadrato variegata.  
*Argenv. conch. t. 21. f. T.*  
*Habitat . . .*
- ocellata. 319. C. testa submarginata lutea: ocellis nigris.  
*List. conch. 4. f. 9. t. 696. f. 43.*  
*Pet. gaz. t. 9. f. 7.*  
*Habitat . . .*
- flaveola. 320. C. testa eroso-marginata fulva albo punctata.  
*Habitat . . .*
- poraria. 321. C. testa marginata subviolacea albo punctata.  
*Habitat . . .*
- Pediculus. 522. C. testa transversim fulcata.  
*List. conch. 4. f. 9. c. 7. t. 1.*  
*angl. 168. t. 3. f. 17. Concha veneris exigua alba striata.*  
*Rumph. mus. t. 39 f. P. Pediculus.*  
*Gvalt. test. t. 14. f. P. & t. 15. f. P. R.*  
*Argenv. conch. t. 21. f. L.*  
*Pet. amb. t. 16. f. 22.*  
*Barr. rar. t. 1326. f. 28.*  
*Habitat in Jamaica, Europa.*
- Nucleus. 323. C. testa utrinque marginata rugosa: supra punctata tuberculis, subrostrata.  
*Rumph. mus. t. 39. f. I. Nux avellana granulata.*



*Gvalt. test. t. 14. f. S.*

*Argenv. conch. t. 21. f. V.*

*Pet. amb. t. 16. f. 11.*

*List. conch. 4. f. 9. c. 8. t. 2. f. 3.*

*Habitat in O. Indiæ orientalis.*

**Staphy-** 324. C. testa, punctis elevatis sine striis, subrostrata, ex-  
**læa.** tremitatibus luteis.

*Habitat . .*

**Cicercu-** 325. C. testa utrinque rostrata, adspersa punctis elevatis.  
**la.**

*Gvalt. test. t. 14. f. T.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

**Globu-** 326 C. testa utrinque rostrata lævi.  
**lus.**

*Rumph. mus. t. 39. f. L. Globulus:*

*Gvalt. test. t. 14. f. M.*

*Pet. amb. t. 16. f. O.*

*Barrel. rar. t. 1326. f. 31.*

*Habitat in Asia.*

## 286. BULLA. *Animal* Limax.

*Testa univalvis, convoluta, inermis.*

*Apertura tuberculosa, oblonga, longi-  
tudinalis, basi integerrima.*

*Columella obliqua.*

**Ovum.** 327. B. testa ovata obtuse subbirostri, labro dentato.

*Bonan. recr. 2. t. 252.*

*Rumph. mus. t. 38. f. Q. Ovum.*

*List. conch. 4. f. 9. c. 9. t. 1. f. 4.*

*Gvalt. test. t. 15. f. A.*

*Argenv. conch. t. 21. f. A.*

*Pet. gaz. t. 94. f. 7.*

*amb. t. 8. f. 6.*

*Habitat in O. Asiatico.*

*Hæc media inter Cypræas & Bullas; Labro exteriori  
precedentibus convenit, interiore lavi ad sequentes  
accedit.*

**Volva.** 328 B. testa birostri, rostris elongatis striatis acutis.

*List. conch. 4. f. 9. c. 9. t. 1. f. 1.*



*Argenv. conch. t. 21. f. I.*

*Habitat ad Jamaicam.*

Spelta. 329 B. testa oblonga utrinque attenuata æquali, labro arcuato: margine incrassato.

*Gvalt. test. t. 15. f. 4.*

*Habitat in M. Mediterraneo. F. Logie.*

*Testa alba, levis, semine Tritici duplo major, vix birostris, sed magis patula. Apertura longitudinalis, lunata cum denticulo obsoleto ad apicem columellæ. Spira externa omnino nulla.*

verruco-330. B. testa transverse angulata, aucta utrinque puncto  
sa. osseo.

*Rumph. mus. t. 38. f. H.*

*List. conch. 4. f. 9. c. 9. t. 2. f. 3.*

*Gvalt. test. t. 16. f. F.*

*Argenv. conch. t. 2. f. M.*

*1 et gaz. t. 99. f. 2.*

*amb. t. 16. f. 23 Gibba.*

*Habitat in India Orientali*

gibbosa. 331. B. testa angulata: cingulo elevato.

*Columan. purp. 29 t. 30. f. 5.*

*List. conch. 4. f. 9. c. 9. t. 1. f. 2, 3.*

*Bonan. rec. 3. t. 249, 339.*

*Gvalt. test. t. 15. f. 3.*

*Argenv. conch. t. 21. f. Q.*

*Pet. gaz. t. 15. f. 5.*

*Habitat in Brasilia.*

Naucum. 332. B. testa rotundata pellucida transversim substriata utrinque umbilicata.

*Rumph. mus. t. 27. f. H. Bulla.*

*List. conch. 4. f. 9. c. 10. t. 1. f. ult.*

*Gvalt. test. t. 13. f. GG.*

*Argenv. conch. t. 20. f. Q.*

*Habitat in Asia.*

Hydatis. 333. B. testa rotundata pellucida longitudinaliter substriata, vertice umbilicato.

*Gvalt. test. t. 13. f. DD.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Magnitudo sæpius Pisi minoris.*



- Ampul- 334. B. testa rotundata opaca, vertice umbilicato.  
la. *Bonan. recr. 3. f. 3.*  
*List. conch. 4. f. 9. c. 10. t. 1. f. penult.*  
*Rumph. mus. t. 27. f. G.*  
*Gvalt. test. t. 12. f. E, H, I.*  
*Grev. mus. t. 9. f. 7, 8.*  
*Pet. gaz. t. 50. f. 13.*  
*t. 99. f. 14.*  
*Kratzenst. Regensf. 20. t. 5. f. 58. & t. 8. f. 21.*  
*Habitat ad ins. Mauriti, Jamaicam, Barbados.*
- lignaria. 335. B. testa obovata oblongiuscula transverse striata, ver-  
tice subumbilicato.  
*Habitat . . e museo Tessiniano.*  
*Testa statura fere Ampullæ, sed magis versus apicem*  
*angustata, minus umbilicata, colore fere ligni; intus*  
*alba & columella flexuosa, ut oculo aditus pateat ad*  
*verticem usque.*
- Physis. 336. B. testa rotundata pellucida lineis crispata, spira  
retusa.  
*Argenv. conch. t. 20. f. I.*  
*Habitat . .*
- Amplu- 337. B. testa subrotunda, spira elevata obtusa, fasciis in-  
ltre. carnatis.  
*Gvalt. test. t. 13. f. FF.*  
*List. conch. 4. f. 9. c. 10. t. 2. f. exterior.*  
*Habitat in Asia.*
- pallida. 338. B. testa cylindrica, spira elevata acuta.  
*Habitat . .*  
*T. livida, longitudinaliter griseo undulata.*
- canalicu- 339. B. testa cylindrica, spiræ anfractibus canaliculatis.  
lata. *Habitat . .*  
*T. testacea pallido nebulata.*
- Fontina- 340. B. testa ovata pellucida sinistrorsa, spira obsoleta, a-  
lis. pertura ovato-oblonga.  
*Fn. suec. 1302.* *It. wgoth. 49.*  
*Habitat in Lacuum plantis subaquaticis.*
- Hypno- 341. B. testa ovata pellucida sinistrorsa, spira prominente,  
rum. apertura ovato-lanceolata.



*Fn. svec.* 1303.

*Habitat in Europæ Muscis humentibus.*

Cypræa. 0. B. testa ovata, spira oblitterata apice prominulo, apertura postice dilatatiore, columella torta.

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Magnitudo Glandis & ultra.*

*Ille posui ne testa confundat, quæ demum labia approximât, dentesque acquirit* 317.

tornatilis. 342. B. testa ovata substriata, spira elevata acutiuscula, columella uniplicata.

*Habitat . .*

*Testa rubicunda, fasciis albis.*

achatina. 343. B. testa ovata, apertura obovata apiceque fangueis, columella lævi.

*Colonn. anat. t. 13. Buccinum exoticum.*

*List. conch. t. 579.*

*Erasm. recr. 3. t. 192.*

*Gualt. test. t. 45. f. B.*

*Argenr. conch. t. 12. f. E.*

*Klein. ostr. t. 3. f. 60.*

*Habitat in O. Americano. Media inter Helices & Bullas.*

\* *Columella dentata.*

Auris  
Midæ. 344. B. testa ovali-oblonga, spira rugosa, columella bidentata.

*Bonn. kirch. 3. t. 412.*

*List. conch. t. 32. f. 30.*

*Rumohr. mus. t. 33. f. HH.*

*Gualt. test. t. 55. f. G.*

*Argenr. conch. t. 13. f. G.*

*Klein. ostr. t. 7. f. 122.*

*Habitat . .*

*Hæc, antecedens & insequens, quasi mediæ Bullas inter & Helices.*

Auris  
Judæ. 345. B. testa oblonga, spira lævi, columella tridentata.

*M. L. U.*

*Habitat . .*

solidula. 346. B. testa oblongo-ovata opaca striata, spira elevata acutiuscula, columella biplicata.



*Bonan. recr. 3. t. 143.*

*Habitat . .*

*Testa albo griseoque longitudinaliter lineata.*

livida. 347. B. testa ovato-cylindrica, spira subelevata obtusifuscula, columella quinque-plicata.

*Gualt. test. t. 25. f. B.*

*Habitat in Africa.*

*Testa livida fasciis transversis, pallidis, obsoletis.*

coffea. 348. B. testa ovata lævi, spira obtusa, apertura utrinque dentata.

*Habitat . .*

*Testa lurido-livida, facie Coni, sed apertura postice contractata.*

287. VOLUTA. *Animal* Limax.

*Testa unilocularis, spiralis.*

*Apertura effulsa, ecaudata, basi emarginata.*

*Columella plicata: Labio interiore aut umbilico nullo.*

\* *Cylindroideæ s. subcylindricæ.*

porphyria. 349. V. testa cylindroide lævi, spiræ basi oblitterata, labro medio retuso.

*List. conch. t. 727.*

*Rumph. mus. t. 39. f. 1.*

*Gualt. test. t. 24. f. O. P.*

*Argenv. conch. t. 16. f. K.*

*Kratzenst. Regensf. 8. t. 2. f. 15.*

*Habitat . .*

*Affinitas tanta cum sequenti, ut potius varietas, quam distincta species, quamvis pretium eam nobilitaverit.*

Oliva. 350. V. testa cylindroide lævi, spiræ basi reflexa.

*List. conch. 4. f. 10. c. 1. t. 2.*

*Rumph. mus. t. 39. f. 2-5.*

*Gualt. test. t. 23. f. B.*

*Argenv. conch. t. 16. f. R. Litterata.*

*Kratzenst. Regensf. 2. t. 1. f. 2.*

*Habitat in M. Indico.*



*Varietates coloribus infinite ludentibus; Litterata præfertur.*

Ispidula. 351. V. testa cylindroide lævi, spira prominente margine unico.  
*Rumph. mus. t. 39. f. 6, 7.*

*Pet. gaz. t. 59. f. 8.*

*Habitat . .*

\* \* *Ovatæ f. obovatæ.*

Perficu- 352. V. testa ovata lævi, spira retuso-umbilicata, colu-  
la. mella septemplicata, labro marginato crenato.

*Pet. gaz. t. 8. f. 10, 2.*

*Barrel. icon. 1326. n. 33.*

*Gvalt. test. t. 28. f. C. D. E. & varietas B.*

*Klein. ostr. t. 5. f. 92.*

*Habitat in O. Africano.*

*Variat colore: alia Cingulata striis rubris; alia Punctata maculis sanguineis.*

monilis. 353. V. testa obovata alba, spira oblitterata concolore.  
*Habitat in China, unde Armillæ & Monilia.*

miliaria. 354. V. testa obovata alba, spira oblitterata flaveola.

*Habitat in M. Mediterraneo frequens.*

*Simillima præcedenti, sed minor, brevior, glaberrima; spiræ anfractibus lineola flava.*

Faba. 355. V. testa ovata lævi subplicata, spira prominente, columella quadriplicata, labro marginato crenulato.

*Gvalt. test. t. 28. f. Q.*

*Habitat in O. Africano.*

*Testa postice vix emarginata, sed margine tenuiore & arcuato notata.*

glabella. 356. V. testa ovata lævi, spira lævigata, columella quadriplicata, labro antice gibbo marginato denticulato.

*Gvalt. test. t. 28. f. L.*

*Habitat in O. Africano.*

*Testa postice vix ac ne vix quidem emarginata, sed margine undique crasso circumdata.*

mercato- 357. V. testa ovata striata scabriuscula, spira obtusata, co-  
ria. lumella retusa, labroque introrsum gibbo denticulato.

*Pet. gaz. t. 9. f. 4.*

*Gvalt. test. t. 43. f. L.*



*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Similima insequenti, a qua differt, quod crassior, brevior, nitidius colorata albo luteoque, saepe etiam cingulo ferrugineo articulato notata, sed imprimis, quod transversim striata, striis elevatis subtuberculatis.*

rustica. 358 V. testa ovata læviuscula, spira prominula, columella recula labroque introitum gibbo denticulato.

*Gvalt. test. t. 43. f. G. H.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Differt a Præcedente quod non striata; convenit columella planiuscula utrinque denticulata & labro introrsum gibbo; ludit coloribus variis, sed tristiuribus.*

pauper- 359. V. testa ovata læviuscula basi striata, spira prominu-  
cula. la, columella quadriplicata, labro obtusato.

*Gvalt. test. t. 54. f. L.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Testa ferruginea, nigra lineis albis, longitudinalibus, subrepandis.*

mendica- 360. V. testa ovata substriata, spira obsolete granulata,  
ria. columella subdentula, labro introitum gibbo attenuato denticulato.

*Pet. gaz. t. 11. f. 5.*

*Gvalt. test. t. 52. f. E.*

*Habitat in Asia.*

*Testa magnitudine seminis Phaseoli, atra, obsolete scabra. Anfractus ventris fasciis 3 flavis. Spira lineamica ascendente, anfractibus subnodosis; neque columella neque Labrum dentatum est.*

\* \* \* Fusiformes.

Tringa. 361. V. testa oblonga lævi, spira prominente detrita, columella triplicata, labro introrsum gibbosiore scabro.

*Gvalt. test. t. 43. f. B.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Testa nitida, lutea, albo nebulosa. Spiræ mucro in omnibus, quotquot cidi, detritus. Labrum exterius minime marginatum, in medio vero introrsum gibbum, sed minus quam in præcedentibus.*

Cornicu- 362. V. testa oblonga lævi cornea, spira longiuscula, co-  
la. lumella quadriplicata, labro æquali mutico.

*Gvalt.*



*Gvalt. test. t. 43. f. N.*

*Habitat in Mari Mediterraneo.*

*Similis antecedenti, sed spira magis elongata; testa tota colore cornu; Labrum minime dentatum aut incrassatum; variat colore totius atro.*

Caffra. 363. V. testa fusiformi lævi.

*Gvalt. test. t. 53. f. E.*

*Habitat . .*

Sanguifuga. 364. V. testa fusiformi sulcata transverse striata.

fuga.

*Pet. gaz. t. 4. f. 5.*

*Rumph. mus. t. 29. f. V.*

*Gvalt. test. t. 53. f. T.*

*Kratzenst. Regensf. 2. t. 1. f. 5.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Fascia antracina e punctis sanguineis distantibus.*

Vulpecula. 365. V. testa fusiformi subangulata inermi transversim striata.

la.

striata.

*Rumph. mus. t. 29. f. R. Turricula.*

*Gvalt. test. t. 54. f. B. C.*

*Habitat in O. Asiatico.*

plicaria. 366. V. testa fusiformi angulata, angulis anticis subspinosis.

*Bonaz. recr. 3. t. 65.*

*Rumph. mus. t. 29. f. S. Turricula plicata.*

*Gvalt. test. t. 54. f. F.*

*Argenv. conch. t. 12. f. Q.*

*Habitat in O. Asiatico.*

pertusa. 367. V. testa fusiformi striata punctis pertusis, labro denticulato.

o

*Gvalt. test. t. 54. f. H.*

*Habitat . .*

Mitra. V. testa fusiformi lævi, labro denticulato.

episcopalis. 368. *Bonaz. recr. 3. f. 120.*

lis.

*Rumph. mus. t. 29. f. K.*

*Gvalt. test. t. 53. f. G.*

*Argenv. conch. t. 12. f. C.*

*Kratzenst. Regensf. 12. t. 5. f. 33.*

papalis. 369. *List. conch. t. 839. f. 67. Buccinum dentatum.*

*Bonaz. recr. 3. t. 119. Turbo Thiara.*



*Rumph. mus. t. 29. f. I.*  
*Gvalt. test. t. 53. f. I.*  
*Argenv. conch. t. 12. f. E.*  
*Kratzenst. Regensf. t. 1. f. I.*  
*Habitat in O. Asiatico.*

**Musica.** 370. V. testa fusiformi, anfractibus spinis obtusis, columella octoplicata.

*Bonan. recr. 3. t. 296, 297.*  
*Gvalt. test. t. 28. f. X. Z.*  
*Argenv. conch. t. 17. f. F. Papyrus musica.*  
*Habitat in O. Americæ ad Jamaicam, Barbados.*

**Vesperti-**371. V. testa fusiformi, anfractibus spinis acutis, columello.  
 mella quadriplicata.

*Bonan. recr. 3. t. 294.*  
*Rumph. mus. t. 32. f. H. Vespertilio.*  
*Gvalt. test. t. 28. f. G.*  
*Habitat in O. utriusque Indiæ.*

**ebrea.** 372. V. testa fusiformi, anfractibus spinis subacutis, columella plicis quinque validioribus tribusque obsoletis.

*Bonan. recr. 3. t. 293.*  
*Rumph. mus. t. 32. f. I.*  
*Gvalt. test. t. 28. f. I.*  
*Argenv. conch. t. 17. f. D.*  
*Habitat in O. Asiatico.*

\* \* \* \* Ventricosæ.

**æthiopi-**373. V. testa ventricosa, spira coronata spinis fornicatis, ca.  
 apice papillari, columella quadri-plicata.

*Bonan. recr. 3. t. 1. Latina.*  
*Rumph. mus. t. 31. f. A. B.*  
*Gvalt. test. t. 29. f. II. I.*  
*Argenv. conch. t. 20. f. F.*  
*Habitat in M. Persico, & Key Asiæ.*

**Cymbiū.** 374. V. testa ventricosa, spira anfractibus canaliculato-marginatis, apice papillari, columella biplicata.

*Column. purp. 29. t. 30. f. 3. Cochlea altaria magna.*  
*Bonan. recr. 3. t. 6.*  
*Gvalt. test. t. 29. f. B.*  
*Habitat in M. Iberico.*



- Olla. 375. V. testa ventricosa, spira lævigata, apice papillari, columella quadri-plicata.  
*Column. aqu. t. 69. f. 4, 6.*  
*List. conch. t. 794. f. 1.*  
*Bonan. recr. 3. t. 2.*  
*Gvalt. test. t. 29. f. A.*  
*Habitat in Philippinis Asiæ.*

288. BUCCINUM. *Animal* Limax.

*Testa* univalvis, spiralis, gibbosa.  
*Apertura* ovata desinens in Canaliculum (f. retusam Lacunam) dextrum, apice retusum.  
*Labium* interius explanatum.

\* a \* *Ampullacea inflata, rotundata, tenui-subdissipata, fragilia.*

- Oleariū. 376. B. testa subrotunda cinctā sulcis obtusis: lineola elevata interstinctis, apertura edentula.  
*Pet. gaz. t. 99. f. 11.*  
*Rumph. mus. t. 27. f. D?*  
*Gvalt. test. t. 44. t. T.*  
*Habitat in O. Indico.*
- Galea. 377. B. testa obovata inflata cinctā sulcis: antice geminatis, apertura edentula.  
*Bonan. recr. 3. t. 183.*  
*Gvalt. test. t. 42. f. A.*  
*Habitat in M. Mediterraneo.*  
*Testa magnitudine sæpe Capitis humani.*
- Perdix. 378. B. testa ovata inflata subsulcata alboque undulata, apertura edentula.  
*Column. aqu. t. 69. f. 5. Cassida neritoides minor variegata.*  
*Bonan. recr. 3. t. 191.*  
*List. conch. t. 899. f. 19.*  
*Rumph. mus. t. 27. f. C.*  
*Gvalt. test. t. 51. f. F.*  
*Argenv. conch. t. 20. f. A.*  
*Habitat ad Americam.*



Pomum. 379. B. testa ovata cincta sulcis obtusis, apertura dentata.

*Barrel. icon. 1325. f. 12.*

*Rumph. mus. t. 27. f. B.*

*Gvalt. test. t. 51. f. C.*

*Argenv. conch. t. 20. f. L.*

*Habitat . .*

Dolium. 380. B. testa ovata cincta sulcis obtusis remotis, cauda prominula.

*Rumph. mus. t. 27. f. A.*

*Bonan. recr. 3. t. 17.*

*Calceol. mus. 40. t. 41.*

*Gvalt. test. t. 39 f. E.*

*Argenv. conch. t. 20. f. C.*

*Habitat in M. Siculo.*

\* b \* *Cassidea Caudata: cauda exserta brevi reflexa; Labro extrorsum inermiti.*

Echino- 381. B. testa cingulis quatuor tuberculosis, cauda promi-  
phorum. nente.

*Bonan. recr. 3. t. 19, 18.*

*Rumph. mus. t. 27. f. 1.*

*Argenv. conch. t. 20. f. P.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

tubero- 382. B. testa cingulis duobus tuberculosis, cauda re-  
sum, curva.

*Habitat . .*

*An prioris varietas?*

plicatum. 383. B. testa antice subplicata decussatim substriata, aper-  
tura dentata, cauda recurva.

*Bonan. recr. 3 t. 11.*

*Gvalt. test. t. 40, f. C.*

*Argenv. conch. t. 18. f. D?*

*Habitat ad Jamaicam.*

cornu- 384. B. testa turbinata scrobiculis punctata coronata, aper-  
tura, tura dentata, cauda recurva.

*Bonan. recr. 3. t. 155.*

*Rumph. mus. t. 23. f. 1.*

*Gvalt. test. t. 40. f. D.*

*Habitat in America.*



- rufum. 385. B. testa decussatim striata: cingulis nodosis interstiti-  
etis linea gemina, apertura dentata, cauda recurva.  
*Rumph. mus. t. 23. f. B.*  
*Barrel. rar. 1325. f. 29.*  
*Gvalt. test. t. 40. f. F.*  
*Kratzenst. Regensf. t. 12. f. 69.*  
*Habitat in Oceano Americano.*
- Hammeū. 386. B. testa subplicata subcoronata, apertura dentata,  
cauda recurva.  
*Bonan. recr. 3. t. 161.*  
*Rumph. mus. t. 23. f. 2.*  
*Habitat . .*
- Testicu- 387. B. testa obovata decussatim striata lævigata, striis ele-  
lus. vatis longitudinalibus, apertura dentata, cauda recurva.  
*Rumph. mus. t. 23. f. 3.*  
*Gvalt. test. t. 39. f. C.*  
*Habitat ad Jamaicam.*  
*Labium interius obitteratum & fere nullum.*
- decussa- 388. B. testa decussatim striata lævigata squamulis quadra-  
tum. tis, apertura dentata, cauda recurva.  
*Bonan. recr. 3. t. 157.*  
*Gvalt. test. t. 40. f. B.*  
*Habitat . .*  
*Labium interius punctis eminentibus notatum. Labium  
exterius interne crenatum.*
- Areola. 389. B. testa substriata maculis quadratis quadrifariam cin-  
cta, apertura dentata, cauda recurva.  
*Bonan. recr. 3. t. 154.*  
*Rumph. mus. t. 25. f. 1, B. 2.*  
*Gvalt. test. t. 39. f. H. G.*  
*Argenv. conch. t. 18. f. I.*  
*Habitat in M. Mediterraneo.*  
*Alia striata sunt, alia lævia. Labium exterius interio-  
ri margine dentatum est.*
- \* c \* *Cassidea Unguiculata: labro postice extrorsum acu-  
leato; cæterum similia Caudatis v.*
- Erina- 390. B. testa subplicata papillis coronata, labro postice  
ceus. muricato.  
*Rumph. mus. t. 25. f. 7.*



*Gvalt. test. t. 39. f. I. D.*  
*Argenv. conch. t. 17. f. G.*  
*Habitat in O. Americano.*

glaucum. 391. B. testa lævi papillisque coronata, labro postice muricato.

*Rumph. mus. t. 25. f. A.*  
*Gvalt. test. t. 40. f. A.*  
*Habitat in O. Asiatico.*

Vibex. 392. B. testa lævi tota, labro postice muricato.

*Bonan. recr. 3. t. 152.*  
*Rumph. mus. t. 25. f. E, 8, 9.*  
*Gvalt. test. t. 39. f. L. F.*  
*Argenv. conch. t. 17. f. H.*  
*Kratzenst. Regensf. t. 10. f. 40.*  
*Habitat ad Jamaicam.*

papillosum. 393. B. testa undique tuberculata, labro postice muricato.

*Rumph. mus. t. 29. f. M.*  
*Argenv. conch. t. 12. f. I.*  
*Habitat in O. Asiatico.*

Glans. 394. B. testa lævi, labro postice muricato, labioque interiore bidentato.

*Rumph. mus. t. 29. f. P.*  
*Habitat in O. Asiatico.*

\* d \* Callosa: columellæ labio dilatato incrassato.

Arcularia. 395. B. testa plicata papillisque coronata, labio interiore explanato gibbo.

*Rumph. mus. t. 27. f. M.*  
*Gvalt. test. t. 44. f. R. O.*  
*Argenv. conch. t. 17. f. C.*  
*Habitat . .*

Pullus. 396. B. testa oblique striata, labio interiore explanato gibbo.

*Habitat in M. Mediterraneo.*  
*Præcedenti dimidio minor, ferruginea, striis longitudinalibus, sed obliquis & fascia transversa alba.*

gibbosulum. 397. B. testa gibba lævi, labio interiore explanato gibbo.

*Gvalt. test. t. 44. f. L.*  
*Habitat in M. Mediterraneo.*



mutabi- 398. B. testa lævi: adultiore rugosa, spina exserta, labio  
le. interiore subexplanato.

*Gvalt. test. t. 44. f. B.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Tena tenera, levis, pallida, anfractibus margine superiori obtuse albis rugosa. Spira exquisita anfractibus distinctissimis, longior re testæ. Adultior vero longitudinaliter rugosa cadit, cinerea, opaca & labium interius antice extenditur crassiusculum.*

Neriteū. 399 B. testa convexa obtusa lævi, labio interiore explanato gibbo obsoleto.

*Gvalt. test. t. 65. f. C. I.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Testa magnitudine 1<sup>1/2</sup> line, specie Nerite, fere orbiculata, convexa, obtusa, lævis. pallida, sutura superiore secotum anfractus linea purpurascente cerniculari. Subtus planiuscula, alba, gibbosa. Apertura postice emarginata, mæ a Neritis altera.*

\* e \* *Detrita: columelle labium quasi adrasum, planum.*

Harpa. 400. B. testa costis æqualibus longitudinalibus distinctis mucronatis, columella lævigata.

*Bonan. recr. 3 t. 185.*

*List. conch. t. 992.*

*Pet. gr. t. 48. f. 13.*

*Rumph. mus. t. 32. f. K, L, M.*

*Gvalt. test. t. 29. f. C, D, E, G.*

*Argenv. conch. t. 20. f. D.*

*Kratzenst. Regenf. t. 2. f. 14.*

*Habitat ad Benghala.*

costatum. o. B. testa costis æqualibus longitudinalibus confertis mucronatis, columella lævigata.

*Habitat . .*

*Simillima precedenti, forte varietas, sed costæ approximata.*

persicum. 401. B. testa scabra, labro crenulato, columella plana.

*Grew. mus. t. 9. f. 5, 6.*

*Rumph. mus. t. 27. f. E.*

*Gvalt. test. t. 51. f. L.*

*Argenv. conch. t. 20. f. E.*

*Habitat in O. Asiatico.*



patulum. 402. B. testa muricata, labro crenato, columella basi lævigata.

*Gvalt. test. t. 51. f. D; E; A.*

*Argenv. conch. t. 20. f. H.*

*Habitat in America.*

*Assis Nerme acuta, sed locus apertura postice sem exit; Nerme vero non. anfractus ventris angulo duplici nodoso & duplici inferiore convexo.*

Lapillus. 403. B. testa ovata acuta utraque lævi, columella plati-  
uscula.

*Faun. svec. 1321.*

*It. wgoth. 199. n. 4. t. 5. f. 4.*

*List. angl. 158. t. 3. f. 5, 6.*

*Habitat ad Oceanii E. v. litora.*

*Turbini litorali concavi facie, loco, magnitudine, con-  
sistentia.*

Smarag- 404. B. testa ovata acuta glaberrima, columella plati-  
dulus. uscula.

*Argenv. conch. t. 9. f. P. Smaragdus minor.*

*Habitat . .*

\* f \* Lævigata (nec præcedentia).

spiratum. 405. B. testa lævi, anfractibus canali plano distinctis, co-  
lumella abrupta perforata.

*Colonna. prep. 15. t. 16. f. 2.*

*Bonap. rec. 3. t. 370. f. 50.*

*Krausb. mus. v. 49. 1. C. L.*

*Gvalt. test. t. 51. f. P.*

*Argenv. conch. t. 20. f. N.*

*Krausb. Recens. t. 10. f. 41.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

glabra- 406. B. testa glaberrima, anfractibus obsolete in limbo ba-  
tum. si subcanaliculato producto.

*List. conch. t. 482.*

*Gvalt. test. t. 43. f. T.*

*Argenv. conch. t. 12. f. G. prior.*

*Klein. ostr. 37. t. 2. f. 47. Dipfacus:*

*Habitat in O. Americano.*

*Testa quasi butyro s. oleo inuncta flavâ. Columella sub-  
perforata:*



virgineū. 407. B. testa subturrita glaberrima erecta, columella truncata sanguinea.

*List. conch. t. 15. f. 10.*

*Pet. gaz. t. 22. f. 7.*

*Gvalt. test. t. 6. f. A.*

*Argenv. conch. t. 14. f. N.*

*Klein. ostr. t. 7. f. 116.*

*Kratzenst. Regensf. t. 10. f. 40.*

*Habitat in Africae fluxis.*

*Teste, quæ quot videt, basi emarginatæ sunt, ut ad Helices referri nequeant.*

præmor- 408. B. testa ovata lævi atra, spira cariosa, columella  
sum. glaberrima.

*Habitat in Europa australiore.*

*Testa magnitudine pene Fabe, tota atra, rudis; vertex cariosus erosus & quasi præmorsus.*

\* *Angulata (nec antea dicta).*

undosum. 409. B. testa ovata: striis transversis elevatis glabris, ventre obtuse quinquangulati, labro intus striato.

*Rumph. mus. t. 29. f. U.*

*Argenv. conch. t. 12. f. N.*

*Klein. ostr. t. 3. f. 61.*

*Habitat in Asia.*

undatum. 410. B. testa oblonga rudi transversim striata: anfractibus curvato-multangulis.

*Bonan. recr. 3. t. 189, 190.*

*List. angl. 156. t. 3. f. 2.*

*Habitat in O. Europæo.*

*Simillimum Murici antiquo & despecto, æque rude.*

reticula- 411. B. testa ovato-oblonga transversim striata longitudi-  
tum. naliterque rugosa, apertura dentata.

*Gvalt. test. t. 44. f. G, C, E.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Testa omnibus facile coloribus varians, magnitudine Avellanæ. (Animal inhabitans Tritonem esse retulit D. D. Kähler).*

icabrieu- 412. B. testa ovato-oblonga scabra transversim rugo-  
lum. sa, longitudinaliter striata, columella plicata, labro inæquali.



*Gvalt. test. t. 53. f. D.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Media inter Volutas & Buccina; a priori differt columella subperforata, convenit columella plicata; ad hanc imprimis accedit fissura baseos elevata.*

nitidum.

413. B. testa ovato-oblonga nitida fasciata, longitudinaliter striato-rugosa, labio intus subdentato.

*Gvalt. test. t. 52. f. C.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Testa variat admodum colore & fasciis, saepe cingulo nigro circumdata. Columella labio minime replicato.*

laevigatum.

414. B. testa ovato-oblonga nitida fusco-striata laevi, apertura edentula unilabiata.

*Gvalt. test. t. 52. f. B.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Testa precedenti simillima, pallida, obsolete maculata striis obscurioribus; sed differt apertura minime dentata & columella absque labio; Spirae etiam minime plicatae sunt.*

\* g \* *Turrita: laevia subulata.*

maculatum.

415. B. testa turrita, anfractibus laevibus integerrimis.

*Bonan. recr. 3. t. 317.*

*Rumph. mus. t. 30. f. A. B. D.*

*Gvalt. test. t. 56. f. B.*

*Argenv. conch. t. 14. f. A.*

*Habitat in O. Africae, Asiae.*

*Testa flavescens maculis purpurascens.*

crenulatum.

416. B. testa turrita, anfractibus in margine crenatis.

*Gvalt. test. t. 57. f. L.*

*Argenv. conch. t. 14. f. T.*

*Habitat in O. Africano.*

hediacum.

417. B. testa turrita, anfractibus margine superiore compresso-attenuato.

*Gvalt. test. t. 56. f. C.*

*Habitat in O. Africano.*

strigilatum.

418. B. testa turrita oblique striata.

*Rumph. mus. t. 30. f. II.*



VERMES. TESTACEA. Buccinum.

*Gvalt. test. t. 57. f. O.*

*Argenv. conch. t. 14. f. R.*

*Habitat in O. Asiatico.*

419. *P. testa turrita, anfractibus bipartitis striatis.*

*Gvalt. test. t. 57. f. N.*

*Habitat in O. Indico.*

420. *P. testa turrita, anfractibus binis laevibus.*

*Habitat in O. Africano.*

421. *P. testa turrita, anfractibus subangulatis, striis tribus muricatis.*

*Gvalt. test. t. 57. f. P.*

*Habitat ad Africam.*

*Testa turrita, anfractibus saepe basi albis.*

289. STROMBUS. *Animal* Limax.

*Testa univalvis, spiralis, latere ampliata.*

*Apertura, Labro saepius dilatato, definens in canalem finitimum.*

\* *Digitati: labio in laciniis lineares exeunte.*

422. *S. testa labio pentadactylo palmato digitis angulato, canis, fauce laevi.*

*Bonan. recr. 3. t. 85, 87.*

*List. conch. t. 866. f. min.*

*Gvalt. test. t. 43. f. B. C.*

*Argenv. conch. t. 17. f. M.*

*Habitat in O. Europaeo, Novegico, Mediterraneo, Americano.*

423. *S. testa labio pentadactylo, digitis curvis, cauda recurvata.*

*Bellon. aqu. 422.*

*Barrel. rar. 327. f. I.*

*Bonan. recreat. 3. t. 312.*

*Kumph. mus. t. 35. f. A. B. C.*

*Gvalt. test. t. 35. f. B. A. & t. 26. f. B.*

*Habitat ad Bandam Afiae.*



Scorpius. 424. S. testæ labro heptadactylo, digitis nodosis: postico longissimo.

*Rumph. mus. t. 36. f. K.*

*Gvalt. test. t. 36. f. C.*

*Argenv. conch. t. 17. f. B.*

*Habitat in O. Asiatico.*

Lambis. 425. S. testæ labro heptadactylo: digitis rectiusculis, fauce lævi.

*Barrel. rar. 1326. f. 7.*

*Bonan. recr. 3. t. 315.*

*R. mus. t. 35. f. E. F.*

*Gvalt. test. t. 35. f. C.*

*t. 36. f. A.*

*Argenv. conch. t. 17. f. E.*

*Kr. konst. Regens. 16. t. 4. f. 45.*

*Habitat in O. Asiæ.*

Millepe- 426. S. testæ labro decadactylo, digitis inflexis, fauce sub-  
da. striata, dorso gibbero compresso.

*Bonan. recr. 3. t. 311.*

*List. conch. t. 865. f. 23. & 869. f. 24.*

*Rumph. mus. t. 36. f. I.*

*Argenv. conch. t. 18. f. B.*

*Habitat in O. Asiæ.*

\* \* Lobati.

Lentigi- 427. S. testæ labro antice trilebo incrassato, dorso ver-  
nosus. uicolo coronato, cauda obtusa.

*Bonan. recr. 3. t. 300.*

*Barrel. rar. 1326. t. 4. & 1327. f. 5.*

*Rumph. mus. t. 37. f. Q.*

*Gvalt. test. t. 32. f. A.*

*Argenv. conch. t. 18. f. C.*

*Habitat in O. Asiæ.*

Gallus. 428. S. testæ labro dilatato: antice mucronato longissimo,  
dorso coronato, cauda recta.

*Bonan. retr. 3. t. 309, 310.*

*Rumph. mus. t. 37. f. 5.*

*Gvalt. test. t. 32. f. M.*

*Habitat . . .*

Auris 429. S. testæ labro antice mucronato, dorso muricato,  
dianæ. cauda erecta acuta.



*Rumph. mus. t. 37. f. R.*

*Gualt. test. t. 32. f. H.*

*Argenv. conch. t. 17. f. O.*

*Klein. ostr. t. 6. f. 106.*

*Habitat in O. Asiæ.*

Pugilis. 430. S. testæ labro antico prominente rotundato, lævi, spiræ spinosa, cauda triloba.

*List. conch. t. 906. f. 26.*

*Bonap. recr. 3. t. 299.*

*Gualt. test. t. 32. f. B.*

*Argenv. conch. t. 18. f. A.*

*Habitat ad Jamaicam.*

*Faux rubra est, testa crocea.*

marginatus. 431. S. testæ labro prominulo, dorso marginato lævi, cauda integra.

*Habitat . .*

Luhuanus. 432. S. testæ labro prominulo, dorso lævi, anfractibus rotundatis æqualibus.

*Rumph. mus. t. 37. f. S.*

*Argenv. conch. t. 17. f. N.*

*Habitat in O. Asiæ frequens.*

gibberulus. 433. S. testæ labro prominulo, dorso lævi, anfractibus gibbosis inæqualibus.

*Rumph. mus. t. 37. f. V.*

*Habitat in O. Asiæ.*

*Latus inferius testæ planiusculum est.*

\* \* \* Ampliati.

Lucifer. 434. S. testæ labro antice rotundato integro, ventre dupliciter striato, spira carinata: tuberculis superioribus minutis.

*Bonap. recr. 3. t. 303, 304.*

*Barrel. var. t. 1327. f. 7.*

*Argenv. conch. t. 17. f. E.*

*Klein. ostr. t. 4. f. 85.*

*Habitat ad Americam australem.*

*Differt a sequenti testa minus carinata, & imprimis spinis spiræ minimis, nec magnis crassis pollicaribus ut in illa.*

43. S.



- Gigas.** 435. S. testa labro rotundato maximo, coronata ventre  
spiraque spiris conicis patentibus.  
*Bonac. recr. 3. t. 321.*  
*Gualt. test. 33. f. A.*  
*Habitat in America.*  
*Testæ color internus vividissimus.*
- latissi-  
mus.** 436. S. testæ labro rotundato maximo, ventre inermi, spi-  
ra subnodosa.  
*Rumph. mus. t. 36. f. L.*  
*Habitat in O. Asiæ.*
- Epidro-  
mis.** 437. S. testæ labro rotundato brevi, ventre lævi, spira  
subnodosa.  
*Barr. rar. 1727. f. 2.*  
*Rumph. mus. t. 36. f. M.*  
*Gualt. test. t. 32. f. L.*  
*Habitat in O. Asiæ.*
- Canariū.** 438. S. testæ labro rotundato brevi retuso, spiraque lævi.  
*Petiv. gaz. t. 98. f. II.*  
*Rumph. mus. t. 36. f. X. N.*  
*Gualt. test. t. 32. f. N.*  
*Argenv. conch. t. 17. f. Q.*  
*Klein. ostr. t. 4. f. 73.*  
*Habitat in O. Asiæ.*
- vittatus.** 439. S. testæ labro rotundato brevi, ventre lævi, spiræ  
elongatæ annectibus futura distinctis.  
*Rumph. mus. t. 36. f. O.*  
*Argenv. conch. t. 12. f. F.*  
*Habitat in O. Asiæ.*  
*Confer. Rumph. mus. t. 37. f. X. Gualt. test. t. 33.*  
*f. B. Argenv. conch. t. 13. f. C. An sola varietas?*
- urceus.** 440. S. testæ labro attenuato retuso brevi striato, ventre  
spiraque plicato-nodosis, apertura bilabiata inermi.  
*Rumph. mus. t. 37. f. T.*  
*Petiv. gaz. t. 98. f. 19.*  
*Gualt. test. t. 32. f. G.*  
*Habitat in O. Asiæ.*
- dentatus. o.** S. testa labro attenuato brevi dentato, ventre spiraque  
plicatis.  
*Habitat . . .*

A a a 5

\*\*\*\*\*

---

Strombi Juniores teste carent omni labro & turbinatæ existunt, quas ad distincta  
genera perperam retulere Authores.



\* \* \* \* Turríti *spira longissima.*

atci. 441. S. testa turrita lævi, labro antice posticeque soluto.  
*Rumph. mus. t. 30. f. R.*  
*Habitat in Asiæ paludibus.*

livius. 442. S. testa turrita nodoso-spinosa, labro antice soluto.  
*Habitat . . .*

290. MUREX. *Animal* Limax.

*Tija* univalvis, spiralis, exasperata  
 futuris membranaceis.

*Apertura* declinans in canalem integram rectam s. subadscendentem.

\* a \* Spinosi *cauda exserta.*

Hauſel- 443. M. testa ovata tuberculata, cauda elongata subulata  
 ium, recta muricata.

*Bonan. recr. 3. t. 268.*

*Rumph. mus. t. 26. f. F.*

*Gualt. test. t. 30. f. E.*

*Argenz. conch. t. 19. f. B.*

*Klein. ohr. t. 4. f. 51.*

*Habitat in O. Asiæ.*

Tribulus. 444. M. testa ovata spinis setaceis trifariis, cauda elongata  
 subulata recta similiter spinosa.

*Column. aqv. t. 60. f. 6. Purpura clavata.\**

*Olear. mus. t. 39. f. 1.*

*List. conch. t. 902. f. 22.*

*Bonan. recr. 3. t. 269.*

*Rumph. recr. t. 26. j. G. 3. \**

*Gualt. test. t. 31. f. A. B. \**

*Argenz. conch. t. 19. f. A. \**

*Habitat in O. Asiæ.*

*Nobis est curatus \* spinis longissimis integris parallelis  
 pedicatis.*

cornutus. 445. M. testa subrotunda spinis subulatis arcuatis cincta,  
 cauda elongata subulata recta spinis sparsis.

*Column. aqv. t. 60. f. 3. Purpura cornuta.*

*Ferrov. gaz. t. 68. j. 12.*

*Rumph. mus. t. 26. f. 5.*

*Gualt. test. t. 30. f. DD.*

*Habitat . . .*



Brandaris. 446. M. testa subovata spiris rectis cincta, cauda elongata, marginata recta spirisque oblique circumdata.

*Bonn. recr. 3. t. 281 (7) 282 (8).*

*Rumph. mus. t. 20. f. 4 (2).*

*Gualt. test. t. 32. f. F. (13).*

*Kratzenst. Regenf. t. 6. f. 67.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Variat a centro in peripheria cingulo spinarum subulatarum. & a peripheria cingulo spinarum subulatarum. & duplici cingulo spinarum conicarum, nivea.*

Trunculus. 447. M. testa ovata spiris anterioribus majoribus cincta, cauda brevior truncata.

*Column. purp. t. 13. f. 1.*

*Bonn. recr. 3. t. 274, 277, 271.*

*Gualt. test. t. 31. f. C.*

*Argenv. conch. t. 19. f. G?*

*Klein. ostr. t. 6. f. 104.*

*Habitat in M. Mediterraneo, Jamaica.*

\*  $\beta$  \* *Frons si ciliaris crispato-frondescens, cauda abbreviata, vulgo Purpuræ dicti.*

ramosus. 448. M. testa turricariam frondosa, spira contigua cauda truncata.

*Column. aqv. t. 60.*

*Bonn. recr. 3. t. 275, 276.*

*Rumph. mus. t. 26. f. 1. A.*

*Gualt. test. t. 35. f. A. & t. 37. f. G, H, I, D, L.*

*Argenv. conch. t. 19. f. E, H, C.*

*Klein. ostr. t. 4. f. 82.*

*Kratzenst. Regenf. t. 7. f. 6.*

*Habitat in Sinu Peruvico, Jamaica.*

Scorpio. 449. M. testa quadrifariam frondosa, spira capitata, cauda truncata.

*Rumph. mus. t. 26. f. D.*

*Gualt. test. t. 37. f. M.*

*Argenv. conch. t. 19. f. D.*

*Habitat in O. Asiatico.*

saxatilis. 450. M. testa quinquefariam frondosa, spira contigua, cauda abbreviata.

*Rumph.*



- Rumph. mus. t. 26. f. C, 2.*  
*Argenv. conch. t. 19. f. F.*  
*Kratzenst. Regensf. 2 t. 1. f. 6. & t. 9. f. 26.*  
*Habitat in O. Asiatico.*
- Erina- 451. M. testa multifariam subfrondoso-spinosa, spiræ an-  
 ceus. fractibus retuso-coronatis, cauda abbreviata.  
*Gvalt. test. t. 49. f. H.*  
*Habitat in M. Mediterraneo.*
- \* γ \* *Varicoli: suturis rotundatis torosis crassisque.*
- Rana. 452. M. testa suturis subvaricosis oppositis compressis sca-  
 bra, cingulis muricatis, apertura edentula ovata.  
*Bonnor. rec. 3. t. 182.*  
*Petiv. gaz. t. 100. f. 12.*  
*Rumph. mus. t. 24. f. G.*  
*Gvalt. test. t. 49. f. L.*  
*Argenv. conch. t. 12. f. P. R.*  
*Kratzenst. Regensf. 26. t. 6. p. 64.*
- Bubo. β. *Rumph. mus. t. 28. f. C. Heclor.*
- Rubeta. γ. *Rumph. mus. t. 28. f. D. Ajax.*  
*Habitat in O. Asiatico.*
- Gyrinus. 453. M. testa suturis varicosis oppositis continuatis, pun-  
 ctis tuberculosis fasciata, apertura edentula orbiculari.  
*Habitat in M. Mediterraneo.*  
*Testa magnitudine nucis coryli, quiescens apice adscen-*  
*dente, undique punctis eminentibus fasciata; Suturae*  
*laterales continuatae obtusae; colore alba fasciis soli-*  
*tariis in singulo anfractu, sed in infimo binæ, per*  
*duos ordines punctorum dilatatae.*
- Lampas. 454. M. testa suturis varicosis suboppositis, gibbosa tube-  
 ribus longitudinaliter tuberculosis, apertura edentula.  
*Rond. test. 2. p. 81.*  
*Gvalt. test. t. 50. f. D.*  
*Habitat in M. Mediterraneo.*
- Oleariū. 455. M. testa suturis varicosis subalternis, numeroso-tuber-  
 culata, dorso pollice mutico striato, apertura edentula.  
*Rond. test. 2. p. 88.*  
*Column. aqu. t. 53.*

*Rumph.*

Varietates conch. ornat. caeli si numerosissimas, Murices tamen frondosos admisi, quan-  
 tis inter se nimis affines.



*Rumph. mus. t. 49. f. I.*

*Gvalt. test. t. 50. f. A.*

*Habitat in Europa australi, M. Mediterraneo.*

**Femora-** 456. M. testa futuris varicosis decussatis trigona rugosa,  
le. antice nodulosa, apertura edentula: antice transversa.

*Grew. mus. t. 11. f. 7, 8.*

*List. conch. t. 941.*

*Bonan. recr. 3. t. 290.*

*Rumph. mus. t. 26. f. B.*

*Gvalt. test. t. 50. f. C.*

*Argenv. conch. t. 13. f. B.*

*Kratzenst. Regensf. 8. t. 2. f. 21.*

*Habitat in O. Asiatico.*

**Lotoriū.** 457. M. testa futuris varicosis decussatis angulata, nodis  
longitudinaliter tuberculosis, cauda flexuosa, apertu-  
ra dentata.

*Argenv. conch. t. 13. f. M?*

*Habitat . .*

**Pileare.** 458. M. testa futuris varicosis decussatis, subnodoso-rugo-  
sa, apertura dentata, cauda subadscendente.

*Gvalt. test. t. 49. f. G.*

*Habitat in M. Mediterraneo,*

**Rubecu-** 459. M. testa futuris varicosis decussatis. obtusa rugis no-  
la. dis, ventre æquali, apertura dentata.

*Argenv. conch. t. 12. f. K.*

*Gvalt. test. t. 49. f. I?*

*Habitat . .*

**Scrobila-** 460. M. testa futuris varicosis scrobiculatis suboppositis,  
tor. lævigata, apertura dentata.

*Gvalt. test. t. 49. f. B.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

**reticula-** 461. M. testa futuris varicosis suboppositis reticulata ma-  
ris. culis tuberculatis, columella subedentula, cauda ad-  
scendente.

*Bonan. recr. 3. t. 193.*

*Gvalt. test. t. 49. f. M.*

*Habitat . .*

**Pyrum.** 462. M. testa futuris varicosis, ovata, transversim sulcata  
nodosa, cauda longiore flexuosa.

*Rumph.*



*Rumph. mus. t. 26. f. E?*

*Gvalt. test. t. 37. f. F.*

*Argenv. conch. t. 13. f. O.*

*Kratzenst. Regensf. t. 6. f. 60, & t. 5. f. 50.*

*Habitat . .*

Anus. 463. M. testa futuris labiis dilatata membranaceis, gibbosa reticulato-tuberculata, apertura lineola, callosa erecta.

*Bonan. recr. 3. t. 279, 280.*

*Rumph. mus. t. 24. f. F.*

*Petiv. gaz. t. 74. f. 9.*

*Gvalt. test. t. 37. f. B, E.*

*Argenv. conch. t. 12. f. H.*

*Habitat in O. Asiatico.*

\* J \* Ecaudati subechinati.

Ricinus. 464. M. testa ecaudata obovata spinis subulatis, apertura dentata, labro dentato.

*Rumph. mus. t. 24. f. E.*

*Gvalt. test. t. 28. f. N.*

*Habitat in O. Asiatico.*

Capitulum. 465. M. testa ecaudata obovata rugosa nodosa, columella plicata.

*Argenv. conch. t. 18. f. K.*

*Habitat . .*

Turbinellus. 466. M. testa ecaudata turbinata spinis conicis: superioribus majoribus, columella plicata.

*Bonan. kirch. t. 20. f. 367.*

*Rumph. mus. t. 24. f. B.*

*Gvalt. test. t. 26. f. L.*

*Argenv. conch. t. 17. f. P.*

*Kratzenst. Regensf. t. 2. f. 18.*

*Habitat in O. Asiatico ad Nussamun*

Nodus. 467. M. testa ecaudata obovata spinis conicis, apertura dentata, columella laevi colorata.

*Habitat . .*

Hystrix. 468. M. testa ecaudata subovata spinis acutis, apertura edentula repanda.

*Argenv. conch. t. 17. f. A.*

*Habitat . .*



- Manci- 469. M. testa ecaudata ovata spinis obsoletis, apertura eden-  
nella. tula, columella transversim striata.  
*Rumph. mus. t. 24. f. 5.*  
*Habitat . .*
- Cerami- 470. M. testa ecaudata obovata spinis divergentibus, co-  
cus. lumella subplicata.  
*Bonan. recr. 3. t. 286.*  
*Rumph. mus. t. 24. f. 1. & t. 49. f. L.*  
*Gvalt. test. t. 55. f. D.*  
*Argenv. conch. t. 18. f. E.*  
*Habitat in O. Asiæ ad Ceram.*
- Hippoca- 471. M. testa ecaudata subovata striata quadrifariam sub-  
stanum. spinosa, apertura transversim striata.  
*Rumph. mus. t. 24. f. C.*  
*Gvalt. test. t. 31. f. F.*  
*Argenv. conch. t. 17. f. L.*  
*Klein. ostr. t. 7. f. 112.*  
*Kratzenst. Regensf. 12. t. 3. f. 32.*  
*Habitat in O. Asiæ ad Bantam.*
- Melon- 472. M. testa ecaudata obovata glauca anfractu subspinoso,  
gena. spira prominula, apertura lævi.  
*Bonan. recr. 3. t. 295, 186.*  
*Rumph. mus. t. 24. f. 2, 3.*  
*Gvalt. test. t. 26. f. F.*  
*Argenv. conch. t. 18. f. H.*  
*Kratzenst. Regensf. 20. t. 5. f. 49. & t. 10. f. 36.*  
*Habitat in America.*  
*Variat cum & sine spinis.*
- scabricu- 473. M. testa ovata plicata decussatim reticulata: maculis  
lus. prominulis, columella plicata, cauda truncata.  
*Gvalt. test. t. 48. f. B, C, D, E.*  
*Habitat . .*  
*Testa nuce cyli major, cancellata & alpea rotis lon-  
gitudinalibus striisque elevatis acatis transversim, colore subserrugineo, fasciis spiralisque albis. Apertu-  
ra alba. Columella umbilicata, plicata, latera acuta  
crenato. Cauda truncata suturis membranaceis & in-  
tegra a Buccinis differt.*
- fentico- 474. M. testa subturrita longitudinaliter costata transver-  
sus. sim cancellata, apertura striata.



*Bonon. recr. 3. t. 35.*  
*Gvalt. test. t. 51. f. G.*  
*Argenv. conch. t. 12. f. O.*  
*Habitat . .*

\* ε \* Bullacei : *testa diaphana.*

Ficus. 475. M. testa obovato-clavata reticulato-striata subdiaphana, cauda patula exterta, spira oblitterata.

*List. conch. 4. f. 10. c. 8. t. 2. f. 3.*

*Bonon. recr. 3. t. 15.*

*Rumph. mus. t. 27. f. K.*

*Petiv. ambon. t. 6. f. 9.*

*Gvalt. test. t. 26. f. I, M.*

*Argenv. conch. t. 20. f. O.*

*Klein. ostr. t. 5. f. 93.*

*Habitat . .*

Rapa. 476. M. testa rotundato-turbinata substriata diaphana, cauda curvata, spira exquisita.

*Rumph. mus. t. 27. f. F. Rapa.*

*Petiv. amb. t. 9. f. 8.*

*Gvalt. test. t. 26. f. H.*

*Argenv. conch. t. 20. f. K.*

*Klein. ostr. t. 4. f. 8.*

*Habitat in O. Asiatico, varius.*

*Hic cum precedenti facie ad Bullas accedit, canali effuso autem differt; hujus denique cauda in junioribus recta, in senioribus longior & sursum curvata evadit.*

Granum. 477. M. testa hemisphærica glabra diaphana, cauda recta patula, vertice papillari.

*Habitat in M. Mediterraneo. E. Brander.*

*Testa grano secalis minor, alba. Anfractus unicus, antice vix manifeste rugosus. Cauda recta, longitudine ipsius testæ. Apertura obovata. An Pullus majoris cujusdam Testæ?*

\* Caudigeri: *cauda subulata clausa recta elongata, testa inermi.*

Fusus. 478. M. testa turrita recto-caudata lævi, labro dentato.

*Bonon. recr. 3. t. 121.*

*Argenv. conch. t. 13. f. D.*

*Klein. ostr. t. 4. f. 77.*

*Habitat in O. Americano.*

*Testa rarior, distinctissima.*

479. M.



- babylonius. 479. M. testa turrata recto-caudata striata, labro fisso.  
*List. conch. t. 917. f. 11.*  
*Rumph. mus. t. 29. f. L.*  
*Gvalt. test. t. 52. f. NN.*  
*Argenv. conch. t. 12. f. M.*  
*Kratzenst. Regenf. t. 1. f. 9.*  
*Habitat in O. Asiæ.*
- Colus. 480. M. testa turrata subrecto-caudata striata nodoso-carinata, labro crenulato.  
*Bonan. recr. 3. t. 360.*  
*Rumph. mus. t. 29. f. F.*  
*Gvalt. test. t. 52. f. L.*  
*Argenv. conch. t. 12. f. B.*  
*Klun. ostr. t. 4. f. 78.*  
*Kratzenst. Regenf. t. 12. f. 62.*  
*Habitat in utraque India.*
- Morio. 481. M. testa patulo-caudata nigra fascia alba, spiræ anfractibus isonodolis, columena rugosa.  
*Bonan. recr. 3. t. 357.*  
*Kratzenst. Regenf. t. 11. f. 61.*  
*Habitat . .*
- Cochlidium. 482. M. testa patulo-caudata, spiræ anfractibus supra planis.  
*Argenv. conch. t. 12. f. A.*  
*Habitat . .*
- canaliculatus. 483. M. testa patulo-caudata, spiræ anfractibus supra canaliculo distinctis.  
*Gvalt. test. t. 47. f. A.*  
*Ellis corall. 85. t. 33. f. B.*  
*Habitat ad Canadam.*
- aruanus. 484. M. testa patulo-caudata, spira spinoso-coronata.  
*Rumph. mus. t. 28. f. A.*  
*Gvalt. test. t. 47. f. B.*  
*Habitat ad Novam Guineam.*
- perversus. 485. M. testa patulo-repandoque caudata, spira contraria subcoronata.  
*Gvalt. test. t. 30. f. B.*  
*Argenv. conch. t. 18. f. F.*  
*Habitat in O. Americano.*



- antivus. 486. M. testa patulo-caudata oblonga, anfractibus octo  
 teretibus.  
*Gz. . . . . t. 46 f. E.*  
*Habitat in O. Europæo.*  
*Simillimus, cum sequenti, est Buccino undato.*
- despe- 487. M. testa patulo subcaudata oblonga, anfractibus octo :  
 ctus. lineis duabus elevatis.  
*It. Wgoth. t. 5. f. 8.*  
*List. angl. t. 3. f. 1.*  
*Habitat in O. Septentrionali.*  
*Rudis omnino uti præcedens testa est.*
- Tritonis. 488. M. testa ventricosa oblonga lævi, anfractibus rotun-  
 datis, apertura dentata, cauda brevi.  
*Bonan. recr. 3. t. 188.*  
*Rumph. mus. t. 28. f. B.*  
*Gvalt. test. t. 48. f. A.*  
*Habitat in Archipelago, America.*
- Tulipa. 489. M. testa ventricosa oblonga lævi, anfractibus rotun-  
 datis, apertura lævi, cauda patula striata.  
*Bonan. recr. 3. t. 187.*  
*Rumph. mus. t. 49. f. H.*  
*Gvalt. test. t. 46. f. A.*  
*Argenv. conch. t. 13. f. K.*  
*Kratzenst. Regensf. t. 9. f. 35.*  
*Habitat . . .*
- Pufio. 490. M. testa ventricosa oblonga lævi, anfractibus rotun-  
 datis, spira striata, apertura lævi, cauda brevi.  
*Bonan. recr. 3. t. 40.*  
*Gvalt. test. t. 52. f. I.*  
*Habitat in M. Mediterraneo.*  
*Testa magnitudine nucis avellanæ, glauco-cærulescens,*  
*fasciis longitudinalibus griseis undatis.*
- corneus. 491. M. testa oblonga rudi, anfractuum marginibus com-  
 planatis, apice tuberculoso, apertura edentula, cauda  
 adscendente.  
*It. wgoth. t. 5. f. 6. fossilis.*  
*Gvalt. test. t. 46. f. F.*  
*List. angl. 157. t. 3. f. 4.*  
*Habitat in Europa australiore.*  
*Testa digito brevior, colore corneum, lævis, sed non gla-*  
*bra, opaca.*



- lignarius. 492. M. testa oblonga rudi, anfractibus obtuse nodosis, apertura edentula, cauda brevi rectiuscula.  
*Bonon. recr. 3. t. 22.*  
*Gvalt. test. t. 52. f. S?*  
*Habitat in Europa australi.*  
*Testa vix digiti magnitudine; anfractus laeves rudes, simplici serie raserium obtusis.*
- Trapezium. 493. M. testa oblonga obtuse angulata, anfractibus subnodosis, apertura dentata, cauda brevior recta.  
*Bonon. recr. 2. t. 287.*  
*Rumph. mus. t. 29. f. E. & t. 49. f. K.*  
*Gvalt. test. t. 46. f. B.*  
*Argenv. conch. t. 13. f. F, H.*  
*Habitat ad Amboinam.*
- tyracufanus. 494. M. testa oblonga, anfractibus illius plicatis tuberculoso-carinatis, apertura edentula, cauda brevi.  
*Bonon. recr. 3. t. 80.*  
*Gvalt. test. t. 52. f. H.*  
*Argenv. conch. t. 13. f. L. sed major?*  
*Habitat in M. Mediterraneo.*
- craticulatus. 495. M. testa turrita, anfractibus rotundatis plicatis transversim reticulatis, apertura dentata, cauda brevi.  
*Habitat . . .*
- scriptus. 496. M. testa subcaudata fusiformi laevi pallida: striis fuscis longitudinalibus variis, labio dentato.  
*Habitat in M. Mediterraneo.*  
*Testa S. Flordei paulo maior, undique laevis, oblonga, vix caudata, pallide albidula commaculata, striis oblongis flexuosis subpiceis.*
- \* η \* *Turriti subulati, cauda brevissima.*
- Aluco. 497. M. testa turrita, anfractibus tuberculatis, stria media spinosa, columella unguiculata, cauda adiacente.  
*Bonon. recr. 3. t. 69. 83.*  
*Rumph. mus. t. 30. f. O.*  
*Gvalt. test. t. 57. f. G. A.*  
*Argenv. conch. t. 14. f. H.*  
*Habitat in M. Mediterraneo.*  
*Testa cinerea labro rotundato.*
- fuscatus. 498. M. testa turrita, anfractibus crenulatis: stria superiore denticulata.  
*Gvalt. test. t. 56. f. H.*



*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Testa fusca, basi obtusa.*

Radula. 499. M. testa turrita, anfractibus tuberculatis: striis duplici serie punctatis.

*Gvalt. test. t. 58. f. F.*

*Habitat in O. Africano.*

*Testa subincarnata, basi obtusa; Anfractuum puncta sepe apice alba.*

asper. 500. M. testa turrita, anfractibus fulcatis transversim striatis muricatis.

*Habitat . .*

granulatus. 501. M. testa turrita tuberculis decussatim adspersa, cauda acuta adscendente.

*Bonan. recr. 3. t. 81.*

*Rumph. mus. t. 30. f. L.*

*Argenv. conch. t. 14. f. K.*

*Klein. ostr. t. 7. f. 119.*

*Habitat in O. Asiatico.*

*Testam tantum vidi, quam inhabitavit & reformavit hospes Bernhardus Eremita.*

291. TROCHUS. *Animal* Limax.

*Testa univalvis, spiralis, subconica.*

*Apertura subtetragono - angulata f rotundata, superius transversa, coarctata; Columella obliquata.*

\* *Umbilicati erecti, perforata columella.*

maculatus. 502. T. testa contorto-umbilicata conica tuberculata: carina dentata.

*Aldr. exsang. 3. p. 363.*

*Olear. mus. t. 9. f. 5.*

*List. conch. 4. f. 6. c. 1. t. 2. f. 1.*

*Bonan. recr. 3. t. 102.*

*Rumph. mus. t. 21. f. A, B, 4, 3.*

*Gvalt. test. t. 59. f. B. & t. 61. f. E.*

*Argenv. conch. t. 11. f. C.*

*Habitat in O. Americano, Asiatico.*

*Testa, detracta extrema tunica, tota argentea.*



perspecti- 503. T. testa crenato-umbilicata convexa obtusa marginata.  
vus.

*Grew. mus. t. 11. f. 3, 4.*

*List. conch. 4. f. 8. c. 3. t. 1, 2.*

*Bonin. recr. 3. t. 27, 28.*

*Rumph. mus. t. 27. f. L.*

*Pet. ambon. t. 2. f. 14.*

*Gvalt. test. t. 63. f. O.*

*Argenv. conch. t. 11. f. M.*

*Kratzenst. Regensf. 26. t. 6. f. 61.*

*Habitat ad O. Asiæ littora.*

*Umbilicus stupendum naturæ artificium.*

hybridus. 504. T. testa crenato-umbilicata convexa, aperturæ co-  
lumella bidentata. *M. L. U.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

crucia- 505. T. testa umbilicata convexa: striis calloso punctatis,  
tus. aperturæ columella unidentata.

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Testa Avellana minor, ferruginea, fasciis longitudinalibus quatuor albidis.*

pharao- 506. T. testa crenato-umbilicata subovata striata: punctis  
nius. concatenatis globosis, apertura dentata.

*Bonan. recr. 141. p. 3. t. 222.*

*List. conch. 4. f. 8. c. 4. t. 1.*

*Pet. gaz. t. 14. f. 10.*

*Gvalt. test. t. 63. f. B.*

*Argenv. conch. t. 11. f. L. Q.*

*Habitat in M. Mediterraneo, Brasiliæ.*

*Puncta nivea & atra, alterna serie in ordinibus transversis.*

Magus. 507. T. testa oblique umbilicata convexa: supra obtuse no-  
dulosa.

*Gvalt. test. t. 64. f. C. ●*

*Argenv. conch. t. 11. f. S.*

*Kratzenst. Regensf. 12. t. 3. f. 27.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

Modu- 508. T. testa umbilicata striata: supra plicata, subtus con-  
lus. vexiore, apertura obovata unidentata.

*Habitat . . . e Museo Tessiniano.*

*Testa magnitudine T. pharaoxii, albida, purpurascenti-maculata, sublenticulari, supra obtuse plicata, subtus magis convexa, unilipse striata, juxta umbilicum in apertura Deas e columella plicata.*



- murica- 509. T. testa subumbilicata ovata: tuberculis muricatis.  
 tus. *M. L. U.*  
*Gvalt. test. t. 64. f. H.*  
*Habitat in M. Mediterraneo.*
- scaber. 510. T. testa umbilicata subovata: sulcis alternis majori-  
 bus moniliformibus.  
*Argene. conch. t. 11. f. T.*  
*Habitat ...*
- varius. 511. T. testa oblique umbilicata convexa, anfractibus sub-  
 marginatis.  
*Habitat in M. Mediterraneo.*  
*Testa convexa, cincta margine obsolete, pallida fasciis*  
*cinerascentibus.*
- cinera- 512. T. testa oblique umbilicata ovata, anfractibus rotun-  
 rius. datis.  
*Habitat in M. Mediterraneo.*  
*Testa cinerea fasciis obliquis pallidis.*
- divarica- 513. T. testa subumbilicata ovata: anfractu infimo remo-  
 tus. tiore, umbilico subconsolidato.  
*Habitat in M. Mediterraneo.*  
*Testa viridis, fasciis punctis sanguineis. Anfractus*  
*versus aperturam magis remotus a reliqua spira.*
- umbilica- 514. T. testa cylindrico-umbilicata conico-convexa: an-  
 ris. fractu submarginato.  
*Habitat in M. Mediterraneo.*  
*Testa saepius ferruginea nebulosa; umbilicus pervius te-*  
*res exacte cylindricus (præter anfractus minores inte-*  
*riores) & intus albus.*
- \* \* Imperforati erecti, umbilico clauso.
- vestia- 515. T. testa imperforata conico-convexa, basi gibboso-  
 rius. callosa, apertura subcordata.  
*Pet. gaz. t. 11. f. 6.*  
*Gvalt. test. t. 65. f. E, F, G.*  
*Habitat in M. Mediterraneo, Asiatico, Chinensi.*  
*Statura T. pharaonii, supra glauca, lineis transversis*  
*undatis pallidis, colore ludantibus. Subtus notata cal-*  
*lo convexo lato albido.*



- Labio. 516. T. testa imperforata ovata striato-tuberculata, apertura dentata.  
*List. conch. 4. f. 8. c. 4. t. 3.*  
*Rumph. mus. t. 21. f. E. Labio.*  
*Gvalt. test. t. 63. f. D, E, G.*  
*Argenv. conch. t. 9. f. N.*  
*Kratzenst. Regenf. t. 10. f. 39.*  
*Habitat in O. Africano & Asiatico.*
- Tuber. 517. T. testa imperforata depressiuscula, anfractibus subcarinatis margine superiore inferioreque nodulosis.  
*Argenv. conch. t. 11. f. R.*  
*Kratzenst. Regenf. t. 3. f. 27.*  
*Habitat in M. Mediterraneo.*  
*Apertura subrotunda est & carina anfractuum lateralis.*
- striatus. 518. T. testa imperforata conica: anfractu infimo subangulato, apertura obovata.  
*Gvalt. test. t. 61. f. N.*  
*Habitat in M. Mediterraneo. Minutus.*  
*Testa alba lineis longitudinalibus obliquis nigris; similis sequentibus duobus, sed infimus anfractus angulo cinctus est.*
- Conulus 519. T. testa imperforata conica lævi, anfractibus linea elevata interstinctis.  
*Bonan. recr. 3. t. 91.*  
*List. angl. 166. t. 3. f. 15.*  
*Gvalt. test. t. 61. f. G-M.*  
*Habitat in M. Mediterraneo & O. Europæo.*  
*Testa sequent: simillima, ut fere varietas minima, etiam apice tuberculata, sed linea inter anfractus prominula; color pulcherrime variegatus.*
- Zizyphus. 520. T. testa imperforata conica livida lævi, anfractibus subcarinatis.  
*Bonan. recr. 3. t. 93.*  
*Rumph. mus. t. 21. f. 1.*  
*List. angl. 166. t. 3. f. 14.*  
*Gvalt. test. t. 61. f. B, C.*  
*Argenv. conch. t. 11. f. N?*  
*Klein. ostr. t. 2. f. 36.*  
*Habitat in M. Mediterraneo & Europæo.*  
*Testa, exuta tunica extima, plumbea evadit.*



\* \* \* Turriti umbilico exserto, qui positi cadunt in latus.

Telesco- 521. T. testa imperforata turrita striata, labro columellari  
pium, spirali integro.

*Bonan. recr. 3. t. 92.*

*List. conch. 4. f. 8. c. 1. t. 5. f. 1.*

*Rumph. mus. t. 21. f. 12.*

*Gvalt. test. t. 60. f. D, E.*

*Argenv. conch. t. 14. f. B.*

*Habitat . .*

dolabra- 522. T. testa umbilicata turrita glabra, columella exserta  
tus, recurvato-contorta sulcata.

*Argenv. conch. t. 14. f. L.*

*Habitat . .*

perver- 523 T. testa imperforata turrita glabra, anfractibus serie  
sus, duplici excavato-punctatis.

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Testa parva, anfractibus cylindricis duplici serie excava-  
to punctatis, præter margines anfractuum etiam cre-  
natio punctata. Apertura quadrata, columella basi pro-  
minula, at non in canalem evidentem. Color fere cor-  
neus.*

puncta- 524. T. testa imperforata turrita, anfractibus serie triplici  
tus, punctorum prominentium.

*Habitat in Europa australi.*

*Testa magnitudine præcedentis s. Hordei, ferruginea  
undique punctis obtusis eminentibus oblecta, in singulo  
anfractu serie triplici, quarum intermedia minor est.  
Apertura quadrata cum columella prominula, vix ma-  
nifeste canaliculata.*

striatel- 525. T. testa turrita imperforata: striis longitudinalibus pa-  
lus, rallelis obliquatis.

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Testa admodum parva, subulata, alba, apice violacea.*



292. TURBO. *Animal* Limax.*Testa* univalvis, spiralis, solida.*Apertura* coarctata, orbiculata, integra.\* Neritoidei *apertura* margine columnari plano imperforato.

obtusa-

526. T. testa subrotunda lævi: superne ventricosiore obtusissima, margine columnari plano.

*Habitat* in O. Septentrionali.

Neritoides.

527. T. testa ovata glabra obtusiuscula, margine columnari plano.

*Gvalt. test. t. 45. f. F.**Habitat* in M. Mediterraneo.*Testa Neritis maxime affinis. Minutus.*

littoreus.

528. T. testa subovata acuta striata, margine columnari plano.

*It. wgoth. 169, 199. t. 5. f. 3.**List. angl. 162. t. 3. f. 9.**Gvalt. test. t. 45. f. G.**Habitat* in O. Europæo, frequens ad littora Norvegiæ.

murica-

529 T. testa umbilicata subovata acuta cincta striis punctis eminentibus, margine columnari obtusiusculo.

*Gvalt. test. t. 45. f. E.**Habitat* in Europa australi.

\* \* Solidi imperforati.

Cimex.

530. T. testa oblongo-ovata striis decussatis: punctis eminentibus.

*Gvalt. test. t. 44. f. X.**Habitat* in M. Mediterraneo; minutus.

Pullus.

531. T. testa imperforata ovata lævi, apertura antice ducta.

*Habitat* in M. Mediterraneo.*Testa* magnitudine seminis Carthami nitida picta varie fasciis maculisque purpuriscentibus fuscis auridisve. *Apertura* antice angulum format, uti T. petiolatus, cui valde affinis.



- perforatus. 532. T. testa imperforata convexa lævi, apertura diducta.  
*Rumph. mus. t. 19. f. I.*  
*Habitat . . .*
- Petholatus. 533. T. testa imperforata ovata lævi, anfractibus sursum  
 subangulatis.  
*Bellon. aqv. 340. Cochlus f. Umbilicus.*  
*Rumph. mus. t. 19. f. D, 5, 6, 7. Cochlea petholata.*  
*Argenv. conch. t. 9. f. K.*  
*Klein. astr. t. 2. f. 51.*  
*Montenap. Rerum. t. 8. f. 18. & t. 9. f. 25.*  
*Habitat ad Barbados.*
- Cochlus. 534. T. testa imperforata ovata striata: stria unica dorsali  
 crassiore.  
*Rumph. mus. t. 19. f. 4.*  
*Argenv. conch. t. 9. f. I.*  
*Klein. astr. t. 1. f. 12.*  
*Habitat in O. Asiatico.*  
*Summus h. argyropomus, sed nulla stria transverse. Um-*  
*bilicus h. enervis o. curvum n. striatum proprie hujus o-*  
*perculum subrotundum, gibbum, lateribus striatum.*
- Chryso- 535. T. testa imperforata subovata rugosa: anfractibus duo-  
 stomus. bus spinulis fornicatis cinerea.  
*Rumph. mus. t. 19. f. E.*  
*Gvalt. test. t. 62. f. II.*  
*Argenv. conch. t. 9. f. D.*  
*Klein. astr. t. 7. f. 126.*  
*Habitat in O. Asiatico.*
- Testum 536. T. testa imperforata ovata: spinis obtusis depressis,  
 persicum. subtus papillosa.  
*Argenv. conch. t. 11. f. P.*  
*Habitat . . .*
- Pagodus. 537. T. testa imperforata conica: spinis obtusis concate-  
 natis, subtus papilloso-striata.  
*Rumph. mus. t. 21. f. D.*  
*Gvalt. test. t. 62. f. B. C.*  
*Argenv. conch. t. 11. f. A. Pagodus.*  
*Habitat in O. Asiatico.*
- Calcar. 538. T. testa imperforata depressa: anfractibus scabris su-  
 pra spinis fornicato-compressis.  
*Lep. conch. 4. f. 6. t. 1. f. 3, 4.*



*Rumph. mus. t. 20. f. I.*  
*Gvalt. test. t. 65. f. N. P?*  
*Argenv. conch. t. 9. f. R.*  
*Klein. ostr. t. 1. f. 27.*  
*Habitat ad Amboinam.*

marmo- 539. T. testa imperforata subovata lævi: supra marginato-  
 ratus. nodulosa.

*Rumph. mus. t. 19. fig. A. B.*  
*Gvalt. test. t. 64. f. A.*  
*Klein. ostr. t. 7. f. 124.*  
*Kratzenst. Regens. 20 t. 5. f. 52.*  
*Habitat in O. Alia ad Zeylonam.*

farmati- 540. T. testa imperforata convexa obtusa: anfractibus su-  
 cus. pra nodosis canali interstinctis.

*Argenv. conch. t. 11. f. B.*  
*Habitat . .*

Olearius. 541. T. testa imperforata convexa obtusa angulato-lævi.

*Bonan. recr. 3. t. 9.*  
*Gvalt. test. t. 68. f. A.*  
*Argenv. conch. t. 20. f. B.*  
*Klein. ostr. t. 7. f. 125.*  
*Habitat . .*  
*Testas tantum reformatas vidimus.*

\* \* \* *Solidi umbilico perforato.*

Pica. 542. T. testa umbilicata conico-rotundata lævi, denticu-  
 lo umbilicali.

*Bonan. recr. 3. t. 29. 30.*  
*Gvalt. test. t. 68. f. B.*  
*Argenv. conch. t. 11. f. G.*  
*Pet. gaz. t. 70. f. 9.*  
*Kratzenst. Regens. t. 4. f. 42. & t. 6. f. 66. & t. 11. f. 57.*  
*Habitat in M Sardinico.*  
*Umbilicus canali duplici obtuso.*

sangui- 543. T. testa subumbilicata conico-convexa lævi: anfra-  
 neus. ctibus subfulcatis.

*Habitat in M. Mediterraneo ad littora Algiriae. E.*  
*Brandier.*

*Testa magnitudine Pisi, sanguinea, convexa, anfractibus obtuse sulcata; umbilicus aliis perforatus, aliis nequaquam.*

544. T.



Argyro- 544. T. testa umbilicata subovata exarata lineis dorsali-  
stomus. bus elatioribus transverse striatis.

*List. conch. t. 584. f. 40.*

*Rumph. mus. t. 19. f. 3, 4.*

*Gualt. test. t. 64. f. D.*

*Argenv. conch. t. 9. f. F.*

*Kratzenst. Regensf. t. 10. f. 43. & t. 1. f. 12.*

*Habitat in M. Indico.*

margari- 545. T. testa umbilicata subovata exarata lineis dorsali-  
taceus. bus elatioribus lævibus.

*Bonan. recr. 3. t. 11.*

*Rumph. mus. t. 19. f. 2.*

*Argenv. conch. t. 9. f. A.*

*Habitat . . .*

*Testa similis T. Argyrostomo, sed albido-virens maculis fuscis, nec purpurascens.*

Delphi- 546. T. testa umbilicata depresso hispida: spinis ramosis.  
nus.

*Grew. mus. t. 11. f. 5, 6.*

*Bonan. recr. 3. t. 31.*

*Rumph. mus. t. 20. f. H.*

*Pet. amb. t. 3. f. 1.*

*Gualt. test. t. 68. f. C.*

*Argenv. conch. t. 9. f. H.*

*Kratzenst. Regensf. t. 3. f. 14.*

*Habitat in O. Asiatico.*

distortus. 547. T. testa umbilicata submucronata undique spinis lævibus.

*List. conch. 4. f. 6. c. 6. t. 1. f. 1, 2.*

*Gualt. test. t. 68. f. D.*

*Habitat . . .*

*Varietas procul dubio antecedentis.*

\* \* \* \* Cancellati.

Scalaris. 548. T. testa cancellata conica: anfractibus distantibus.

*Rumph. mus. t. 49. f. A.*

*Pet. amb. t. 2. f. 9.*

*Gualt. test. t. 10. f. ZZ.*

*Argenv. conch. t. 14. f. V.*

*Habitat . . .*

*Varietas procul dubio sequentis, sed magnitudine, anfractibus omnino distantibus, solisque cingulis connexis differt; pretiosissimus artis perdita luxus.*



Clathrus. 549. T. testa cancellata turrata, anfractibus contiguus lævibus.

*Fa. suec.* 1325.

*List. conch.* t. 588. f. 51.

*Bonn. recr.* 3. t. 111.

*Rampb. mus.* t. 29. f. W.

*Gvalt. test.* t. 58. f. H.

*Klein. ostr.* t. 3. f. 66.

*Planac. conch.* t. 5. f. 7, 8.

*Habitat in O. Europæo, Americano.*

*Purpura violacea veterum, nec punicea, ab hac desumpta. Planacus.*

crenatus. 550. T. testa subcancellata turrata: anfractibus contiguus supra crenatis. *M. L. U.*

*Habitat . . .*

lacteus. 551. T. testa cancellata turrata: striis longitudinalibus elevatis confertis.

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Testa similis T. Clathro, sed minor Gr. Hordei, striis elevatis, nec tamen membranaceis, & valde confertis; nicea.*

striatulus. 552. T. testa subcancellata turrata: anfractibus contiguus cingulisque varicosis interceptis.

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Testa magnitudine seminis Hordei alba, anfractibus cinctis striis membranaceis parvis, perimque rugis convexis collatis. Apertura minus orbiculata, fere obovata & subtus subangulata.*

Uva. 553. T. testa cancellata ovata obtusa: anfractibus contiguus: striis longitudinalibus imbricatis.

*Pet. gaz.* t. 27. f. 2. Olivaris striata fasciata.

*Gvalt. test.* t. 58. f. D.

*Habitat . . .*

corneus. 554. T. testa umbilicata: anfractibus teretiuseulis decussato-striatis, apertura reflexa. *M. L. U.*

*Habitat . . .*

reflexus. 555. T. testa umbilicata convexo-prominula, anfractibus teretibus substriatis, apertura reflexa.

*Habitat in Europa australi.*

Lincina. 556. T. testa oblonga obtusa rugoso-striata, apertura umbilico dilatato plano crenato.



*List. conch. t. 26. f. 24.*

*Sloan. jam. 2. t. 240. f. 12, 13.*

*Klein. ostr. t. 3. f. 71.*

*Brown. jam. t. 40. f. 5.*

*Habitat in Jamaica. Terrestris.*

\* \* \* \* \* *Turriti proprie dicti.*

imbrica- 557. T. testa turrita: anfractibus deorsum imbricatis.  
tus.

*Bonan. recr. 3. t. 118.*

*Gualt. test. t. 58. f. E.*

*Habitat in Jamaica.*

replica- 558. T. testa turrita lævi: anfractibus sursum imbricatis.  
tus.

*Argenv. conch. t. 14. f. E.*

*Habitat . .*

acutangu- 559. T. testa turrita: anfractibus carina unica majore  
lus. acuta.

*Bonan. recr. 3. t. 117.*

*Gualt. test. t. 58. f. B.*

*Habitat . .*

duplica- 560. T. testa turrita: anfractibus carinis duabus acutis.  
tus.

*Bonan. recr. 3. t. 114.*

*List. arg. 100. t. 3. f. 7.*

*Gualt. test. t. 58. f. C.*

*Argenv. conch. t. 14. f. C.*

*Habitat in O. Europæo.*

exoletus. 561. T. testa turrita: anfractibus carinis duabus obtusis  
distantibus.

*Bonan. recr. 3. t. 113.*

*Habitat in Europa australi.*

Terebra 562. T. testa turrita: anfractibus carinis sex acutis.

*Fn. suec. 1322.*

*Column. aqu. t. 53. f. 2.*

*Bonan. recr. 3. t. 115.*

*Rumph. mus. t. 30. f. M.*

*Gualt. test. t. 58. f. A.*

*Argenv. conch. t. 14. f. D.*

*Habitat in O. Europæo.*

563. T.



- variegatus. 563. T. testa turrita: anfractibus planiusculis: striis septem obsoletis.  
*Conan. recr. 3. t. 112.*  
*Habitat . .*
- ungulinus. 564. T. testa turrita: anfractibus striis decem exoletis.  
*Habitat in O. Europæo.*
- annulatus. 565. T. testa turrita: anfractuum futura marginata prominente |  
*Gvalt. test. t. 58. f. L.*  
*Habitat . .*
- bidens. 566. T. testa turrita pellucida: anfractibus contrariis futura subcrenata, apertura postice bidendata.  
*Gvalt. test. t. 4. f. C.*  
*Habitat in Europa australi; terrestris.*
- perverfus. 567. T. testa turrita pellucida: anfractibus contrariis, apertura edentula.  
*Fn. swec. 1300.*  
*List. angl. 124. t. 2. f. 11.*  
*Habitat in Europæ muscosis; terrestris.*
- muscorum. 568. T. testa turrita obtusa pellucida: anfractibus secundis, apertura edentula.  
*Fn. swec. 1301. It. æl. 99.*  
*List. angl. 121. t. 2. f. 6.*  
*Habitat in Europæ muscosis; terrestris.*
- auriscalpium. 569. T. testa turrita alba levissima, apertura porrecta planiuscula concava obtusa.  
*Argenv. conch. t. 32. f. 19?*  
*Habitat in M. Mediterraneo. F. Logie.*  
*Testa subulata, lactea, glaberrima, 7 f. S. f. in m.*  
*Apertura dilatata auriscalpium referens; in eo porrecto, obtuso, concavo, marginato.*
- politus. 570. T. testa turrita imperforata glaberrima, apertura ovata.  
*Habitat in M. Mediterraneo.*  
*Testa Gr. Hordei magnitudine, albissima, opaca nec pellucida, nitidissima, anfractibus linea exarata tenui interstinctis.*



293. HELIX. *Animal* Limax.

*Teste* univalvis, spiralis, subdiaphana,  
fragilis.

*Apertura* coarctata, intus lunata s. sub-  
rotunda: tegmento circuli dento.

\* Ancipites, *testa longitudinaliter utriusque angulata.*

Scara-  
bæus.

571. H. testa ovata subancipiti, apertura dentata.

*List. conch.* 4. p. 5. c. 5. t. 1. f. 1, 2.

*Bonon. recr.* 3. t. 385.

*Rumph. mus.* 91. t. 27. f. 1. Cochlea imbrium.

*Pet. gaz.* t. 4. f. 10.

*Gualt. test.* t. 4. f. S.

*Argenv. conch.* t. 12. f. T.

*Klein. ostr.* t. 1. f. 23.

*Habitat in Asiæ montibus.*

\* \* Carinatae anfractibus margine acuto.

Lapicida. 572. H. testa carinata umbilicata utrinque convexa, aper-  
tura marginata transversali ovata.

*Fn. swec.* 1298.

*It. wgoth.* 27.

*List. angl.* 126. t. 2. f. 14.

*Habitat in Europæ rupibus terrestrius; ut Larvæ li-  
gnum, sic calcem rodens.*

Oculus  
capri.

573. H. testa subcarinata umbilicata convexa, apertura mar-  
ginata.

*Rumph. mus.* t. 27. f. O.

*Pet. gaz.* t. 76. f. 6.

*Klein. ostr.* t. 1. f. 11.

*Habitat in Asiæ arboribus.*

Albella. 574. H. testa carinata umbilicata planiuscula: subtus gibba,  
apertura semicordata.

*Fn. swec.* 1299.

*It. æl.* 65.

*Gualt. test.* t. 3. f. Q.

*Habitat in Europæ rupibus.*

Striatula. 575. H. testa subcarinata umbilicata convexa striata, sub-  
tus gibbosiore, apertura subrotundo-lunata.

*Habitat Algeriæ. E. Brander.*

*Testa grisea anfractibus transverse striatis. Umbilicus  
patulus.* 576. H.



- algira. 576. H. testa subangulata umbilicata convexa; anfratibus  
senis, umbilico pervio.  
*Habitat in Mauritania. E. Brander.*  
*Differt a priori anfratibus 6, nec 4; umbilico paten-*  
*tissimo, nec tenui; anfractuum angulo obtuso, nec*  
*patulo.*
- Leucas. 577. H. testa subcarinata umbilicata convexa laevi: sulcus  
gibbosa, umbilico minutissimo, apertura labiata co-  
lunata.  
*Habitat in Africa. E. Brander.*  
*Testa albidula: supra fascia; subtus lineis purpurascen-*  
*tibus.*
- Planor- 578. H. testa subcarinata umbilicata plana: supra concava,  
bis. apertura oblique ovata utrinque acuta.  
*Fn. svec. 1306.*  
*Litt. angl. 145. t. 2. f. 27. - - conch. 2. t. 1. f. 42.*  
*Pet. gaz. t. 10. f. 11.*  
*Gualt. test. t. 4. f. EE.*  
*Klein. ostr. t. 1. f. 8.*  
*Habitat in Europæ stagnis.*
- compla- 579. H. testa deorsum a carina umbilicata convexa: sulcus  
nata. plana, apertura semicordata.  
*Fn. svec. 1308.*  
*Habitat in Europæ aquis dulcibus.*
- ringens. 580. H. testa subcarinata imperforata convexa, apertura ob-  
longa: labio postice quadruplicato.  
*Bonap. recr. 3. t. 330.*  
*Argenv. conch. t. 32. f. 13.*  
*Habitat . . . e Museo Testarum.*  
*Testa magnitudine H. laevissima, sed magis convexa, in-*  
*vida, anfracta in medio carinata alba. Apertura H.*  
*Carocolle, extorjare dilatata-marginata, elongata*  
*Labio postico intus plicis 4, sulcis 3.*
- Carocol- 581. H. testa carinata imperforata convexa.  
la. *Argenv. conch. t. 11. f. D.*  
*Habitat . . . terrestris.*  
*Similimus H. Laevide, sed magnitudine volentariarum, nec*  
*ut illa, tantum extimi digiti.*



- Cornu militare. 582. H. testa subcarinata imperforata convexa, apertura paulo-marginata.  
*Gvalt. test. t. 3. f. I.*  
*Habitat . . terrestris.*
- Vortex. 583. H. testa carinata plana : supra concava, apertura ovali.  
*Fn. svec. 1307.*  
*List. angl. 145. t. 2. f. 28.*  
*Gvalt. test. t. 4. f. GG.*  
*Habitat in Europæ stagnis.*
- scabra. 584. H. testa subcarinata imperforata ovata acuminata striata. *M. L. U.*  
*Habitat . .*  
*Testa fasciis fuscis dissectis : in inferiore anfractu linea elevata.*
- gothica. 585. H. testa carinata utrinque convexa cornea : fasciis subferrugineis.  
*Habitat in Sveciæ nemoribus.*
- Gualtierana. 586. H. testa carinata imperforata depressa decussatim striata, apertura utrinque acuta. †  
*Gvalt. test. t. 68. f. E.*  
*Habitat . .*
- \* \* \* Rotundatæ anfractibus & umbilicatæ.
- cornea. 587. H. testa supra umbilicata plana nigricans, anfractibus quatuor teretibus.  
*Fn. svec. 1304.*  
*List. angl. 143. t. 2. f. 26. - - exercit. 2. p. 59.*  
*Gvalt. test. t. 4. f. DD.*  
*Argenv. conch. t. 31. f. 7. c.*  
*Habitat in Europæ aquis dulcibus.*
- spirorbis. 588. H. testa utrinque concava plana albida, anfractibus quinque teretibus.  
*Fn. svec. 1305.*  
*Habitat in Europæ Lacubus, magnitudine Sem. Anetni.*
- contorta. 589. H. testa subumbilicata plana utrinque æquali, apertura lineari arcuata.  
*Fn. svec. 1309.*  
*Habitat in Europæ stagnis supra plantas.*



- Cornu  
arietis. 590. H. testa umbilicata planiuscula, apertura ovali.  
*List. conch. t. 136. p. 49. Cochlea magna compressa.*  
*Argenv. conch. t. 11. f. E.*  
*Klein. ostr. t. 1. f. 7.*  
*Habitat in O. Europæo.*
- hispida. 591. H. testa umbilicata convexa hispida diphara, anfractibus quibus, apertura subrotundo-lunata.  
*Fn. svec. 1290.*  
*Habitat in Svecia; terrestris.*
- amantilla-  
cea. 592. H. testa subumbilicata subrotunda glabra, anfractibus supra ventralioribus, amolico obtecto, apertura ovato-oblonga.  
*Rumph. mus. t. 27. f. Q.*  
*Gvalt. test. t. 1. f. R.*  
*Habitat in Asia; terrestris.*
- Pomatia. 593. H. testa umbilicata tuberosa obtusa decolori, apertura subrotundo-lunata.  
*Fn. svec. 1293.*  
*Gesn. aqu. 255.*  
*Aldr. exsangu. 389.*  
*List. angl. 111. t. 2. f. 1.*  
*Swamm. bibl. t. 4 f. 2.*  
*Gvalt. test. t. 1. f. A.*  
*Argenv. conch. t. 32. f. 1.*  
*Habitat in Europe, Cæcis nemoribus.*
- glauca. 594. H. testa umbilicata subrotunda acuminata, latro marginato, apertura ovali.  
*Habitat . . .*
- Citrina. 595. H. testa umbilicata convexa obtusa flavescens: fascia fusca.  
*Gvalt. test. t. 1. f. D.*  
*Argenv. conch. t. 32. f. 10.*  
*Habitat in Jamaica australi; terrestris.*
- arbutorum. 596. H. testa umbilicata convexa acuminata, apertura suborbiculari bilinguata: antice elongata.  
*Fn. svec. 1295.*  
*List. angl. 119. t. 2. f. 4 - - conch. 1. n. 52.*  
*Argenv. conch. t. 32. f. 8.*  
*Habitat in Europæ arbutis.*



- ungulina. 597. H. testa umbilicata convexa, apertura marginata sub-orbiculata: supra elongata.  
*Rumph. mus. t. 27. f. R. Lapillus.*  
*Habitat . . .*
- itala. 598. H. testa umbilicata convexa: anfractibus 5 teretibus, umbilico patulo.  
*Habitat in Europa australi.*  
*Testa albida, fascia una alterave fusca.*
- hispana. 599. H. testa umbilicata convexa, anfractibus 5 teretibus, umbilico tenui.  
*Habitat in Europa australi.*  
*Testa colore corneo.*
- lutaria. 600. H. testa umbilicata ovato-oblonga: interne coloratione, apertura subovata.  
*Habitat . . .*
- perversa. 601. H. testa subumbilicata ovato-oblonga contraria sulphurea.  
*Grew. mus. t. 10. f. 9.*  
*Bonan. recr. 3. t. 116.*  
*Pet. gaz. t. 44. f. 7.*  
*Gvalt. test. t. 5. f. P. O.*  
*Argens. conch. t. 12. f. G. B. Unique.*  
*Habitat . . . fluviatilis.*
- \* \* \* \* *Rotundatæ imperforata.*
- jaunthina. 602. H. testa subimperfiorata subrotunda obtuse discipana fragilissima, apertura pollice dilatata, labro emarginato.  
*Column. aquat. 23. t. 22. - - purp. t. 13. f. 2.*  
*Bonan. recr. 3. t. 5.*  
*Stear. jam. t. 1. f. 4. & t. 572. f. 23.*  
*Rumph. mus. t. 20. f. 2.*  
*Gvalt. test. t. 64. f. O.*  
*Ag. angl. 301. p. 2071. Cochlea colore speciosior.*  
*Brown. jam. 399. t. 39. f. 2. Cochlea purpurea tenuis, ore ampliore.*  
*Habitat in Europa, Asia, Africa; in M. Mediterraneo frequentior; etiam pelagica.*
- Vivipara. 603. H. testa imperforata subovata obtusa cornea: cingulis fuscis, apertura suborbiculata.



*En. svec.* 1312.

*List. angl.* 133. t. 2. f. 18 - - *exerc.* 2. p. 17. t. 2.  
*conch.* 2. t. 26. f. 26.

*Cod. angl.* t. 8. f. 1.

*Sum. n. bel.* t. 9. f. 3.

*Habitat in Europæ magnis, argillofis imprimis.*

nemora- 604. H. testa imperforata subrotunda lævi diaphana fascia-  
lis. ta, apertura subrotundo-lunata.

*En. svec.* 1294. *It. cel.* 127. *It. wgoth.* 34.

*List. angl.* 116. t. 2. f. 3. - - *conch.* t. 1. n. 54.

*Pet. mus.* 5. n. 14.

*Gualt. test.* t. 1. f. P.

*Habitat in Europæ arboribus.*

lucorum. 605. H. testa imperforata subrotunda lævi fasciata, aper-  
tura oblonga fusca

*Gualt. test.* t. 1. f. C.

*Habitat in Europæ arboribus.*

guinea. 606. H. testa imperforata foveolata obtusa grisea: fasciis  
duabus pallidis, apertura obovata.

*Gualt. test.* t. 1. f. D.

*Habitat in Europæ australi; terrestris.*

Hama- 607. H. testa imperforata subrotundo fusca: fascia longi-  
stoma. tudinali alba, apertura purpurea.

*Habitat . . .*

\* \* \* \* \* *Oblongæ turrita imperforata.*

decolla- 608. H. testa imperforata subtruncata: spira mutilato-trun-  
ta. cata, apertura obovata.

*Pet. gaz.* t. 66. f. 1.

*Gualt. test.* t. 4. f. O. P. Q.

*Argenv. conch.* t. 31. f. 5.

*Habitat in Europa australi, Oriente; terrestris.*

*Testa apice transversim abscissa & consolidata est.*

Pupa. 609. H. testa subimperforata ovato-oblonga rudi, anfracti-  
bus senis, apertura lunato-oblonga.

*Habitat in Mauritania. E. Brander.*

barbara. 610. H. testa imperforata oblonga rudi; anfractibus octo-  
nis, apertura subrotundo-lunata.

*Habitat Algeriæ. E. Brander.*



*Testa precedentii similis, sed dimidio minor s. Hordei  
 semine paulo major; infima apertura subius sæpe fas-  
 scia grisea cincta.*

- Amaru- 611. H. testa imperforata oblonga, anfractibus spinoso  
 la. dentatis.  
*Rumph. mus. t. 33. f. FF. Voluta fluviatilis.  
 Argenv. conch. t. 31. f. 6. β.  
 Habitat in Asiæ fluviis.*
- stagnalis, 612. H. testa imperforata ovato - subulata subangulata,  
 apertura ovata.  
*Fn. svec. 1310.  
 Pet. mus. t. 82. n. 85.  
 List. angl. 137. t. 2. f. 21. - - conch. 2. t. 123. f. 21.  
 Gualt. test. t. 5. f. I.  
 Frisch. inf. 8. t. 7.  
 Habitat in Europæ stagnis.*
- fragilis. 613. H. testa imperforata ovato - subulata tereti pellucida,  
 apertura ovato - oblonga.  
*Fn. svec. 1311.  
 Habitat in Europa.*
- putris. 614. H. testa imperforata ovata obtusa flava, apertura  
 ovata.  
*Fn. svec. 1317.  
 Bonan. recr. 3. t. 54?  
 Tulp. obs. 200. t. 201.  
 List. angl. 140. t. 2. f. 24. - - conch. t. 123. f. 23.  
 Klein. ostr. t. 3. f. 70.  
 Habitat in Europæ stagnis.*
- limosa. 615. H. testa imperforata oblongiuscula pellucida, aper-  
 tura ovata.  
*Fn. svec. 1314.  
 Habitat in Europæ paludibus.*
- tentacu- 616. H. testa imperforata ovata obtusa impura, apertura  
 lata. subovata.  
*Fn. svec. 1313.  
 List. angl. 135. t. 2. f. 19.  
 Habitat in Europæ stagnis.*
- Auricu- 617. H. testa imperforata ovata obtusa, spira acuta bre-  
 laria. vilissima, apertura ampliata.



*Fn. svec.* 1315.

*List. angl.* 139. t. 2. f. 23. - - *exerc.* 2. p. 54.  
*conch.* 2. t. 123. f. 32.

*Argenv. conch.* t. 31. f. 7.

*Klein. ostr.* 54. t. 3. f. 69.

*Habitat in Europæ fluviiis, stagnis.*

balthica. 618. H. testa imperforata ovata acuminata, rugis elevatis, apertura ovata ampliata.

*Fn. svec.* 1316.

*It. gotl.* 261.

*Habitat ad M. Balthici littora.*

Neritoides. 619. H. testa imperforata convexa longitudinaliter striata, rima umbilicali, apertura subrotunda. *M. L. U.*

*Gvalt. test.* t. 64. f. I.

*Habitat . .*

*Testa livida.*

perspicua. 620. H. testa imperforata convexo-ovata, labro nullo, apertura ad apicem usque hiantem. *M. L. U.*

*Habitat . .*

*Testa pellucida, lactea.*

Haliotis. 621. H. testa imperforata depresso-planiuscula, apertura ovali dilatata usque in apicem.

*Pet. gaz.* t. 12. f. 4.

*Rumpf. mus.* t. 40. f. R.

*Gvalt. test.* t. 69. f. F.

*Argenv. conch.* t. 8. f. D.

*Habitat in M. Mediterraneo, Americano.*

*Testa lactea, pellucida, in apicem usque perspicua uti Haliotis, sed tragus non pertusus.*

ambigua. 622. H. testa subimperfiorata convexa: fulcis remotis compressis, apertura semiorbiculari.

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Testa parva Neritoides, alba, convexa; spira lateralis, obtusa, tota cingitur lineis remotis 6 ad 8 compressis, elevatis: apertura semiorbiculari; hinc etiam Neritoides, modo Labium interius non esset reflexum; umbilicus perforatus est in junioribus, in adultioribus vero nullus.*



201. NERITA, *Animal* Limax.

Testa univalvis, spiralis, gibba, sub-  
tus planiuscula.

Apertura semiorbicularis: labio co-  
lamellæ transverso, truncato,  
planiusculo.

## \* Umbilicatae.

Carrena. 623. N. testa umbilicata laevi, spira submucronata, umbi-  
lico lobo bifido.

Rumph. mus. t. 22. f. C. Valvata 4.

Gualt. test. t. 67. f. L, Q, R, S, V, X.

Argen. conch. t. 10. f. C.

Kratzenst. Regensf. 10. t. 3. f. 34.

Habitat in O. Asiæ.

glaucina. 624. N. testa umbilicata laevi, spira obtusiuscula, umbili-  
co fenestralo: lobo gibbo dicolori.

List. conch. 4. f. 5. c. 1. t. 5. f. 1.

Rumph. mus. t. 22. f. N. Valvata laevis.

Gualt. test. t. 67. f. M, P, T.

Habitat in O. Europæo.

Vitellus. 625. N. testa umbilicata subglobosa, umbilico perforato  
æquali.

Rumph. mus. t. 22. f. D. Valvata 5.

Habitat in O. Asiæ.

Albumẽ 626. N. testa umbilicata convexa, umbilico subcordato:  
lobo explanato.

List. conch. 4. f. 5. c. 3. f. 1, 2.

Rumph. mus. t. 22. f. B. Vitellus compressus.

Gualt. test. t. 67. f. A, B.

Argen. conch. t. 10. f. T.

Kratzenst. Regensf. 20. t. 5. f. 54.

Habitat in O. Asiæ.

Mam- 627. N. testa umbilicata ovata glabra, umbilico obtecto,  
milla. apertura ovata

Gualt. test. t. 67. f. nit. Cochlea nivea.

List. conch. 4. f. 5. c. 3. t. 1. f. 3, 4.

Rumph. mus. t. 22. f. E. Valvata 7: Albula.



*Gvalt. test. t. 67. f. C; D.*

*Argenv. conch. t. 10. f. X. Uber tenue.*  
*Habitat ad Barbados.*

\* \* Imperforatæ labio edentulo.

nodosa. 628. N. testa obsolete pluribus ordinibus solida, labro angulato.

*Er. n. recv. 3. t. 173, 174.*

*List. conch. t. 804. f. 13.*

*Gvalt. test. t. 67. f. B. B.*

*Klein ostr. 17. t. 1. f. 30.*

*Habitat . .*

*Diffus. Murici Nodulo et ta fractura, sed postice lacuna dentata, qui neglecta fuerunt genera.*

Corona. 629. N. testæ antrostibus coronatis spinis, labiis edentulis.

*Rumph. mus. t. 22. f. O. Valvata spinosa.*

*Pet. amb. t. 3. f. 4.*

*Argenv. conch. t. 10. f. 2.*

*Habitat in Asiæ fluviis.*

Radula. 630. N. testa fuscata tuberculis æqualibus, labiis edentulis. *M. L. U.*

*Habitat . .*

cornea. 631. N. testa obsolete striata, labiis edentulis.

*Argenv. conch. t. 10. f. M.*

*Habitat . .*

fluviatilis. 632. N. testa rugosa, labiis edentulis.

*Fn. svec. 1318.*

*List. angl. 136. t. 2. f. 20.*

*conch. 2. p. 1. t. 38.*

*Pet. mus. 67. n. 718.*

*Habitat in Europæ cataractis.*

littoralis. 633. N. testa lævi, vertice carioso, labris edentulis.

*Fn. svec. 1320, 1319. It. æl. 261.*

*List. angl. 164. t. 2. f. 3.*

*conch. t. 4. f. 8. f. 39.*

*Pet. mus. 67. n. 717.*

*Habitat ad Maris Europæi littoræ scopulosque, modis innumeris variegata.*



lacustris. 634. N. testa læviuscula cornea, apice exquisito, labiis edentulis.

*Habitat in Europæ lacubus.*

*Testa similis N. littorali, sed cornea, nec vertice carioso.*

\* \* \* Imperforatæ labio dentato.

bidens. 635. N. testa lævi, labio interiore bidentato. *M. L. U.*

*Habitat . .*

viridis. 636. N. testa lævi viridi, labio interiore medio crenulato.

*Brown. jam. 399. N. minima viridis.*

*Habitat ad Minorcam, Jamaicam. E. Brander.*

*Testa parva admodum, viridis, interdum fusco lacteoque undata, ad labium albo-maculata.*

virginea. 637. N. testa lævi ovata, labio interiore gibbo denticulato.

*Bonan. recr. 3. t. 204.*

*Pet. gaz. t. 11. f. 3.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

polita. 638. N. testa lævi, labiis utrisque dentatis.

*Rumph. mus. t. 22. f. I, 2. Valvata alpina.*

*Gualt. test. t. 66. f. C.*

*Argenv. conch. t. 10. f. K.*

*Kratzenst. Regensf. 16. t. 4. f. 43.*

*Habitat in O. Asiæ.*

Peloron-639. N. testa striata, labiis dentatis: interiore planiusculata.  
lo rugoso.

*Rumph. mus. t. 22. f. K. Valvata 2 fasciata.*

*Habitat in O. Asiæ ad Bandam.*

Albicilla. 640. N. testa striata, labiis subdentatis: interiore tuberculato.

*Rumph. mus. t. 22. f. 8.*

*Habitat ad Hitoë.*

Histrion. 641. N. testa sulcata transverseque striata, labio interiore dentato.

*Rumph. mus. t. 22. f. 6.*

*Habitat . .*



plicata. 642. N. testa sulcata, labiis dentatis: interiore rotundato; exteriori utrinque dentibus acutis conicis. *M. L. U.*  
*Habitat . . .*

grossa. 643. N. testa sulcata, labiis dentatis: interiore convexo rugoso.  
*Rumph. mus. t. 22. f. N.*  
*Gvalt. test. t. 66. f. V.*  
*Habitat in O. Asia.*

Chamæleon. 644. N. testa sulcata sulcis viginti, labiis dentatis: interiore rugoso tuberculato.  
*Rumph. mus. t. 22. t. L. Valvata 3 undulata.*  
*Argenv. conch. t. 10. f. Q.*  
*Kratzenst. Regensf. 12. t. 3. f. 26.*  
*Habitat in O. Asia ad Bandam.*

undata. 645. N. testa sulcata sulcis triginta, labiis dentatis: interiore rugoso tuberculato.  
*Rumph. mus. t. 22. f. 4.*  
*Gvalt. test. t. 66. f. X.*  
*Habitat in O. Asia ad Amboinam.*  
*Differt a precedenti etiam apice magis prominente, & sulcis latiusculis, nec tenuibus striis.*

Exuvia. 646. N. testa sulcata, labiis dentatis: interiore tuberculato.  
*Bonap. recr. 3. t. 220.*  
*List. conch. 4. f. 1. c. 1. t. 2. f. 5.*  
*Rumph. mus. t. 22. f. M.*  
*Pet. gaz. t. 100. f. 6.*  
*Gvalt. test. t. 66. f. CC.*  
*Argenv. conch. t. 10. f. I.*  
*Habitat in O. America & Asia.*

## 295. HALIOTIS. *Animal* Limax.

*Testa* auriformis, patens: Spira occultata laterali; Disco longitudinaliter poris pertuso.

Midæ. 647. H. testa subrotunda utrinque nitida.  
*Gvalt. test. t. 69. f. B.*  
*Habitat . . .*

648. H.



- tubercu- 678. H. testis fabovata, rugis transversis tuberculatis.  
lata. *Pin. juss. 126. Haliotis striata rugosa.*  
*Rond. pisc. 5. Auris marina.*  
*Bell. aquat. 395.*  
*Aldr. exsangu. 551. f. 1, 2.*  
*Bonan. recr. t. 91. f. 1, 2.*  
*Lyn. angl. 167. t. 3. f. 16.*  
*conch. 614.*  
*Habitat in O. Europæo.*
- striata. 679. H. testis ovata transversim rugosa longitudinaliter  
striata.  
*Habitat in O. Asiæ.*
- varia. 680. H. testis ovata, striis longitudinalibus: majoribus tu-  
berculatis.  
*Habitat . . .*
- marino- 681. H. testis ovata, striis longitudinalibus; transversis  
rata. obsoletis.  
*Argenv. conch. t. 7. f. B.*  
*Habitat in O. Africano.*
- atinina. 682. H. testis oblonga extra foramina angulata, striis ele-  
vatis.  
*Rumph. mus. t. 40. f. E, F.*  
*Gvalt. test. t. 69. f. D.*  
*Argenv. conch. t. 7. f. E.*  
*Kratzsch. Regens. t. 9. f. 20.*  
*Habitat in O. Indiæ.*
- parva. 683. H. testis ovata, angulo inter foramina & spiram.  
*Habitat in O. Africano.*  
*antecedentes præcedentes valde affines & forte omnes tan-  
tum varietates.*

296. PATELLA. *Animal* Limax.

*Testis* univalvis, subconica, abs-  
que spira.

\* *Labiatae s. labio interno instructæ.*

equestris. 684. P. testis integra orbiculata, labio fornicali perpendi-  
culari.

*Rumph. mus. t. 40. f. P, Q.*



*Pet. amb. t. 16. f. 28.*  
*Gvalt. test. t. 9. f. X.*  
*Argenv. conch. t. 6. f. K.*  
*Habitat in O. Indico.*

Neritoides- 655. P. testa integra ovata apice subspirali, labio laterali.  
 dea. *M. L. U.*  
*Habitat . .*

chinesis- 656. P. testa integra subconica lævi, labio laterali.  
 fis. *Bonap. recr. 1. 7. 12.*  
*List. conch. 4. f. 1. c. 7. f. 3.*  
*Argenv. conch. t. 6. f. P. Lucus chinensis.*  
*Habitat in M. Mediterraneo.*

porcellana- 657. P. testa integra ovali, apice recurvo, labio postico  
 na. - plano.  
*Rumph. mus. t. 40. f. O.*  
*Habitat in O. Indiæ.*

fornicata, 658. P. testa integra ovali postice oblique recurva, labio  
 postico concavo.  
*Gvalt. test. t. 69. f. H?*  
*Argenv. conch. t. 6. f. N.*  
*Habitat ad Nivam infulam.*  
*Differt a precedenti spira laterali, labioque concavo albo,*

\* \* Dentatæ s. basi margine angulatæ.

laciniosa. 659. P. testa radiis elevatis inæqualibus: extus crassioribus  
 obtusis.  
*Rumph. mus. t. 40. f. C.*  
*Argenv. conch. t. 6. f. O.*  
*Habitat in India.*

facchariana- 660. P. testa angulata: costis septenis carinatis obtusis.  
 na. *Bonap. kirch. 1. t. 32.*  
*List. conch. 4. f. 1. c. 3. t. 1. f. 1, 2.*  
*Rumph. mus. t. 40. f. B.*  
*Pet. amb. t. 3. f. 3.*  
*Gvalt. test. t. 9. f. I, M, O.*  
*Argenv. conch. t. 6. f. M.*  
*Klein. ostr. t. 8. f. 4.*  
*Habitat ad Barbados.*



- barbara. 661. P. testa dentata: costis novendecim elevatis fornicato-muricatis. *M. L. U.*  
*Habitat . .*
- granularis. 662. P. testa dentata: striae elevatis macronibus imbricatis.  
*List. conch. 4. f. 1. c. 3. t. 3. f. 2.*  
*Gualt. test. t. 9. f. F.*  
*Argenv. conch. t. 6. f. H.*  
*Kratzenst. Regensf. 8. t. 2. f. 24.*  
*Habitat in O. Europæ australis.*
- granatina. 663. P. testa angulata: striae ad decem laevibus.  
*List. conch. 4. f. 1. c. 3. t. 2. f. 3, 4.*  
*Argenv. conch. t. 6. f. G.*  
*Kratzenst. Regensf. t. 9. f. 21.*  
*Habitat in O. Europæ australis.*
- vulgata. 664. P. testa subangulata: striae quatuordecim obsoletis, margine dilatato acuto.  
*Fann. Jvec. 1291.*  
*List. angl. 195. t. 5. f. 40. mala.*  
*Gualt. test. t. 8. f. G.*  
*Habitat in O. Europæ rarioribus saxis, frequens.*  
*Testa subtus colore testudinis.*
- cærulea. 665. P. testa subangulata: striae numerosis inæqualibus, subtus cærulea.  
*Habitat in M. Mediterraneo.*
- tuberculata. 666. P. testa subdentata conica tuberculata: pectice retusa.  
*Habitat . .*
- \* \* \* *Mucronatæ vertice acuminato recurvo.*
- ungarica. 667. P. testa integra conico-acuminata striata: vertice hamoso revoluta.  
*Gualt. test. t. 9. f. V, W.*  
*Klein. ostr. t. 8. f. 10.*  
*Habitat in M. Mediterraneo.*
- mammillaris. 668. P. testa integra conica striata subdiaphana, vertice reflexo lævi.  
*List. conch. t. 537. f. 17.*  
*Klein. ostr. t. 8. f. 1.*  
*Habitat in M. Mediterraneo.*



- pectinata- 669. P. testa integra ovata: striis rugosis subramosis, ver-  
ta. tice subcentrali reflexo mucronato.  
*Klein. ostr. t. 8. f. 1.*  
*Habitat in M. Mediterraneo.*  
*Testa opaca; intus lavis testudinea; extus striis nu-  
merosis, longitudine inaequalibus.*
- lutea. 670. P. testa integra, ovali convexa striata, vertice sub-  
marginali reflexo mucronato. *M. L. U.*  
*Habitat . . .*  
*Vertex prope marginem exteriorem residet.*
- unguis. 671. P. testa integerrima oblonga margine antico retusa,  
vertice mucronato carinato.  
*Rumph. mus. t. 40. f. L.*  
*Pet. gaz. t. 32. f. 9.*  
*Habitat in Amboina ad littora, sub Arena.*
- lacustris. 672. P. testa integerrima ovali membranacea, vertice  
mucronato reflexo.  
*Faun. suec. 1292.*  
*List. angl. 151. t. 2. f. 32.*  
*Gvalt. test. t. 4. f. AA.*  
*Habitat in Europæ aquis dulcibus, adherens plantis.*
- \* \* \* \* Integerrimæ absque vertice mucronato.
- pellucida. 673. P. testa integerrima obovata gibba pellucida: radiis  
quatuor cæruleis.  
*Habitat in M. Mediterraneo. E. Brander.*  
*Testa junc P. lacustris, sed major et tucque; livida,  
giberrima radiis cæruleis interstitiis; ad . . . cum  
marginem quasi vertex obsoletus est.*
- testudina- 674. P. testa integerrima ovata laevi glaberrima.  
ria. *List. conch. 4. f. 1. c. 2. t. 2.*  
*Gvalt. test. t. 8. f. B.*  
*Argenc. conch. t. 6. f. P.*  
*Habitat . . .*
- compres- 675. P. testa integerrima ovali oblonga laevi: dorso com-  
sa. pressa.  
*Habitat . . . e Museo Tessiniano.*  
*Testa e mucronis, fava.*
- rustica. 676. P. testa integerrima conica, striis quinquaginta ob-  
tulis. *i. st.*



*List. conch. 4. f. 1. c. 4. t. 1.*

*Gualt. test. t. 8. f. P. & t. 9. f. C?*

*Habitat . .*

fusca. 677. P. testa integerrima ovata conica: stris elevatis.  
- *M. L. U.*  
*Habitat . .*

notata. 678. P. testa integra striata: vertice submergato erecto,  
intus alba: macula atra cordata medio albida.

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Testa stris elevatis levibus f. 3. Intus alba margine  
fusco maculato; sub juncione macula spatulata nigra,  
medio alba.*

cruciata. 679. P. test. integerrima ovali subconvexa fusca cruce  
alba picta. *M. L. U.*  
*Habitat . .*

reticulata. 680. P. testa integra conica compressa venoso-reticulata.  
*Habitat in M. Mediterraneo.*

\* \* \* \* \* *Perforatæ vertice.*

Fissura. 681. P. testa ovali striato reticulata, vertice recurvo, an-  
tice fissâ.

*List. conch. t. 543. f. 28.*

*Klein. ostr. t. 8. f. 116. Patella reticulata exigua alba, fissura  
notabili in margine.*

*Habitat ad Anagninam rarius. Lister; ad Algiziam fre-  
quentior. L. Iscander.*

*Teste fissura linearis, a margine antico ad lateris me-  
dium incisa.*

Pustula. 682. P. testa ovali gibboso-convexa striato-reticulata,  
margine crenulato, vertice perforato.

*Klein. ostr. t. 8. f. 3*

*Habitat in M. Mediterraneo. Bonan.*

*Testa simillima precedenti, apertura margini postico  
propior.*

græca. 683. P. testa ovata convexa: margine intricatum crenula-  
to, vertice perforato.

*Bonan. recr. 1. t. 6.*

*Tournef. iter. 1. t. 94.*



*Gvalt. test. t. 9. f. N.*

*Kratzsch. Regem. 8. t. 2. f. 23.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

nimbosa. 684. P. testa ovata striata rugosa fusca, vertice oblongo-perforato.

*List. conch. 4. f. 1. c. 1. t. 1, 2.*

*Gvalt. test. t. 9. f. P, Q, R, S, T.*

*Argenv. conch. t. 6. f. 1.*

*Habitat in M. Europæ australis, Americæ.*

Nubecu-685. P. testa subovata rugosa alba rubro radiata, vertice  
la. ovato-perforato.

*Habitat in M. Mediterraneo siciliano.*

*Lineæ s. puncta alba, radiæ rubræ, alba rubro radiata, apertura circumscissa & imbricata.*

297. DENTALIUM. *Animal . . .*

*Testa univalvis, tubulosa, recta, monothalamia, utraque extremitate pervia.*

Elephan-686. D. testa angulata subarcuata continua.  
tinum.

*Bonan. recr. 1. t. 3.*

*List. conch. 4. f. 2. f. 3.*

*Rumph. mus. t. 41. f. 1. Denticulus elephantis;*

*Pet. amb. t. 16. f. 33.*

*gaz. t. 13. f. 9.*

*Gvalt. test. t. 10. f. 1.*

*Argenv. conch. t. 7. f. H.*

*Habitat in Oceano Indico, Europæo.*

Dentalis. 687. D. testa striata subarcuata interrupta.

*Rumph. mus. t. 41. f. 6.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Teste apex valde acuminatus & ruber est.*

Entalis. 688. D. testa tereti subarcuata continua.

*Faun. svec. 1327.*

*Bonan. recr. 1. t. 9.*

*List. conch. 4. f. 2. f. 3.*

*Rumph. mus. t. 41. f. 5.*



*Gvalt. test. t. 10. f. F.*

*Argenv. conch. t. 7. f. K.*

*Habitat in O. Europæo, Indico.*

minutū. 689. D. testa tereti erectiuscula lævi minuta.

*Planc. conch. t. 2. f. 2.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Testa tam parva, ut genus nisi armatis oculis non conspicitur.*

298. SERPULA. *Animal Teredo. Column. aqu. t. 22. f. 4. Ellis cor. t. 38. f. 2.*

*Testa univalvis, tubulosa, adhærens, sæpe isthmis integris passim intercepta.*

Semīnulum. 690. S. testa regulari ovali libera glabra.

*Planc. conch. t. 2. f. 1?*

*Gvalt. test. t. 10. f. S.*

*Habitat in M. Adriatico; minuta.*

*Testa recedit a congeneribus quod libera sit nec adhæreat aliis corporibus, quamvis anfractus inter se uniti, & quod apertura in mea non conspicua.*

planorbis. 691. S. testa regulari orbiculata plana æquali.

*Habitat in Conchis pelagicis.*

*Testa vix manifesta, nisi squamula orbiculata arte adnata, absque omni spirarum rudimento externo, at fracta dilcedens horizontaliter, intus ostendit spiram peregrine testa, cui insedebat, insculptam, tanquam circulos concentricos.*

spirillum. 692. S. testa regulari spirali orbicula pellucida, anfractibus teretibus sensimque minoribus.

*Planc. conch. t. 1. f. 8.*

*Habitat in Oceano super Sertularias & Zoophyta alia.*

*Differt a sequenti, cui simillima, quod triplo minor; quod pellucida, nec opaca; quod ad latus inferius vix manifeste canaliculata; quodque anfractus omnino teretes, nec a latere centrum respiciente obsolete canaliculati.*



- spiror- 693. S. testa regulari spirali orbiculata, anfractibus supra  
bis. introrsum subcaualicatis sensimque minoribus.  
*It. wgoth. t. 170.*  
*Planc. conch. 18. n. 3.*  
*Gvalt. test. t. 10. f. O.*  
*List. conch. 4. f. 3. t. 2.*  
*Habitat in Oceani & Pelagi Fucis, Zoophytis.*
- triquetra. 694. S. testa repente flexuosa triquetra.  
*It. wgoth. 170.*  
*Gvalt. test. t. 10. f. P.*  
*E. N. C. 1727. p. 315. t. 10.*  
*Habitat in Oceano supra Testas, Lapides, Naves,  
Fucos.*
- intricata. 695. S. testa filiformi scabra tereti flexuosa.  
*Habitat in M. Mediterraneo super Pinnas aliaque re-  
crementa marina.*  
*Testa rotunda sed tenuioris varie flexa, cinerea, oculto  
anfractu valde radis & fere scabra observanda.*
- contortu- 696. S. testa sericea rugosa glomerata.  
plicata. *Habitat in O. Europæo.*
- glomerata. 697. S. testa tereti decussato-rugosa glomerata.  
ta. *Fn. Suec. 1325.*  
*Gvalt. test. t. 10. f. T.*  
*Argenv. conch. t. 29. f. B.*  
*Habitat in O. Europæo.*
- lumbri- 698. S. testa tereti flexuosa: apice spirali acuto.  
calis. *List. conch. 4. f. 3 f. 1.*  
*Rumph. mus. t. 41. f. I.*  
*Gvalt. test. t. 10. f. Q.*  
*Argenv. conch. t. 29. f. I.*  
*Habitat in Indiis.*
- arenaria. 699. S. testa subangulata articulata integra distincta.  
*Bonan. recr. 1. t. 20. f. C.*  
*Rumph. mus. t. 41. f. E. Solen arenarius.*  
*Gvalt. test. t. 10. f. L. N.*  
*Habitat in Indiis.*
- anguina. 700. S. testa teretiuscula, fissura longitudinali subarti-  
culata.



- Rumph. mus. t. 41. f. H. Solen anguinus.*  
*Argenv. conch. t. 29. f. H.*  
 β. *List. conch. 4. f. 3. f. 2.*  
*Rumph. mus. t. 41. f. 2.*  
*Gvalt. test. t. 10. f. Z.*  
*Habitat in India.*  
*Polyneorpha, sed distinctissima rima sua articulata, quamvis magnitudine diversissima.*

Penis ♀ 701. S. testa tereti recta extremitate radiata : disco poris cylindricis.

- Bonan. kirch. 1. t. 38.*  
*List. conch. 4. f. 3. f. 3.*  
*Rumph. mus. t. 41. f. 7.*  
*Gvalt. test. t. 10. f. M.*  
*Argenv. conch. t. 7. f. G.*  
*Habitat ad Amboinam.*

Penicillus. 702. S. testa teretiuscula recta basi flexuosa. †

- Ellis corall. 92. t. 34.*  
*Habitat in M. Mediterraneo ad Melitam.*

ringens. 703. S. testa tereti recta punctato-arenacea. Fig. 8.

- Baker. micr. t. 8. f. 2, 3, 4, 5.*  
*Schæff. monogr. 1755.*  
*Habitat in Europæ Lacubus frequens; minuta.*  
*Testa Dentali structura, sed basi tenuiore fixa, ex arenulis confectis constructa, minima oculo armato dignoscenda. Animalculum refert florem didynamia.*



## IV. LITHOPHYTA.

Animalia Mollusca composita, pullulantia e Corallio Lapideo subiecto, cui inserta, quodque ædificant.

## 299. TUBIPORA. Animalia Nereides.

Corallium tubis subcylindricis, lævibus, basin usque cavis.

musica. 1. T. corallio cylindris parallelis combinatis: dissepimentis planis lævibus remotis.

*Hort. cliff* 481 Tubipora membranis transversis tubos perpendiculares connectens.

*Tournef. inst.* 575. t. 342. Tubularia purpurea.

*Edw. av.* t. 93. f. 3.

*Argenv. conch.* 352. t. 29. f. A.

*Morif. hist* 3. p. 657. f. 15. t. 10. f. 22.

*Vellch. hecast.* 44. t. 14 Tubularia coralloides.

*Shaw afr* 37. Madrepora tubis eleganter coagmentatis ruberrimis

*Bauh. hist.* 3. p. 808. f. 2. Alcyonium fistulosum rubrum.

*Rumph. amb.* 6. p. 236. t. 85. f. 2. Halcyonium rubrum indicum.

*Habitat in Mari Indico, rubro.*

infundibuliformis. 2. T. corallio turbinato infundibuliformi subprolifero.

*Hort. cliff.* 480. Madrepora cyathiformis turbinata interius prolifera.

*Habitat in Pelago.*

Verrucosa. 3. T. corallio subrotundo glomerato, tubis ovatis: ore subtridentatis.

*Ellis corall.* t. 27. f. e, E?

*Habitat in M. Mediterranei Algis, sæpius ramulos cingens.*

Corallium s. glomer albus oculo armato inspicendus ut ora tubulorum pateant.



- Urceus. 4. T. corallio urceolato subsimplici: ore sexdentato.  
*Schæff. monogr. 1755. t. 2. f. 7-9.*  
*Habitat in Europæ aquis dulcibus.*
- serpens. 5. T. corallio repente filiformi subramoso: tubis rigidis  
 cylindricis distantibus erectis.  
*Habitat in M. Mediterranei Conchis, Fucis &c.*
- repens. 6. T. corallio repente filiformi dichotomo: tubis flexilibus  
 cylindricis distantibus erectis. *Fig. 5.*  
*Amœn. acad. 2. p. 63.*  
*Bæck Act. Stockh. 1746. t. 6. f. 3, 4?*  
*Rœs. inf. app. polyp. t. 73, 74, 75.*  
*Schæff. monogr. 1754. t. I. f. 1, 2.*  
*Habitat in Aquæ dulcis Plantis, in Nymphæa &c.*  
*Minuta.*
- arenosa. 6. T. corallio tophoso poris adperso, intus cellulis con-  
 camerato.  
*Ellis corall. 90. t. 36. Tubularia arenosa anglica.*  
*Habitat in O. Europæo, frequens inter Angliam &*  
*Belgium. J. F. Gronovius.*  
*Antiqui videntur Nereis esse.*

300. MILLEFORA. *Animalia* Hydræ.

*Corallium* tubis turbinatis, te-  
 retibus.

- cellulosa. 7. M. corallio membranaceo contorto-reticulato.  
*Hort. cliff. 480. Millepora membranacea rigida cellu-  
 losa connata labyrinthiformis.*  
*Bauh. hist 3. p. 809. Eschara.*  
*Raj. angl. 3. p. 31 n. 1. Eschara retiformis.*  
*Bonon. kirch. t. 286. f. 10.*  
*Rumph. amb. 6. p. 247. t. 87. f. 5. Reticulum ma-  
 rinum.*  
*Ginann. adriat. 9. t. 4. f. 9.*  
*Ellis corall. 71. t. 30. f. H, a. Eschara foliacea mil-  
 lepora lapidea extremitatibus hinc inde irregulariter  
 coalescentibus, utraque superficie ex cellulis ova-  
 tis constans.*  
*Habitat in M. Numidico, Mediterraneo.*



Membrana lapidea, alba, campanulato-turbinata, varie complicata, perforata foraminibus oratis inæqualibus in quincuncem; supra punctata; subtus lævis.

Liche-  
noides.

8. M. ramosissima plana: supra scabra porosa, subtus glabra, lateribus dilatatis.

*Habitat* . .

Rami ramosissimi in plano, facie Lichenis fruticulosi s. foliacei. Ramuli filiformes, teretiusculi, subcomplanati, supra scabri, subtus glabri, lateribus denticato-serratis. Pori inter scabritiem superiorem vix manifesti.

Dami-  
cornis.

9. M. ramosa scabra, poris sparsis immersis.

*Gualt. test. t. 104.* Madrepora candida ramosa damicornua referens, foraminibus rotundis in superficie insignita.

*Rumph. amb. 6. t. 86. f. 3.* Lithodendron littoreum.

*Bonn. hist. 3. p. 846.* Corallium asperum candicans aduiterinum.

*Habitat in O. Asiatico.*

Rami ramosi, breues, punctis subscabri. Pori sparsi, impressi, patentes interiori margine, fundo obtusi.

Alcicor-  
nis.

10. M. ramosa compressa, poris sparsis obsoletis.

*Morif. hist. 3. l. 15. t. 10. f. 26.* Corallium albidum latum & compressum ad extrema tantum ramosum.

*Habitat* . .

Caulis pedalis, albus, compressus, varie ramosus, obtusus, fragilis. Pori sparsi, minimi, vix conspicui, remoti.

reticula-  
ta.

11. M. ramosissima: ramis linearibus compressis anastomosantibus: hinc poris prominulis confertissimis.

*Habitat in Mari Mediterraneo. D. D. Kæhler.*

Caulis ramosissimus, instar Lichenis rangiferini, horizontalis; ramis passim connexis & reticulatis, linearibus, compressis, supra lævibus, subtus tectis quasi verrucis, in quibus pori confertissimi.

lineata.

12. M. ramosissima dichotoma, poris per series digestis.

*Habitat* . .

Caulis filiformis, ramosissimus, divaricatus, concatenatis ramis. Pori per series longitudinales.



compres- 13. M. ramis compressiusculis subdichotomis distantibus,  
sa. poris undique prominulis scabris.

*Habitat in M. Mediterraneo. D. D. Kahler.*

murica- 14. M. ramosa, poris confertis stellatis prominentibus  
ta. erecto-truncatis.

*Hort. cliff. 481. Millepora ramosissima, punctis sub-  
tus semiovato-prominulis, ramis acutis.*

*Sloan. jam. 1. p. 51. t. 18. f. 3. Corallium album  
porosum maximum muricatum.*

*Tournef. inst. 573. Madrepora erectior ramosa, tuber-  
culis crebris sursum spectantibus.*

*Gvalt. test. t. 81. Madrepora candida digitata, ramis  
tenuioribus peracutis quasi dimidiatis & sursum spe-  
ctantibus densissime exasperata.*

*Rampb. amb. 6. p. 239. t. 86. f. 1. Lithodendron  
calcareum.*

*Nouv. Voy. 3. p. 566. f. 15. t. 10. f. 3. Porus albus  
erectus ramosus, tuberculis crebris sursum spectan-  
tibus.*

*P. de l'Inde Test. 116. Madrepora ramosa, ramis adspersis  
punctis tuberculatis apice introrsum magis hiantibus.*

*Habitat in Pelago Asiatico.*

*Rami varii, albi, striis exesivis tecti, adspersi undique  
macronibus cavis latere superiore truncatis s. cochlea-  
ribus, interne fere stellatis.*

Eschara. 15. M. membranacea undique adnata.

*Leff. Atl. Stockh. 1752. p. 111. f. 1-4. Millepora cru-  
stacea plana adnata, punctis quincuncialibus.*

*Amun. acad. 1. p. 105. f. 19. Millepora membranacea  
plana, punctis quincuncialibus.*

*Ellis corall. t. 25. f. e?*

*Trascurt in Oceano Europæo & M. Balthico.*

crustacea. 16. M. crustacea parasitica indivisa, tuberculis gibbis sca-  
bris imbricatis, poris radiatis.

*Ellis corall. 75. t. 27. f. F.*

*Habitat in M. Mediterranei Algis.*

*Crassa constat quasi tuberculis, convexis, equalibus: sin-  
guis poro laterali, e quo, ubi perfectus, setæ 5 bre-  
ves prominent, quarum quæ marginali inferius insident  
reliquis longiores.*



301. MADREPORA. *Animalia Medusæ. Ellis cor.*  
*t. 32. f. A. Donat. adriat.*  
*t. 6 f. F.*

*Corallium tubulis stellato-lamellosis.*

\* Simples: *Stella unica communi simplici.*

Acetabulum. 17. M. stella orbiculari solitaria planiuscula, pedunculo filiformi.

*Bauh p. n. 367. Androsaces petrae innascens major & minor*

*Tournef. inf. 49. t. 338. Acetabulum marinum.*

*Brown jam. 74. t. 49. f. A. Acetabulum caule simplici, cyatho striato.*

*Habitat in O. Europæo, Americano.*

Verruca. 18. M. stella orbiculari solitaria planiuscula sessili: disco cylindris flosculoso, ambitu radiato.

*Ginann. adriat. 10 t. 4. f. 10. Fungus marinus.*

*Habitat in M. Mediterraneo.*

*Corallium magnitudine vix dimidiati, sessile, planum, album; cum perfectum ligno ex tubis aggregatis, uti flos compositus. Ambituque stris exaratis more floris radiati; Media itaque inter Milleporas & Madreporas.*

turbinata. 19. M. simplicissima turbinata lævis, stella concava.

*Amen. acad. 1. p. 87. t. 24. f. I, II, III, IV, VII.*

*Erasm. lib. t. 36, 38, 33, 32. Lang. figurat. 52. t. 12.*

*Fungitis major orbicularis gotlandicus.*

*Heist. lib. t. 5. f. 9, 10, 11, 13, 15, 17. Wolff.*

*hass. t. 10. f. 3, 4. Columellius turbinatus.*

*Habitat in M. Balthico.*

Fungites. 20. M. simplex acaulis convexa, lamellis simplicibus.

*Hort. cliff. 481. Madrepora simplex acaulis orbiculata convexa, lamellis denticulatis.*

*Bonon. kirch. 263. t. 257. f. 17. Fungus petrificatus.*

*Rumph. amb. 6. p. 247. t. 88. f. 1-4. Fungus saxeus.*

*Bauh. hist. 3. p. 801. f. 1, 2. Fungus lapideus.*

*Olear. mus. 74. t. 34. f. 2. Fungites IV.*

*Best. mus. t. 26. f. 3. Fungus marinus lapideus.*



*Clus. exot.* 125. f. 1. Fungus lapidosus.

*Boerh. lugdb.* 1. p. 2. Fungus coralloides pileatus lamellatus.

*Shaw. afr.* 6. Fungus coralloides lamellatus maris rubri.  
*Habitat in Mari rubro.*

*Stella simplex centro concavo. Lamellæ acutæ, inæquales, basin versus isthmis connexæ.*

Pileus. 21. M. simplex acaulis conglomerato-lamellosa, lamellis verrucosis.

*Rumf. amb.* 6. p. 243. t. 88. f. 3. Fungus saxeus.

*Habitat in O. Asiatico.*

*Stella composita ex stellis excavatis: Radiis palmatis centrum & peripheriam respicientibus. Radii alterni in stellulis altiores margine bifariam crenato, alterni humiliores angustiores.*

Mæandrites. 22. M. subsimplex acaulis, centris concatenatis, lamellis dentatis.

*Roy. lugdb.* 525. Madrepora composita sinuosa, lamellis duplici serie integris.

*Gvalt. test.* t. 51. Mæandrites costis amplioribus acutis & rarioribus lamellis.

*Pet. fil.* 217. t. 20. f. 17. Corallium crispum.

*Sloan jam.* 1. p. 56. t. 18. f. 5. Fungus lapideus major undulatus.

*Habitat in O. Americano.*

*Stella ex centris variis, copiosis, oblongis, confluentibus in canales labyrinthiformes. Centra non ex suturis, sed ex lamellis. Lamellæ non emarginatæ.*

labyrinthiformis. 23. M. simplex acaulis, centro repando-labyrinthiformi, lamellis retusis.

*Hort. cliff.* 481. Madrepora composita labyrinthiformis hemisphærica, lamellis duplicato ordine integris obtusis, sinibus æqualibus.

*Pet. gaz.* 7. t. 68. f. 1. Corallium album americanum.

*Vallisn. op.* 1. t. 17.

*Gvalt. test.* t. 10. f. 29. Madrepora costis latis sinuosis & sulcatis.

*Hill. plant.* 2. Mycedium convexum gyris sulcatis.

*Bocc. epist.* 17. p. 141. Astroites undulatus major.

*Olear. mus.* 74. t. 34. f. 1. Astroites.

*Best. mes.* 83. t. 26 f. 1. Massa coralloides albicans, maris fluctus representans.

*Habi-*



*Habitat in O. Americano.*

*Stella convexa. Sutura reptans, millefaria, humilior, e qua assurgit altius lamellis interjecta. Lamellæ parallele.*

areolata. 24. *M. simplex acaulis: ambulacris pinnatis, pulvillis angustis truncatis*

*Pet. fil. 216. t. 20. f. 16.*

*Rumph. amb. 6. p. 244. t. 87. f. 1.*

*O'eur. mus. t. 34. f. 4.*

*Cus. exot. 125. Fungus faxeus minor.*

*Habitat in O. Asiatico.*

*Discus convexus: Ambulacris profundis latissimis pinnatis inaequalibus; Pulvillis elevatis angustis compressis truncatis.*

\* \* *Compositæ: Stella e plurimis composita.*

punctata. 25. *M. composita acaulis, punctis stellaribus confertis.*

*Habitat in Oceano Europæo*

*Lapis rotundatus albus fragilis. Puncta conferta parva inaequalia, singula poris 10 s. 12 pertusis conflata.*

Agarici-tes. o. *M. composita acaulis sulcata, sulcis carinatis, stellis concatenatis.*

*Habitat in O. Indico.*

*Lapis constans lamellis variis divergentibus semiorbiculatis, exaratis utrinque sulcis plurimis repandis: Fundo stellis concatenatis.*

truncata. 26. *M. composita, corporibus proliferis disci pluribus margine coadunatis, stellis truncatis: centro cylindrico-concavis. Amæn. acad. 1. p. 93. t. 4. f. X: 3. XVIII.*

*Habitat . . fossilis.*

stellaris. 27. *M. composita, corporibus proliferis centralibus solitariis, stellis margine dilatato-coadunatis. Amæn. acad. 1. p. 94. t. 4. f. XI. 4.*

*Habitat . .*

polygamma. 28. *M. composita, stellis cylindricis duodecim-radiatis intermixtisque concavis majusculis convexis. Chin.*

*Lagerstr 51. f. 15.*

*Habitat in O. Asiatico,*

29. *M.*



- favosa. 29. *M. composita*, stellis angulosis concavis coadunatis.  
*Amen. acad.* 1. p. 96. t. 4. f. *MII*.  
*Bocc. mus.* 1. t. 5. f. 3. Astroites.  
*Habitat . . fossilis.*
- Astroites. 30. *M. composita*, stellis subrotundis concavis coadunatis.  
*Hort. cliff.* 481.  
*Olear. mus.* 74. t. 34. f. 5.  
*Bocc. mus.* 1. t. 5. f. 4. Astroites V.  
*Gesn. fig.* 35.  
*Worn. mus.* 63.  
*Plot. oxon.* 87. t. 2. f. 6, 7. Astroites.  
*Boet. lap.* 298.  
*Sloan. jam.* 1. p. 54. t. 21. Lapis Astroites f. stellaris.  
*Ald. mus.* 272. t. 877, 878, 879. Stellatus lapis.  
*Habitat . . fossilis.*
- Organū. 31. *M. composita*, cylindris striatis membrana deflexa striata combinatis.  
*Amen. acad.* 1. p. 96. t. 4. f. 6: 1. Madrepora composita, corporibus proliferis e centro solitariis, membrana reflexa coadunatis stellatis.  
*Habitat . . fossilis.*
- flexuosa. 32. *M. composita*, stellis cylindricis flexuosis scabris: superne distinctis fastigiatis.  
*Amen. acad.* 1. p. 96. t. 4. f. *XIII*: 5. Madrepora composita, cylindris flexuosis scabris, cortice hinc inde coalitis.  
*Habitat . . fossilis.*
- turbinata. 33. *M. composita*, stellis turbinatis lævibus subdichotomis apice contingentibus.  
*Edw. av.* t. 194.  
*Habitat . .*
- fascicula-  
ris. 34. *M. composita*, stellis cylindricis rectis glabris: superne distinctis fastigiatis.  
*Bauh. hist.* 3. p. 795. Corallio æmuis Madrepora.  
*Bonan. mus.* t. 266. f. 9.  
*Kirch. t.* 253. f. 9. Balanorum cylindraceorum glomerus.  
*Gvalt. test.* t. 106. f. G.  
*Rumph. amb.* 9. f. 245. t. 87. f. 3. Caryophyllus lævus.



*Bocc. mus. 1. p. 288. t. 5. f. 1. Madrepora I.*

*Shaw. afr. 17. Fungus tubulatus & stellatus.*

*Donat. marin. 53. t. 6.*

*Habitat in O. Africano.*

*E basi calcarea cylindri plures fastigiati distincti.*

- Ananas.** 35. M. composita, corporibus profleris e centro pluribus undique coadunatis, stellis convexis striatis centro concavis. *Amœn. acad. 1. p. 92. t. 4. f. IX, VIII: 2.*  
*Brom. lib. 5. 39. Fungites gotlandicas, brevi pediculo, magno amplo pileo.*  
*Helw. lith. 53. t. 5. f. 22. Corallium albidam superficie figuris asteriformibus prope modum oblitteratis.*  
*Bocc. mus. 1. p. 288. t. 9. f. 7. Althoites.*  
*Habitat . . fossilis.*

\* \* \* *Ramosæ: Stellis simplicibus.*

- peritusa.** 36. M. ramosissima glabra, axillis perforatis, stellis conicis.  
*Habitat . .*

*Rami similes Corallio albo, numerosi, subdiaphani. Axillæ perforatæ cavitatibus majoribus s. minoribus.*

*Ramuli gerunt stellas turbatas formam ramulorum dentatas, tunc striatas, quasi calices ex canalibus exterioris latere erecti, unde bigniam quibus stellares flexuosis ramis.*

- ramea.** 37. M. ramosa pinnata undulato-striata, stellis terminalibus.

*Pet. gaz. t. 76. f. 7.*

*Marjgl. mar. t. 30. f. 136.*

*t. 31. f. 44.*

*Habitat in O. Americano & Asiatico.*

*Rami magni, solitarii, bigniam alternatum ramosi. Stellæ terminales ramulorum, solitariae, cylindricæ.*

- rubra.** 38. M. ramosa glabra, ramis vagis, superficie striis obliquis, stellis obsoletis lateralibus.

*Bauh pin 266. Corallium rubrum.*

*Tournef. inst. 572. f. 339.*

*Worm. mus. 231.*

*Ellis corall. 53. t. A, C.*

*Donat. marin. 43. t. 5.*

*Habitat in Mari Numidico ad la Calle;*



Caulis teres varie ramosus divaricatus solidus; rubra corticilis substantia in interioribus deficit. Striæ obliquæ parallelæ. Stellæ parvæ rariores, sparsæ, nec terminales.

oculata. 39. M. ramosa glabra concava, ramis alternis, superficie striis obliquis, stellis distiche alternis.

*Icon. cl. 451.* Madrepora tumida ramosa, ramis teretibus lævibus solidiuticulis, lamellis integris.

*Worm. mus. 234.*

*Raj. hist. 62.* Corallium album.

*Tournef. inst. 573.* Madrepora vulgaris.

*Bauh. hist. 3. p. 793.* Corallium album oculatum officinarum.

*Imperat. nat. 627.* Corallium album fistulosum.

*Ellis corall. 95. t. 35. f. B.* Corallium album majus.

*Moris. hist. 3. p. 655. f. 15. t. 10. f. 1.* Porus magnus Corallio affinis.

*Gualt. test. t. 24.* Acropora alba, foraminibus stellatis amplioribus.

*Habitat in Mari Siculo, Tyrrheno.*

Caulis lævis, varie ramosus, solidus, versus basin cylindrico-cavus. Superficies striis obsoletis, obliquis, parallelis. Stellæ non prominent, sed pori alternati stellati.

virginea. 40. M. corallio subdichotomo solido albido, stellis sparsis prominulis.

*Habitat in Pelago.*

Corallium simile M. oculatæ, a qua differt: Colore albido-purpurascente; Ramis rectis, nec flexuosis; Caule solido, nec tubuloso; Stellis sparsis prominulis, nec distiche alternis.



## V. ZOOPHYTA.

*Animalia composita, efflorescentia.*  
*Stirps vegetans.*

302. ISIS. *Flores . . .*

*Stirps radicans, lapideus, nudus, rigidus,*  
*geniculatus.*

Hippuris. 1. I. stirpe corallino, articulis striatis, geniculis attenuatis.  
*Hort. cliff. 480. Sertularia ramosissima, articulis sul-*  
*catis*

*Mus. Tessin. 118. idem.*

*Clus. exot. 124. Hippuris saxea.*

*Bauh. hist. 3. p. 788.*

*Raj. hist. 68.*

*Best. mus. 78. t. 23.*

*Olear. mus. 76. t. 35. f. 4.*

*Rumph. amb. 6. p. 228. t. 84. Accabarium album.*

*Gvalt. test. 118.*

*Edw. av. t. 93.*

*Habitat . .*

dichoto- 2. I. stirpe corallino, articulis lævibus, geniculis decor-  
 ma. ticatis.

*Per. gaz. 7. t. 3. f. 10. Hippuris coralloides carnea*  
*capensis, geniculis limosis.*

*Habitat in M. Æthiopico.*

ocracea. 3. I. stirpe corallino, articulis decorticatis, geniculis no-  
 dolis.

*Hort. cliff. 480. Lithoxylon ramosum erectum articu-*  
*latum rigidum, ramis sæpius liberis oppositis compres-*  
*sis, geniculis crassiusculis.*

*Rumph. amb. 6. p. 234. t. 85. f. 1. Accabarium*  
*rubrum.*

*Habitat in M. Indico.*

4. I.

Zoophyta non sunt, uti Lithophyta, authores suæ Teste; sed Testa ipsorum; sunt enim corpora (uti flores) imprimis generationis organa, adjectis nonnullis oris motusque instrumentis, ut motum, quem extrinsecus non habent, a se ipsis obtineant.



Anastatica. 4. I. stirpe capillari paniculato minutissimo. Fig. 16.

*Amœn. acad.* 2. p. 64. n. 4, 5.

*Act. angl.* 1747. n. 454. t. 1. f. 5.

*Schæff. monogr.* 1754. t. 1. f. 3, 4.

*Needh. micr.* t. 7. f. 3, 4, 5.

*De Geer act. Stockb.* 1747. t. 6. f. 4, 5.

*Trembl. act. angl.* 1747. n. 454. t. 1. f. 5.

*Habitat in Aquæ dulcis Comitibus, plerumque frequens.*

*Hyarum rejecti compositam in Germaniâ, sed adeo parva, ut eia raris admodum oculis; si plerumque ramis terribet Hydra f. spiralis testis, & ad minimum unum contractum omnes in globum mare An. Juncæ J. cœ; maris an calcæis restat stirps ramosa, rigida, dum ad tactum tantum sentitur scurriles, quæ oculo armato stenticulum refert.*

Encrinus. 5. I. stipite osseo subulato simplicissimo subcontorto.

*Ellis corall.* 96. t. 37. Hydra marina arctica, corporibus multis octotentaculatis basi junctis & scapo prælongo osseo sustentatis.

*Habitat in M. Grœnlandico.*

303. GORGONIA, Flores e poris sparsis laterali-  
bus. *Ellis cor.* t. 26. f. M.

*Proles* rariores e calyce galeato bilabiato: Labio superiore tridentato; inferiore subtridentato.

*Stirps* radicans, corneus, flexilis, continuus, cortice calcæreo crustatus.

Spiralis. 1. G. simplicissima spiralis scabra.

*Rumph. amb.* 6. p. 202. t. 78. f. C. Palmjuncus anguinus.

*Habitat in India.*

*Caulis* crassitie pennæ, ater, teres, adspersus per series punctis acutis.



- Ventali-  
na. 2. *G. reticulata*, ramis brevibus extreme compressis.  
*Mart. cliff.* 480. Lithoxylon ramiforme, ramis opposi-  
tite compressis, densa reticulata, primo albis et cæcis  
primordialis.  
*Boiss. voy. t. 9. p. 6.* Ceratophyton maximum cine-  
reum elegantissime reticulatum.  
*Calceol. mus. 17. t. 16.*  
*Marsil. mar. t. 19. f. 84.*  
*Bonan. kirch. t. 266. f. 12.*  
*Planch. ann. 5. p. 209. t. 39. f. 1.*  
*Habitat in O. Atlantico.*  
Quædam auctoritas, hanc speciem non versus ra-  
miformem, sed versus extremam compressam, quod  
cum e figuris hariolari non liceat, de synonymis sæ-  
pe hanc speciem hanc, utram ad hanc vel alteram  
speciem referat, non determinat.  
*G. reticulata*, ramis brevibus extreme compressis.  
*Mart. cliff.* 480. Lithoxylon ramiforme, ramis parallele  
compressis: primordialis ramis superioribus  
*Calceol. mus. 17. t. 16. f. 16.*  
*Boiss. voy. t. 9. p. 6.*  
*Planch. ann. 5. p. 209. t. 39. f. 1.*  
*Roch. arch. t. 2. p. 79.*  
*Habitat in O. Atlantico.* Ceratophyton Sabel-  
lum veneris Linnæi.  
*Boiss. voy. t. 9. p. 6.* Ceratophyton album dense reti-  
culatum fibris laticulis.  
*Habitat in O. Atlantico.*
- Antipa-  
thes. 4. *G. subramosa* erecta ramis nitida.  
*Marsil. corall. t. 18. f. 82.*  
*Ginann. adriat. t. 7. f. 20.* His palma  
*Habitat inter Tropicos, in O. Atlantico.*  
Caulis crassitie fere digiti, erectus, albus, glaberrimus,  
parum ramosus.
- Ceratophyta. 5. *G. dichotoma* fistula, axillis divaricatis.  
*Mart. Voy. 115.* Lithophyton ramis virgatis atris,  
cortice albo poroso.  
*Planch. ann. 5. p. 223. t. 83.* Virga sanguinea.  
*Catèd. car. 2. p. 21. t. 21.* Lithoxylon longe ramo-  
sum, cortice navo perforato.



*Ginann. adriat. t. 8. f. 21.* Lithophyton mar. albicans.

*Habitat in Indiis & M. Adriatico.*

*Caulis dichotomus, erectus, subserratus, niger, axillis divaricatis compressis. Rami flexuosi, erecti, cornei, medulla fere nulla. Crusta alba, membranacea.*

pinната. 6. *G. compressiuscula ramis distichis compressis.*

*Hort. cliff. 450.* Lithoxylon pinnato-ramosum erectum compressum flexile, ramulis fetaceis.

*Marsil. mar. t. 20. f. 94.*

*Breyn. prodr. 3. p. 34. t. 30.* Lithoxylon incrustatum, ramis compressis fetosis quasi pinnatis.

*Clus. exot. 121.* Quercus marina theophrasti.

*Habitat in O. Asiatico.*

*Caulis parum compressus, ut rami duo latera spectent, superius & inferius. Rami alterni pinnati distichi purpurascetes.*

ænea. 7. *G. paniculata, ramis alternis confertis dichotomis fetaceis.*

*Rumph. amb. 6. p. 207. t. 30. f. 2.*

*Habitat in India.*

*Caulis inferne nudus, superne paniculatus, ovatus, flexuosus. Rami alterni, conferti, dichotomi, pellucidi, desinentes in ramulos fere capillares.*

Placomus. 8. *G. paniculata, ramis vagis tomentosis, calycibus octodentatis.*

*Breyn. prodr. 3. t. 29.* Lithophyton fuscum subhirtum.

*Habitat in Mari Norvegico.*

Abies. 9. *G. paniculata, ramis recurvis muricato-scabris.*

*Habitat in O. Indico.*

*Caulis lævis. Rami conferti recurvi, punctis acuminatis fere imbricatis, vix conspicuis, scabri.*



304. **ALCYONIUM.** *Flores Medullæ, sparsi intra corticem Hydride vesiculari poris pertusa. Ellis cor. t. 17. f. D.*

*Stirps radicata, stuposa, tuni- cato-corticata, continua.*

1. *A. stipite arborecente, ramis obtusis.*  
*Mus. Tejin. 120. t. 10. Lithoxylon norvegicum.*  
*Clas. exot. 19. t. 119. Arbuscula marina coralloides.*  
*Worm mus. 230. Plantâ marina coralloides.*  
*Bauh. hist. 3. p. 797. Planta marina coralloides rubra.*  
*Habitat in Oceano Norvegico.*

2. *A. acule coriaceum oblongum rugosum.*  
*Raj. angl. 3. p. 31. n. 2.*  
*Ellis corall. 82. n. 2. t. 32. f. A, a. Alcyonium ra- mulo-digitalum molle, asteriscis undique ornatum.*  
*Habitat in O. Europæo.*

Bursa. 3. *A. acule pulposum subglobosum.*  
*Bauh. hist. 3. p. 795. Alga Pomum monspeliensium.*  
*Bauh. pin. 363. Bursa marina.*  
*Raj. hist. 33. angl. 3. p. 31. Bursa marina.*  
*Ellis corall. 82. n. 1. t. 17. f. B, C, D. Alcyonium pulmonis instar lobatum.*  
*Habitat in O. Europæo.*

305. **TUBULARIA.** *Flores Hydræ. Ellis cor. t. 16. f. C. & t. 17. f. A.*

*Stirps radicata, subgeniculata, tubulosa, membranacea.*

indivisa. 1. *T. cylindris simplicissimis geniculatis.*  
*Raj. angl. 3. p. 31. n. 4. Adianti aurei minimi facie planta marina.*  
*Ellis corall. 31. n. 2. t. 16. f. C. Corallina tubularia calamos arundinaceos referens.*  
*Habitat in Oceano Europæo.*



- ramosa. 2. *T. cylindris ramosis, geniculis contortis.*  
*Ellis cor. 31. n. 3. t. 16. f. A. & t. 17. f. A. Co-*  
*rallina tubularia gracili & ramosa, ramis ramulorum*  
*contortis.*  
*Habitat in Oceano Europæo.*

306. *ESCHARA. Flores Hydræ. Ellis cor. t. 29.*  
*f. D. 1.*  
*Stirps radicata, papyracea, nu-*  
*da, porosa.*

- foliacea. 1. *E. foliacea ramosa, laciniis cuneiformibus rotundatis.*  
*Hort. ciff. 250. Millepora membranacea dextus ra-*  
*mosissima, ramis distinctis planis obtusis superne di-*  
*latatis.*  
*Ellis corall. 70. t. 29. f. A. Eschæra foliacea mille-*  
*pora spongiosa, cellulis arcuatis acuminis utrinque in-*  
*structa.*  
*Baub. pin. 367. Porus cervinus imperati.*  
*Bank. hist. 3. p. 799. Alga marina palystratos porosa.*  
*Morif. hist. 3. p. 646. f. 15. t. 8. f. 16. Millepora ma-*  
*rinus seruposus albidus telam fericeam textura sua*  
*æmulans.*  
*Raj. angl. 3. p. 42. n. 9. Fucus telam lineam feri-*  
*ceamve textura sua æmulans.*  
*Tournef. inst. 568. t. 334. Idem.*  
 β. *Ellis. corall. 69. t. 23. f. A. Eschæra foliacea mille-*  
*pora tenera angustior, foliolis quasi abscessis, cellulis*  
*oblongis alternis utrinque instructa.*  
*Morif. hist. 3. p. 646. f. 15. t. 8. f. 17. Fucus mari-*  
*nus seruposus albidus angustior compressus, extremi-*  
*tatibus quasi abscissis.*  
*Habitat in Oceano Europæo.*

- fistulosa. 2. *E. ramea dichotoma fistulosa articulata teres.*  
*Ellis corall. 45. n. 1. t. 23. f. A.*  
*Baub. hist. 3. p. 311. Corallina fistulosa fragilis crassior.*  
*Raj. hist. 65. Idem.*  
*Pluk. phyt. 2. 26. f. 2. Corallina fistulosa fragilis: in-*  
*ternodiis prælongis lævibus albis, sarciminum modo*  
*concatenatis.*



*Barrel. icon. 1275. f. 7. Muscus coralloides polygono-*  
*noides, falicorniae folio, major.*

*Habitat in Oceano Europæo.*

fragilis. 3. *E. ramea dichotoma fistulose articulata compressa.*  
*Pluk. alm 118. t. 166. f. 4. Corallina fistulosa fle-*  
*xilis geniculata mollis americana, segmentis latis &*  
*compressis.*

*Habitat in Oceano Americano.*

divarica- 4. *E. ramea dichotoma fistulosa compressa divericata.*

ta. *Habitat in O. Asiatico.*

*Dichotoma, compressa, absque geniculis, subflexilis,*  
*crassiuscula, longitudine digiti, alba.*

verticil- 5. *E. ramea verticillata articulata cylindrico-articulis.*

lata.

*Morif. hist 3 p. 646. f. 17. t. 8. f. 14. Fucus pur-*  
*pureus ramulis tenetè divisus gemulatus.*

*Ri. anal. 3 p. 34. n. 9. Corallina tena purpurea*  
*compressa.*

*Habitat in Oceano Europæo.*

*Facies Læva, valde flexilis. Articuli filiformes, ver-*  
*ticillati, parum ancipites.*

### 307. CORALLINA. Flores . . .

*Stirps radicata, articulata, fi-*  
*brofa cortice calcareo: ar-*  
*ticulis punctatis.*

Opuntia. 1. *C. trichotoma: articulis compressis subreniformibus.*

*Ellis corall. 53. t. 25. f. 1, 2.*

*Clus. hist. 2. p. 250.*

*Bauh. pin. 364. Fucus folio subrotundo.*

*Bauh. hist. 3. p. 800. Opuntia marina.*

*Pluk. alm 118. t. 26 f. 1. Corallina latifolia f. Opun-*  
*tia marina.*

*Imperat. natur. 853. f. 854. Sertularia.*

*Habitat in Oceano Europæo, Americano.*

officina- 2. *C. trichotoma, articulis cylindricis: terminali ovato.*

lis

*Ellis corall. 48. n. 2. t. 24. f. A.*

*Bauh. hist. 3. p. 810. Corallina.*



- Bauh. pin.* 363. Muscus maritimus f. Corallina offic.  
*Raj. hist.* 1. p. 65. *angl.* 3. p. 33. n. 1. Corallina.  
*Dal. pharm.* 60. Corallina.  
*Habitat in O. Europæo.*
- squamata. 3. *C. bipinnata*, articulis obovatis compressis.  
*Ellis corall.* 49. n. 4. t. 24. f. C. Corallina anglica  
 erecta, ramulis dense pinnatis lanceolæ forma.  
*Pluk. alm.* 118. t. 48. f. 4. Corallina magis erecta  
 pennata, eburneo nitore candicans.  
*Bauh. pin.* 364. Muscus coralloides squamulis loricatus.  
*Lob. ic.* 2. p. 249.  
*Habitat in Oceano Europæo.*
- corniculata. 4. *C. dichotoma*, articulis bicornibus: corniculis articulatis.  
*Ellis corall.* 50. n. 6. t. 24. f. D. Corallina alba exi-  
 gua, ramulis dichotomis: segmentis corniculatis.  
*Habitat in Oceano Europæo.*
- barbata. 5. *C. dichotoma* articulis cylindricis, ramulis apice bar-  
 batis.  
*Ellis corall.* 53. t. 25. f. C. Corallina articulata ja-  
 maicensis.  
*Habitat in Oceano Americano.*
- fragilissima. 6. *C. dichotoma*, articulis solitariis filiformibus divaricatis.  
*Swan. tom.* 1. p. 58. t. 20. f. 5. Corallina minima,  
 capillaceo folio?  
*Habitat in Indiis.*  
*Parva, setacea, fragilissima, albissima, articulis longis  
 simplicibus, rigidis.*
- rubens. 7. *C. dichotoma capillaris*, articulis cylindricis brevissi-  
 mis: dichotomiæ subclavatis.  
*Ellis corall.* 59. n. 5. t. 22. f. E. Corallina ramulis  
 dichotomis teneris capillaribus rubentibus.  
*Bauh. hist.* 3. p. 511. Corallinæ affinis f. Muscus ma-  
 rinus tenui capillo.  
*Bauh. pin.* 363. Muscus capillaceus, multifido folio,  
 albidus.  
*Habitat in Oceano Europæo.*
- cristata. 8. *C. dichotoma capillaris*: articulis omnibus clavatis.  
*Ellis corall.* 51. n. 7. t. 24. f. F. Corallina dichotoma,  
 capillis densis cristatis ispermophoros.



*Barrel. ic.* 1296 f. 2. Muscus coralloides cristatus.  
*Habitat in Oceano Europæo.*

spermo- 9. *C. dichotoma capillaris inferne pinnata, articulis cy-*  
phoros. lindricis.

*Ellis corall.* 51. n. 8 t. 24. f. G. Corallina alba sper-  
mophoros, capillis tenuissimis.

*Morif. hist.* 3. p. 671. f. 11. t. 9. f. 9. Corallina mu-  
ticolâ.

*Pluk. alm.* 119. t. 168. f. 3.

*Habitat in Oceano Europæo.*

Penicil- 10. *C. culmo simplici, ramis fasciculatis fastigiatis dich-*  
lus. tomis flexilibus inarticulatis.

*Habitat in Asia.*

*Stirps crassit. e pennæ, longitudine digiti, cortice fere  
tectus, e cujus apice, penicilli instar, fasciculus ramo-  
rum filiformium.*

308. SERTULARIA, Flores Hydræ. *Ellis cor. t.*  
5. f. A; t. 9. f. C; t. 10. f.  
A; t. 20. f. C.

*Stirps radicata, fibrosa, nu-  
da, articulata; articulis  
unifloris.*

\* *Ovariis distinctis & exsertis instructæ.*

rosacea. 1. *S. denticulis oppositis truncatis, calycibus oblongis fo-*  
liaceo-rosaceis, ramis alternis.

*Ellis corall.* 6. n. 7. t. 4. f. A. Corallina pumila  
pennata, denticulis tenerrimis & oppositis, vesicu-  
lis florem lili vel mali punicæ se expandentem refe-  
rentibus.

*Habitat in Oceano.*

pumila. 2. *S. denticulis oppositis mucronatis recurvatis, calycibus*  
obovatis, ramis vagis.

*Ellis corall.* 9. n. 8. t. 5. f. A.

Sertulariæ & phææ affines radicatae in mare plantarum, radiculis extra se disper-  
sis, quæ in hoc horum animalium non sunt, quæ a ventis non obtinent, volun-  
tario nisu assequantur omnino animalcula.



*Raj. angl. 3. p. 37. n. 19.* Corallina pumila repens minus ramosa, denticulis bijugis.

*Habitat in Oceano.*

capitata.

3. S. denticulis oppositis mucronatis erectis, calycibus obovatis operculatis, ramis alternis.

*Ellis corall. 8. n. 6. t. 3. f. B.*

*Raj. angl. 3. p. 36. n. 13.*

*Pluk. alm. 119. t. 47. f. 11.* Corallina muscosa denticulata procumbens, caule tenuissimo, denticulis ex adverso sitis.

• *Raj. hist. 79. Moris. hist. 3. p. 650. f. 15. t. 9. f. 3.* Muscus marinus denticulatus procumbens, caule tenuissimo, denticulis bijugis.

*Mor. hist. 3. p. 650. f. 15. t. 9. f. 2.* Muscus marinus ramosus minus arenacei coloris.

*Habitat in Oceano.*

capitata.

4. S. denticulis suboppositis truncato-subtridenticulatis, calycibus bidentatis, ramis alternis.

*Ellis corall. 4. n. 1. t. 1. f. A.* Corallina vesiculata, ramosa, denticulis oppositis cylindricis: oribus crenatis patulis.

*Habitat in Oceano.*

abietina.

5. S. denticulis suboppositis rebulosis, calycibus ovalibus, ramis alternis.

*Ellis corall. 4. n. 2. t. 1. f. B.*

*Raj. angl. 3. p. 35. n. 12.* Corallina abietis forma.

*Pluk. alm. 119. t. 47. f. 5.* Corallinae affinis Abies marina dicta.

*Mor. hist. 3. p. 650. f. 15. t. 9. f. 1.* Muscus maritimus, filicis folio.

*Bauh. hist. 5. p. 799.* Musci marini genus foliis pinnatis.

*Bauh. pin. 365.* Abieti similis maritima.

*Habitat in Oceano.*

capitata.

6. S. denticulis suboppositis subacutis, calycibus obovatis bidentatis, ramis sparsis.

*Ellis corall. 7. n. 5. t. 3. f. A.* Corallina capitei forma, denticulis ovalibus paululum alternis, ramis in cetera et rariora capitamenta sparsis, veliculis bidentibus.

*Habitat in Oceano.*



- argentea. 7. S. denticulis suboppositis mucronatis, calycibus ovalibus, ramis alternis paniculatis.  
*Ellis corall.* 6. n. 4. t. 2. f. 5.  
*Raj. angl.* 3. p. 26. n. 17. *Plin. aln.* 119. t. 48. f. 3. Sertularia in corall. alba v. denticulata, ramis in creberrima capillamenta sparsis.  
*Morif. hist.* 3. p. 650. f. 15. t. 9. f. 4. Muscus marinus minor, denticulis alternis.  
*Bocc. mus.* 1. p. 259. t. 6. f. 6. Muscus marinus argenteus coralloides ramosus erectus.  
*Habitat in Oceano.*
- avicularia. 8. S. denticulis suboppositis mucronatis, calycibus globosis, ramis alternis simplicibus.  
*Ellis corall.* 3. n. 2. t. 20. f. A. & t. 28. f. 7. Corallina erecta ramulis & ramis simplicibus tubulosis eas tubum parte aviculari capulis dentatis & latere cellularum gerens.  
*Habitat in Oceano.*
- rugosa. 9. S. denticulis alternis obsoletis, calycibus rotundissimis, ramis vagis.  
*Ellis corall.* 26. n. 23. t. 15. f. A. Corallina exigua repens, denticulis alternis, nucleus medicæ cochineæ æmulis.  
*Habitat in Oceano.*
- halecina. 10. S. denticulis alternis obsoletis, calycibus ovalibus ore obliquo, caulibus coadunatis.  
*Ellis corall.* 17. n. 15. t. 10. Corallina erecta tabulosa pennata, halecis spinæ facie.  
*Raj. angl.* 3. p. 26. n. 15. Corallina scruposa pennata, cauliculis crassiusculis rigidis.  
*Habitat in Oceano.*
- thuja. 11. S. denticuli alternis tubulosi adpressis, calycibus obovatis ore cylindrico, caule dichotomo disticho.  
*Ellis corall.* 10. n. 9. t. 5. f. B. Corallina avicularia, caule annulato rigido, ramis dense stipatis & mucronatis terminatis, denticulis caulis adpressis.  
*Raj. angl.* 3. p. 50. n. 47. *Sibb. scot.* 2. t. 1. p. 56. Fucus equilei facie ostreae testæ armatus.  
*Habitat in Oceano.*



eburnea. 12. S. denticulis alternis truncatis prominulis, calycibus gibbis rostratis, ramis paniculatis.

*Ellis corall. 39. t. 21. f. A.* Corallina cellifera minima fragilis ramosa & vesiculifera, colore eburneo, cellis tubiformibus conjunctis paululum arcuatis & fere oppositis.

*Habitat in Oceano.*

cornuta. 13. S. denticulis alternis truncatis spinosis, calycibus gibbis rostratis, ramis alternis.

*Ellis corall. 42. n. 10. t. 21. f. C.* Corallina cellifera minutissima falcata & crustata, cellulis capricorniformibus simplicibus vesiculas gerens.

*Habitat in Oceano.*

Myriophyllum. 14. S. denticulis secundis acutis, calycibus cylindricis sessilibus, ramis pinnatis incurvatis.

*Ellis corall. 12. n. 13. t. 8. f. A.* Corallina pennata & falcata, pennas caudae phasianii referens, caule gibbo.

*Burr. ic. 1292. f. 2.* Corallina fruticosa pennata.

*Baub pin. 363.* Muscus maritimus, filicis folio.

*Mars. b. p. 3. p. 650.* Muscus marinus pennatus, ramulis & capillamentis falcatis.

*Zanck monogr. venez. 1714. Giann. opusc. t. 11. f. 24.* Myriophyllum pelagicum.

*Habitat in Oceano.*

Stipes *ra. hu. p. 100* referens, a latere anteriore sulco excavatus, pennatus Radiis e sulco alternis, simplicibus, approximatis, alternato-divaricatis, parallelis, aequalibus, articulatis, incurvis.

Fructificatio solitaria e jugulo articulo radii, a latere incurvato, cylindrica, pellucida, ramo approximata, bractea subulata se dimidio brevior.

falcata. 15. S. denticulis secundis tubulosis, calycibus ovatis, ramis pinnatis alternis.

*Ellis corall. 12. n. 11. t. 7. f. A.*

*Raj. angl. 3. p. 36. n. 16. Pluken. alm. 119. t. 47. f. 12.* Corallina muscosa pennata, ramulis & capillamentis falcata.

*Mars. b. p. 3. p. 650. f. 15. t. 9. f. 2.* Muscus pennatus, ramulis & capillamentis falcatis.

*Habitat in Oceano.*



- Pluma. 16. S. denticulis secundis campanulatis, calycibus gibbis  
 cillis, furculis pinnatis a terribus lanceolatis.  
*Ellis corall.* 13. n. 12. t. 7. f. B. Corallina pennata  
 et lanceolata, denticulis florum lili convallium refe-  
 rentibus.  
*Encycl. meth.* 1. p. 257. t. 6. f. 6. Pinnaria marina imperati.  
*Habitat in Oceano.*
- antenni- 17. S. denticulis verticillatis setaceis, calycibus subsessili-  
 na. bus verticillatis, furculis subsimplicibus.  
*Tournef. inst.* 570.  
*Ellis corall.* 13. n. 12. t. 7. f. B.  
*Raj. angl.* 3. p. 34. n. 10. Corallina astaci corniculo-  
 rum.  
*Pink. alm.* 1. 9. t. 48. f. 6. Corallinae affinis non ra-  
 mosa viridaci coloris, astacorum corniculis instar ge-  
 niculata.  
*Raj. angl.* 3. p. 34. n. 10. Muscus marinus equisetiformis non ra-  
 mosus.  
*Ginn. opusc.* 16. t. 11. f. 25. Myriophyllum non ra-  
 mosum.  
 C. Corallina ramosa cirris obita. *Raj. angl.* 3. p. 35.  
 n. 11.  
*Habitat in Oceano*  
 Stirps simplex, fruticosa, teres, setiformis, rigidiuscu-  
 la, verticillata setis quaternis, brevibus, capillaribus,  
 articulatis.  
 Fructificationes solitariae ad setarum articulos a latere  
 interiore l. superiore.
- verticil- 18. S. denticulis obsoleteis, calycibus campanulatis denti-  
 lata. culatis erectis verticillatis, pedunculis longissimis con-  
 tortis.  
*Ellis corall.* 23. n. 20. t. 13. f. A. Corallina ramosa,  
 ramis singulis equisetiformibus, in summis capitamen-  
 tis contortis & verticillatim dispositis vesiculas cam-  
 paniformes gerens.  
*Habitat in Oceano.*
- volubilis. 19. S. denticulis secundis acutis, calycibus campanulatis  
 dentatis, pedunculis longissimis contortis.  
*Ellis corall.* 24. n. 21. t. 14. f. A. Corallina minima  
 scandens, vesiculas campaniformes in summo caule  
 lineari contorto gerens.  
*Habitat in Oceano.*



- Cuscuta. 20. S. denticulis obsoletis, calycibus ovatis axillaribus, ramis oppositis simplicibus.  
*Ellis corall.* 23. n. 26. t. 14. f. C. Corallina cuscutæ forma minima ramosa repens, ramulis oppositis, vesiculis minutissimis ovatis contertis geniculis ramorum insidentibus,  
*Habitat in Oceano.*
- Uva. 21. S. denticulis obsoletis, calycibus ovatis racemosis, ramis vagis.  
*Ellis corall.* 27. n. 25. t. 15. f. C. Corallina minima repens, vesiculis ovatis uvarum instar ramulis adhærentibus.  
*Habitat in Oceano.*
- lenticula  
18. 22. S. denticulis obsoletis, calycibus secundis cylindricis geniculis palmis congestis, sarculis filiformibus.  
*Ellis corall.* 27. n. 21. t. 15. f. B. Corallina exigua, caule geniculato scandens, vesiculis ex unoquoque geniculo seorsum, ut siringam panis referant.  
*Raj. angl.* 3. p. 28. n. 2. Mucoides lenticigerum, caule geniculis cuscutæ instar implexis.  
*Habitat in Oceano.*
- geniculata. 23. S. denticulis alternis contortis, calycibus obovatis subrotatis, caule geniculato flexuoso simplici.  
*Ellis corall.* 22. n. 19. t. 12. f. B. Corallina minima repens, caule nodoso articulado vesiculis alternis instructo.  
*Habitat in Oceano.*
- dichotoma. 24. S. denticulis obsoletis, calycibus obovatis axillaribus, pedunculis interis, caule dichotomo geniculato.  
*Ellis corall.* 21. n. 13. t. 12. f. A. Corallina procurrentis, caule comæ longo filiformi articulado, vesiculis ramorum axillis pedunculis contortis insidentibus.  
*Habitat in Oceano.*
- spinosa. 25. S. denticulis obsoletis, calycibus ovato-subulatis, ramis dichotomis spinosis.  
*Ellis corall.* 20. n. 17. t. 11. f. B.  
*Raj. angl.* 3. p. 34. n. 7. Corallina confervoides geniculata alba, geniculis crassiusculis pellucidis.  
*Habitat in Oceano.*



- pinnata 26. S. denticulis obsoletis, calycibus ovalibus, caule simplici pennato lanceolato.  
*Ellis corall. 19. n. 16. t. 11. f. A.* Corallina fetacea inflar arundinis gemiculata, capitamentis angulis unicuique geniculo alternatim dispositis.  
*Habitat in Oceano.*
- polyzonias. 27. S. denticulis alternis subdenticulatis, calycibus obovatis polyzonis, caule subramoso.  
*Ellis corall. 5. n. 3. t. 2. f. A, B. p. 28 f. 1.*  
*Raj. angl. 3. p. 35. n. 13.* Corallina minus ramosa alterna vice denticulata, denticulis lineis transversis externe striatis.  
*Habitat in Oceano.*
- fetacea. 28. S. denticulis secundis subcylindricis, calycibus oblongis cauli adpressis, furculis alternato-pinnatis lanceolatis.  
*Ellis corall. t. 38. f. 4.* Corallina fetacea.  
*Habitat in Oceano.*
- stipitata. 29. S. denticulis secundis, calycibus campanulatis pediculis infra frondes, furculis alternato-pinnatis lanceolatis.  
*Ellis corall. t. 38. f. 5.* Corallina capitamentis falcatis.  
*Habitat in Oceano.*
- Pennaria. 30. S. denticulis secundis, furculis bipinnatis.  
*Tronch. in M. Indico. Steller.*  
 Caulis serripedulis, rudis, contortus, pinnatus Ramis alternis, subpetiolatis, distantibus, parallelis. Rami pennati radiis parallelis, approximatis & fere contiguis (ut in penna); Radii articulati, dorso convexi, sed latere superiore imbricati. Sic rami referunt structura Sert. plumam, sed distincta species magnitudine, compositione, approximatis radiis, facie.
- Lichenastrum. 31. S. denticulis obtusis bifariam imbricatis, calycibus obovatis secundis parallelis, caule pinnato, ramis dichotomis.  
*Ellis corall. 11. t. 6. f. 10.* Corallina erecta pennata, denticulis alternis cauli adpressis, lonchatis l. polypodii facie.  
*Habitat ad Kamtschatka. Steller.*



Caules compressi, nudi, articulati. Rami distichi prod-  
eunt, sed dichotomi, bifariam imbricati, fortis ob-  
tusis (uti Ellis t. 6. f. A.), ut fere quadrangu-  
les evadant. Ab altero latere tantum ramulorum O-  
varia ovata, apice bianca, sessilia, proxima, pa-  
rallela & pectinata serie secundum unum s. inte-  
rius latus ramuli.

cedrina. 32. S. denticulis subcylindricis tubulosis quadrifariam im-  
bricatis, ramis vagis quadrangulis sursum incrassatis.

*Habitat ad Kamschatka. Steller.*

Caules longiusculi, sordidi & squalentes. Rami va-  
gi, saepe dichotomi, sensim versus apices via mani-  
feste crassiores, obtusi, tota quadrifariam imbricati  
tubulis cylindricis, intersecantibus, nudi  
valde quadrangulares evadunt. Differt a S. 31.  
quod squamae non distinctae, sed omnes imbricatae, &  
quod quadrifariam imbricatae sunt, variis quinque-  
fariam, nec bifariam.

purpurea. 33. S. denticulis subovatis tubulosis quadrifariam subim-  
bricatis, calycibus erectis campanulatis, ramis dichotomis quadratis.

*Habitat ad Kamtschatka. Steller.*

Tota atro-purpurea, dichotoma, fastigiata. Rami tetra-  
goni, quadrifariam angulis imbricati squamis tubulo-  
sis, ovatis, sed non ita confertis, ut sese tangant.  
Ovaria (forte) sunt squamae patentes, sursum inflexae  
campanae sessiles, turbinatae, quarum margo interior  
versus ramos brevior.

flexuosa 34. S. denticulis obsoletis, calycibus alternis ovatis sessili-  
bus, caule simplici flexuoso.

*Læfl. Act. Stockh. 1752. p. 114. t. 3. f. 5-10. Ma-  
drepora plantæformis mollis, caule flexuoso, ramulis  
alternis turbinatis.*

*Ellis corall. t. 38. f. 1. A. Corallina altera vice den-  
ticulata.*

*Habitat in Oceano.*

\* \* Ovarii non distinctis, sed intra articulos latitan-  
tibus.

Bursaria. 35. S. denticulis oppositis compressis fastigiatis, ramis di-  
chotomis.



*Ellis corall.* 41. n. 8. t. 22. f. A. Corallina cellifera minima ramosa, cellulis compressis oppositis, filiculae bursa pastoris formam æmulans.

*Habitat in Oceano.*

loricata. 36. S. denticulis oppositis truncatis obsolete.

*Ellis. corall.* 40. n. 7. t. 21. f. B. Corallina cellifera mollis ramosissima, geniculis ad loricae formam accedentibus.

*Raj. suppl.* 15. Muscus coralloides mollis elatior ramosissimas.

*Pluken. mant.* 56. Corallina geniculata mollis, internodiis rotundis brevioribus.

*Habitat in Oceano.*

fastigiata. 37. S. denticulis alternis acutis, ramis dichotomis fastigiatis.

*Ellis corall.* 33. n. 1. t. 18. f. A. Corallina cellifera erecta ramosissima tenerrima & plumosa.

*Raj. angl.* 3. p. 37. n. 20. t. 2. f. 1. Corallina pumila erecta ramosior.

*Habitat in Oceano.*

neritina. 38. S. denticulis alternis acutis, ramis dichotomis inæqualibus.

*Ellis corall.* 35. t. 19. f. A. Corallina cellifera americana.

*Habitat in M. Mediterraneo & Americano.*

scruposa. 39. S. denticulis alternis angulatis spinosis, ramis dichotomis.

*Ellis corall.* 38. n. 4. t. 20. f. C. Corallina cellifera minor repens ramosa & scruposa, cellulis alternis a latere angulatis.

*Habitat in Oceano.*

reptans. 40. S. denticulis alternis bidentibus, ramis dichotomis.

*Ellis. corall.* 37. n. 3. t. 20. f. B. Corallina cellifera minor repens ramosa, tubulis lævibus: interdum hamosis sparsim dispositis, fucis testisque alligata.

*Raj. suppl.* 15. Muscus coralloides pumilus ramosus.

*Habitat in Oceano.*

ciliata. 41. S. denticulis alternis ciliatis infundibuliformibus, ramis dichotomis.



*Ellis corall. 28. n. 5. t. 20. f. D.* Corallina cellifera  
minime creta ramosa, cellularis interstitiis ramibus rari  
conjugatis, oribus potentissimis superne ciliatis et al-  
ternatim prominentibus.

*Habitat in Oceano.*

chelata. 42. S. denticulis secundis ore subtus cornuto, ramis al-  
ternis.

*Ellis corall. 42. n. 9. t. 22. f. B.* Corallina cellifera  
minime ma ramota & falcata, cellularis simplicibus mu-  
ri cornu facie invicem insertis.

*Habitat in Oceano.*

angulata. 43. S. denticulis nullis, furculis simplicissimis filifor-  
mibus.

*Ellis corall. 43. n. 11. t. 22. f. C.* Corallina  
forma simplici non ramosa.

*Habitat in Oceano*

*Atque quasi ex pilis brevissimis, obtusis, caetera com-  
posita.*

polypina. 44. S. corpusculis concatenatis pellucidis hyalinis, pediculis  
subdigitata.

*Ellis corall. 25. n. 22. t. 13. f. B, C.*

*Habitat in O. Euxino, imprimis in M. Mediterraneo  
super plantas aquaticas*

*Resert Corallinum s. Hydram, at pellucida tota.*

309. HYDRA. Flos ore terminali circæo radiis.

*Stirps subradicata, glutinosa, apice  
florifera.*

Polypus. 1. H. nuda, tentaculis septenis capillaribus.

*En. suec. 1283.* Hydra vinctis, corpore æquali, tenta-  
culis corpore brevioribus.

*Amœn acad. 2. p. 63.* Polypus subcylindricus, ore ien-  
tis fenis radiato.

*Leuw. act. angl. 261. f. 1, 2, 3, 4. & 283. p. 1494.*

*Trembl. polyp. t. 10. f. 8, 9.*

*Baker. polyp. 1714. oct. t. 1-22.*

*Bæck Aët. Stockh. 1746. t. 6. f. 1, 2.*

*Ellis corall. t. 26. f. C.*



Schæff. monogr. 1754. t. 1. f. 1-15. & t. 2, 3.

Habitat in Aquis dulcibus.

...; videtur... tentaculis brevibus; gaudet;  
reliqui longioribus; an itaque sufficienter specie dis-

... penam aperiente Tremblæo, etiam ad Zoophyta  
mixtissima indigitabat.

H. nuda, tentaculis senis, involucro campanulato. †  
... ad. 2. ... Involutus campanulatus integer...

Beck Act. Stockb. 1746. t. 6. f. 5, 6.

Schæff. monogr. 1754. t. 1. f. 4.

Habitat ad Angliam.

Utrum ad ... aut L. ... sit referenda, ulterius  
inquirendum.

socialis. 3. H. nuda mutica torosa rugosa.

Rœs. inf. 3. p. 584. t. 95, 96, 94. f. 4.

Habitat in Aquis dulcibus.

torosa. 4. H. nuda tentaculata, stirpe solitario sensim ampliato,  
apertura ciliata.

Rœs. inf. 3. p. 594. t. . . f. 5, 6, 7, 8.

Habitat in Aquis dulcibus.

pyraria. 5. H. capsula mutica obovata, corpusculo tentaculis bi-  
geminis.

Rœs. inf. 3. p. 606. t. 98. f. d, e.

Habitat in Aquis dulcibus.

convallaria. 6. H. capsula mutica campanulata, corpusculo tentacu-  
lis bigeminis.

Rœs. inf. 3. p. 597. t. 97.

Habitat in Aquis dulcibus.

cratægaria. 7. H. capsula mutica globosa, corpusculo tentaculis bi-  
ginis.

Rœs. inf. 3. p. 604. t. 98. f. 3, 2: a.

Habitat in Aquis dulcibus.



opercula-8. H. capsula mutica ovali, corpusculo tentaculis ciliata. †

*Rœs. inf. 3. p. 609. t. 98. f. 5, 6.*

*Habitat in Aquis dulcibus.*

umbella-9. H. capsula ciliata globosa, corpusculo mutico. †

*Rœs. inf. 3. p. 674. t. 100.*

*Habitat in Aquis dulcibus.*

*Capsula punctis lineaque flexuosa notata.*

berberina-10. H. capsula mutica ovali, corpusculo mutico. †

*Rœs. inf. 3. p. 673. t. 99.*

*Habitat in Aquis dulcibus.*

digitalis-11. H. capsula mutica cylindrica semiclausa. †

*Rœs. inf. 3. p. 607. t. 98. f. 4.*

*Habitat in Europæ aquis dulcibus.*

*Ab orbe condito cimmeriis tenebris sepultos, hos mundi indivisibilis incolas, accensa face eduxit curæ plurimis affinibus oculatissimus Rœsel.*

310. PENNATULA. *Stirps* liber, subulatus: Basi lævi; Rachi pennata.

Os bafeos commune rotundum.

phosphorea-1. P. stirpe rachi utrinque pennato.

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 69.*

*Tournef. inst. 569. Muscus pennam referens.*

*Barr. rar. t. 1273, 1274. Penna marina.*

*Baub. hist. 3. p. 802. Penna marina.*

*Imperat. nat. 650. Penna marina.*

*Baub. pin. 363. Muscus pennæ similis.*

*Shaw. afr. app. 5. Fucus pennam referens.*

*Ginann. adriat. t. 55. f. 114. Penna marina.*

*Habitat in Oceano, fundum illuminans.*



- flosa. 2. P. stirpe rachi utrinque pennata: basi tentaculis duobus.  
*Bocc. mus. 1674. p. 286. t. 286.*  
*Habitat in M. Mediterranei Aiphiis.*  
*Setæ 2, rubræ, ad basin rachios pennatæ insertæ, ipsa-*  
*que rachi longiores.*
- Sagitta. 3. P. stirpe approximate pennato apice nudo.  
*Chin. Lagerstr. 42. f. 3.*  
*Habitat in Pelagi Lophiis Histrionibus, basi intra cu-*  
*tem inserta.*
- mirabilis. 4. P. stirpe filiformi, pinnis lunatis pectinatis remotis di-  
 stiche alternis.  
*Mus. Ad. Frid. 1. p. 96. t. 19. f. 4.*  
*Chin. Lagerstr. 49.*  
*Habitat in O. Norvegico.*

311. TÆNIA. Stirps liber, moniliformis, articula-  
 tus, membranaceus, articulis in-  
 tus floriferis.

Os ad singulum articulum proprium.

- Solium. 1. T. osculis marginalibus solitariis.  
*Amœn. acad. 2. p. 74. t. 1. f. 1.*  
*Fauv. succ. 1267. Tænia articulata teres.*  
*Tyson. act. angl. 1683. n. 146. t. 1. & 2. f. 2, 6, 10.*  
*Lumbricus latus.*  
*Andry lumbr. . . f. 5. Solium.*  
*Bewerw. thes. 202. t. 202. f. 3.*  
*Plater. prax. 993. Vermis cucurbitinus.*

F f f 2

Coulet.

TÆNIA altera eorum dicitur senescit, dum paritur ob altera, infinite procedens, uti  
 dicitur Graevius.

Tyson, Andry, Tulpius alique caput super isor ne ad extremitatem evasorem de-  
 poverunt, & se hoc vidisse dixerunt, sed juliant, cum cum articulis propria  
 eorum dicitur, & eorum eorum eorum eorum, quod caricidit eorum.

TÆNIÆ articuli, dicitur, Cucurbitini ordiant, verice ne eorum articulis  
 more matris, in infirmum, cum singulo articulo sit suum os, sua viscera. Tæ-  
 niæ hinc, in, eorum eorum, absque radice f. e., similitudine eorum eorum  
 S. eorum, latente intra unamquemque articulum animalculo cum sua fructi-  
 ficatione.



*Coulet. monogr. Lumbricus latus.*  
*Habitat in Intestivis Mammalium, Piscium.*

vulgaris. 2. T. oſculis lateralibus geminis. *Aman. acad. 2. p. 80.*  
*t. 1. f. 2.*

*Faun. ſvec. 1266. Tænia articulata plana.*

*Plat. præx. 992. Lumbricus latus ſ. Tænia vulgari-  
 norum.*

*Schenk. obſ. 111. p. 408. Tænia.*

*Spigel. monogr. Lumbricus latus.*

*Barthol. act. 1673. p. 148. t. 39.*

*Andry lumbr. t. 9. Tænia vulgaris.*

*Bewerw. theſ. 202. t. 202, f. Tænia.*

*Gadd. ſatagund. 88.*

*Habitat in omnibus limo repletis. Ego, Gadd; fre-  
 quens in Homine, Canibus.*

lata. 3. T. oſculis lateralibus ſolitariis. *Aman. acad. 2. p. 80.*  
*t. 1. f. 3.*

*Habitat in Mammalium inteſtinis.*

canina. 4. T. oſculis marginalibus oppoſitis. *Aman. acad. 2. p.*  
*81. t. 1. f. 4.*

*Ruyſch. obſ. 84.*

*Act. Stockh. 1747. t. 5. f. a.*

*Habitat in Mammalium inteſtinis.*

312. VOLVOX. *Corpus liberum, gelatinofum. ro-  
 tundatum, artubus deſtitu-  
 tum.*

*Proles ſubrotundi, nidulantes,  
 ſparſi.*

globator. 1. V. globofus.

*Backer. microſc. 322.*

*Rœſ. inſ. 3. p. 617. f. 1-3. Globo-Animal.*

*Habitat in Europæ Lacubus.*




*Volvendo seque rotando celeriter moriens absque artibus! vitipateris matris, nepotibus, pronepotibus, abnepotibus conspicuis intra animalculum mentis sumum.*

Chaos. 2. *V. polymorpho-mutabilis.* †

*Roes. inf. 3. t. 101. f. A-T.*

*Habitat in Aquis dulcibus.*

*Forma propria desitutus omnes anomalas assumens & citissime immutans, Prometheo inconstantior.*



APPEN-

---

Pauca hæc vidimus operum DEI,  
 Multa abscondita sunt majora his.

*Syrac. XLIII: 3.*

---



## APPENDIX.

- curcu-  
lioides. A. CERAMBYX thorace mutico: ocellis quatuor ni-  
gris elytrisque sesquialtero, antennis mediocribus.  
(pag 395. §. 44-45).  
*Habitat in Germania. Berg Isacson.*  
*Statura & Magnitudo Curculionis abietis. Thorax*  
*Elytraque nebulosa: strigis flavis, sparsis, undatis.*  
*Ocelli 4 supra thoracem, quorum posteriores mino-*  
*res, prioribus approximati; Elytra singula in medio*  
*Ocello atro iride lutea & anterieus ocello dimidiato*  
*minus evidenti.*
- Catax. A. PHALÆNA Bombyx elinguis, alis reversis flavis uni-  
coloribus: puncto flavo. (p. 500. §. 20-21).  
*Habitat in Germania. Berg Isacson.*  
*Statura & Magnitudo PH. B. Neustriæ, sed tota fla-*  
*va: alarum puncto centrali albo: margine obsolete ru-*  
*fo. Inferior Alarum margo reversus albus.*
- grammi-  
ca. B. PHALÆNA Bombyx spirilinguis, alis deflexis luteis:  
superioribus flavis nigro striatis; inferioribus fascia  
terminali nigra. (p. 506. §. 51-52).  
*Habitat in Germania. Idem.*  
*Statura PH. Jacobææ, sed paulo major. Alæ Superiores*  
*angustæ & fere lanceolatae, inferioribus pallidiores:*  
*Striis nigris subramosis; subtus versus apicem fusce-*  
*scentes. Inferiores saturate-luteæ: postice supra fa-*  
*scia latiuscula nigra & subtus fascia puncto majuscu-*  
*lo nigra. Abdomen luteum, quinquefarium nigro*  
*punctatum. Antennæ nigrae, angustissimæ, ut vix*  
*manifeste pectinatae.*
- rufina. C. PHALÆNA Bombyx spirilinguis cristata, alis rufis:  
fasciis subfuscescentibus: postica latiore; subtus rufe-  
scentibus. (p. 507. §. 57-58).  
*Habitat in Germania, ab eodem.*  
*Antennæ angustissimæ. Tentacula magis saturate rubra.*
- Hecta. D. PHALÆNA Noctua elinguis lutea, alis deflexis:  
superioribus fasciis duabus albidis obliquis punctato in-  
terruptis. (p. 508. §. 61-63).  
*De Geer inf. t. 7. f. 12.*  
*Habitat in Europa. Clerck.*





*Simillima* Phal. *Lupulinae*, sed dimidio minor. Antennæ similiter brevissimæ, luteæ. Alarum fascia e punctis majoribus. Synonymon itaque De Geerei ad Phal. 63. excludatur.

teutona- E. PHALÆNA *Geometra* pectinicornis, alis cinereo-gris-  
ria. fescentibus: striga ferruginea, posteriusque ordine trans-  
verso punctorum nigrorum. (p. 522. §. 149-150).  
*Habitat in Europa. Berg Isacson.*  
*Ordo punctorum etiam in inferiori pagina adest.*

rurinana. F. PHALÆNA *Tortrix* alis superioribus flavescens  
macula marginali posterius fusca. (p. 531. §. 213-214).  
*Habitat in Europa. Clerck.*  
*Alæ flavescens: Inferiores albidiores; Superiores in me-  
dio litura oblitterata obliqua & macula fusca ad mar-  
ginem exteriorem s. crassiorem, versus posteriora.*

uddman- G. PHALÆNA *Tortrix* alis cinereis macula ferruginea  
niana. marginis dorsalis transversa. (p. 513. §. 213-214).  
*Habitat in Europa. Clerck.*  
*Alæ Superiores cinereæ, parum nebulosæ, margine ex-  
teriore strigis nigris minimis; in medio marginis dor-  
salis macula transversa fusco-ferruginea.*

Planci. A. ASTERIAS stellata lobis quindecim echinatis. (p. 662.  
n. 8-9).  
*Column. phytob. app. t. 38. f. A. Stella marina pente-  
caidecatis.*  
*Habitat ad Goam Asiae.*




---

Ea quæ scimus sunt pars minima eorum,  
quæ ignoramus.

---




## EMENDANDA.

pag.	lin.		lege	operæ.	pag.	§.	I.	f. 1, 8	leg. f. 1, 3.
3	--	22	opere	operæ.	233	--	I.	296	-- 269.
4	--	2	interiore.	in interiori.	347	--	13.	t. 13	-- t. B.
41	§.	3	humores	humeros.	399	--	30.	3 9	-- 349.
101	--	ult.	garrulæ.	garruli.	353	--	59.	377	-- 357.
109	--	6	viridi	iride.	369	--	3.	4 9	-- 414.
148	--	5	robata	lobata.	373	--	40.	533	-- 535.
196	--	112	COECILIA	CÆCILIA.	378	--	11.	47	-- 474.
204	--	***	longiore	breviore.	381	--	32.	486	-- 486.
228	--	198	colubrina	colubrinus.	385	--	70.	483	-- 453.
238	--	4	vivipari	ovipari	419	--	5.	78	-- 901. f. 1.
242	--	175	Palpi	Palpi semicordati.	427	--	11.	1, 4	-- 1, 4.
343	--	206	Libella	Libellula.	489	--	r. 5.	B 5.	-- I. B. 5.
		219	Murella	Mutilla.	490	--	6.	pag. 9.	-- pag. 10.
253	--	54	opacus	auratus.	504	--	40.	2. 4. 2.	-- 2. 4. 1.
359	--	39	Fn. sv. 539	deleatur.	520	--	133.	1. 6 8.	-- 1. B. 8.
374	--	54	cæruleo	deleatur.	522	--	145.	24	-- 42.
408	--	3	gnita	ignita.	775	--	621.	t. 8. f. D.	-- t. 7. f. C.
431	--	38	aptera	apterus.					
508	--	63	DeGeer citatio	deleatur.					
510	&	511	feticornis	spirilinguis.					
645	--	269	MYES	MYA.					
648	--	247	spithama	spithamea.					
679	--	62	intricatum	aculeatum.					
703	--	199	fareta	farcta.					
720	--	297	testacea	testaceo.					

## ADDENDA.

- 209 §. 40 Pet. gaz. I. t. 1. f. 1.
- 346 -- 9 Fn. svec. 342.
- 371 -- 27 Fn. svec. refer ad 28.
- 390 -- 11 Frisch inf. 13. t. 8.
- 46 -- 9 Fn. svec. 9.
- 367 -- 20 hæc a n. 31. figuris distingui nequit, ideoquo synonyma utrisque communia, forte ambæ tantum sexu differunt.
- 379 -- 15 & 49. adeo similes, ut synonyma utrisque communia; esse tamen distinctos, nec sexu tantum differentes, scutellum pluresque notæ suadent.







Greta Macbeth™ ColorChecker Color Rendition Chart