

1301. *Clytus plebejus* (*Callidium*).

- FABR. *Ent. syst.* tom. II, p. 334, n° 7.
 Ejusd. *Syst. Eleuth.* tom. II, p. 349, n° 15.
 OLIV. *Ent.* tom. IV, 70, p. 49, n° 67, pl. 6, fig. 72.
 DE CASTELN. et GORY, *Monogr. des Clyt.* p. 99, pl. 19, fig. 119.
 MULST. *Hist. nat. des col. de France, Longic.* p. 85, n° 10.
Leptura rustica, RAZOUM. *Hist. nat.* tom. I, p. 155, n° 60.
Cerambyx figuratus, SCOP. *Ent. carn.* p. 55, n° 176.

Cette espèce, que je n'ai rencontrée qu'une seule fois, a été prise à la fin de mai, sur les fleurs de la carotte sauvage, aux environs de Bougie.

1302. *Clytus glaucus*¹. (Pl. 42, fig. 1.)

- FABR. *Syst. Eleuth.* tom. II, p. 351, n° 22.
Callidium glaucum, ejusd. *Ent. syst.* tom. II, p. 336, n° 73.
 OLIV. *Ent.* tom. IV, 70, n° 56, pl. 6, fig. 68.
Clytus griseus, DE CASTELN. et GORY, *Monogr. des Clyt.* p. 80, n° 177, pl. 15, fig. 92 bis.

Je n'ai trouvé qu'une seule fois cette espèce, que j'ai prise dans les premiers jours de juin, sur les chardons, près de Tixerain, aux environs d'Alger.

Pl. 42, fig. 1. *Clytus glaucus*, grossi, 1^a la grandeur naturelle, 1^b une antenne.

1303. *Clytus trifasciatus*.

- FABR. *Syst. Eleuth.* tom. II, p. 351, n° 24.
 DE CASTELN. et GORY, *Monogr. des Clyt.* p. 63, pl. 12, fig. 63.
 MULST. *Hist. nat. des col. de France, Longic.* p. 87, n° 12.
Callidium trifasciatum, FABR. *Ent.* tom. II, p. 336, n° 75.
 PANZ. *Faun. Germ. fasc.* 112, pl. 2.

Habite les environs de Constantine; je n'ai rencontré que très-rarement cette espèce, que j'ai prise tout à fait à la fin de mai; elle se tient le long des tiges des chardons.

1304. *Clytus sexguttatus*. (Pl. 42, fig. 2.)

Long. 9 à 12 millim. $\frac{1}{2}$, larg. 2 millim. $\frac{1}{2}$ à 4 millim.

C. capite rufo, subtilissimè granario; thorace fuscorufescente, sat subtiliter granario, anticè posticèque flavo-piloso; elytris sat fortiter granariis, nigro subrubrescentibus, utrinque flavo trivittatis; abdomine sternoque nigris, albido-subflavescente maculatis marginatisque; pedibus fuscorufescentibus, flavescente-pilosis.

Il ressemble un peu au *C. trifasciatus* de Fabricius, et vient se placer après cette espèce.

¹ Il y a probablement erreur pour la localité assignée à cette espèce par Fabricius et Olivier.

La tête est brune, très-finement chagrinée, revêtue de poils d'un blanc jaunâtre, avec le sillon longitudinal placé entre les antennes, très-profondément marqué. Les antennes sont d'un ferrugineux assez foncé, couvertes d'une tomentosité jaunâtre. Le thorax est d'un brun ferrugineux, assez finement chagriné, et parsemé, à ses parties antérieure et postérieure, de poils jaunâtres, courts, serrés, qui forment deux bandes transversales assez bien prononcées. L'écusson est entièrement caché par des poils d'une belle couleur jaune. Les élytres, plus fortement chagrinées que le thorax, sont d'un noir très-légèrement teinté de rougeâtre, et ornées de chaque côté de trois bandes transversales d'une belle couleur jaune, dont la postérieure terminale est beaucoup plus petite. Tout le corps en dessous est d'un noir foncé assez brillant avec le sternum bordé, sur ses parties latérale et postérieure, de blanc très-légèrement jaunâtre; un peu au-dessus du trochanter de la seconde paire de pattes, on aperçoit une tache arrondie de même couleur; enfin, tous les segments abdominaux sont largement bordés postérieurement de blanc très-légèrement jaunâtre. Les pattes sont d'un blanc roussâtre, revêtues de poils jaunâtres.

Se trouve dans l'Est et dans l'Ouest de nos possessions; je l'ai pris en mai dans les environs d'Alger, et les individus que je possède de la province d'Oran m'ont été donnés par M. Warnier, qui a rencontré ce joli *Clytus* dans les environs de Tlemsén.

Pl. 42, fig. 2. *Clytus sexguttatus*, grossi, 2^a la grandeur naturelle, 2^b une mâchoire, 2^c une mandibule, 2^d une patte de la dernière paire.

Genus *CARTHALLUM*, Mulst. *Callidium*, Fabr.

1305. *Cartallum ruficolle* (*Callidium*).

FABR. *Ent. syst.* tom. II, p. 319, n° 4.

EJUSD. *Syst. Eleuth.* tom. II, p. 334, n° 4.

OLIV. *Ent.* tom. IV, 70, p. 19, n° 22, pl. 22, fig. 27.

MULST. *Hist. nat. des col. d'Europe*, Longic. p. 96, n° 1.

Très-commun dans l'Est et dans l'Ouest sur les Carduacées, pendant les mois de mai et de juin; cette espèce varie excessivement pour la taille. Environs d'Oran, d'Alger, de Constantine, de Bône et du cercle de Lacalle.

Je possède une variété que j'ai trouvée dans les environs de Milah (province de Constantine), et chez laquelle le thorax est entièrement noir; cette variété n'est pas très-rare.