

la locomotion différent aussi; ainsi, au lieu d'être entièrement d'un jaune ferrugineux, comme dans *O. oculata*, l'extrémité des tibias, ainsi que tous les articles des tarses, sont d'un brun foncé.

Cette jolie espèce est assez rare; je n'en ai rencontré que deux individus, que j'ai pris vers le milieu de mai sur des fleurs d'aubépine, près les marais du lac Tonga, aux environs du cercle de Lacalle.

Pl. 42, fig. 9¹. *Oberoa maculicollis*, grossie, 9^e la grandeur naturelle, 9^e la lèvre inférieure, 9^e une patte de la dernière paire.

1326. *Oberoa mauritanica*. (Pl. 42, fig. 10.)

Luc. Ann. des sc. nat. 2^e série, tom. XVIII, p. 188.

Elle est voisine de l'*O. pupillata*, près de laquelle cette espèce vient se placer.

Cette *Oberoa*, que je n'ai pas rencontrée, m'a été communiquée par M. L. Buquet; elle a été prise dans les environs d'Alger, par M. Gérard.

Pl. 42, fig. 10². *Oberoa mauritanica*, grossie, 10^e la grandeur naturelle, 10^e une antenne.

Genus *PHYTÆCIA*, Mulst. *Saperda*, Fabr. *Cerambyx*, Sch.

1327. *Phytæcia Guerinii* (*Saperda*). (Pl. 42, fig. 11.)

DE BAUME, Rev. zool. par la soc. Civ. 1840, p. 278.

Saperda glauca (femelle), ENIGUS, Reiz. in der Regenz. Algier, von M. Wagner, tom. III, p. 189, n^o 43, pl. 7. *Saperda cinerea*, GONY, Mag. de zool. 1841, p. 9, pl. 74.

Ce n'est que dans l'Ouest, aux environs d'Oran, pendant les mois de mars et avril, que j'ai rencontré cette espèce, remarquable par la différence qui existe entre les deux sexes; elle est assez rare, et je l'ai prise quelquefois dans les tiges des chardons, les deux sexes réunis.

Pl. 42, fig. 11³. *Phytæcia Guerinii*, grossie, 11^e la grandeur naturelle, 11^e une antenne, 11^e une patte de la première paire.

1328. *Phytæcia Warnieri*, Luc. (Pl. 43, fig. 1.)

Long. 20 millim. larg. 6 millim.

P. atra; capite thoraceque punctatis, albido-pilosis, hoc utrinque vittâ griseo-virescente ornato; elytris punctatis, cinerescens-pilosis, marginibus griseo-virescentibus; corpore pedibusque punctatis, griseo-virescentibus-pilosis.

¹ A la légende de la planche 42, au lieu de 8, lisez: 9.

² A la légende de la planche 42, au lieu de 9, lisez: 10.

³ A la légende de la planche 42, au lieu de 10, lisez: 11.

Noire. La tête, assez forte, large, parsemée de points assez gros, placés çà et là, est revêtue de points blancs, courts et très-serrés. Les antennes sont peu allongées, épaisses et entièrement couvertes d'une tomentosité courte, très-serrée, d'un gris verdâtre. Le thorax est court, assez fortement ponctué, parsemé de poils d'une belle couleur blanche, et orné en dessus, de chaque côté, d'une large bande longitudinale formée par des poils d'un gris verdâtre. L'écusson est entièrement couvert de poils blancs. Les élytres, beaucoup plus larges que le thorax, avec les angles huméraux saillants, arrondis et fortement ponctués, sont entièrement couvertes de poils d'un gris cendré clair, et bordées, de chaque côté, par des poils d'un gris verdâtre; parmi ces poils, qui sont très-serrés, on aperçoit, sur le bord externe des élytres, des points noirs bien marqués et disposés en ligne longitudinale. Tout le corps, en dessous, ainsi que les pattes, est noir, ponctué et entièrement couvert de poils d'un gris cendré verdâtre.

Cette espèce, qui vient se placer entre les *Phytæcia Guerinii* et *vittigera*, ne pourra être confondue avec ces dernières, à cause de sa forme, qui est beaucoup plus large, des bandes d'un gris verdâtre qui ornent le thorax, et de ses élytres, qui sont beaucoup plus larges et moins rétrécies postérieurement.

Cette espèce, que j'ai dédiée à M. Warnier, a été rencontrée par ce chirurgien dans les environs de Tiemsén; elle habite aussi l'Est de nos possessions, car j'ai trouvé en mai, aux environs de Constantine, sous les pierres, une vieille femelle de cette *Phytæcia*, qui probablement avait passé l'hiver, puisqu'elle était presque entièrement dépourvue de poils.

Pl. 43, fig. 1. *Phytæcia Warnieri*, grossie, 1^e la grandeur naturelle, 1^e une patte de la seconde paire.

1329. *Phytæcia vittigera* (*Saperda*). (Pl. 43, fig. 9.)

FABR. Syst. Eleuth. tom. II, p. 318, n^o 3.

SCH. Syn. ins. tom. III, p. 400, n^o 212.

MULST. Hist. nat. des col. de France, Longic. p. 200, n^o 1.

Phytæcia maculata (var. A), ejusd. op. cit. p. 200.

Se trouve assez communément pendant les mois de mai, aux environs d'Oran, d'Alger, de Bône et de Constantine; je l'ai rencontrée aussi dans l'oasis de Milah et aux environs de Sétif; cette espèce se plait sur les chardons.

M. Mulsant, dans son Histoire naturelle des coléoptères de France, indique cette espèce comme ayant été prise en France; mais n'y aurait-il pas par hasard erreur dans la localité assignée par cet auteur à cette *Phytæcia*?

Pl. 43, fig. 9. Une mâchoire, 9^e une mandibule, 9^e la lèvre inférieure de la *Phytæcia vittigera*.

1330. *Phytæcia punctum*.

MENEZES. Voy. au Cam. p. 227, n^o 1033.

MULST. Hist. nat. des col. de France, Longic. p. 203, n^o 4, pl. 2, fig. 7.

Elle a été prise, dans les environs de Tiemsén, par M. le docteur Warnier, qui n'a rencontré que quelques individus de cette espèce.