

Cette espèce n'est pas très-commune, surtout la femelle; elle habite les environs de Philippeville et du cercle de Lacalle, où je l'ai rencontrée pendant les mois de mai et de juin; cette Lepture se plaît dans les lieux boisés et humides.

Pl. 43, fig. 10. *Leptura oblongo-maculata* (femelle), grossie, 10^a la grandeur naturelle, 10^b une mâchoire, 10^c une mandibule, 10^d la lèvre inférieure.

1345. *Leptura Fontenayi*.

MULST. *Hist. nat. des col. de France, Longic.* p. 271, n° 4, pl. 3, fig. 8.

M. Mulsant, en décrivant cette espèce, n'en a connu que le mâle; quant à la femelle, elle est tout à fait semblable à ce dernier, seulement elle est plus grande et surtout beaucoup plus épaisse.

Cette Lepture varie pour la couleur de son thorax, car j'ai rencontré des individus des deux sexes chez lesquels cet organe est de la même couleur que les élytres.

Cette espèce, que j'ai prise pendant les mois de mai et de juin, habite les environs du cercle de Lacalle, et se plaît dans les bois marécageux du lac Tonga; on la rencontre aussi dans les environs de Constantine et de Bougie.

1346. *Leptura melas*, LUC. (Pl. 43, fig. 11.)

Long. 12 à 14 millim. larg. 5 millim. à 5 millim. $\frac{1}{2}$.

L. atro-nitida; capite, thorace fortiter punctatis, scutello glabro, nigro-nitido, vix punctulato, elytrisque sat fortiter punctatis; corpore pedibusque subtiliter punctulatis, albido-pilosis.

D'un noir brillant; la tête est plus profondément chagrinée que dans la *L. scutellata*, et présente de petits poils soyeux, assez allongés, blanchâtres et placés çà et là. Les palpes maxillaires et labiaux sont noirs, avec la naissance de chaque article ferrugineuse. Les antennes sont noires, finement ponctuées, avec les trois premiers articles, et la naissance du quatrième d'un noir brillant, et ceux qui suivent tomenteux. Le thorax est parsemé de points plus forts et plus profondément marqués que dans la *L. scutellata*, et chez les quatre individus que j'ai rencontrés, cet organe présente une petite saillie longitudinale lisse et assez bien marquée. L'écusson est très-petit, à peine ponctué, et n'est point garni par un duvet épais d'un jaune doré ou d'un blanc d'argent, comme cela se voit chez la *L. scutellata*. Les élytres paraissent un peu plus étroites que celles de la *L. scutellata*; elles sont d'un noir brillant, avec les points que ces organes présentent un peu plus forts, plus profondément marqués, et un peu moins serrés que dans la *L. scutellata*; il est aussi à noter que tous ces points ne présentent pas de poils, comme cela se voit chez notre espèce française. Le dessous du corps, ainsi que les pattes, est d'un noir brillant, finement ponctué, et revêtu de poils blancs, courts et peu serrés.

La femelle ressemble au mâle; seulement elle est un peu plus courte et surtout beaucoup plus épaisse.

Cette espèce a la plus grande analogie avec la *L. scutellata*; mais elle en diffère par la couleur, qui est d'un noir plus brillant; par les points de son thorax et de ses élytres, qui sont un peu plus forts et plus profondément marqués, et enfin par l'écusson, qui est dépourvu de poils d'un jaune doré ou d'un blanc d'argent, comme cela se voit dans la *L. scutellata*.

J'ai rencontré cette Lepture, vers le milieu de juin, sur les fleurs de la carotte sauvage, dans les bois du lac Houbeira; environs du cercle de Lacalle.

Pl. 43, fig. 11. *Leptura melas*, grossie, 11^a la grandeur naturelle, 11^b une antenne, 11^c une patte de la troisième paire, 11^d une élytre grossie.

QUATRIÈME FAMILLE.

LES CHRYSOMÉLIENS.

PREMIÈRE TRIBU.

LES EUPODES.

Genus *DONACIA*, Fabr. *Leptura*, Linn. *Stenocorus*, Geoffr.

1347. *Donacia polita*.

KUNZ. *Nov. act. Halens.* 11, 4, p. 29.

LACORD. *Monogr. des col. subpent. de la fam. des Phytoph.* p. 127, n° 18.

C'est dans les premiers jours de février, aux environs du cercle de Lacalle, sur les roseaux qui se trouvent sur les rives du lac Houbeira, que j'ai pris cette espèce, dont je n'ai rencontré qu'un seul individu.

1348. *Donacia typhæ*.

BRAHM. in *Ahrens. nov. act. Halens.* 1, 3, p. 37, 19.

KUNZ. *ibid.* 11, 4, p. 47, 19.

GYLLENH. *Ins. Suec.* tom. IV, p. 680, 13-14.

STEPH. *Illustr. of Brit. ent.* tom. IV, p. 276, 20.

LACORD. *Monogr. des col. subpent. de la fam. des Phytoph.* p. 162, n° 40.

Trouvé à la fin de mars sur des plantes aquatiques qui se trouvent aux bords d'une petite mare située sur la route de Lacalle à Bône.