

Elle ressemble un peu à la *P. punctum*, dans le voisinage de laquelle elle vient se placer. Noire; la tête, dans les individus qui n'ont subi aucun frottement; est revêtue de poils blancs, assez allongés, et parsemée de points arrondis, assez forts, peu profondément marqués et serrés. Les antennes sont noires, allongées, filiformes et finement ponctuées. L'écusson est entièrement lisse. Le thorax est allongé, légèrement rétréci à sa partie postérieure et parsemé de points semblables à ceux de la tête. Les élytres sont assez allongées, rétrécies dans leur partie médiane, avec leur angle huméral assez saillant: dans leur partie médiane, elles présentent une côte longitudinale assez prononcée, et sont fortement déprimées de chaque côté de la suture; elles sont ponctuées, mais les points qui forment cette ponctuation sont plus forts, plus profondément marqués et moins serrés que ceux de la tête. Tout le corps, en dessous, est de même couleur qu'en dessus, finement ponctué et parsemé de poils d'un gris cendré-clair. Les pattes sont rouges, avec la naissance des tibias, l'extrémité des fémurs dans les seconde et troisième paires de pattes seulement, et tous les tarses d'un brun assez foncé.

J'ai rencontré cette espèce, pendant les mois de mai et de juin, dans les environs d'Alger et de Philippeville; elle habite aussi les environs de Tlemsèn, car j'en possède plusieurs individus qui ont été pris autour de cette ville par M. Warnier. Cette Phytécie n'est pas très-commune.

Pl. 43, fig. 6. *Phytæcia erythrocnema*, grossie, 6<sup>e</sup> la grandeur naturelle, 6<sup>b</sup> une antenne.

1338. *Phytæcia malachitica*, Luc. (Pl. 43, fig. 7.)

Long. 8 millim. larg. 2 millim.  $\frac{1}{2}$ .

*P. fuscorufescens*, omninò virescente-tomentosa; capite laxè subtiliterque punctulato; thorace subtilissimè granario, in medio levissimè carinato; elytris elongatis, angustis, subtilissimè punctulatis; corpore pedibusque fuscorufescentibus, virescente-tomentosis.

D'un brun roussâtre et entièrement recouvert par un duvet serré, assez court, d'un beau vert clair. La tête, parsemée de points fins et très-peu serrés, présente, outre le duvet dont elle est revêtue, des poils testacés, très-allongés et peu serrés. Les yeux sont noirs; les organes de la manducation sont d'un brun roussâtre et hérissés de poils verdâtres, assez courts et peu serrés. Les antennes sont d'un brun roussâtre, avec le duvet verdâtre dont elles sont recouvertes plus fin et plus serré que celui de la tête. Il est aussi à noter qu'à l'extrémité de chaque article on aperçoit quelques poils d'un jaune testacé, à l'exception cependant du premier article, où ces poils sont en plus grand nombre. Le thorax, très-finement chagriné, revêtu de longs poils testacés, présente dans sa partie médiane une petite saillie longitudinale très-légèrement marquée. L'écusson est de même couleur que la tête et le thorax. Les élytres, beaucoup plus larges que le thorax à la base, sont allongées, étroites et parcourues longitudinalement par des points fins, serrés, qui forment sur ces organes des lignes longitudinales assez rapprochées, et que l'on voit un peu à travers le duvet verdâtre, qui paraît un peu moins serré que celui de la tête et du thorax. Tout le corps en dessous est de même couleur qu'en dessus; il en est de même des organes de la locomotion.

tion, qui, outre le duvet verdâtre dont ils sont revêtus, ainsi que le dessous de l'abdomen, sont hérissés de poils soyeux, assez allongés, peu serrés, testacés; il est aussi à noter que, dans ces derniers organes, les griffes des tarse sont d'un ferrugineux clair.

Cette jolie petite espèce, qui n'avait encore été signalée que comme se trouvant en Sicile, habite les environs d'Arzew, où elle a été rencontrée en mai par M. Degenès, capitaine de corvette.

Pl. 43, fig. 7. *Phytæcia malachitica*<sup>1</sup>, grossie, 7<sup>a</sup> la grandeur naturelle, 7<sup>b</sup> une antenne.

---

## QUATRIÈME TRIBU.

### LES LEPTURIENS.

---

#### Genus *VESPERUS*, Serv. *Stenocorus*, Fabr. Oliv.

##### 1339. *Vesperus luridus* (*Stenocorus*).

ROSSI, *Faun. etrusc. Mantiss.* tom. II, *Append.* p. 96, pl. 3, fig. 1.

MULST. *Hist. nat. des col. de France, Longic.* p. 216, n° 2 (mâle), 218 (femelle), pl. I, fig. K (femelle).

*Vesperus Solieri*, GERM. *Faun. Europ.* fasc. 18, pl. 20 (femelle).

DE CASTELN. *Hist. nat. des ins.* tom. II, p. 409, n° 1 (mâle et femelle).

Je n'ai rencontré qu'une seule fois cette espèce, que j'ai prise le soir près le feu d'un bivac, dans le douair de Djab-Allah. Milieu de novembre. Environs du cercle de Lacalle. La femelle, qui m'a été communiquée par M. L. Buquet, a été prise dans les environs d'Alger.

---

#### Genus *STRANGALIA*, Serv. *Leptura*, Fabr.

##### 1340. *Strangalia aurulenta* (*Leptura*).

FABR. *Syst. Eleuth.* tom. II, p. 364, n° 57.

PANZ. *Faun. Germ.* fasc. 90, pl. 5 (mâle).

OLIV. *Ent.* tom. IV, n° 73, p. 18, 21, pl. 3, fig. 31 (femelle).

SCH. *Syn. ins.* tom. III, p. 495, n° 64.

MULST. *Hist. nat. des col. de France, Longic.* p. 251, n° 1.

*Leptura 4-fasciata*, ROSSI, *Faun. etrusc.* tom. I, p. 161, n° 401.

Cette espèce est assez rare en Afrique; elle a été trouvée par mon collègue M. Durieu de Maisonneuve sur les fleurs de l'*Echinops spinosus*, dans une excursion que nous fîmes, vers le milieu de juin, sur les bords des marais du lac Tonga, aux environs du cercle de Lacalle.

<sup>1</sup> Dahl, in *Cat. Sturm.* p. 263 (inédit).