

coupe générique doit être conservée dans le domaine de la science (1), et qu'il doit en être de même pour le genre *Acinipe* de M. le docteur Rambur, quoique ce genre soit rapporté par M. Brisout à celui des *Acri-dium*.
(G. M.)

DIAGNOSES d'espèces nouvelles qui seront décrites et figurées prochainement.

Cardium Loroisii, Huppé. — Testa subtrapezia, turgida, tenui, longitudinatiter obsolete sulcata; luteo-aurantiaca; umbonibus tumidis, incurvis lœvibus violascentibus, lunula anoque striis minutissimis concentricis vix impressis, ano cordato elato pallido tribus sulcis majoribus cincto; rima crenulata intus alba. — L. 62; l. 65; épaiss. 55 mill. — Hab. ?

Pyrula Penardi, Montrouzier. — Testa ventricosa, ficoidea, ampullacea, tenui, basi striata, transversim scabriuscula, squalide alba, subumbilicata; anfractibus turgidis; spira exsertiuscula; cauda brevi; columella excavata, reflexa, foliata. Canali subrostrato, anterius reflexo; apertura ovato-oblonga, intus alba, basi rosea. — L. 60; l. 43 mill. — Hab. Nouvelle-Calédonie.

Lucanus pentaphyllus, Reiche. — Elongatus, convexiusculus, fusco-piceus; elytris, mandibulisque fusco-castaneis. Caput nitidulum; carina frontali parum perspicua, occipitali parum elevata; mandibulis capite sesqui longioribus, rotundatim curvatis; gracilibus, apice furcatis, medio unidentatis, denticulisque 4-6 ante medium 1-2 pone medium tuberculiformibus, obtusis, haud quadrato truncatis instructis; antennarum capitulo in utroque sexu pentaphyllo. Thorax nitidulus, transversus, subquadratus, angulo laterali rotundato. Scutellum, elytra, pectus, abdomen, pedesque ut in Luc. Cervo. — Hab. Gallia meridionali circâ Telonem et Portum veneris.

Prionus Lefebvrei, de Marseul. — Nigro brunneus, nitidulus, capite sat grosse punctatus, antennis apice rufescens, prothorace transverso, antice latiore basi marginato, utrinque subsinuato, lateribus acute bispinoso, supra lœvigate pace punctulato; elytris

(1) Elle a été conservée aussi par M. H. Fischer, dans un travail très-consciemment fait, ayant pour titre : *Orthoptera euro-paea*, p. 245 (1853).

convexis, strigosulis angulo suturali spinoso, margine inflexo ferrugineo. — L. 33; élytr. 23; l. 9 mill. — Hab. la Syrie.

Prionobius cedri, de Marseul. — Elongatus, parum convexus, brunneus; fronte varioloso punctato, inter oculos longitrussum sulcato: prothorace brevi transverso, basi apiceque marginato, supra grosse et inaequaliter punctato, in medio spatio lœvigate, lateribus inflexis arcuatim dilatatis spinosis; scutello marginato, basi punctato; elytris rugosis apice obtusis, obsolete 4 costatis; pedibus compressis, inermibus, tarsis subtus canaliculatis. — L. 38; élytr. 30; l. 13. — Hab. la Syrie.

Xenodorum Bonvouloiri, de Marseul. — Nigrum, flavo-hirtum, apice nigro brunneis; capite prothoraceque rugoso punctatis, hoc 5, tuberculis lœvibus (2, 3); elytris testaceis, vitta media transversa, apiceque nigris, undique at parte testacea minus dense punctatis. — L. 14; élytr. 9; l. 5 mill. — Trouvé à Paris, et provenant probablement des bois exotiques de l'exposition universelle.

Doreadion Amorii, de Marseul. — Niger, nitidus, pube grisea vestitus, supra parce punctatus; fronte sulcata; pronoto utrinque obtuse dentato; elytris tenuiter costatis oblongo ovalibus, apice singulatim rotundatis; tibiis apice bispinosis, intermediis extus obtuse dentatis, fulvo-hirtis. — L. 13; l. 4 1/2. — Hab. l'Espagne.

Triammatus Saundersii, Chevrolat. — Alatus, cinereus. Elytris nigro-flavoque variegatis, basi tuberculatis. Capite thorace pecto-reque infra in lateribus albidis; antennis basi cinereis, articulis tribus nodosis apice elongatis nigris. — L. 32; l. 11 mill. — Hab. Borneo.

TABLE DES MATIÈRES.

H. AUCAPITAINE. — Notice sur le Mouflon à manchettes.	5
J.-R. BOURGUIGNAT. — Aménités malacologiques.	7
MARCEL DE SERRES. — Note sur le genre Dreissenæ.	21
GUERRIN-MÉNEVILLE. — Note sur la Muscardine.	26
Académie des Sciences de Paris.	52
Mélanges et nouvelles.	54