

Il ressemble au *Callidie pulvérulent*, mais il est beaucoup plus court. Les antennes sont d'un fauve obscur, de la longueur du corps. La tête est d'un fauve brun, couverte de poils cendrés. Le corcelet est arrondi, d'un fauve brun, couvert d'un duvet cendré. Les élytres sont ponctuées, d'un fauve brun, couvertes d'un duvet cendré, avec une ligne longitudinale, au milieu, obscure. Le dessous du corps est testacé. Les pattes sont pâles.

Il a été trouvé à Saint-Domingue, par le C. Palissot-Beauvois.

98. *CALLIDIE abdominal*.

*CALLIDIUM abdominale*. Pl. 8 fig. 103. a. b.

C. noir; corcelet et abdomen fauves; élytres ponctuées, violettes.

C. nigrum, thorace mutico abdomineque rufis, elytris punctatis violaceis.

Differt a *Callid. ruficollis*, corpore dimidio minore, antennis nigris, thorace mutico suprâ subbituberculato, abdomine rufo.

Il ressemble au *Callidie ruficollis*, mais il est une fois plus petit. Les antennes sont noires, un peu velues, presque de la longueur du corps. La tête est noire. Le corcelet est fauve, inégal, sans épines et sans tubercules sur les côtés. Les élytres sont ponctuées, violettes. La poitrine et les pattes sont noires. L'abdomen est fauve.

Je l'ai trouvé au midi de la France, sur différentes fleurs.

99. *CALLIDIE parsemé*.

*CALLIDIUM irroratum*. Pl. 8. fig. 104. a. b.

C. corcelet arrondi, ponctué, fauve; élytres moitié fauves, moitié bleues, avec quelques points irréguliers, blancs.

C. thorace rotundato punctato rufo, elytris cæruleis basi rufis punctis albis sparsis.

Parvum. Antennæ nigræ, basi rufæ, longitudine corporis. Corpus antice rufum postice cæruleum. Thorax rotundatus punctatus. Elytra valdè punctata, pilis albis maculata. Pedes nigri femoribus rufis.

Il est petit. Les antennes sont de la longueur du corps, noires,