

58. ATTELABVS *senex.*

Insecta.

*Magnitudo* infra. Attel. formicarium, totus aterrimus, lanugine copiosa, sed fugaci vestitu, quae vel in toto corpore atra, vel in capite thoraceque cana. In femina postici pedes maiores, arcuati. *Antennae* extorsum vix crassiores. *Thorax* subglobosus.

Haeret in Spicis Elymi arenarii.

59. CERAMBYX *hieroglyphicus.*

*Forma* C. scalaris, quo maior. Subtus coerulecenti canus; pedes polline coerulescunt; antennae coerulecenti, nigroque annulatae. Caput et thorax magis lanuginosa, area magna longit. atra, et thoracis utrinque puncto. *Elytra* glabra, nigra: *Sutura* coerulecenti-alba, ramis utrinque quinis, obtusis, quorum priores et ultimus transuersi, tertius radice duplex antrorum recurvatus, quartus reclinatus. Praeterea puncta exterius sparsa quinque.

Occurrit in Sylvis Sibiriae borealioris.

60. CERAMBYX *perforatus.*

*Magnitudo* et forma praecedentis, supra puluere albidus, subtus lanugine flavius. *Antennae* coerulecentes, nigro annulatae. *Thorax* nigro punctatus, utrinque ductu nigro. *Elytra* puluere albida duellu atro ab axilla ad medium, punctisque a dorso per longitudinem dispositis quinis, aterrimis, ut quasi foramina appareant. *Punctum* unicum extra stigam axillarem.

Cum praecedente occurrit rarius.

61. CERAMBYX *Glycyrrhizae.*

*Forma* C. pedestris, sed saepius maior. *Antennae* et quibusdam caput picea; pedes cano irrorati testacei. *Corpus* subtus nigrum, sed totum polline albo irroratum. Vertex atque thorax area aterrima albo marginata, quam diuidit linea nivea, per suturam elytrorum continuata. *Elytra* aterrima, opaca, exterius carinata, fasciis singula duabus, lineaque albis longitudinalibus. In quibusdam albedo pallidus, elytraque a dorso nigro conspurcata, velut a Muscis. Apterous.