

1 Corps non garni de longs poils dressés.

2 Elytres irrégulièrement marqués de petites plaques lisses sur un fond de duvet gris fin et assez serré, ces plaques quelquefois peu nettes.

3 Prothorax plus ou moins arrondi au milieu et plus ou moins finement rugueux, élytres sans petite épine à l'angle sutural, plaques lisses petites, plus nombreuses aux épaules. Long. 20-28, *sericeus* Fabr.

3' Prothorax non arrondi au milieu, grossièrement rugueux, élytres avec une petite épine à l'angle sutural, plaques lisses nombreuses aux épaules, un peu plus larges que chez le *sericeus*. L. 18 mil. ? Algérie *Abeillei* n. sp.

2' Elytres sans plaques lisses mais garnis de mouchetures grises ou blanchâtres très variablement disposées, assez courtes et rapprochées.

L. 11-23 mil. *nebulosus* Oliv., *cinereus* Vill.

1' Corps garni de longs poils en dessus de la pubescence courte ordinaire.

4 Poils un peu inclinés en arrière, prothorax ordinairement allongé.

5 Elytres peu profondément ponctués, couverts d'un duvet gris (sur fond un peu noir-rougeâtre) régulièrement continu et comme parsemé de nombreux petits points dénudés; prothorax généralement au moins aussi long que large, souvent plus long. L. 11-18 mil. *griseus* Fabr.

4' Poils ordinairement dressés plus ou moins droits, prothorax globuleux et plus ou moins court.

5' Elytres assez profondément ponctués, à fond glabre garni de mouchetures de duvet gris, souvent un peu jaunâtre, disposées comme chez le *cinereus* assez irrégulièrement et souvent d'une façon assez espacée. Prothorax souvent plus large ou généralement aussi large que long.

L. 9-15 mil. *affinis* Luc.

A' Corps rouge et jaune, non revêtu de duvet gris sur toute la surface.

L. 15-20 mil. *pallidus* Oliv.

Chez cette espèce les élytres présentent ordinairement une large bande brune transversale près de l'extrémité et une mince trainée de duvet gris en dessus, cette fascie remontant plus ou moins nette ensuite sur la suture et se prolongeant quelquefois en arrière en dessinant comme une croix.

H. Abeillei est revêtu d'un duvet gris fin, le fond est bien rougeâtre, le premier article de ses antennes est très long, son écusson est bien arrondi, les

pattes sont courtes, la tête est sillonnée au milieu entre les yeux, et le prothorax offre au milieu comme un commencement de tubercule large. J'ai dédié cette nouvelle espèce à un des rares entomologistes bien connus, assez désintéressés pour ne pas craindre de communiquer à l'occasion leurs précieux insectes et le concours de leur savoir plus précieux encore.

Je m'étonne que l'*affinis* soit réuni sur les derniers catalogues au *griseus*, l'entomologiste sous l'autorité duquel cette réunion a été faite n'a certainement pas eu sous les yeux les deux espèces, sans cela il aurait été frappé, je pense, comme moi je le suis, de leur différence. L'*affinis* se distingue nettement du *griseus* par les élytres mouchetés sur fond dénudé et non régulièrement garni de duvet seulement piqueté de points dénudés, le prothorax aussi est plus globuleux, les poils sont ordinairement dressés plus droits, la nuance foncière est uniforme et ne présente pas de teinte noirâtre. Je pense que le *Callidium pulverulentum* Er. W. 3-188, par ce caractère : *elytris antierius profunde punctatis*, se rapporte plutôt à l'*affinis* qu'au *griseus*.

H. fasciculatus Fald., p. 266, se rapporte aussi probablement à cette espèce pour deux raisons, la première c'est que la description assez vague, comme beaucoup des anciennes, ne lui convient pas moins qu'au *griseus*, la deuxième c'est que je possède l'*affinis* du Caucase, c'est-à-dire la forme qui a dû le plus vraisemblablement tomber dans les mains de l'auteur. J'adopte le nom d'*affinis*, dont je suis bien sûr, ayant vu les types dans la collection Lucas, plutôt qu'un autre antérieur mais douteux. *Certus primus est*, voilà la seule priorité absolue selon moi.

Monohammus Parendeli Théry.

(Soc. ent. Fr. 1891, bul. XXIII)

Je ne connais pas cette espèce, aussi me contenterai-je d'en donner une description abrégée d'après l'auteur. Peut-être est-ce une variété du *galloprovincialis* Ol.

D'un noir bronzé. Ecusson revêtu de duvet flave laissant à la base un triangle un peu dénudé. Elytres presque parallèles, surtout ♀, très ruguleusement ponctués, surtout à la base, parsemés de mouchetures de duvet cendré ne formant aucune tache. ♂ Long. 23 mil. Larg. 8 mil. Antennes noires, environ trois fois plus longues que le corps. Troisième article environ deux