

rax sont généralement un peu plus droits; les élytres sont un peu moins densément et un peu plus fortement ponctuées à leur base, plus obsolètement en arrière. Je ne parle pas de la couleur de la tête qui est insignifiante, bien que souvent plus obscure; ni du 3^e article des antennes qui est variable dans ce genre, ainsi que l'a constaté M. Bourgeois. — Lyon, Bugey, Bresse. — Je ne l'ai jamais pris en Provence, où le *variabilis* est commun.

Cyphon coarctatus Pk. — On reconnaît dans le *coarctatus* plusieurs races remarquables, qui, à la rigueur, pourraient constituer des espèces distinctes, entre autres: — 1^o Le *palustris* Thoms., entièrement testacé avec les élytres plus finement ponctuées et à côtes presque obsolètes. — Saxe; — 2^o *elongatus* Tourn., moindre, à 3^e article des antennes plus étroit mais à peine moins long que le 2^e, avec les élytres plus fortement ensellées chez les ♂ et leur espace densément pointillé réduit à l'impression. — Cluny, Bugey, Bresse; — 3^o, le *meridianus* R., à couleur généralement plus obscure, à taille moindre et forme plus oblongue, plus parallèle et plus déprimée, avec le 3^e article des antennes plus grêle mais un peu moins long que le 2^e, l'impression postscutellaire des élytres plus profonde, l'espace densément pointillé étendu en arrière en dehors de celle-ci et un petit tubercule lisse de chaque côté de la pointe de l'écusson. — Hyères.

Cyphon Kuukeli R. — La pubescence des élytres, dans cet insecte, n'est pas frisée ainsi que je l'avais indiqué à tort, mais elle est plus longue et plus redressée que chez tous ses congénères, et, pour cette raison, elle doit constituer une espèce distincte.

Cyphon convexus R. — Cet insecte a tout-à-fait la couleur et la forme du *Paykuli* Guér., mais la ponctuation est moins forte et plus serrée. Peut-être n'en est-il qu'une simple variété. (A suivre).

DESCRIPTION D'ESPÈCES ET VARIÉTÉS DE LONGICORNES SYRIENS

Cortodera discolor Fairm. (V.) **rubripennis** (Fairm. An. Fr. 66 p. 277 v. B.) Mêmes caractères généraux que le *discolor* proprement dit mais élytres d'un rouge brique un peu brillant au lieu d'être noirs.

Stenopterus rufus L. (V.) **atricornis**. — Cuisses assez largement noirâtres comme chez la variété *geniculatus* Kr. avec les antennes entièrement noires, une trainée noire aux épaules comme chez le type.

Lioderes Kollari Redt. (V.) **nigripes**. — Coloration du *Phy. testaceus* L., var. *analis* Redt. ou *nigricollis* Muls. C'est-à-dire offrant les pattes et le dessous du corps noirs, les antennes obscurcies.

Pilemia tigrina Muls. var. **griseomaculata**. — Voisine de la *P. tigrina* M., dont elle me paraît n'être qu'une variété bien qu'elle paraisse d'une taille plus petite avec une forme un peu plus large et les élytres, un peu plus profondément ponctués. — Prothorax plus ou moins rougeâtre, au milieu, élytres mouchetés. Cette variété est caractérisée par les antennes peu visiblement annelées et les élytres garnis de mouchetures grises régulières et arrondies, peu nombreuses. La *Pilemia tigrina* proprement dite avec les antennes nettement annelées présente des mouchetures élytrales très variables et irrégulièrement disposées ordinairement très mélangées de duvet gris et jaunâtre.

Long. 10, 12 mil.

Phytoecia praetextata Setv. var. **nigricollis**. — Assez étroite et presque parallèle chez les ♂. Écusson noir, cendré à l'état frais. Antennes

et pattes noires, avec le dessous du corps de la même couleur pubescent de cendré. La tête et le prothorax sont entièrement noirs, les élytres d'un jaune rouge offrent deux points noirs externes dont le premier huméral et une large tache suturale allongée s'étendant presque sur toute la longueur des élytres

Long. 7.-9. mil.

Toutes ces variétés ont été capturées en Syrie (Territoire d'Akbes) cette année, par M. Delagrangé qui me les a procurées.

Phytoecia asiatica voisine de la *lincola* v. *pulla* Ggl. par l'aspect et surtout de la *nigricornis* par la coloration. Pattes grises moins l'extrémité supérieure de tous les tibias et la deuxième moitié des quatre cuisses antérieures, rougeâtres. Dessous du corps pubescent de gris avec la poitrine très garnie de duvet blanc cendré épais. Tête et prothorax assez fortement et densément ponctués, ce dernier pas très long un peu atténué à la base et un peu dilaté et arrondi avant celle-ci avec trois lignes de duvet presque effacées. Écusson arrondi très garni de duvet blanc sale épais. — Élytres à peine convexes (à duvet gris vert) assez éparsemment ponctués, à peine atténués et vaguement tronqués offrant une côte peu visible. — Antennes pas très longues, grisâtres.

Communiquée par M. Delagrangé. Akbes. Long. 9 mil.

La *Ph. asiatica* se distingue de la *Ph. v. pulla* Ggl. par le prothorax plus long, la forme plus parallèle des élytres; elle est revêtue en dessus d'un duvet gris-vert et non gris plus ou moins cendré ce qui la distingue très visiblement de la *nigricornis* F.

Brachyta Delagrangei. — Très grande et large avec les antennes courtes d'un testacé rougeâtre, un peu obscurcies à l'extrémité. Tête et prothorax noirs presque entièrement revêtus de duvet doré-orangé, ce dernier assez court, bien plus étroit que les élytres, offrant une forte épine sur les côtés avec le dessus granuleux; partie antérieure du prothorax s'avancant sur la tête étroite et longue en avant d'un sillon transversal; la partie postérieure un peu élargie et à bords tranchants offre une grande impression transversale formant en dessus comme un bourrelet; milieu du prothorax fortement bosselé. Écusson presque en triangle arrondi revêtu d'un beau duvet doré-orangé. — Élytres assez convexes offrant leur plus grande largeur aux épaules qui sont arrondies et légèrement saillantes, à peine atténués à l'extrémité (celle-ci arrondie) d'un beau jaune d'ocre avec des dessins noirs. Les dessins élytraux sont ainsi formés: une bande suturale qui entoure et s'élargissant l'écusson et s'atténue vers l'extrémité, deux bandes transversales obliques inclinées l'une vers l'autre et offrant entre elles une large tache noire sur le bord externe et à peu près au milieu des élytres, une petite tache noire isolée près de l'extrémité. Pattes robustes, courtes, d'un testacé rougeâtre revêtues de poils orangé-doré avec les cuisses noirâtres à l'extrémité et en dessus seulement. Dessous du corps noir revêtu de duvet doré-orangé fin et assez épais surtout sur la poitrine et les derniers segments abdominaux.

Long. 19 mil. Larg. épaules, 8 mil. une ♀ communiquée par M. Delagrangé.

La *Brachyta Delagrangei* se rapproche par la taille et la forme des *bifasciata* Ol. et *balcanica* Hampe, elle se distingue à prime abord, de ces deux espèces par les épines du prothorax et le duvet orangé-doré qui garnit plusieurs de ses membres; elle semble devoir se placer en tête du groupe, la forme de son prothorax fortement épineux marquant avec ses antennes courtes et épaisses le passage des *Pachyta* Ser. aux *Brachyta* Fairm.

M. Pic