

13. CORTODERA RUFIMANA Waltl. — Cette espèce varie et passe quelquefois à une coloration générale d'un noir gris, moins les pattes antérieures et l'extrémité de l'abdomen, d'un jaune rougeâtre; pubescence générale d'un gris jaune (var. *obscurans*).

14. LEPTURA (ANOPLODERA) RUFIPES Schall., var. FUSCIPES Muls. (KRUPERI Gangl.).

15. LEPTURA (VADONIA) LIVIDA L. et variation à suture noirâtre.

16. LEPTURA UNIPUNCTATA Fabr.

17. LEPTURA HEYDENI Gangl. (USTULATA Mén.). — (Voir Daniel, Coleopt. Studien, I, p. 11.)

Voisin de *L. rufa* Brullé, avec les mêmes signes noirs sur les élytres (♀) ou une bande apicale noire seulement (♂), sur fond d'un jaune pâle au lieu d'être rouge; les quatre tibias antérieurs au moins sont jaunâtres, les postérieurs sont armés de deux épines chez le mâle.

18. LEPTURA TONSA Daniel, Coleopt. Studien, I, p. 31.

19. LEPTURA PALLENS Brullé.

20 * LEPTURA CORDIGERA Füssl. (HASTATA Sulz.). (1).

21. LEPTURA ? SCUTELLATA L., var. INSCUTELLATA Pic (Descr. Longic. Syrie, p. 3).

Peut être plus qu'une variété par sa taille avantageuse, la forme très élargie et l'absence du duvet à l'écusson (♂, ♀), ainsi qu'au bord extérieur du prothorax (♀).

22. LEPTURA MONTANA Muls., var. LEUTHNERI Gangl. — Variable, passant même quelquefois au noir complet (♂, ♀), var. *nigerrima*.

23. LEPTURA (PACHYTODES) (2) ERRATICA Dalm.

24. L. (STRANGALIA) MACULATA Poda et var. BINOTATA Muls. (voir Pic, Mat. Long., I, p. 13).

25. L. (STRANGALIA) EMMIPODA Muls.

26. L. (STRANGALIA) SYRIACA Pic (Descr. Longic. Syrie, p. 1). — *Nigra, nitida*. St. verticali affinis, prothorace anterieus latiore, abdomine capiteque nigris distinguenda. — Long. 14—15 mill.

(1) Les espèces précédées d'un astérisque (*) sont celles qui figurent dans le mémoire de M. L. Fairmaire.

(2) Voir, pour les caractères du sous-genre : « Mat. Étud. Longic. » I, p. 65, par Maurice Pic.