

*Eryx mauritanicus* Luc. Azazga. — *Heliotaurus* v. *Perroudi* Muls. Aomar, Yakouren. — *Tetratoma Baudueri* Perris var. Sur les branches mortes de Chêne. Forêts de Yakouren, de l'Akfadou, des Beni-Ghobri. — *Phloeotrya rufipes* Ol. var. Forêt de l'Akfadou. — *Asclera* var. *tenietensis* Ab. Djurjura, Akfadou.

*Peritelus kabylianus* Pic. Forêt des Beni-Ghobri sur Merisier. — *Scythropus cedri* Mars. Djurjura. — *Magdalisc Grilati* Bedel. Sur Aubé-pines et Merisiers, forêts des Beni-Ghobri, de l'Akfadou.

*Leptura oblongomaculata* Buq. et variété *obscurithorax*. Azazga. — *Grammoptera angustata* Pic. Djurjura, Akfadou. — *Callimus angulatus* Schr. Forêt de l'Akfadou (nouveau pour l'Algérie).

**Glytus (Caloclytus) Theresae** n. sp. (1). — Taille, forme et dessins de *C. speciosus* Sch., mais élytres d'un noir brillant à taches ou fascies d'un gris jaunâtre; prothorax densément pubescent de gris jaunâtre et orné de chaque côté d'une tache noire. — Yakouren.

*Liopus Bedeli* Pic. Forêts de l'Akfadou, des Beni-Ghobri. — *Phytoecia erythrocnema* Lucas. Aomar, Yakouren.

*Oticephala forcipifera* Luc. var. Maillot, sur Lentisque. — *Gynandrophthalma algerica* Weise. Forêt des Beni-Ghobri. — *Chrysomela edoughensis* Frm. Forêt de l'Akfadou.

### Descriptions de quelques espèces nouvelles de Coléoptères

Par F. GUILLEBEAU.

**Microtyphlus Theryi** n. sp. — Long. 4,40 mill. — Entièrement ferrugineux, glabré, lisse vu avec une forte loupe; antennes et pattes testacées. Tête aussi longue que large, convexe, un peu moins large que le corselet, biimpressionnée entre les antennes. Yeux nuls. Antennes courtes, pas plus longues que le corselet, le 1<sup>er</sup> article épais, deux fois aussi long que large, les autres de moitié plus étroits, subtransverses. Corselet trapéziforme, aussi large que les élytres, un peu moins long que large au bord antérieur qui est largement échancré, les angles antérieurs obtus, les postérieurs droits, les côtés faiblement arqués, la base échancrée au milieu. Élytres deux fois et demie aussi longs que le corselet, subdéprimés, à côtés parallèles, le sommet arrondi. Métasternum excavé au milieu de la base; hanches postérieures écartées, tibias

(1) Sera décrit complètement dans le 2<sup>e</sup> fascicule des *Matériaux pour servir à l'étude des Longicornes*, en préparation.