

bande arquée antérieure remontant sur la suture jusqu'à l'écusson qu'elle n'entoure pas, cette bande à peine arquée en arrière. Segments de l'abdomen largement bordés de blanc.

Long. 10-11 mill. Asie-Mineure (Delagrange in coll. Pic).

Retrouvé depuis par M. et M<sup>me</sup> Korb, à Konia.

*Dorcadion Escherichi* var. *obliquesignatum*. ♂ se distingue par les bandes blanches latérales plus larges, ne laissant entre elles que les signes noirs suivants : une bande interne très courte et très étroite, une bande externe également très étroite mais prolongée presque jusqu'à l'extrémité et en arrière de celle-ci et isolé, un petit trait oblique atteignant presque l'extrémité.

Asie-Mineure : Konia (Korb, in coll. Pic).

Une ♀, offrant une pubescence générale un peu fauve, présente un dessin latéral à peu près analogue, mais avec la bande interne plus large, la tache oblique postérieure non séparée.

*Dorcadion talyschense* v. *posticeinterruptum*. Diffère de la forme type par le dessin élytral, la bande dorsale étant plus ou moins raccourcie en arrière et jamais réunie postérieurement à la bande humérale. Une très étroite bande présuturale, ordinairement raccourcie à l'extrémité.

♀ ♂ Caucase (coll. Pic).

*Dorcadion Delagrangei* v. *fuscopubescens*. Dessins de la forme type mais pubescence foncière d'un brun fauve ; antennes roussâtres.

♂ ♀ Akbès (Delagrange, in coll. Pic).

*Dorcadion divisum* Germ. variétés. Noir, y compris les antennes et les pattes, ces organes parfois vaguement roussâtres avec les élytres ornés de dessins blancs analogues à ceux de *divisum*, c'est-à-dire ayant en plus de la bordure externe et suturale, une bande humérale entière et une bande dorsale variable, rarement entière (v. *indivisum*), le plus souvent variablement interrompue soit postérieurement, soit antérieurement ou postérieurement (v. *subinterruptum*).

Long. 11-14 mill. Asie-Mineure : Konia (M. Korb, in coll. Pic).

*Dorcadion graecum* v. *lunulatum*. Se distingue de la forme type par le dessin élytral particulier, non crucifère, la bande transversale foncée étant réduite à une macule arrondie, séparée de la bande longitudinale présuturale foncée.

Smyrne (coll. Pic).

*Dorcadion anatolicum* ♂. Mat, court et assez large ou peu allongé, noir, pubescent de gris ou de fauve ; base des antennes, pattes, et parfois le

pourtour élytral, rougeâtres. Tête peu forte, densément pubescente, ornée de taches veloutées sur le vertex. Prothorax très transversal, densément ponctué, dilaté et muni d'un tubercule émoussé au milieu de ses côtés, un peu déprimé et sillonné sur le disque, plus ou moins revêtu de pubescence grisâtre, parfois avec une ligne médiane blanchâtre ou de vagues bandes fauves ou brunâtres. Ecusson à pubescence blanche. Elytres un peu plus larges que le prothorax, plus ou moins subarqués sur les côtés, sans côtes distinctes; ils sont densément revêtus d'une pubescence veloutée noire ou brunâtre et ornés des dessins blancs ou blancs jaunâtres suivants : une très large bordure externe, une bordure suturale assez étroite, une bande humérale entière et une bande dorsale réunie à la bande humérale antérieurement et variablement interrompue en arrière (rarement celle-ci est continue ou presque = *v. ininterruptum*). Dessous du corps souvent en partie roussâtre, pubescent de grisâtre. ♀ variable, plus ou moins densément pubescente de grisâtre ou de brun fauve avec ordinairement les bandes indistinctes, tantôt ornées chacune d'une macule postmédiane variable foncée, tantôt sans macule. (Cette dernière nuance peut correspondre comme sexe ♀ à la var. ♂ *ininterruptum*.)

Long. 12-14 mill. Asie-Mineure. (ex-coll. Tournier); Konia, (M. Korb).

Très voisin de *Piochardi* Kr., dont il n'est peut-être qu'une variété, il en diffère par le dessin élytral, le prothorax dépourvu de bandes foncées nettes, etc.

*Dorcadion carinipenne*. Court et large, noir, presque mat avec la base des antennes et les pattes roussâtres. Tête petite, sillonnée, ornée de taches veloutées sur le vertex. Prothorax pas très court, impressionné latéralement et muni de chaque côté d'un tubercule denté un peu relevé, largement pubescent de grisâtre sur les côtés et étroitement sur le milieu avec une bande discale foncée, plus large de chaque côté; un faible sillon longitudinal médian. Ecusson pubescent de blanc. Elytres un peu plus larges que le prothorax, subarqués latéralement, subarrondis à l'extrémité avec les épaules arrondies, ornés de deux côtes carénées latérales (l'externe étant plus longue et plus saillante) séparées par une dépression antérieure assez marquée; ces organes sont revêtus d'une pubescence d'un noir velouté et ornés des dessins blanchâtres suivants : une bordure externe et suturale étroites, une bande humérale assez large et un peu arquée, une bande dorsale plus étroite et presque droite, celle-ci jointe à la bande humérale anté-