

- (v.) *turkestanicus* Ganglb. H. 89. 280.
Turk.
- validicornis*. (Kr.) Pic (1) Catalogue. 16.
? Turk.
- biformis*. Tourn. Rev. Z. 72. 342; T. 37;
Pic Ech. n° 127. Cauc.
- minutus*. Gebl. B. Mosc. 59. 348. Sibérie.
s. g. Anisorus Muls. 2. 467.
- quercus*-Goeze Natur. 1783, 74; M. 2. 468;
Jac. Duv. Pl. 56. f. 266. Eur. md. b.
humeralis F. Mant. I. 158. S. El. II.
359.
- (v.) *dispar*. Panz. ♀ Fn. Germ. XVII, 1.
M. 1. 231; Pic M. L. 1. 4.
Fr., All., Turq., Anat.
magdalenae Ab. in. litt.
- (v.) ♀ *unicolor*. Fleisch; *discolor* Fleisch.
W. 87. 237. Autriche.
- (v.) ♀ *discoideus* Reitt. W. 89. 163. Cauc.
- (v.) *marginatus* Kr. l. c. Autriche.
- (v.) *scutellaris* Kr. l. c. Turquie.
- (v.) *subvittatus* Reitt. l. c. Cauc.
- (v.) ♀ *subapicalis* Reitt. l. c. Cauc.
- heterocerus*-Ganglb. W. 82. 139. Syrie.
- (v.) *nigripennis*. Pic Misc. Ent. 96. 141.
Syrie.
- Lacordairei* Pascoe Proc. 67. 84; Ab. 69.
121; T. 137. Grèce.
- Akimerus** Serville A. 1835. 212.
Acimerus (Catalogues).
- Schäfferi*-Laich. Tyr. II. 130; M. 2. 473;
Jac. Duv. Tab. 57 f. 267.
All., Hongr., Suisse, Fr.
- cinctus* F. Mant. I. 146; *dentipes* Muls.
- Pachyta** Serville A. 35. 213; Muls.
2. 477.
Anthophylax Blessig. Hor. IX. 232.
- Lamed*-L. Syst. Nat. X. 391; M. 2. 478;
T. 36. Eur., Sib.
- pedella* Deg. *spadicea* Payk.
- (v.) *nigrina*. Pic M. L. 1. 5. Alpes.

(1) Assez robuste. Dessous du corps, moins l'abdomen, tête et prothorax noirs, le reste du corps testacé. Antennes relativement longues et épaisses. Élytres ornés de côtes distinctes, subarrondis à l'extrémité. Long. 15000. ? Turkestan (in coll. Pic). Caractérisé par ses antennes robustes et la structure élytrale.