

sur l'avant-corps, fortement sur les élytres, entièrement noir sauf une petite macule humérale roussâtre peu marquée, tarsi roussâtres. Perse (coll. Pic).

M. E. Reitter a publié sur *Ctenopus trifossus* Pic (*Wien. Ent. Zeit.* 1903, p. 258) la note suivante : « *Ct. trifossus* Pic, d'Italie C<sup>ie</sup>, est une variété de coloration qui d'après mon matériel ne paraît se rencontrer que chez les ♂. » Cette synonymie, publiée après une note où il est parlé de *impressicollis* Fairm., peut prêter à confusion et c'est pourquoi sans doute le nouveau *Zoological Record* (1903) a noté la synonymie de *trifossus* Pic avec *impressicollis*. En réalité, *trifossus* Pic se rapproche de *neapolitanus* Baudi et c'est certainement ce dernier que Reitter a voulu désigner, bien qu'il ne l'ait pas nommé, pour l'établissement de sa synonymie. Il pourrait bien se faire que *Ctenopus frater* Reitt. (1903) soit synonyme de *Ct. intrusus* Seidl. (1896), ce qui serait à étudier avec les types.

**Brachypteroma Holtzi**, n. sp. Allongé, peu brillant, brièvement pubescent en dessus avec la tête, l'abdomen et le dessus du corps noirs ; tête moyenne, foncée avec les parties de la bouche rousses, fortement ponctuée, déprimée au milieu, yeux gros et saillants ; antennes atteignant le sommet des élytres ♀ ou le dépassant ♂, rousses, les articles médians légèrement noueux au sommet, les derniers épaissis ; 2<sup>e</sup> subglobuleux, 3-5 à peu près égaux, les suivants plus courts ; prothorax roussâtre avec une ligne médiane foncée antérieure, densément et fortement ponctué, plus long que large, plus large chez ♀ que chez ♂, étranglé en avant et surtout en arrière, anguleusement subdilaté de chaque côté en dessous du milieu ; écusson grand, revêtu d'une pubescence blanchâtre épaisse ; élytres flaves, plus larges que le prothorax, modérément ponctués, impressionnés derrière l'écusson et plus faiblement sur le disque, un peu resserrés avant l'extrémité, légèrement déhiscent et séparément arrondis au sommet qui est rembruni, épaules assez avancées en avant ; ailes foncées, dépassant l'abdomen ; abdomen noir, les segments parfois distinctement bordés de gris ; pattes testacées avec les cuisses plus ou moins roussâtres ou rembrunies, quelquefois avec les tibias et cuisses postérieurs un peu plus foncés. Long. 6-7 mm. Taurus cilicien : Efrenk (coll. Holtz et Pic). — Diffère de *B. ottomanum* Heyd. par le prothorax roussâtre, cet organe en plus de structure un peu différente, bien plus large chez ♀, les épaules plus avancées en avant (1).

**Plagionotus Bobelayei**, var. nouv. *Mouzafferi* (2). Allongé, progressivement atténué en arrière, noir à fascies ou macules jaunes (analogues à celles de *Bobelayei*, seulement, médiane au moins, plus larges), antennes et pattes testacées ; prothorax ayant son tiers basal revêtu de pubescence jaune. L. 16-17 mm. Perse (coll. Pic). — Distinct à première vue par la pubescence plus ou moins continue, et non disposée sous forme de bande, sur la base du prothorax puis la 2<sup>e</sup> bande médiane des élytres très large et presque droite.

**Clytanthus hircanus** (Rost), n. sp. (3). Noir, un peu brillant, pubescent de gris et orné, en outre, de dessins gris élytraux, ceux-ci à peu près disposés comme chez

(1) Encore un *Etcetera descriptif* mis dans le but de permettre que la verve satirique de certains auteurs puisse s'exercer de nouveau, pour le plus grand profit de la science.

(2) Dédié à S. M. Mouzaffer Eddin, shah de Perse.

(3) Une description plus longue de cette espèce paraîtra prochainement (*Mat. Long.* V. pt. 2).

*figuratus* Scop., avec la bande postmédiane particulière et qui, au lieu d'être élargie sur la suture comme chez l'espèce ordinaire, est distante de la suture ou au moins diminuée sur cette partie. L. 10-12 mm. Perse : Astrabad. Reçu de M. Rost.

**Dorcadion culminicola** n. s.-esp. **Holtzi**. — Relativement étroit et allongé, très brillant, finement et très peu ponctué, entièrement roux sauf le dessous et l'avant-corps qui sont plus ou moins obscurcis ou rembrunis ; prothorax sans bandes de pubescence distincte ; élytres ornés, en plus de la bordure complète, d'une seule fascie humérale de pubescence grise. Long. 10 mill. Taurus (ex Holtz) (1). Est décrit plus longuement dans mon prochain cahier des *Mat. Long.*, qui paraîtra prochainement.

M. Pic.

## Coléoptères américains nouveaux

**Eupactus (Thaptor) Dejeani**. Minutus, convexus, nigro piceus, distincte punctatus, sat dense in thorace et capite, sat sparse in elytris ; antennis testaceis ; elytris instriatis.

Court et assez large, convexe, peu brillant, brièvement pubescent, à ponctuation forte, plus serrée sur l'avant-corps, noir de poix avec les pattes rembrunies ; antennes testacées, premier article courbé, suivants petits, trois derniers gros et épaissis, les deux de l'extrémité peu détachés l'un de l'autre ; tête peu convexe ; prothorax assez court, progressivement atténué en avant ; élytres courts et larges, à épaules marquées, un peu rétrécis au sommet avec une faible dépression latérale incomplète, mais sans aucune trace de strie. Long. 1,5 mm. Mexique : Teapa (coll. Pic). — Très distinct par sa petite taille jointe à sa forte ponctuation ; plus convexe et plus court que *brevis* Pic.

J'ai été un peu embarrassé pour classer cette espèce qui par sa forme rappelle *Liolius punctatus* Gorh., je l'ai placée de préférence dans le genre *Eupactus* à cause de ses antennes relativement longues et dont le premier article est distinctement recourbé, comme celui de la figure de *Taptor throscoïdes* Gorh. (*Biologia Cent. Am.* III, 2, tab. 10, fig. 12.)

**Priotoma Gounellei**. Satis breve, modice convexus, nitidus, fulvo pilosus et hirsutus, crebre punctatus, nigro piceus ; antennis testaceis ; elytris instriatis.

Assez court et large, un peu convexe, brillant, fortement ponctué, noir de poix, orné d'une pubescence flave longue, en partie redressée et entremêlée de quelques poils obscurs ; tête large, fortement ponctué ; antennes testacées, à trois derniers articles épaissis et longs, antépénultième large et prolongé en dessus, pénultième assez longuement prolongé en forme de dent au sommet, terminal plus long, simple mais large ; prothorax court, distinctement rétréci en avant ; à double ponctuation, l'une fine, l'autre large et assez écartée ; élytres courts et assez larges, assez rétrécis en arrière, sans aucune strie même latéralement, seulement une faible dépression médiane externe, ces organes avec une ponctuation forte et écartée, irrégulièrement disposée, épaules marquées ; pattes un peu roussâtres. Long. 2,3 mm. Brésil : Caraça et Tijuca (Gounelle in coll. Pic). — Cette espèce peut se classer provisoirement dans le

(1) Outre l'exemplaire de ma collection, j'en ai vu un autre chez notre collègue J. Clermont.