

- bescente claire des élytres plus rapprochée de la suture surtout ♂.
Long. 15 m. Kurdistan : Mardin (coll. Pic *types*). Malatia (Wiener Hofmuseum). *Theresæ* Pic.
- 5 Pubescence (1) sur l'avant-corps, l'écusson, le dessous et les pattes foncée (d'un brun rouge ou d'un brun noir). 15.
- Pubescence sur l'avant-corps, l'écusson, le dessous et les pattes claire (jaunâtre pâle ou grisâtre, parfois d'un gris flave). 6.
- 6 Elytres ayant des côtes, au moins des traces de côtes, celles-ci placées entre les bandes ou les rangées de macules pubescentes. 8.
- Elytres dépourvus de toute trace de côtes, par conséquent les intervalles entre les macules ou les bandes pubescentes au même niveau que ces macules ou bandes. 7.
- 7 Elytres ayant chacun trois bandes blanchâtres qui sont quelquefois interrompues surtout antérieurement ; tantôt à élytres plus ou moins largement rougeâtres et repli huméral clair (forme type), tantôt à élytres brièvement rougeâtres à repli huméral foncé sauf au sommet (v. *semilimbata* Pic) (2), rarement à coloration foncière foncée. Quelquefois les bandes sont remplacées par des rangées de macules (var. *interrupta* mihi., du Kurdistan). Long. 22 à 38 m. Transcaucasie, Kurdistan. *Scowitzi* Fald.
- Elytres ayant chacun des rangées, au nombre de trois ordinairement sur le disque, de macules d'un blanc jaunâtre ou flaves. Long. 18-27 m. Caucase (*types* et *co-types* in coll. Reitter et Pic). *Angelicæ* Reitt.
- 8 Elytres ne présentant pas une longue bande de pubescence sur le repli, près du bord latéral (parfois ce repli seulement un peu garni de pubescence à la base), offrant seulement des bandes ou rangées de macules sur le dessus. 9.
- Elytres ayant, en plus des rangées du dessus, une bande complète de pubescence sur le repli et près du bord externe. Long. 24-26 m. Perse. (*iranica* Dan.) *Jakovlevi* Sem.

(1) Ici commence le tableau du s. g. *Semnosia*, il comprend mes espèces intercalées dans le synopsis abrégé de Daniel.

(2) La var. *semilimbata* diffère, en outre, des autres exemplaires que je connais de *Scowitzi*, par le prothorax subcylindrique et le repli huméral moins pubescent en avant. Je note, une fois pour toutes, que, sauf var. *interrupta*, les types des espèces ou variétés que j'ai décrites sont dans ma collection.