

Notes entomologiques diverses

— (Suite) —

Velleiopsis marginiventris Fairm. — Cette très rare et superbe espèce décrite de Bulgarie se retrouve en Turquie d'Asie, à Adana (coll. Pic). — Ce staphylinide pourrait bien être parasite de quelque espèce de *Vespa* à nid souterrain.

On trouve en Syrie, à Akbès, une petite espèce de *Cantharis* peu brillante, entièrement noire, pattes comprises avec seulement les man libules, le pourtour de l'abdomen et du prothorax (étroitement chez ce dernier) et la base des antennes testacées ; cette espèce a été nommée, improprement selon moi, *brevipennis* par quelques entomologistes, *brevipennis* étant décrit comme ayant le prothorax transversal, tandis que cet organe est carré, et même un peu plus long que large, chez les exemplaires en question. Les *Cantharis* d'Akbès semblent, en outre, différer de *pulicarius* F. par le prothorax moins brillant sur le disque, les tibias postérieurs très fortement arqués et de *malatiensis* Heyd., par la macule prothoracique grande, le 1^{er} article des antennes entièrement testacé ; cette race syrienne pourra prendre le nom de *akbesiana* ; j'en possède plusieurs exemplaires recueillis par Ch. Delagrangé. On trouve chez cette espèce la forme ♀ brachyptère que j'appellerai *v. abbreviata*.

Dorcadion Semenowi Gglb. — Parfois la ♀ de cette espèce présente des côtes élytrales très prononcées et entre celles-ci, sur le disque, de larges bandes de pubescence plus ou moins grisâtres, la bande présuturale étant, sur chaque élytre, parsemée de quelques macules noires irrégulières ; je donne à cette variété provenant de Issyk-Kul, dans le Turkestan (coll. Hauser) le nom de *issykhulense*.

Leptura dubia, Scop. var. nov. *moreana* ♂. — Cette variété provenant du Taygetos, et faisant partie de ma collection est caractérisée par sa coloration entièrement noire à l'exception, sur chaque élytre, d'une macule humérale arquée jaune paille, les antennes longues, etc.

Dans le synopsis que j'ai donné (*Bull. Fr.*, 1906, p. 119) sur les variétés de *Crioceris asparagi* L. je n'ai pas cité une variété (celle-ci m'étant inconnue) présentant, par suite de l'oblitération des tâches blanches des élytres, une coloration foncée sur le dessus du corps, cette variété peut prendre le nom de *obliterata*. Cette curieuse modification a été mentionnée par Lucas, il y a déjà longtemps (*Bull. Fr.*, 1882, p. CLVIII), comme ayant été recueillie dans les environs d'Argenteuil.

J'ai capturé, cet été dernier aux Guerreaux deux modifications peu importantes de *C. asparagi* L. qui ne me semblent pas devoir mériter un nom, mais dont voici le signalement, l'un a le milieu des élytres largement jaune avec 2 macules foncées sur chacun de ses organes, l'autre a la dernière macule élytrale réunie à la bordure marginale.

(A suivre.)

M. PIC.