

Guerreaux), aut elytris nigris, et antice luteo fasciatis (**var. Theresae**, des Guerreaux).
Elytris nigris, abdomine testaceo (**var. atripennis**, des Guerreaux).

Leptura rubra v. nov. semimarginata. ♂. Niger, elytris antice lateraliter et ad humeros rufo notatis, tibiis tarsisque rufescentibus. Alpes (coll. Pic). — Cette variété est très distincte par la coloration des élytres devenue presque entièrement foncée.

Dorcadion Bravardi n. sp. (1) ♂. Oblongo-elongatus, nitidus, niger, glaber, capite thoraceque albo lineatis, illo dense punctato-rugoso, elytris albo cinctis, apice minute rufo tinctis, disperse punctatis, antennis pedibusque nigris. Long. 15 mill. Environs de Salonique (Bravard, in coll. Pic). — A placer près de *D. lineatocolle* Kr., très distinct, à première vue, par le premier article des antennes et les pattes foncées.

Dorcadion salonicum n. sp. ♀. Oblongo-ovatus, nitidus, niger, articulo primo antennarum, femoribus, tibiis elytrisque apice breve rufis, his albo cinctis; thorace in disco sat sparse punctato; elytris lateraliter deplanatis et subcarinatis. Long. 17 mill. Même origine que le précédent. A placer près de *D. femoratum* Brullé.

Dorcadion thessalicum n. sp. ♀. Oblongo-elongatus, parum nitidus, niger, articulo primo antennarum pedibusque obscure rufescentibus; thorace irregulariter punctato; elytris postice attenuatis, lateraliter carinatis, in disco minute et sparse punctatis. Long. 16 mill. Thessalie (coll. Pic). — Plus allongé que le précédent, moins brillant avec la ponctuation élytrale plus fine.

Rhynchenus pilosus sub. esp. baborensis. Niger, antennis, tarsis tibiisque pro parte testaceis, nitidus, parum dense sat regulariter griseo ant aurato pubescens, thorace supra late, scutello, elytrisque ad suturam antice griseo pubescentibus, elytris aurato pubescentibus, pro parte et parum distincte griseo maculatis. Long. 4 mill. Algérie : Dj. Babor (coll. Pic). — Parait intermédiaire entre *R. pilosus* F. et *irroratus* Ksw.

Lema 10 punctata var. nov. Kuldschana. Pedibus pro parte testaceis, elytris testaceis, nigro notatis : macula humeralis, fascia mediana reducta, maculis 2 posticis grandis. Turkestan : Kuldscha (coll. Pic).

Crioceris 12 punctata v. nov. gallica. Scutello rufo aut testaceo, infra corpore rufo, minute et parum distincte brunneo notato. France méridionale : Ria, Bordeaux (coll. Pic).

Crioceris 12 punctata v. nov. Peyroni. Testaceus, antennis, articulo 1° rufo excepto, geniculis et tarsis nigris, elytris in singulo parum distincte brunneo quinque maculatis. Mont Liban (Peyron in coll. Pic) — Cette variété se distingue par la coloration en majeure partie testacée et les élytres dépourvus de macule humérale foncée.

Cryptocephalus brunnicollis Suffr. Chez cette espèce d'Égypte on peut distinguer les trois variétés nouvelles suivantes, dont les types sont dans ma collection : 1° **var. luxorensis**, de Louxor : Elytris luteis, ad suturam postice et ad humeros brunneo notatis. 2° **var. multimaculatus**, d'Assuan : Elytris luteis, ad basin et post medium

(1) Ce *Dorcadion* et les suivants seront décrits plus longuement dans un prochain cahier des « Matériaux pour servir à l'étude des Longicornes ».