

par l'écusson nettement tronqué au sommet et les pattes en partie roussâtres. Maroc : Oudja (coll. Pic).

**Hylophilus graciosus v. nov. Alfieri** ♀. Antennis testaceis, satis gracilibus, articulo 2° subglobose, articulis 3-5 æqualibus; elytris ad basin rufis, postice nigris et ad apicem rufo notatis. Egypte (coll. Alfieri). — Diffère de la forme type par les antennes relativement plus grêles, la coloration élytrale, la portion foncée ne remontant pas vers l'écusson.

**Zonábriis incerta v. nov. margensis**. Signaturis nigris elytrorum reductis. Egypte : Marg (coll. Alfieri). — Chez cette variété, voisine de la var. *Paykulli* Bilb. il n'existe aucune bande complète aux élytres mais seulement des dessins noirs réduits ou disjointes.

**Tetropiopsis major**. n. sp. Parum elongatus, nitidus, castaneus; antennis plus ♂, minusve ♀, brevibus; thorace breve, postice valde attenuato, dense punctato-ruguloso; elytris elongatis ♂ ♀, irregulariter punctatis. Long. 15-17 mill. Sinaï (coll. Alfieri et Pic). — Espèce distincte de *numidica* Chob., par sa taille avantageuse, en même temps que sa coloration apparaissant uniforme.

**Cryptocephalus curvilinea v. nov. Carnerii**. Pro majore parte rufo-brunneus, luteo notatus, elytris sat fortiter et irregulariter punctatis, puncto humerale nigro. Egypte : Mariout. Des chasses de Carneri, reçu de Alfieri. — Distinct, à première vue, par la présence de la seule macule humérale noire.

**Cryptocephalus Anastasei** n. sp. Oblongus, nitidus, supra glaber, infra griseo pubescens, luteo-testaceus, antennis apice brunneis, scutello lateraliter et infra corpore pro parte nigris; thorace elytrisque pro parte nigro marginatis et nigro 4-maculatis; elytris brevibus, mediocre pro parte regulariter punctatis, Long. 4 mill. Egypte. Reçu de Alfieri. — Se rapproche de *C. 10-notatus*. Suf., caractérisé par le prothorax orné de quatre macules noires transversalement disposées et les élytres en ayant également quatre mais disposées deux à deux et un peu obliquement.

**Thelyterotarsus cribripennis** n. sp. Oblongus, postice attenuatus, nitidus, griseo pubescens, niger, elytris flavis, nigro maculatis (antice, post medium late et ante apicem breve); pedibus nigris, flavo notatis; capite minute et sparse punctato; thorace sat breve et lato, sparse punctato; elytris parum pubescentibus et thorace paulo latioribus, latis brevibus, pro majore parte fortiter aut dense punctato-rugulosis, ad apicem sparse et pro parte lineato punctatis. Long. 3 mill. Egypte (coll. Alfieri). — Espèce distincte entre toutes par la sculpture non régulière des élytres.

(A suivre.)

M. Pic.

## Coléoptères exotiques en partie nouveaux

(Suite.)

**Oberea maculiventris** Pic (1923) préoccupé, est à muter en **notativentris**.

**Caryopemon Lhostei** (nov.) Oblongo-ovatus, pro majore parte niger, rufus aut nigro-piceus, antennis nigris, ad basin rufis, longe pectinatis ♂, femoribus posticis supra et apice nigro notatis; thorace satis breve et lato, fortiter et sparse punctato,

in disco late denudato, medio luteo lineato; elytris satis brevibus, pro parte denudatis, antice et ad suturam albo notatis, aut luteo pubescentibus, postice albo lineatis; pygidio nigro maculato. Long. 7 mill. Eclos de graines originaires de Ceylan. Communiqué et donné par M. Lhoste à qui je suis heureux de dédier cette nouveauté. — Voisin de *C. cruciger* Steph. (ex figure) en différant, au moins à titre de variété, par les cuisses postérieures maculées de foncé avant le sommet et les élytres dépourvus de dessins noirs distincts.

**Caryopemon centronotatus** n. sp. Oblongo-elongatus, niger, dense griseo aut luteo pubescens, thorace medio nigro bilineato, elytris fulvo aut griseo pubescentibus, in disco pro parte denudatis et medio albonotatis. Long. 8-9 mill. Cochinchine (coll. Pic). — Voisin de *C. luteonotatus* Pic, distinct, à première vue, par le revêtement plus uniforme, non multimaculé aux élytres. La var. nov. *Lajoyei* a les élytres en partie glabres avec quelques petites lignes, ou macules, pubescentes internes basales et apicales jaunes, ou grises, et une grande macule médiane blanche.

**Kytorhinus Lefevrei** n. sp. Oblongus, niger, pro majore parte dense griseo pubescens; antennis elongatis, apice longe dentatis; thorace parum breve, antice paulo attenuato, lateraliter minute et postice valde sinuato; scutello longissimo, angustato, apice inciso et elevato; elytris pro parte substriatis, dense punctatis, apice sublævibus; femoribus posticis elongatis, indentatis, postice paulo curvatis, articulo 1° tarsarum arcuato. Long. 5 mill. — Eclos de graines de *Daubentonia* reçues de Chine (Lefèvre, ex Losthe). Décrit d'après une ♀ de ma collection (1). — Espèce très caractérisée par la particulière structure de son écusson et par le corps tout noir.

Note sur **Micropelecotoïdes**. Dans le synopsis du genre *Micropelecotoïdes* Pic (hors-texte du n° 417, qui a dû être raccourci à l'impression, la place manquant) ne figurent pas deux petites espèces voisines: *Dohertyi* Pic de Malacca et *sumatrensis* Pic; ce dernier très variable est déjà étudié dans ses principales variétés (*l'Echange* 1910 p. 21 et 1924 p. 19). Il manque aussi une nouvelle espèce (*parallelus* mihi), du Musée de Dahlem, originaire de Kina Balu, remarquable par sa forme étroite et parallèle et qui offre une coloration analogue à celle de *rufithorax* Pic, mais avec les élytres largement pouprés à la base et ces organes dépourvus de la bande grise présuturale.

**Pyrota latemaculata** n. sp. Parum elongatus, nitidus, luteus, nigro notatus, membris nigris, femoribus late et tibiis ad basin luteis; capite robusto, luteo multi nigro notato; thorace elongato, antice valde attenuato et depresso, parum punctato, flavo, in disco late et lateraliter minute nigro maculato; elytris thorace valde latioribus, parum elongatis, flavis, ad basin nigro bimaculatis, macula interna grossa, externa minuta, et ante apicem late nigris. Long. 18 mill. Brésil. — Voisin de *postica* Lec., en diffère par le prothorax à grande macule noire médiane irrégulière et la macule anteapicale des élytres plus étendue, atteignant presque le sommet.

**Pyrota tetaceithorax** n. sp. Angustatus, nitidus, niger, thorace testaceo; capite inter oculos testaceo notato, sparse et irregulariter punctato; articulis 3-5 antennarum validis, 3° elongato, 5° paulo transverso, ceteris apice subdentatis; thorace elongato, antice paulo attenuato, fere impunctato; elytris thorace paulo latioribus,

(1) D'après M. Lhoste le ♂, qu'il possède et que je ne connais pas, aurait les antennes pectinées.

postice attenuatis. Long. 14-15 mill. Rép. Argentine. — Espèce très distincte par sa coloration.

*Synallecula cherenensis* n. sp. Longissimus, nitidus, sparse pubescens, rufus, capite, antennis abdomineque apice nigris; thorace brevis, antice subarcuato, dense punctato; in disco impresso; elytris thorace distincte latis, longissimis, minute striatis, interstriis mediocre punctatis. Long 8 mill. Erythrée: Cheren. — Ressemble à *S. longipennis* Pic, prothorax plus densément ponctué, élytres un peu plus étroits, pattes rousses.

*Synallecula impressicollis* n. sp. Oblongus, parum nitidus, rufus, capite, antennis, pedibus pro parte abdomineque apice nigris, elytris in disco et irregulariter nigro lineatis. Long. 5 mill, Zanzibar. — Voisin de *S. lateplagiata* Pic, mais prothorax nettement impressionné sur le disque et à la base, élytres à dessins noirs particuliers, en forme de courtes lignes ou taches discales, non symétriques sur les élytres.

(A suivre.)

M. PIC.

## Réflexions pratiques et réfléchies <sup>(1)</sup>

PAR M. PIC (Suite.)

Certains entomologistes, sous prétexte de marcher au progrès, joignent aujourd'hui le scalpel à la loupe pour déterminer et arrivent ainsi à un merveilleux résultat: nommer avec certitude mais les  $\sigma$  seulement. Avec ce séduisant système sont reléguées au rang des *vieilles barbes* les  $\text{♀}$  qui, par injustice du sort, ne sont pas munies de *forceps*.

Ce système déterminateur exclusif semble un défi jeté à un autre progrès en marche, le féminisme en voie de devenir une réalité palpable. Mais, en patronant une innovation, sait-on bien réfléchir aux portées pratiques qui en découlent? Et la raison n'est-elle pas quelquefois en opposition absolue avec le résultat décisif escompté? Le système innovateur présenté comme admirable, l'est-il pour tous, sans conteste, ou seulement établi à l'usage de quelques rares privilégiés de la nature? Il est très délicat de répondre à ces points d'interrogation et la sagesse unie à l'expérience m'incite à laisser chacun se prononcer à sa guise, car c'est là un vaste champ, très productif à la controverse, inépuisable même au point de vue critique! Personnellement (c'est une explication, non une excuse), je redoute de m'engager les yeux fermés et le cœur soulagé d'un poids lourd, dans le déterminisme sexuel absolu qui me semble devoir être parfois entravé par des poils (synonyme de cheveux) importuns.

(A suivre.)

M. PIC.

(1) Voir pour cet article les nos 394, 395 et 397 de l'*Echange*. J'ai écrit, en son temps, tout ce qu'il y avait lieu de dire — sans aller trop loin, — c'est ce qui explique la longue interruption passée. Je reprends aujourd'hui l'article interrompu, pour présenter quelques réflexions de grande actualité, en m'évertuant d'écrire avec la plume de circonstance, à pointe humoristique; les savants à mine sévère et les esprits trop austères au font la bonne grâce, je l'espère, de juger mon style avec quelques ménagements.