

Vadonia Steveni v. n. sareptana. Elytris rufo-luteis, ad suturam, antice paulo latoire, nigro marginatis et in disco ad medium nigro maculatis. Sarepta. — Caractérisée par le sommet des élytres, sauf bordure apicale rem-brunie, roux. La var. *bilitigiosa* mihi (= *litigiosa* Plav. nec Muls.), a la pubescence de l'avant-corps foncée et la bande suturale étroite.

Pidonia lurida v. n. notaticollis. Thorace nigro, in medio supra diverse rufo, capite diverse rufo et nigro. Chartreuse (Pic).

Cryptocephalus bidens v. n. semilimbaticollis [Phyt.]. Thorace violaceo, lateraliter viride limbato, elytris viridibus. Salonique.

Orsodacna lineola v. n. innotatipennis [Phyt.]. Capite thoraceque rufo brunneis, elytris luteis, membris pro majore parte testaceis. Allemagne.

O. lineola v. n. luteoapicalis. Capite thoraceque rufescens, pro parte iridescentibus, elytris piceis, ad humeros luteo lineatis et apice luteo notatis. Eubée.

Oncocepala incisa n. sp. [Phyt.]. Oblongo-subovatus, elytris lateraliter paulo incisis, niger, tuberculo frontale et tuberculis thoracis rufis, elytris pro majore parte rufo marginatis, diverse sculptis, tibiis pro parte rufis. Long. 4 mill. Madagascar. — Diffère de *Perrieri* Frm. par la forme des élytres, l'absence de macule rousse basale sur ces organes.

O. Madoni n. sp. Oblongus, subcuneiformis, niger, paulo rufo notatus, pedibus rufescens; elytris lateraliter fere rectis, diverse sculptis, costa prima diverse 4-nodosa. Long. 4,5 mill. Gabon. — Voisin du précédent avec les élytres différents.

O. ruficornis n. sp. Oblongo-elongatus, postice paulo