

Fühlhörner, die so lang als der Körper sind, haben an den Spitzen ihrer Gelenke schwarze Binden; und auf jeder Flügeldecke sind die Länge hinab vier schwarze Punkte, das von jedesmal das letzte wie verloschen aussieht. Die Flügel selbst sind rußig; der Rückenschild ist walzenförmig und ohne Erhöhungen.

Man findet ihn in den österreichischen Gärten, in denen Lindenalleen angebracht sind, sparsam.

§. 10.

### Gebrandmarkter Holzbock.

*Cerambyx pustulatus.* C. niger; thorace inermi cylindrico, medio macula ferruginea.

**Beschreibung.** Er ist gerade so groß, als der schwarze Holzläser (*Leptura nigra*. Lin.). Sein Rückenschild ist walzenförmig, und das ganze Insekt so ziemlich linienförmig. Die Farbe ist schwarz, ohne Glanz. Auf der Mitte des Rückenschildes sitzt ein rostfarbener Fleck, und von dieser Farbe sind auch die Schenkel an ihren Spitzen. Die Fühlhörner sind so lang als der Körper.

Seine Heimath ist Oesterreich.

§. 11.

### Eis enfärbiger Holzbock.

*Cerambyx ferreus.* C. thorace tereti muticò; plumbeo niger immaculatus.

**Beschreibung.** Das Insekt ist linienförmig, von dem Baue des gebrandmarkten Holzbockes, aber etwas größer und durchaus gleichfärbigt. Die Farbe ist wie altes Eisen, das eine Schwärze an sich genommen hat. Die Fühlhörner sind so lang als der Leib, der Rückenschild walzenförmig und ohne Erhöhungen.

Er ist um Einz zu Hause.

§. 12.