

Diagn. Fulco-rufescens; antennis æqualibus, nitidis, ~~interno~~ latere denticulatis, scabris: articulo primo longitudine secundi & tertii simul sumpta.

In Carniola media.

Antennæ articulus primus lin. 5. longus. Thorax marginatus, 3 lin. latus, $1\frac{2}{3}$. longus: angulis posticis dentatis. Elytrum lineis duabus, elevatis, tuberculosis, antice deletis: apice obtusum, thorace & capite pallidius. Pedes antennis concolores.

(*) Thorace mutico.

175. CERAMBYX Scalaris.

El. long. lin. 5. lat. $1\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 394.

Faun. Svec. 2. 697. Leptura.

FRISCH. Ins. 12. Tab. 3. fig. 1. p. 29-30.

P. PODA. Mus. Græc. p. 34.

Diagn. Niger; capite flavo; oculis & triangulo ad nucham nigris. Elytro margine toto, punctisque, flavis.

In hortis.

Antennæ æquales flavae: articulis apice nigris. Thorax latere & margine utroque flavis. Elytrum punctis 10 flavis, quorum quinque libera, cætera cohærentia cum margine interno scalam repræsentant; præter has maculas est & lineola flava versus apicem elytri posita. Corpus subtus nigrum, sed flavescente villo pubescens.

176. CERAMBYX Figuratus.

El. long. lin. $3\frac{1}{3}$. lat. $\frac{2}{3}$.

Diagn. Niger; elytri fascia, linea obliqua clavata curva, puncto que ad basim, albis.

In floribus plantarum Umbellatarum.

Thorax ovatus, villosus. Elytra apice truncata. Abdominis segmenta tria prima margine albo. Si ab uno angulo externo lineæ obliquæ elytri ducetur alia recta, tunc in elytris unitis resultaret rudis figura vultus. Elytri etiam apex albidus est.

Leptura Rustica LINN. Faun. Svec. 2. 692. hic pertinere videtur.