

Hab. in *Chinae* prov. *Se-tshuan*: ad urb. Tsa-gu-tin (Tsa-ku-ting=Li-fan-fu) (exped. G. Potanin! VIII. 1893).—Solum specimen ♂ (coll. P. Semenov).

6. *Apatophysis caspica*. sp. n.

♂. Mediocris, superne subdense cinereo-tomentosa, antennis sat fortibus longitudinem corporis fere 1.25 superantibus, inde ab articulo 3<sup>o</sup> sensim compressis, articulis 3<sup>o</sup> et 4<sup>o</sup> subaequalibus, 5<sup>o</sup> praecedentibus duobus unitis manifeste brevioris angulo apicali extero plus minusve obtuso, 6<sup>o</sup>—9<sup>o</sup> eodem angulo producto; capite normali; prothorace apice distincte angustiore quam apice, tuberculis lateralibus validis, conicis, angulis basalibus extrorsum haud porrectis, elytris ad humeros dilatatis, dein fortiter retrorsum angustatis, plus minusve crebre et manifeste usque ad  $\frac{3}{4}$ , interdum etiam ulterius punctatis (nonnunquam punctis subtilibus subobsoletisque jam inde a medio oblitteratis); metatarso postico longitudinem articuli ultimi vix vel distincte superante.

♀. Brevis et lata, prioniformis, superficie glabrâ, antennis apicalem elytrorum trientem vix attingentibus, quoad relationem singulorum articulorum cum mare congruens; capite parum incrassato; prothorace tuberculis lateralibus plerumque obtusioribus; coleopteris totum abdomen nunquam obtegentibus, castaneis (semperne?), nitidis, haud vel vix conspicue alutaceis, crebre et sat fortiter fere ad apicem usque punctatis; sterno subtilissime pubescenti, ventre fere glabro, nitido, segmento basali processu intercoxali latissime lobi-formi, coxis posticis late distantibus.

Long. ♂ 11—16, ♀ 15—16.5 mm.

Hab. totâ prov. *Transcaspicâ* nec non in *Transcaucasiâ orientali*: Derbent (A. Komarow!), fl. Rubas pr. Derbent (J. Faust!), Eldar (ora orient. prov. Tiflisiensis) (L. Mlokoszewicz! VII. 1899) Turcomania sine indicat. loci (E. Koenig! 1886), Balchan Majus (coll. anonym. F. Hauser!), Kizil-arvat (A. Tschoglow! 1892), Sumbar (O. Herz! 1894), Tedshen (ipse! V. 1889; P. Varentzow! V. 1892), Bairam-ali (P. Varentzow! V. 1895), Keletkaja (D. Glasunow! VI. 1893), fl. Kushka (in finibus Rossiae, non Afganiae, ut false indicat Hauser!) (coll. anonym. Hauser!=Sarro?).—Specimina numerosa ♂, 2 ♀ (coll. P. Semenov).