

mune de Gagny, du côté de Chelles où il l'a récoltée en nombre sur *Galeopsis tetrahit*. C'est sur cette même Labiée que M. RUTER l'a observé dans les Vosges. En même temps que ce Curculionide, M. MOLLANDIN DE BOISSY a pris un certain nombre de *Chrysomela graminis* L. qui, dans cette localité où ne se trouve ni *Tanacetum vulgare*, ni Composées du genre *Achillea*, semble s'accommoder du *Galeopsis tetrahit* sur lequel il vit en compagnie de son congénère le *Chrysomela fastuosa*.

Communications.

Note sur quelques espèces des genres

Asias SEM. et *Purpuricen*us SRV. [COL. CERAMBYCIDAE

par A. SEMENOV-TIAN-SHANSKIJ et D. ZNOJKO.

Asias Kozlovi, n. sp. — ♂. Asiadi halodendri PALL. *proximus similisque, sed minor, elytris pallidius aurantio testaceis plagâ communi nigrâ 1/3-2/3 latitudinis occupante, elytrorum apicem ad suturam tangente, in quadrante basali abrupte angustatâ, scutellum plerumque attingente, humeris maculâ parvulâ nigrâ (nonnunquam fere evanescente) signatis; capite, pronoto et elytrorum basi pilis erectis paulo longioribus incanis sat abunde obsitis, nigrâ elytrorum parte ob pubescentiam magis densam et pallidam canescenti; corpore subtus pedibusque densius et multo longius albido-pilosis; antennis tenuioribus, manifestissime albido-pilosis; pronoto minus transversali, lateribus pone medium minus fortiter dilatato, tuberculo lateraliminus a medio distante; elytris ad humeros paulo magis dilatatis; sternito abdominali ultimo apice magis manifeste exciso. Ceterum *A. halodendri similis*.*

— ♀ differt a ♂ antennis multo brevioribus, elytrorum apicem vix superantibus; elytris ad humeros minus dilatatis; pedibus brevioribus, femoribus posticis elytrorum apicem non attingentibus; sternito abdominali ultimo apice simplici; ceterum ab *A. halodendri* differt iisdem signis atque ♂.

Long. : ♂ ♀ 8,8-13 mm.

Mongolia centr. : vallis fluvii Goj-tzo, monaster. Shar-tzan-sume (expéd. P. KOZLOVI! 28-V, 3-VI-1909 : 3 specim.); Tzagan-bulyk, Ok-tzun-kuduk (ead. expéd. ! 20-28-V-1909 : 1 specim.); Gobi septentr. (expéd. ejusdem! 4-11-VI-1926 : 2 specim.). — 6 specimina (3 ♂, 3 ♀) in coll. P. SEMENOV-TIAN-SHANSKIJ, nunc in Museo Zool. Acad. Sc. U. R. S. S. et in coll. ipsius Musei.

Ab *Asiade degener* SEM. differt, praeter colorationem corporis, praesertim antennis tenuioribus et longioribus, albido-pilosis (in *A. degener*

antennae nigro-pilosae sunt), pronoto minus transversalis; elytris ad apicem magis angustatis, lateribus minus parallelis.

Asias heptapotamicus (SEM.). — !*Purpuricen* (*Asias*) *heptapotamicus* A. SEMENOV-TIAN-SHANSKIJ : *Revue russe d'Entomologie*, XX [1926], p. 48 (♀).

Ayant actuellement sous les yeux une série de 32 spécimens de cette forme provenant des environs du lac Zaïsan et des monts Saur (A. JACOBSON! 12-VI, 5-VII-1910), nous pouvons constater que l'*A. heptapotamicus* est lié à la forme typique de l'*A. halodendri* PALL. par de nombreuses formes transitoires, qu'on rencontre parfois aussi en Mongolie. Il en résulte que l'*Asias heptapotamicus* doit être considéré comme une race (sous-espèce) de l'*A. halodendri* PALL., propre au centre de l'Asie.

Asias diabolicus (RTR.). — *Anoplites diabolicus* REITTER : *Wien. ent. Zeitg.*, [1915], p. 170 (♂).

L'*Asias diabolicus* RTR. ne diffère de l'*A. mongolicus* GANGLB., outre la coloration noire de tout le corps, que par les élytres un peu plus dilatés aux épaules, par les fémurs plus allongés, par la pubescence du corps moins dense et les antennes et les pieds couverts de poils plus foncés. Tous ces caractères n'étant pas parfaitement constants dans l'*Asias mongolicus* (dont nous avons pu étudier une série de 26 spécimens de diverses localités de la Mongolie), il est à supposer que l'*A. diabolicus* ne présente qu'une race géographique (sous-espèce) de l'*A. mongolicus*.

Nous avons sous les yeux un seul ♂ de l'*Asias diabolicus*, topotype, provenant des environs du lac Zaïsan. riv. Kaldzhir (M. SIJAZOV! 30-VI-1909).

Purpuricen (*Asias*) *montanus* GAH. — *Purpuricen* (*Asias*) *montanus* GAHAN, *Fauna of Brit. India, Col.*, I [1906], p. 186. — *Purpuricen* (*Asias*) *montanus* A. SEMENOV-TIAN-SHANSKIJ : *Revue russe d'Entomologie*, VII [1908], p. 261 (♀).

Variet toto corpore nigro unicolori exceptis elytrorum epipleuris sine apice et angusto margine laterali dorsi rubido-aurantiis (ab. *moesta* nov.).

Kashmir : vallis fluminis Sind, haud procul a Sonomarg (exped. A. AVINOV! 21-VI-1912 in alt. 2.400 m. 1 specim., ♂), Kapdap (eadem exped. eodemque tempore, in alt. 1.660 m.; 1 ♀). — Duo specimina (1 ♂, 1 ♀) in coll. SEMENOV-TIAN-SHANSKIJ, nunc in Museo Zool. Acad. Scien. U. R. S. S.

Le deuxième spécimen de cette aberration extrême (♀) fut pris sur les fleurs des Ombellifères à la limite inférieure de la zone des Conifères.