

Г. Суворовъ (Петроградъ).

Новые виды родовъ *Dorcadion* и *Compsodorcadion*
(Coleoptera, Cerambycidae).

G. Suvorov (Petrograd).

Espèces nouvelles des genres *Dorcadion* et *Compsodorcadion*
(Coleoptera, Cerambycidae).

Dorcadion demokidovi, sp. n.

♂. Лобъ достаточно сильно выпуклый, часто и грубо пунктированный; чрезъ весь лобъ и темя проходитъ ясная продольная борозда; по сторонамъ этой борозды лобъ въ густыхъ коричневатобархатистыхъ пятнахъ, а на темени пролегаютъ бѣлыя, достаточно широкія полосы, не достигающія передняго края переднеспинки; остальная часть темени въ густомъ черно-бархатистомъ покровѣ; само темя сильно выпукло. Усики крѣпкіе и толстые, на $\frac{1}{4}$ не достигающіе вершины надкрылій; 1-ый членникъ ихъ красноватый, только вершина его нѣсколько затемнена; 2-й и 3-й до $\frac{3}{4}$ своей длины тоже красноватые; остальные членники черные.

Переднеспинка квадратная, достаточно выпуклая; передній край прямо обрѣзанъ, задній нѣсколько округленъ и плотно прилегаетъ къ основанію надкрылій; очень грубо морщинисто пунктирована, съ тонкою, линейною, бѣлою срединною полосой, съ небольшими бархатистыми пятнами по сторонамъ; остальная часть поверхности почти совсѣмъ голая, съ крѣпкими, достаточно острыми боковыми шипами, направленными прямо въ стороны.

Щитокъ треугольно-вытянутый, густо покрытый бѣлыми волосками.

Надкрылья овальныя, съ правильно закругленными плечами, съ основаніемъ равнымъ основанію переднеспинки, съ достаточно широкою бѣлою, по наружному краю ровною шовною полосой; вдоль этихъ шовныхъ полосъ пролегаетъ широкая черная бархатистость; остальная поверхность надкрылій совсѣмъ голая, съ двойнымъ пун-

ктиромъ: очень тонкимъ, частымъ и грубымъ, разбросаннымъ. У основанія надкрылій два очень короткихъ вдавленія: одно плечевое, другое спинное; плечевое ребро у основанія ребристо-морщинисто, далѣе къ вершинѣ достаточно рѣдко, но грубо пунктировано. Краевая бѣлая полоса въ очень рѣдкихъ бѣлыхъ волоскахъ вершина надкрылій красноватая.

Ноги крѣпкія и толстыя, красноватыя и только вершины членковъ лапокъ темноватыя; густо покрыты бѣлыми прилегающими волосками.

Низъ тѣла черный, очень тонко пунктированъ, покрытъ скудною волосистостью.

♀. Въ $1\frac{1}{2}$ раза крупнѣе ♂, съ сильно закругленно-расширенными надкрыльями, съ наибольшею шириной посрединѣ, съ едва достигающими середины надкрылій усиками. Бархатистая полоса, пролегающая вдоль шва, много шире, чѣмъ у ♂; такая же густая черная бархатистость имѣется и въ основаніи надкрылій; остальная поверхность надкрылій не гола, какъ у ♂, а покрыта густыми, темными волосками. Спинное вдавленіе достигаетъ середины надкрылій, плечевое почти достигаетъ вершины ихъ; плечевое вдавленіе въ основной половинѣ въ крупныхъ и частыхъ бугоркахъ и у самага основанія покрыто зачаточной бѣлой полоской. Плечевое ребро въ остальной половинѣ сильно морщинисто-бугристо.

♂ дл. 12 мм., шир. 5 мм.; ♀ дл. 15 мм., шир. 7 мм.

Мукузанъ, удѣльное имѣніе Сигнахскаго уѣзда, Тифлисской губ., 11. IV. 1914 (К. Э. Демокидовъ!).

Dorcadion dobrovljanskii, sp. n.

Опредѣляется легко при помощи приложенной таблички, по сравненію съ *D. scabricolle* Dalm.:

1 (2). Переднеспинка грубо и часто пунктирована, съ небольшими, тупыми, но крѣпкими боковыми шипами, направленными прямо въ сторону. Щитокъ маленькій треугольный, на вершинѣ закругленный. Надкрылья густо-черно-бархатисты, съ шовной линейной бѣлой полосой, по краямъ ровною, и съ такою же плечевой, вдвое болѣе широкою; наружная краевая бѣлая полоса по внутреннему краю ровная, столь же широкая, какъ и шовная. Ноги красноватыя, лапки буро-красноватыя. Дл. ♂ 12—15 мм., шир. 4—5,5 мм. — Закавказье.

D. scabricolle Dalm.

2 (1). Переднеспинка въ рѣдкомъ, но грубомъ пунктирѣ, съ болѣе крѣпкими и болѣе острыми боковыми шипами, направленными

также прямо въ сторону. Щитокъ вдвое бóльшій при тѣхъ же размѣрахъ жука, треугольный, на вершинѣ закругленный. Надкрылья между шовной и плечевой полосой совсѣмъ голы, очень тонко пунктированы, въ силу чего представляются нѣсколько матово-черными; шовная и плечевая бѣлая полосы по краямъ очень неровныя, въ очень скудныхъ волоскахъ, почти одинаковой ширины; наружная въ такихъ же рѣдкихъ бѣловатыхъ волоскахъ, по вну треннему краю неровная, какъ-бы изъѣденная, у вершины сливающая съ плечевой. Всѣ ноги красноватыя. Дл. ♂ 12 мм., шир. 4,5 мм. — Эриванская губ.: сел. Куки.

D. dobrouljanskii, sp. n.

Dorcadion goktshanum, sp. n.

D. goktshanum, sp. n., весьма схожъ съ *D. maljuzhenkoi* Pic, что видно изъ прилагаемой таблички:

1 (2). Шипы переднеспинки значительно крѣпче, достаточно остры. Щитокъ съ замѣтно выпуклыми боковыми сторонами, съ совсѣмъ острою вершиною. Надкрылья ♂ коричнево-бархатистыя, на вершинѣ не имѣютъ бѣлой полосы; надкрылья ♀ свѣтло-сѣро-бархатистыя. ♂ дл. 12 мм., шир. 5 мм. — Кавказъ, Елизаветполь.

D. maljuzhenkoi Pic.

2 (1). Шипы переднеспинки маленькіе, совсѣмъ тупые. Щитокъ съ прямолинейно сходящимися къ вершинѣ боковыми сторонами и на вершинѣ закругленный. Надкрылья всегда съ ясною, короткою, бѣлою полосой на вершинѣ; у обѣихъ половъ черно-бархатистыя. ♂ дл. 11 мм., шир. 4,5 мм.; ♀ дл. 15 мм., шир. 6 мм. — Озеро Гокча.

D. goktshanum, sp. n.

Dorcadion armenum, sp. n.

Болѣе всего схожъ съ *D. sulcipenne* Krtz.

Лобъ и темя съ яснымъ продольнымъ килемъ; по обѣимъ сторонамъ кия на темени широкія коричневатобархатистыя полосы.

Переднеспинка поперечная, почти квадратная, съ короткими тупыми, но очень крѣпкими боковыми шипами; срединная бѣлая полоса широкая, по обѣимъ сторонамъ ея расположены очень широкія коричневатобархатистыя полосы, боковыя стороны ея не покрыты бархатистымъ покровомъ, скудно волосисты и тонко пунктированы.

Щитокъ треугольный, на вершинѣ закругленный; поверхность его вдавлена.

Надкрылья коричневато-бархатистыя, съ узкою, линейною, бѣлою шовною полосой; вдоль этой полосы пролегаетъ густая, широкая, коричневато-бархатистая полоса. Надкрылья съ двумя ясными продольными вдавленіями: плечевымъ, достигающимъ почти вершины надкрылій, и спиннымъ, доходящимъ до половины ихъ.

Ноги крѣпкія, толстыя, красноватыя, покрытыя тонкими, достаточно длинными, прилегающими волосками.

♂ дл. 12 мм., шир. 5 мм.

Закавказье: озеро Гокча, VI. 1902 (Елачичъ!).

Dorcadion borodini, sp. n.

1-й и 2-ой членики усиковъ совсѣмъ красные, 3-й и 4-ый на вершинѣ черноваты, остальные буроваты; 1-ый по длинѣ равенъ 2-ому и 3-ему, взятымъ вмѣстѣ.

Переднеспинка поперечная, въ $1\frac{1}{2}$ раза шире своей длины, съ короткими, но крѣпкими боковыми шипами, съ широкою срединною бѣлою полосой и съ очень широкими боковыми бѣлыми полосами.

Надкрылья съ правильно закругленными плечами, съ боковыми сторонами, постепенно расширяющимися до середины и также постепенно суживающимися къ вершинѣ. Плечевая бѣлая полоса очень широкая, почти въ четыре раза шире основной полосы; спинная полоса у основанія надкрылій соединяется съ плечевой полосой, втрое уже ея и не достигаетъ вершины надкрылій; шовная полоса на вершинѣ соединяется съ плечевой.

Всѣ ноги сплошь красныя, только основанія члениковъ лапокъ темноваты.

♂ дл. 10,5 мм., шир. 3,5 мм.

Ставропольская губ.: станица Прасковья (Д. Н. Бородинъ!).

Dorcadion karsense, sp. n.

Лобъ густо покрытъ буровато-бѣлыми, прилегающими волосками; чрезъ весь лобъ, темя и средину переднеспинки пролегаетъ тонкая срединная борозда; по сторонамъ продольной борозды темени пролегаютъ широкія коричневато-бархатистыя полосы; остальная поверхность темени въ густыхъ буровато-бѣлыхъ, прилегающихъ волоскахъ. Усики толстые, крѣпкіе, не достигающіе вершины надкрылій на $\frac{1}{3}$ ихъ длины; 1-ый членикъ красноватый, очень толстый, по длинѣ равный длинѣ послѣдующихъ двухъ; остальные членики совсѣмъ черные.

Переднеспинка поперечная, почти квадратная; поверхность ея съ двумя широкими, коричневато-бархатистыми полосами, служащими продолженіемъ бархатистыхъ полосъ темени; остальная поверхность

въ густыхъ буровато-бѣлыхъ волоскахъ. Шипы крѣпкіе, достаточно острые, направленные прямо въ стороны.

Надкрылья овальные, съ наибольшею шириной посрединѣ, сильно выпуклыя, съ двумя широкими плечевыми и спинными буровато-бѣлыми полосами, сливающимися между собою у основанія и на вершинѣ надкрылій; шовная полоса достаточно широкая, по наружному краю неровная, вдвое уже спинной и плечевой полосъ, которая почти одной и той же ширины; краевая буровато-бѣлая полоса очень широкая, покрывающая всю подогнутую часть надкрылій.

Ноги очень крѣпкія, толстыя, красноватые, густо одѣты буровато-бѣлыми прилегающими волосками.

♂ дл. 12 мм., ширина 5 мм.

Окрестности крѣпости Карса.

***Dorcadion scabricolle elisabethpolicum*, subsp. n.**

Этотъ подвижъ — локальная форма, водящаяся въ окр. Елисаветполя. Отличается отъ типичнаго *D. scabricolle* Dalm. меньшей величиной, болѣе широкими бѣлыми полосами надкрылій и двумя короткими бѣлыми полосками у ихъ основанія, которыхъ у типичнаго *scabricolle* Dalm. совсѣмъ нѣтъ или онѣ представлены зачаточными точками.

D. scabricolle Dalm: ♂ дл. 10—16 мм., шир. 3,5—5 мм.

D. scabricolle elisabethpolicum Suvoг: ♂ дл. 10—13 мм., шир. 3,5—4 мм.

***Dorcadion euxinum*, sp. n.**

♂. Лобъ сильно выпуклый, грубо, но рѣдко пунктированный; темя плоское, съ срединною бѣлою полосой и съ двумя коричнево-бархатистыми пятнами по ея сторонамъ; чрезъ весь лобъ и темя пролегаетъ тонкая борозда. Усики достаточно толстые, едва достигающіе середины надкрылій, черные, 1-ый членикъ по длинѣ почти равенъ 3-му.

Переднеспинка поперечная, почти квадратная, сильно выпуклая, съ срединною бѣлою полосой, достаточно грубо, но рѣдко пунктированная, съ небольшими, тупыми, но очень крѣпкими въ основаніи боковыми шипами, направленными прямо въ стороны. Щитокъ нормально треугольный, на вершинѣ закругленный; покрытъ бѣлыми прилегающими волосками.

Надкрылья достаточно выпуклы, съ круто закругленными плечами, съ боковыми сторонами параллельными до середины, далѣе постепенно суживающимися къ вершинѣ, съ широкимъ и правильнымъ вершиннымъ закругленіемъ; густо-черновато-бархатистые. Пле-

чевая бѣлая полоса широкая, по внутреннему краю неровная, въ основной половинѣ въ мелкихъ густо-черныхъ бархатистыхъ пятнахъ; спинная вдвое уже плечевой, передъ вершиною съ нею сливающаяся, покрытая въ основной половинѣ черно-бархатистыми пятнами; шовная бѣлая полоса втрое уже плечевой, линейная, по наружному краю ровная; краевая бѣлая полоса очень широкая, по внутреннему краю ровная, въ основной половинѣ въ мелкихъ бархатисто-черныхъ пятнахъ.

Ноги достаточно крѣпкія и толстыя, красноватыя, въ густыхъ бѣлыхъ прилегающихъ волоскахъ.

♂ дл. 11,5 мм., шир. 4 мм.

Новороссійскъ, V. 1909 (Н. Н. Богдановъ - Катковъ!).

Dorcadion daratshitshagi, sp. n.

Весьма схожъ съ предыдущимъ видомъ; отличія видны изъ слѣдующей таблички:

1 (2). Основаніе переднеспинки по ширинѣ замѣтно много меньше основанія надкрылій; отъ прямоугольныхъ плечевыхъ закругленій, боковыя стороны надкрылій до середины параллельны; спинная бѣлая полоса въ густыхъ бархатисто-черныхъ пятнахъ; бархатистость надкрылій черновата; ноги красноваты.

D. euxinum, sp. n.

2 (1). Основаніе переднеспинки по ширинѣ равно ширинѣ основанія надкрылій; боковыя стороны надкрылій отъ ихъ основанія, правильно закругляясь, имѣютъ наибольшую ширину посрединѣ; спинная бѣлая полоса пятенъ не имѣетъ; бархатистость надкрылій свѣтло-коричневая; ноги еще болѣе красныя. ♂ дл. 11 мм., шир. 4 мм.

Эриванская губ.: Дарачичагъ (Д. М. Малюженко!).

D. daratshitshagi, sp. n.

Dorcadion kagyzmanicum, sp. n.

Лобъ достаточно выпуклый, въ густыхъ желтоватыхъ волоскахъ. Темя въ такихъ же желтоватыхъ волоскахъ, съ двумя свѣтло-коричневато-бархатистыми пятнами. Усики по длинѣ достигаютъ $\frac{2}{3}$ длины надкрылій; 1-ый ихъ членикъ красноватый, остальные буроватые.

Переднеспинка совсѣмъ квадратная, сильно выпуклая, передній и задній края прямо обрѣзаны; съ короткими, тупыми, но крѣпкими въ основаніи боковыми шипами; густо покрыта свѣтло-коричневатою бархатистостью, съ широкою бѣлою полосой.

Щитокъ большой, треугольный, на вершинѣ острый, густо покрытый желтовато-бѣлыми волосками.

Надкрылья овальныя, слабо выпуклыя, съ правильно закругленными плечами, съ основаніемъ равнымъ основанію переднеспинки,

съ наибольшою шириной посрединѣ. Поверхность въ густомъ свѣтло-коричневатомъ бархатистомъ покровѣ, съ широкою, линейною шовною полосой, вдоль которой пролегаетъ густая темно-коричневатая бархатистая полоса, пропадающая у вершины.

Ноги достаточно крѣпкія, красноватыя; густо покрыты тонкими бѣлыми прилегающими волосками.

♂ дл. 11 мм., шир. 3,8 мм.

Карсская обл.: Кагызманъ.

У всѣхъ видовъ *Compsodorcadion* группы *C. cephalotes* В. Як. усики черные. Различаются они слѣдующимъ образомъ:

1 (4). Шипы переднестинки острые, очень длинные, направленные прямо въ стороны.

2 (3). Плечевая бѣлая полоса надкрылій очень широкая, по внутреннему краю ровная; спинная состоитъ изъ ряда удлинненныхъ бѣлыхъ полосокъ. Усики почти достигаютъ вершины надкрылій.

♂ дл. 23 мм., шир. 7,5 мм.

Балхашъ, IV. 1886 (А. М. Никольскій).

***C. cephalotes* В. Як.**

3 (2). Плечевая бѣлая полоса надкрылій еще шире, спинная отсутствуетъ. Усики много короче, кончаясь на $\frac{2}{3}$ длины надкрылій.

♂ дл. 23 мм., шир. 8,2 мм.

Тургайская обл.: Калмакъ, 12. V. 1912 (колл. Семенова-Тянь-Шанскаго).

***C. turgaicum*, sp. n.**

4 (1). Шипы переднеспинки много короче, но очень крѣпкіе въ основаніи. Усики длинные, едва не достигающіе вершины надкрылій.

5 (6). Плечевая бѣлая полоса надкрылій очень широкая, по краю ровная; спинная состоитъ изъ ряда достаточно крупныхъ, бѣлыхъ пятенъ. За плечевыми закругленіями надкрылья не сдавлены.

♂ дл. 21 мм., шир. 7 мм.

Алтай: Чаръ-Чурбану, сел. Таубинское, 22. V. 1910 (А. Г. Якобсонъ!).

***C. alexii*, sp. n.**

6 (5). Плечевая бѣлая полоса надкрылій состоитъ только изъ ряда маленькихъ бѣлыхъ пятенъ; только у вершины надкрылій эти пятна сливаются въ довольно короткую бѣлую полосу; спинная бѣлая полоса совсѣмъ отсутствуетъ. Шипы переднеспинки много длиннѣе и острѣе, чѣмъ у предыдущаго вида; за плечевыми закругленіями надкрылья сильно сдавлены. ♂ дл. 21 мм., шир. 7 мм.

Акмолинская обл.: озеро Улу-Куль, 21. V. 1912 (Мальцевъ!).

***C. akmolium*, sp. n.**