

teribus 6 spinosus, flavo-pilosus. *Elytra* basi valdè deindeque obsoletè punctata, maculis numerosis irregularibus flavo-pilosis tecta, apice sub-acuta. *Sternum* tenuissimè punctulatum, flavo-pilosum. *Abdomen* confertim et tenue punctulatum, flavo-pilosum. *Pedes* tenuissimè punctulati.

OBS. Ce TYPE est voisin du T. MACULATUS Fab., dont il diffère : par les mandibules tout autrement conformées, plus courtes, plus robustes, presque renflées, et finement ponctuées ; le front presque lisse ; les antennes plus grêles, non pectinées ; le prothorax non rugueux sur les bords latéraux ; et par les élytres moins fortement ponctuées.

9. TITHOES INTERMEDIUS (Buquet Coll.) Thomson, *n. sp.*
(SYN. *T. Flavomaculatus*, Kollar *in litt.*). Patria : Natal.
Long. 50-82 mill. Lat. 18-31 mill. ♂ *Rufo-brunneo-obscurus* ; *mandibulæ nigræ*, *sat elongatæ* ; *antennæ nigræ*, *haud pectinatæ* ; *elytra flavo-pilosa et flavo-maculata*.

♂. *Rufo-brunneo-obscurus* ; *mandibulæ nigræ* *sat elongatæ*, granulosæ ; frons ferè lœvis ; *antennæ nigræ*, articulis 7-10 extus apice vix productis, tenuissimè punctulatæ. *Prothorax* tenuissime punctulatus, lateribus 6 spinosus, et flavo-pilosus. *Scutellum* flavo-pilosum. *Elytra* tenuè punctulata, anticè medio cicatricibus ovalibus 2 instructa, flavo-pilosa, posticè rotundata. *Sternum* punctatum, flavo-pilosum. *Abdomen* flavo-pilosum. *Pedes* obsoletè punctati, flavo-pilosí.

OBS. Ce TYPE se rapproche du T. CONFINIS de Laporte, mais en diffère par les mandibules moins robustes, moins fortement granuleuses, le front presque lisse, non sinué, les antennes plus courtes, le prothorax moins fortement 3 tuberculeux, et par les élytres à cicatrices antérieures de points bien plus apparents, et à vestiture pubescente tout autre.

10. TITHOES ARABICUS Thomson, Djedda, Arabia. ♀.

Long. 70 mill. Lat. 22 mill, *Brunneo-niger*, *nitidus*, *immaculatus* ; *elytra basi sat valde et sparsim punctulata*.

♀. *Brunneo-niger*, *nitidus*, *immaculatus*. *Caput* inter oculos scabrosum, occiput granulosum ; mandibulæ grossè punctatæ ; antennæ nec pectinatæ, corporis dimidium nec attingentes, artic. 7-10 extus apice paulo prolongatis. *Prothorax* lateribus 6 spinosus et scabrosus, anticè valdè punctatus, medio bi-elevatus et lœviter punctulatus. *Elytra* basi sat valdè et sparsim punctulata deinde lœviter corrugata, longitud. obsoletèque 4 carinata, apice rotundata. *Corpus* subtilis nitidum. *Sternum* tenuè et valdè confertim punctulatum. *Abdomen* ferè lœve. *Pedes* tenuissimè punctulati.

OBS. Très-voisin du T. CAPENSIS White, dont il diffère cependant par le prothorax fortement ponctué antérieurement, ainsi que par les élytres fortement et largement ponctuées à leur base.

(4). G. ZELOGENES Thomson, G. N. ($\xi\eta\lambda\omega\varsigma$, émulation, $\gamma\epsilon\nu\omega\varsigma$, race). G. CACOSCELIS Newmannii *valdè similis*, *sed ♂ antennis alio modo ædificatis et multum brevioribus, præcipue differt*.

♂. *Corpus* elongatum. *Caput* prothorace longius ; mandibulæ magnæ, falciformes, capite multum longiores, dextra apice simplice acuta, sinistraque apice bifida ; oculi valdè distantes, sub-grossè granulati ; palpi maxillares labialibus multum longiores ; *antennæ* dimidium corporis vix attingentes, robustissimæ, fimbriatæ, pectinatæ, 12 articulatæ, scapo breve crasso, artic. 3^o cæteris singulis longiore, 4-5-6 gradatim decrescentibus extus apice pectinatis, 7-11 sub-æqualibus fimbriatis, pectinatis, ultimo obtuso, 3-12 subtus excavatis (3^o usque versus extremitatem integro excepto). *Prothorax* transversus, lateribus medio spinosus. *Elytra* convexa, elongata, apice obtusa. *Prosterni* et *mesosterni* appendices laminiformes, angustæ. *Abdominis projectura inter coxalis trian-*