

élargies; enfin le prothorax a une tout autre forme et les élytres sont pubescentes, comme chez les *D. thracicum* Küst ou *D. pedestre* L., mais elle diffère de ces dernières espèces par sa taille, sa forme, ses antennes, son coloris, etc.

26. *DORCADION AURATUM*, TOURN. *Souram*.

♂ long. 11 mill., larg. 4 mill.; ♀ inconnue.

Oblong, noir; pattes et premier article des antennes d'un roux testacé. Tête assez fortement mais peu densément ponctuée, marquée, sur le milieu, d'une carène longitudinale lisse, brillante, qui est encore divisée par un fin sillon longitudinal; cette carène s'arrête sur une dépression transversale qui est située un peu au-dessus de l'insertion des antennes; vertex finement sillonné et marqué, de chaque côté de ce sillon, d'une tache subtriangulaire pubescente noirâtre; face très-finement recouverte d'une pubescence grisâtre qui voile une partie de la ponctuation; antennes des trois quarts de la longueur du corps assez fortes et robustes; premier, deuxième article et base du troisième garnis d'une pubescence jaunâtre, sommet du troisième et suivants finement pubescents de brun. Prothorax un peu plus large que long, faiblement échancré à son bord postérieur, fortement élargi sur ses bords latéraux en un tubercule long obtus, placé exactement au milieu de sa longueur; moyennement convexe en dessus, fortement élargi sur ses bords latéraux en un tubercule long, obtus, placé exactement au milieu de la longueur; dessus moyennement convexe, fortement très-densément et subgranuleusement ponctué surtout sur les côtés, marqué dans son milieu d'un faible sillon longitudinal qui est maigrement recouvert d'une pubescence d'un blanc grisâtre. Scutellum recouvert d'un duvet blanc et marqué, sur le milieu, d'un fin sillon longitudinal glabre. Élytres d'un tiers plus larges à leur racine que la base du protho-

rax; angle huméral relevé en une carène assez saillante mais peu prolongée; marquées, au-dessus de celle-ci, d'une fossette courte, peu profonde; densément recouvertes, en dessus, d'une pubescence d'un brun foncé; ornées, chacune, d'une fine ligne suturale et d'un fin rebord externe d'un blanc de neige; de trois bandes entières, d'un point préscutellaire et de quelques taches postérieures formées par une pubescence dorée soyeuse; la première bande part de la base de l'élytre, entre l'angle huméral et le scutellum, se dirige en ligne droite vers l'extrémité, où elle se réunit à la seconde qui est humérale; la troisième est située sur le repli latéral, part de la racine au-dessous de l'angle huméral et côtoie sur toute sa longueur la ligne blanche externe; le point préscutellaire est formé par un rudiment de ligne et se trouve placé à la racine de chaque élytre entre la première bande dorée et la ligne suturale; les taches postérieures sont situées sur le dernier tiers des élytres et sont rangées assez régulièrement presque en ligne; la fossette humérale et la base de la première ligne dorée offrent quelques gros points. Dessous du corps, densément et finement ponctué, densément recouvert d'une pubescence courte d'un gris cendré; segments abdominaux étroitement bordés de testacé. Pattes finement recouvertes d'une pubescence grise et marquées de petits points dénudés.

*Rapports et différence.* — Je ne puis placer cette espèce que dans le voisinage des *D. lineatum* F., ou *D. vittigerum* F., quoiqu'elle ait peu de rapports avec celles-ci; elle diffère également complètement du *D. sericatum* Kryn, dont elle rappelle un peu le coloris.

(La suite prochainement.)