

- * Oliv. Ent. IV. 73. p. 9. 7. T. 2. f. 16. —
Enc. Meth. *Lept.* n. 11.
- * Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 42. *Lept.* Sect. II.
- * Panz. Fn. G. LXIX. 11. * Ent. p. 269. 9.
- * DeGeer Ins. V. p. 132. 7.
- * Hoppe Ent. Taschenb. 1796. p. 170. 18.
- * Schrank En. Ins. p. 153. 287.
- * Cederh. Fn. Ingr. n. 294.
- * Müll. Zool. Dan. Pr. p. 94. 1056.
Vill. Ent. I. p. 261. 6.
- * Schæff. Icon. Tab. 39. f. 2.
Harrer Besch. I. p. 220. 365.
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 285. 3.
Gleditsch Einl. II. p. 88.
- * *Var. β. L. rubra.* * Scop. Ent. Carn. p. 46. 148.
Loc. *Europa.*
- ♀ 23. *Variicornis. f).* Nov. Spec.
Loc. *Curlandia?*
- ♂ 24. *Virens.* * Fabr. S. El. II. p. 358. 20. * Ent.
S. I. II. p. 342. 16. * Mant. I. p. 158.
12. * Sp. Ins. I. p. 247. 8. * S. Ent.
p. 197. 6.
- * Linn. Fn. Sv. n. 682. * Syst. Nat. I. II.
p. 638. 7. * ed. Gmel. I. IV. p. 1870. 7.
- * Oliv. Ent. IV. 73. p. 9. 8. T. 2. f. 14. —
Enc. Meth. *Lept.* n. 15.

f) LEPT. VARIICORNIS: thorace scabro posteriorius bipulvinato, nigra, elytris luteis apice præmorsis, antennis nigro luteoque annulatis. A Dom. Schoen in Durben Curlandiæ, benevole communicata. Statura *Lept. rubræ* Linn. Fabr. & maximis ejus exemplaribus æqualis. Antennæ corpore breviores, articulis 3 baseos, tribusque, apicis, nigris; 4, 5, 6 & 8 basi luteis apice nigris, 7:0 toto nigro. Caput nigrum immaculatum, longius quam in *L. rubra*. Thorax muticus, niger immaculatus, griseo-pubescens, totus scabrosus; antice angustatus, posteriorius sensim dilatatus, sed ante basin sinuatam constrictus; dorsum parum convexum, sed posteriorius pulvillum bilobum vel cordatum æmulans. Elytra tota rubro-testacea, crebre & evidenter rugoso-punctata, apice oblique præmorsa. Corpus subtus & pedes, nigri immaculati. DALM.