

16. *Leptura cardinalis* nob. n. sp.: *Elongata, nigra, elytrorum dimidio basali sanguineo, tibiis anterioribus mediisque partim rufo-testaceis; capite dense punctato, vertice tenue sulcato, antennis longissimis, apicem elytrorum fere (♂) vel trientem apicalem paene (♀) attingentibus, ab articulo 5° evidenter serratis; prothorace latitudine longiore, convexo, antice constricto, lateribus leviter rotundato, ante medium latissimo et gibboso-ampliato, ante basin transversim profunde impresso, in disco impressionem versus fortiter declivi, longitudinaliter sulcato, in sulci fundo polito, confertim grosse punctato, breviter denseque, lateribus longius parceque pubescente; elytris elongatis, latitudine magis quam duplo longioribus, retrorsum gradatim attenuatis, apice subemarginatis, angulo exteriori recto, suturali obtusiusculo, confertim subtiliusque punctatis, in parte sanguinea flavo-, in parte apicali atra appressim nigro pilosis, antice pubescentia longiore nulla; corpore subtus confertissime punctato, griseo-pubescente; segmento anali in ♂ simpliciter truncato, in ♀ leviter emarginato et longitudinaliter subsulcato; pedibus gracillimis, tarsis posticis in ♂ tibiarum longitudine, tantum tertii articuli planta penicillata, tibiis posticis in utroque sexu apice bispinosis. Long.: 15½—18 mm.*

*Patria: Bucharia orientalis, prov. Kulaeb.*

Der syrischen *Leptura tripartita* Heyden sehr nahestehend, aber durch gestrecktere Körperform, feinere Punktur der Flügeldecken und anders gestaltetes Halsschild unterschieden. Bei *tripartita* ist dasselbe mehr kugelig, gleichmässig gewölbt, die grösste Breite befindet sich in der Mitte, bei *cardinalis* vor der Mitte an Stelle einer seitlichen, höckerigen Auftreibung. In der Färbung stimmen beide Arten im Allgemeinen überein, nur ist bei ersterer auch die Spitze der Mittel- und Hintertibien hell gefärbt. Sehr charakteristisch für *Leptura cardinalis* (♂) sind die sehr langen, die Flügeldeckenspitze fast erreichenden Fühler, und die sehr schlanken Beine. Ob die Heyden'sche Art in dieser Beziehung mit der hier beschriebenen übereinstimmt, lässt sich vorläufig nicht feststellen, da wir von derselben nur das einzige Originalstück, ein ♀, kennen, die äusseren Fühlerglieder sind bei demselben merklich kürzer als bei *cardinalis* ♀.

Ein ♂ ♀ aus Kuläb (Turkestan) in unserer Sammlung.

17. *Pogonochaerus anatolicus* nob. n. sp. ♀: *Brunneo-piceus, variegatim albido-cinereo-fusco-ochraceo-tomentosus, toto corpore parcissime, tibiis densius longiusque setosus; fronte sub-*