

Leptura hastata Sulz. Inf. tab. 5. fig. 11.

Habitat in Europa australiori.

Affinis *L. melanurae*, at elytra in omnibus rubra et futura a medio ad apicem nigra, versus apicem tamen color niger angustatus. Abdominis segmenta margine villis argenteis splendent.

Mas minor abdomine magis rufescente.

2 puncta- 3. *L. nigra villosa*, elytris liuidis: futura puncto medio
ta. apiceque nigris.

melanura 4. *L. nigra* elytris rubescentibus liuidi sue: futura apice-
que nigris.

Variat saepius magnitudine duplo minore.

liuida. 5. *L. nigra*, elytris testaceis immaculatis, pedibus nigris.
Duplo maiorem varietatem e Germania accepi, at vix
distinctum.

emargi- 6. *L. atra*, elytris purpureis apice emarginatis nigris.
nata. Habitat Cajennae Mus. D. Hunter.

Corpus *L. rubra* maius, atrum, immaculatum. Elytra subholosericea, purpurea apice late emarginata, atra. Abdomen atrum segmentis basi argento nitentibus, apice bidentatum.

sanguino- 7. *L. nigra*, elytris sanguineis.
lenta.

villica. 8. *L. ferruginea*, antennis elytris pectoreque fuscis.

rubra. 9. *L. nigra*, thorace elytris tibiisque purpureis.

testacea. 10. *L. nigra*, elytris testaceis, tibiis rufis, thorace postice rotundato.

Mas videtur praecedentis, saepius copula iunctae inveniuntur.

pubescens. 11. *L. nigra cinereo villosa*: costa alarum basi testacea.
Habitat in Suecia Dom. de Pay Kull.

Affinis *L. testaceae*. Corpus totum nigrum, cinereo villosum sola costa alarum basi testacea.

virens. 12. *L. sericeo virens*, antennis fusco viridique variis.

atra. 13. *L. corpore toto nigro*.

humeralis 14. *L. nigra*, humeris abdomineque ferrugineis.

Habitat in Germania Dom. Schneider.