

16. *Phytoecia annulata*: nigra, opaca, capite thoraceque linea media albido-tomentosa, elytris dense albido-fuscoque variegatis, antennis albido-tomentosis fusco-annulatis. Long. $5\frac{1}{2}$ lin., lat. $4\frac{3}{4}$ lin.

Kopf und Halschild schwarz, sehr dicht runzelig-punktirt, ersterer bräunlich pubescent, beide mit einer, am Kopfe bräunlichen, am Halschild graulich=weiß behaarten Mittellinie; die Fühler graulich=weiß, vom dritten an fast die Hälfte der Spitze rehbraun behaart, was ihnen ein geringeltes Ansehen gibt; das Schildchen graulich=weiß und dicht behaart; Flügeldecken schwarz, glänzend, ziemlich dicht und tief punktirt, seine Oberfläche mit einem ziemlich dichten, vorne rehbraunen, nach rückwärts weißlichen Filze bedeckt, der häufig durch glatte Stellen unterbrochen ist und auf der vordern Hälfte drei, schwach angedeutete weißliche Streifen bildet; Unterseite und Beine schwarz, glänzend, graulich=weiß, an der Vorderbrust mehr rehbraun=behaart, mit schwarzen, nackten, durchleuchtenden Punkten.