

des individus qui sont entièrement noirs; d'autres qui sont de cette couleur, avec les élytres ferrugineuses, quelquefois même d'un châtain clair.

1309. *Stenopterus mauritanicus*, Luc. (Pl. 42, fig. 3.)

Long. 10 millim. $\frac{1}{2}$, larg. 3 millim.

S. capite nigro, granario; thorace nigro, anticè posticèque vittâ transversali flavescence-aureo marginato; elytris ferrugineis, posticè fuculentibus, ad suturam tomentoso-flavescence-aureo vestitis, lineâ longitudinali sat fortiter punctatâ, atque elevatâ; corpore nigro-nitido, sterno abdomineque tomentoso-flavescence-aureo maculatis; pedibus antennisque ferrugineis.

Il ressemble beaucoup aux *S. rufus* et *præustus*, avec lesquels il ne pourra être confondu à cause de son thorax, qui, antérieurement et postérieurement, et seulement en dessus, est bordé par une tomentosité d'une belle couleur d'un jaunâtre doré. La tête est noire, chagrinée comme dans le *S. præustus*, mais d'une manière moins serrée cependant. Les organes de la manducation sont de même couleur que la tête. Les antennes sont entièrement ferrugineuses. Le thorax est de même forme que celui du *S. præustus*, chagriné et tuberculé comme dans cette dernière espèce, et largement bordé, à ses parties antérieure et postérieure, par une tomentosité courte, serrée, d'une belle couleur d'un jaunâtre doré. L'écusson est revêtu d'une tomentosité semblable à celle que présente le thorax. Les élytres, pour la forme, sont semblables à celles du *S. præustus*; elles sont entièrement ferrugineuses, à l'exception cependant de leur extrémité, qui est légèrement teintée de brunâtre. La côte longitudinale que ces organes présentent est un peu plus saillante et ponctuée d'une manière plus forte et moins serrée que celle du *S. præustus*; enfin il est aussi à noter que, de chaque côté de cette saillie et surtout près de la suture, les élytres présentent un duvet d'un jaunâtre doré, moins serré que celui que l'on voit sur le thorax. Tout le corps en dessous est d'un noir brillant, ruguleusement ponctué, surtout sur la partie sternale, qui présente de chaque côté deux taches d'un beau jaune doré. L'abdomen, sur les parties latérales, est orné de quatre taches transversales de même couleur que celles du sternum, et dont la quatrième ou la postérieure est beaucoup plus petite. Les pattes sont de même couleur que les élytres.

J'ai rencontré cette espèce pendant les mois de mai et de juin, dans l'Est (environs de Bougie) et dans l'Ouest, mais plus particulièrement dans cette partie de nos possessions. Ayant rapporté en France quelques bûches de lentisque et de cytise qui avaient été coupées dans les environs d'Oran, j'ai obtenu de ces diverses espèces de bois, pendant les années 1843 et 1844, une douzaine d'individus de cette jolie espèce.

Pl. 42, fig. 3. *Stenopterus mauritanicus*, grossi, 3^a la grandeur naturelle, 3^b une mâchoire, 3^c une mandibule, 3^d la lèvre inférieure, 3^e une antenne.