

*Toxotus mirabilis* mihi Tab. III. fig. *f*.Long.  $6\frac{5}{4}$  lign. Larg.  $2\frac{1}{4}$  lign.

Niger, dense cinereo-holosericeus, elytris rufescentibus singulo fascia sinuata pone medium, antice maculis 4 nigris ornato; abdomine antennis, palpis, pedibusque rufis, cinereo tomentosus.

Cette belle espèce est noire et couverte entièrement d'un duvet soyeux très épais, qui par sa couleur grisâtre ou plutôt jaunâtre fait paraître la tête, le corselet et le dessous du corps gris-jaunâtre. Les yeux sont très noirs et assez saillants. Les antennes sont de la longueur du corps. Le corselet est plus large que la tête, l'épine de chaque côté est bien distincte et l'impression transversale à la base assez fortement marquée. L'écusson est très distinct, noir et entièrement couvert d'un duvet blanc-jaunâtre. Les élytres sont presque deux fois aussi larges que le corselet, allongées, avec les épaules un peu relevées. Elles sont rougeâtres, couvertes d'un duvet grisâtre et ont quelquefois les côtés latéraux un peu foncés, ce qui leur donne un reflet presque bleuâtre. Chacune est ornée, un peu au-de-là de son milieu, d'une bande sinueuse en forme de w remontant et de quatre points ou taches noires sur sa partie antérieure. Trois points sont disposés en triangle, c. à. d., un vers la suture, puis un au milieu, un encore vers la suture mais plus bas et le quatrième à la même distance sur le bord latéral. Ces points, de même que la bande, sont



bordés de poils couchés plus clairs que le reste des élytres. Les palpes, les antennes, les pieds et l'abdomen sont roux et couverts d'un duvet gris. Le mâle est plus petit, mais dessiné de même. Il doit être placé près du meridianus.

J'ai pris cette espèce au mois de Mai sur les fleurs de divers arbrisseaux sur les montagnes de Gadschory à 45 verstes de Tiflis.

*Rhagium rufipes* mihi Tab. III. fig. g.

Long.  $7\frac{1}{3}$  lign. Larg.  $2\frac{1}{2}$  lign.

Nigrum, nitens, griseo-holosericeum; elytris nigris florescenti-albido adpersis, singulo fascia transversa, macula magna apiceque testaceis; antennis pedibusque rufis; palpis obscurioribus.

Il est de la grandeur du *Rh. Inquisitor* auquel il ressemble un peu, mais il est ordinairement plus soyeux et a les élytres couvertes de petits toupets blanc-jaunâtres, d'un poil court, qui sont disposés presque en lignes longitudinales entre les trois carènes élevées de chaque élytre. On y voit en outre une bande jaune et transversale un peu sinuée qui n'atteint guère la suture, puis sur les deux tiers de la longueur des élytres une tache presque ronde de la même couleur, disposée entre la 4<sup>ème</sup> et la 2<sup>e</sup> ligne élevée et enfin le bout est bordé encore de la même couleur. Les antennes sont courtes et ne dépassent pas la moitié de la longueur du corps, elles sont rousses de même que les pieds. L'abdomen est noir et couvert entièrement d'un duvet