

sont fortement rétrécies vers l'extrémité. Le corselet est plus court et les rugosités plus irrégulières, plus entrecoupées et formant une espèce de croix élevée au milieu. L'extrémité des élytres est plus distinctement tronquée et plus fortement rougeâtre.

Il se trouve en Tauride, en Géorgie, en Asie mineure et dans les pays limitrophes de la mer Caspienne.

*Callidium viridescens, elongatum, fere parallelum, depressum, scrobiculato-punctatum, viridi-aeneum, pilis cinereis parce adpersum; ore, antennis, corpore subtus pedibusque fuscis; fronte subexcavato, thorace transverso, antice truncato postice subcordato, elytris longissimis, scrobiculato rugosis, humeris distincte angulatis. Long. 4 l. — lat. 1¼ l.*

Espèce rappelant le *Cal. dilatatum*, mais plus allongée et plus étroite surtout aux élytres, à corselet plus grossièrement scrobiculeux, les élytres fortement rugueuses, mais nullement réticulée et sans indices de nervures élevées. De la Sibérie orientale.

*Hylotrupes bifasciatus* Motsch., *statura H. bajuli, sed paulo latior. Subelongatus, postice attenuatus, depressus, punctatus, cinereo pubescens, ater, elytris fasciis duabus testaceis, basi leviter infuscatis; thorace transversim ovato, crebre punctato, tuberculis duabus medio, carinulis obliquis postice basisque levis, nitidis; elytris punctatis nigro et testaceo pilosis; antennis subvalidis. Long. 6 l. — lat. 2 l.*

Du nord de la Chine.

*Pronocerus dauricus, elongatus, parallelus subdepressus, punctatus, nitidus, cinereo puberulus, niger; thorace rufo; elytris plumbeo micantibus, capite breve, crebre punctato, medio canaliculato, antice transversim*